

Minn vom 10. III. 1870

Hochgeehrter Herr Professor!

Mit Vergnügen habe ich Ihr ganzes
hiesiges Schreiben erhalten und die
gewünschten Aufzeichnungen ge-
macht.

Auf dem beiliegenden Blatte fin-
den Sie die botanischen Notizen
über *Trichonema subpalustre*
Herb. Das selbe wurde mit bloßer
Sammung des Kewerds zu erst
in Bot. Reg. veröffentlicht; die
Loffelbeere findet sich in dem
Klatt'schen Catalog in der Lin.
naea.

Maly fand die Pflanze im Vermac
bei Cattaro. er ließ sie untersuchen
und wird, so viel ihm möglich ist,
senden.

Der Jan. Regierungsrath Feigl und Se-
milin haben in Cattaro Dörfer und Zö-
wisten. Die *Aurinia microphylla*
Fgl. ist noch nicht beschrieben. Der
Name kommt mir in Gortina. Der
Catalogus von und künftige zu nach
in dem Baum - Auszugnis von
der Wimmergastung von Josen
1858 vgl.

Mit sehr geringem Gehalt an
alkalischen Stoffen

aus demselben

Dr. H. W. Reichardt.

Vienne 10 marzo 70

Onorevolissimo Professore,

Con piacere ho ricevuto la d. lei gradita lettera, e fatte
le indagini da lei desiderate.

Nel foglietto unito alla borsa le sottopongo
al *Trichoneura subpalustre* Herb. Il medesimo fu
col semplice nome pubblicato per la prima volta
sul *Bot. Belg.* La descrizione si trova nel lavoro
del *Plant. Belg.* nella *Linnaea*.

Maly trovò la pianta presso *Vermac* nei d.
torri di *Cattaro*. Egli vuole esser mandato
e spedirà ciò che gli sarà possibile.

Dal Consiglio di governo Sig. Feigl e Jamzler
debbo indirizzarle tanti complimenti.

La *Aurinia microphylla* Fgl. non è ancor
descritta. Il nome corre nei Cataloghi di semi
soltanto, e compare per la prima volta nel Catalogo
di semi dell'orto di Vienna nell'anno 1858.

Con Distintissima considerazione, rimango

il suo Devotissimo
H. H. W. Reichardt.



Trichonema subpalustre Herb. (sine
diagnosi) in Edwards Bot. Beg. 1847 (XXXIII op.
totius vel ~~II~~ nov. ser.) t 40, 1. (Supra copia iconis.)

Descriptio reperitur in:
Revisione Iridearum, Auct. Dr. F. W.

Wlatt. (Conclusio). — Linnaea XXXIV, (XVIII)
1865-66. p. 669.

16. *Trichonema subpalustre* W. Herbert.

T. scapo tereti multifloro erecto demum refle.
xo folioso, foliis filiformi-ensiformibus ear.
vatis acutis striatis scapum superanti.
bus basi longe vaginantibus, spathis bi.
valvibus, valvis lanceolatis acutis, purpu.
reo-punctatis; perigonii tubo brevi, lacini.
nis lanceolatis acutis striatis albis

margine caeruleis, stigmatibus papillo-
sis. — Ic. Bot. Reg. ~~XXXIII~~. t. 40, f. 1.

Hab. Morea l. Bony St. Vincent (in Herb.
r. Berol.), ad ~~Thessalonicam~~ Thessalonicam,
et in insulis Ionicis, Herbert.

Scapus 2-3" altus; folia $\frac{1}{2}$ " lata. Spa-
thae 6" longae. Perigonii lacinae
10" longae, 2" latae.