

Trento, 4. II. 1911

Carpino Amico -

Ho fatto schizzo del mio esbano a livello
una sezione di rinvenimento del Corticium
cerinum come segue:



Lo trovai dunque i basidi molto in-
quali ed alla base delle ife ramificate,
1"2 p. crasse che raggiungono verso la metà
dei basidi, altro non vidi. I processi
arboriformi non li vidi, ma inteso che
questo fungo va subito in farina e riesce
difficile il vedere bene le singole parti sen-
za l'uso di reagenti.

Qualche volte però anche Höhnel benché
sia un distinto microscopista, vede doppio,
p. es. ha ridotto il mio Corticium Eickhe-
rianum a Pezizyphon velutinum che ha cistidi
colopali, mentre nel mio io non sono capace
di trovare che qualche basidio un po' pronu-
nente se troverò materiale fresco ten-

ÖSTERR. POSTVERWALTUNG
ADMINISTRATION
DES POSTES D'AUTRICHE

KORRESPONDENZ-
KARTE

CARTE POSTALE



Chiarissimo Signor Professore
Dr. P. A. Saccardo
Padova
R. Orto Botanico

Tempo in mezzo viaggio del Cor.
Amim acelinum.

Con cordati saluti
attenti

G. Bregantini