

Thoua Andrachnes Les. id. p. 110, t. VI. f. 3.

Epi et hypophylla, unilocularis. Peritheciis globosis adnatis, ostiis prominulis pertusis intus nigris. Sporis minimis simplicibus, oblongo-fusculis.

var B. orbiculans

Peritheciis in annulorum dispositis a Orianda - Imperialis, flg. cl. l'arbutus andrachnes

Thoua Laricis Les. id. p. 111, t. IV. f. 5.

brunneus, unilocularis. Receptaculis sporis vel subcreatis nigris, ostiis papillatis. Sporis oblongo-fusculis simplicibus fusculis.

laevis et cetera de Mitula.

Sphaeropsis Les. No. 13. p. 112

Perithecia Sphaeroides, ostiata, sporis ovatis unilocularibus fere.

Sph. conica Les. id. t. V. f. 9.

Spora. Perithecia conica celis laevibus, basi appressata ligno albicante tandem nigrescunt intus.

= Amphisphaeria conica !

A Castropo, sur le tronc d'un quercus pubescens  
« La description de Sphaeria strobilacea Fr., que l'on  
ne nous a pas, convient parfaitement à cette espèce  
et se parait indifférent que par l'absence des  
thèques. Le bois sur lequel elle se développe est percé  
d'un trou blanc qui ne peut être regardé comme  
plus tard, alors il devient noir comme s'il avait été  
brûlé. Les réceptacles sont petits, sur des surfaces  
à mesure qu'ils grossissent ils prennent la forme  
d'un cône parfait, lisse, noir, percé par une pore  
au sommet; la base est large; ils renferment

dans leur intérieur un pelpe noir, gris,  
sur le microscope, et formé de spores  
ovales, allongés, rugés et cloisonnés en  
leur partie moyenne. Le mycélium se fait  
distinquer des sphaëris, durs différenciés par l'absence  
de thèques, par l'absence de mycélium.

Septoria Ramentaceorum Le. p. 113, t. IV, f. 4

Hypophylla atra maculiformis. Peritheciis  
confertis albis minimis. Spor. filiformibus cur-  
vatis utrinque acutis medio septatis.

Sur la yaillan sur des feuilles d'un Ramentaceum  
Septoria Rhodis Le. p. 114, t. V, f. 4

Hypophylla, in maculis fuscis marginatis insidens.  
Peritheciis sparsis raris inuatis, ostiis incon-  
spicuis. Spor. filiformibus 3-4 septatis pellucidis.

A oriondas - Imperiales, sur les feuilles du Rhodis  
cotinus.

Ascochyta acerina Le. p. 115, t. V, f. 7

Hypophylla. Peritheciis sparsis, raris, inuatis, e  
macula viridi emergentibus, ostiis ~~inconspicuis~~  
inconspicuis. Spor. lineariibus, pellucidis, septatis,  
sterilibus globosis.

Dans le voisinage de Laspi, sur les feuilles de  
l'acer compertum.

Geiza phaeodoma Le. p. 97, t. IV, f. 7

Geizaria, obcavata, nuda. Disco concavo fusciscente ma-  
gine proeminente fuso. Stipite brevissimo crasso albicante.

Théloni, sur les charmes de Ramentaceum à Calais.

Geize glabre, hémisphérique d'un demi-ligne, supportée par un pédicelle  
court, épais et blanc; la cupule est d'un brun clair  
et sa marge saillante plus foncée au centre.