


*Strimatissimo liquor Professore*

nel Fan. II dei Fungi Longobardici

inseveris; fra altre cose nelle nuove, un  
Thysoverme (almeno credo d'esserne hen  
 apposto, riguardo al genere) parassita delle  
 foglie del Ranunculus Ficaria. Leve  
 mando alcune foglie e



15-20  $\mu$   
 diam. Schist;

perche  
 lo Schisto, qui unito, perche  
 Ella possa giudicare.

Si avvicina al Ph. vagans

ma oltre che per  
 l'ammontare minore degli sporange  
 questi sono sempre intercellu-

lari; non forma poi ne tubercoli ne fosse  
 nelle foglie, ma sempre una cute globulosa  
 pelata. L'episporio molto grosso e bruno  
 chiaro, il contenuto granulato o gelatino,  
 talora con qualche grossa goccia, il tutto  
 di color verdiccio di turchese. Gli sporange  
 sono sferici o globosi se fra loro distanti o  
 lenti, poligonali se stipati in serie fra le cellule  
 del palizzata. Vantaggi di parti germinare

Ma non mi riesce; nemmeno in una  
gelatina apposta che mi serve magari  
frequentemente per la gemmazione di tante  
altre specie. Il micelio è ortogono  
forma reticoli che occupano quasi tutte  
le cellule, le ife sono estremamente cili.  
Credo sia fosse una specie ben distinta,  
anzi volere decorarla del di lei nome,  
caro al culto della micologia, ma ho  
stimato bene, chiederle prima consiglio.

Perdoni i continui disturbi che  
le Anneo e un eredità di Les Doms

F. Cavara

Parigi 16/8/92.