



STAZIONE AGRARIA SPERIMENTALE
MODENA

Modena li




Fig. 1.



Fig. 3
giovane



Fig. 2.
Sezione

Gambò bulboso alla base, senza
volva; solido, bianco, o più tardi
bruniccio nella parte inferiore; liscio
o solcato nella gioventù in più
squamosetto. Anello epife nella
prima gioventù, ma è tenuissimo,
fugace, bianco.—

Cappello dapprima subgloboso-convesso,
poi piano, ed infine col centro depresso
ed a' margini (poco) rialzati, bianco-
sporco, rosso, o chiaro-bruno, speciat-
menti fino a che l'involuppo esterno
è intero. Più tardi tale membrana
si rompe in scaglie irrego-
lari, appresse, (non arriciate) che
spiccano sul fondo bianco del
cappello con un colore più scuro.
~~Cappello non striato al margine~~
lamelle bianche in tutte le
età finiscono a certa distanza
dal gambò, come in fig. 2.

Cosa può essere? L'A. cau-
peris? Ma mi è un po' troppo
scuro di cappello — e le lamelle
non si coloriscono in bruno col-
l'età. — Il A. phalloides
?

Non dovrebbe avere il gambo
vuoto!

Poi, l'odore è anche abbastanza
buono.

Infine, non so che far-
mene.

Agaricus (Lepiota) eximius
v. affinis *speciosus*