


RG 942

A



Calto 180fawco 3 / 4



B
RG. 942

STORIA
DEGLI
UCCELLI

ORNITHOLOGIA



STORIA NATURALE
DEGLI UCCELLI

TRATTATA CON METODO

E ADORNATA

DI FIGURE INTAGLIATE IN RAME
E MINIATE AL NATURALE

TOMO SECONDO.

ALL' ALTEZZA REALE DELLA SERENISSIMA

MARIA LUISA

INFANTA DI SPAGNA

ARCIDUCHESSA D' AUSTRIA

GRADUCHESSA DI TOSCANA

ec. ec. ec.



IN FIRENZE L' ANNO MDCLXIX.

NELLA STAMPERIA MOUCKIANA.

Con licenza de' Superiori.

ORNITHOLOGIA

METHODICE DIGESTA

ATQUE

ICONIBUS AENEIS

AD VIVUM ILLUMINATIS ORNATA

TOMUS SECUNDUS.

AD REGIAM CELSITUDINEM SERENISSIMAE

MARIAE ALOISIAE

HISPANIAE INFANTIS

ARCHIDUCIS AUSTRIAEC

MAGNAE ETRURIAE DUCIS


ec. ec. ec.



FLORENTIAE ANNO MDCLXIX.

IN AEDIBUS MOUCKIANIS.

Cum facultate Praesidum;



ALTEZZA REALE

L fregio nobilissimo , che l' ALTEZZA VOSTRA REALE aggiunge a questa nostra Opera , accordandole l' onore della sua Sovrana Protezione , farà una gran congettura in nostro favore per quei tempi remotissimi , ne' quali reso celebre il Vostro Nome diverrà l' epoca più gloria per la Toscana , e per l' Italia . Si rammenterà con stupore la felicità di questo suolo nella guisa istessa , che di pochi altri si rammenta in tutti gli Annali dell' uman genere , e si dirà come due Anime eccelse lungamente de-
siderate-

LETTERA DEDICATORIA.

fiderate , e per ispecial privilegio dalla Provvidenza accordate a' voti comuni della Toscana , s' unirono già in una nobile emulazione , dando alle Arti , alle Lettere , alle Scienze , e ad ogni maniera di bene operare , esempio , eccitamento , e favore . E' già stato frequenti volte ripetuto in lode di tutti coloro , che nel decorso de' tempi furono per una quasi special missione del Cielo destinati a dover fare la delizia di questo , o di quel Popolo , che con questo metodo principalmente giunsero a coltivar quelle Provincie , e quei Regni , che divennero poscia nelle nostre memorie i modelli dell' universale imitazione . Ma più di rado si sollevarono a tanta celebrità di gesta , e di nome l' Eroine dell' antichità . Camilla Regina de' Volsci , Zenobia de' Palmyreni , Semiramide degli Assiri , Tamiri degli Sciti , e tante altre , non divennero invitte , virtuose , e famose , che a fronte unicamente di temute disgrazie , e di potenti nemici , che la loro felicità , ed i loro Regni minacciavano . Ma l' ALTEZZA VOSTRA REALE collocata in un posto superiore ad ogni tentazione di orgoglio , e di vanità , tranquilla in seno della sua Real Famiglia , non per altro dovrà dirsi , che si porga all' incoraggiamento d' ogni lodevol opra , ed impresa , che per grandezza d' animo , e d' intelletto . E chi potrà pertanto nell' universale ammirazione resistere alle prime impressioni , che farà nella sua opinione tutto ciò , che si veda di fatto , o di pubblicato sotto i Vostri veneratissimi auspici , fregiato del Vostro Nome , e dalla Vostra special Clemenza favorito , e protetto ? Questa ferma fiducia sostiene in gran parte il nostro coraggio già capace di perdersi nella vastità , e difficoltà dell' impresa , che abbiamo fra mano ; e ci sembra quasi un' anticipata ricompensa di quelle fatiche , che adopreremo per condurla ad onorevole fine , l' avere adesso questa favorevole opportunità di proteggerci profondamente inchinati appiè del Trono ,

Di V. A. R.

Umiliissimi Servi e Sudditi
Dott. SAVERIO MANETTI.
LORENZO LORENZI.
VIOLANTE VANNI.

(1.)

BIBLIOTECA ORNITOLOGICA

OSIA

CATALOGO DI TUTTI GLI AUTORI

fino ad ora editi, che hanno trattato tanto in generale, che in particolare degli UCCELLI, o di cose ad essi in specie modo attinenti; il qual Catalogo non solo serve a dar notizia degli stessi Autori, la maggior parte de' quali non sono citati in quest' Opera, se non abbreviati, ma ancora per dare intiera informazione delle Opere loro, e delle varie edizioni di esse.

A CARETE. Relation des Voyages dans la Rivière de la Plate, &c de la par terre au Perou. → Edition normam, & tempus non indicamus, quia editionem non vidimus.
ACUSSIA (Charles d'Acussia). La Fauconnerie, avec les portraits au naturel de tous les oiseaux. Roven 1644. in 8.

ACTA Bononiensia. V. Commentarios.

— Breslavien. Breslaviae. Lingua Germanica conscripta in 4.
— Dantiscana. Dantisca. Lingua Germanica in 4.
— Edemburgensis. Edemburgi. Lingua Anglicana in 4.
— Eruditorum Liphiensis. Lipsiae in 4. Quorum Volumen primum prodiit 1681.
— Hafniensis. Hafniae in 4.
— Harlemensis. Harlemi. Lingua Belgica in 8.
— Helvetica. Basileae in 4, quorum volumen primum prodiit anno 1731.
— Physico-Medica Academias Caecareas Leopoldino-Carolinac, exhibentia Ephemerides. Norimbergae in 4.
— cum fig. = Ephemeridum Sinopsis a Kellnerio exposita. V. Kellnerum.
— Nova eiusdem Academiae. Ibidem cum fig.
— Svetica. Hamburgi. Lingua Svecica in 8.
— Academiae Regiae Scientiarum Parisiensis. Parisis in 4. = Amstelodami in 8. Lingua Gallica titulo Historie de l' Académie Royale &c.
— Societatis Regiae Scientiarum Upsaliensis. Holmiae in 4. = Regia haec Societas anno 1720. ABA sua edere incepit.
— Societatis Regiae Scientiarum Berolinensis. Berolini in 4.

ADANSON. Histoire Naturelle du Sénégal. Parisis 1759. in 4. cum figuris.

AEILIANS (Claudi). De Natura Animalium Libri XVII. Tiguri apud Gesneros fratres in fol. 1556. eum alii Aelianni Graciss & Latinis Operibus, Alia extat editio in 12. 1611. ex interpretatione Petri Rillii,
& Conradi Gelneri. = Genevæ 1616. in 12. = Londini 1744. in 4. Tom. 2. cum animadversionibus Conradi Gesneri, & Danielis Trilleri, cura Abrahami Gronovii.

AGNESII (I. Baptiste). De Avibus, quae in Albutera palude prope Valentiam degunt Liber. Extat in eius operibus Poeticis editio 1545.

AITINGER (Conradus). Casellis 1654. 1681. in 4. Lingua Belgica cum tabulis.

ALBERTUS (cognomento Magnus) De Animalium proprietatibus Lib. XXVII. in fol. Mantuae 1479. Editio rarissima litteris initialibus vario colore depictis. Vener. 1519. cum Friderici II. Imperatoris de Falconibus. Item: De virtutibus Herbarum, Lapidum, & Animalium; cum Opusculo de Falconibus, Aistribus, & Accipitribus. Lugduni 1596. in 12. = Amstelodami 1648. in 8. & alibi.

ALBERTINUS (Aegidius). Munchen in 4. 1613. = Agit Lingua Germanica de feris ac mansuetis Quadrupedibus nec non de Animalibus repenis, Avibus, & Piscibus.

ALBINI. The natural History of English Som Birds. Londini 1737. 1741. in 8. = Icones consinet maris, foeminae, & Ovi, necnon quorundam additistorum naturalem in primis canarinorum Passerum, quorum curam praescribit.

ALBINUS, (Eleazar Piñor). Natural History of Birds. London 1731. Tom. 2. = Hoc est Naturalis Avium Historia, in qua 101. Aves coloribus illuminatae reprobantur = Eiusdem Anglicæ alia extat editio in 3. Vol. Londini. Vol. 1. & 2. 1738. Vol. 3. 1740 = Eiusdem Naturalis Avium Historia tribus Tomis, ac 306. Tabulis depictis comprehensa, ex Anglico idiomate in Gallicum conversa cum notis Derbamii. Haec comitum 1750. in 4.

— Eiusdem Naturalis Historia Avium Angliae, & præcipue canis aestimatarum, cum illarum ovis. Anglicæ conscripta. Londini 1737. in 8.

ALDROVANDI (Ulysses). Ornithologia, sive de Avium Historia Lib. XX. Tomis tribus comprehensa in fol. Bononiae, T. II.

BIBLIOTHECA ORNITHOLOGICA

SIVE

AUCTORUM OMNIUM CATALOGUS,

quorum Opera editæ sunt, & qui de AVIBUS vel in genere, vel in specie, rebusque aliis ad Aves signanter spectantibus scripserunt; qui Catalogus non solum ad tradendam corundam pleniorum notitiam interfuit, cum priores, dum ipsorum mentio in hoc Opere facta est, contraria forma vominentur, verum etiam ad illorum operum ideam, normam, & editiones declarandas plaustrum praefabuit.

- noniae . Tomus primus 1599. qui Libros XII. comprehendit : Tomus secundus Librum XIII. ad XVIII. inclusive . Tomus Tertius 1603. & binos ultimos Libros continet . = Editio altera prodita Bononinae 1634.
- Tomi tres pariter insimil prediere Francofurti in folio , cum Tabulis similiter ligneis 1610.
- Aldrovandus paulo post Bellonii , & Gesneri tempora , anno scilicet 1610. de Avibus scriptis . Plura ab his eximo cum indicio collegit , plurimisque novas species descripsit . Quae ad Avium Historiam spectantia habet hic Author , multa , aliorum testimonio , vel in Autorum Libris relata , vel a relatoribus quibuscumque tradita , parum de veritate sollicitus , cumulavit , doctissimus vero nullam antiquitatis eruditioem circa ipsas silvas ; icona ausem , quae Avium dedit , Gesnerianis equiparanda sunt .
- ALPINI (Prospere) . Historia Aegypti naturalis &c. Lugduni Batavorum 1735. in 4. Vol. 2.
- ANALECTA Transtalpina . Scil. Epitome Commentariorum Regiae Scientiarum Academiae Sveciae pro annis 1739. 1752. Veneris 1762. Tom. II. in 8. cum Tabulis aeneis . = Nonnulla ad Historiam Avium pertinentia Svecico idiomate in supradictis Commentariis descripta , in Latinum versa exponuntur .
- ANDERSON. Histoire Naturelle de l'Islande , & de Groenlande , du Détroit de Davis , & d'autres Pays situés sur le Nord , traduite de l'Allemand . Parisiis 1750. Vol. 2. in 12.
- Anonymous. Description of three hundred Animals , vix . Beasts , Birds , Fishes &c. hoc est : Descriptio 300. Animalium , videlicet Quadrupedum , Avium , Piscium &c. Londini 1753. in 8. cum figuris aeneis .
- A Description of a great variety of Animals &c. Scil. Descriptio magnae varietatis animalium &c. Londoni 1753. in 8. cum Tab. aeneis 90.
 - A new , and complete Dictionary of arts , and Sciences &c. Scil. Lexicon novum Artium , & Scientiarum &c. Londini 1754. in 2. Vol. in 8. cum Tab. 300. aeneis . Quamplurima animalia in hoc opere describuntur , & depinguntur .
 - Claves Avium secundum methodum Kleinianam , cum additamentis nonnullis Linnaeanis . Parisiis 1754. in 8. cum figuris . V. Bomare .
 - Memoire instructif sur la maniere de rassembler , de preparer , de conserver , & d'envoyer les diverses curiosités d'Histoire naturelle &c. à Paris 1758. & vend. à Lyon in 8. cum Tab. aeneis . Capite primo metbedum , qua Aves diversis praeparationibus accommodari , ipsa que tueri longius possint , docet , loquiturque de ipsorum ovis , arque nids .
 - Système naturel du Regne animal &c. suivant les méthodes de M. Klein , d'Arteci , & de M. Linnaeus . Parisiis 1754. Vol. 2. in 8. cum fig.
- AQUAVIVUS (Belisarius) . De Aucupio per Accipitres . Neapolis 1519. in 8. = Basileae 1578.
- Eiusdem . De Venatione , & Aucupio Libri tres . Neapolis 1529. in fol.
- Instruction pour elever , nourrir , & dresser toute sorte de petits Oiseaux &c. à Paris 1698. in 12. second. edit.
- ARISTOTELIS STAGIRITAE Historia Animalium . Lugduni 1590. in fol. Textu Graeco-Latino ex Bibliotheca Iſaacii Cajabonii , cuius Librum de communis Animalium motione , nec non Librum alterum de Animalium inces- fu interpretatus est , eisque paraprases adiecit Nicolaus Leonicus . Quinque Libri de Generatione Animalium editi ibidem sunt ex interpretatione Theodori Gaza . In primum huius operi Librum commentaria adiecit Guarinonus . In partes vero Animalium Scholia editis Epbesius . Libri de Animalibus seorsim prodierunt Florentiae 1520. in fol. textu Graeco-Latino .
- Eiusdem Historia Animalium prodit . Parisiis 1533. in fol. per Gazam . = Francofurti 1587. in 4. ad diis Theophrasti collectaneis de Animalibus ; & Tolosae 1619. in fol. cum interpretatione , & nosis Scaligeri textu Greco , & Latino .
 - Eiusdem . Historia Animalium , simplici textu Greco , & Latino . Lutetiae Parisiorum 1619 in fol. Vol. 2.
 - Eiusdem . De partibus Animalium , eorumque causis Lib. 4. Parisiis 1542. in 8. = Aristotelis Operum alias autem extant editiones , quas brevissatis gratia reticemus . Addere sufficiat Aristotelem Ornithologiac fundemta iecisse , Aves e vicinia , & remorioribus locis collectas describendo , licet descriptiones , notasque characteristicas , quas dedit , minus completas tradidisset . Eiusdem vero sceltores ipsius scripta explicandi gloriam ambiendo maioris confusionis Autores fuerunt . Aristoteles Aves omnes a pedum , digitorumque configuratione , qui scilicet membrana liberi , vel intertexti sunt , in duo tantum agmina divisit , in terres nempte , & aquaticas .
- BAERII (Nicolai) . Ornithophonia , seu harmonia melicarum Avium , iuxta naturas , virtutes , & proprietates carmine Latino-Germanico , praemissis earumdem Iconibus . Bremae 1702. in 4. = Recensantur in hoc Libro Laudes Lusciniae , Luteolas , Canariae , Alaudae , Carduelis , Linariae , Acanthidis , Fringillae , Merulae , & Rubicillae .
- BALMINI (Babusla Aloisii) . Examen melissaeum , idest novarum Apicularum Colonia . Viennae Austriae 1670. in 12.
- Miscellanea Historica Regni Bohemiae in quibus natura Bohemicae telluris &c. explicantur . Pragae 1680. in fol. = Inter naturalia Avis vulgo Zlatohlavvel , Lasinis Hurteapitella describitur . Avis Regulo minor dicitur , capite luteis pennis ornato .
- BALL (Laurenii) . Museum Adolpho-Fridericianum . Upsaliæ 1746. in 4.
- BARRERAES (Petri) . Ornithologiae Specimen novum . Perpiniani 1745. in 4.
- Eiusdem . Essai sur l'Histoire naturelle de la France aequinoctiale &c. à Paris 1741. & 1749. in 12.
- Compendium huius etiam in Actis Acad. Reg. Scientiarum ann. 1741. = Ornithologia , seu series Avium in Ruscione , Pyrenaeis , arque in Gallia aequinoctiali obseruatorum . Perpiniani 1745. in 4.
- BARTHOLINI (Thomas) . De Cygni Anatome , eiusque cantu Dissertatio . Hafniæ 1650. in 4. cum notis Berlini 1668. in 8.
- Cygni

- Cygni Anatome. Hafniæ 1668. auctius a Gasparo filio edita. = Anatome brevis, plus philologiae, & singularitas est, ut vocant, dum obseruaverat Aldropandus.
- Eiusdem Acta medica, & Philosophica Hafniensis. Volumina V. Hafniæ in 4. = Volumen 1. editum 1673. cum Tabulis aeneis continet inter alia Aquilas, & Columbae anatomen pag. 6. & 274. = Vol. 2. cum Tabulis pariter aeneis editum 1675. habet Cercopithei anatomen pag. 14. De ovis Galli, & Serpentum pag. 46. In ovo, & Pulla obseruationes pag. 109. De Avium lingua pag. 191. De canali alimentorum ulu- lac ob. pag. 242. De canali alimentorum Ardeæ cum duplice ductu Pancreatico & Biliario pag. 288. Pa- venis anatomen pag. 314. Anatomen Psittaci pag. 320. Historiam muscularum Aquilæ. Vol. V. ann. 1680. editum cum Tab. pariter aeneis continet anatomen Ciconiae pag. 249. De linguae Pici martii structura mirabili pag. 251.
- BARTRAM (Io.). Observations on the inhabitants, climate, soil, rivers, productions, animals &c. at Niagara &c. Scil. Obseruationes circa incolas, clima, solum, producta, animalia, & reliqua Niagarae Fluminis in A- merica. Septentrionali &c. Londini 1751. in 8.
- BARBOLI (P. Daniello). Del Ghiaccio, & della Coagulazione. Bologna 1682. in 4.
- De demeritione Hirundinum in mari loquitur: carundemque demeritionem defendere nititur.
- BEHRENS (Rudolphi Augusfi). Von dem fremden Vogel Cacadu, wie auch wau-waven. in Act. Breslavi. 1722. = Agit de Psittaco Edwardi Tabulæ 160. & de Vulture eiusdem Tab. 2.
- BELLONIUS (Petrus). Histoire de la Nature des Oiseaux avec leurs descriptions, & mœurs portraits retirés du naturel, écrite en sept Livres. A Paris 1555. in fol.
- Eiusdem Bellonii Portraits d'Oiseaux, Animaux &c. d'Arabie, & d'Egypte. A Paris 1557. & 1618. in 4. His Autor natione Gallus contemporaneus Gesneri longa itinera circa Mediterraneum, Aegyptum, Palæstinam &c. insituit; multarum Avium novas descriptions adiecit, veteres examinando multa emen- davit, amplificauitque, primumque suis, qui per configurationis externæ, & viræ generis affinitates A- vium systematicam aliquam divisionem insituit, earumque Leonis dedit, sed incongrua, & inconcinna fe- re omnia.
- BESLERI (Michaelis Rupersi). Gazophylacium rerum naturalium. Norimbergæ 1642. Lipsiae, &c. Franco- furti 1716. & 1733. in fol. cum Tabulis aeneis num. 34. quarum nonnullæ, a V. scilicet usque ad XI. Aquilam Montanam, Hirundinem aquatica Avem mirabilis conformatio preeditam, Avem cuculliam aquatica nuncupatam, scolopacem istidem aquaticam, varias Cygni partes, ut sternum, caput, atque collum, summo artificio diffectas, tandem Rhinocerem Avem, atque Paradisacem, sive Manucodiastam ostendunt.
- BERGERON (Petri). Voyages en Afie. Hagae comitum 1735. Tom. 2. in 4. cum fig.
- BLASII (Gerhardi). Zootomia, seu Anatome variorum Animalium figuris variis illustrata. Amstelodami 1681. in 4. cum figuris aeneis. = Editio prior ibid. in 8. cusa fuerat. Totum opus in V. partes dividitur, quarum secunda Avium distinctiones, carundemque ova, pulli, ac generationem tractat.
- BLEGNY (Nicolai). Zodiacus Medico-Gallicus, sive Miscellaneorum Medico-Physicorum &c. Opera Nicolai de Bleigny, & de la Roche. Parisis in 4.
- BOCHART (Samuelis). Hierozoicon, seu bipartitum opus de Animalibus Sanctæ Scripturæ ex recensione Io. Leusden. Leydae 1692. Vol. 2. in fol. = Francofurti 1738. pariter in fol.
- BOMARE (M. Valmont de). Dictionnaire raisonné & universel des Animaux &c. Parisis 1749. Vol. 4. in 4. Authoris nomen Literis. M. D. L. C. D. B. abscondit. Animalia omnia inter quæ & Aves, in hoc Operæ nominantur non solum, sed & describuntur, atque omnium proprietates, atque in Systemate Lin- naeano, Kleiniano, & Brissoniano divisiones, & propria genera astringuntur.
- Dictionnaire raisonné universel d'Histoire naturelle. Parisis 1765. Tom. 5. in 8.
- BONANNUS (Philippus) editor, atq. illustrator Musei Kirkeriani. V. Kirkerum.
- BONTII (Iacob). Historiae Naturalis, & Medicæ Indiae Orientalis Libri VI. a Guillelmo Pisone in ordinem redacti. Amstelodami 1658. in fol.
- BORELLI (Io. Alphonsi). De motu Animalium. Romæ 1681. in 4. cum fig. = Inter animalium motus, quos magna peritis ac doctrina determinare amittit, Avium in volatu, omnibusque carundem directionibus sum in defensu, cum in adscensu vires perpendiculariter, atque explicat.
- BORLACE (Will). The natural History of Cornwall &c. Oxford in fol. Scilicet Historia Naturalis Cornubiae. Oxo- niæ 1758. in fol. cum Tabulis aeneis 28. nirdissimis. Iuxta alia rariores Cornuballiae Aves describuntur.
- BRADLEY (Richard). A Philosophical account of the Works of nature &c. Scil. Philosophae narrationes Operum naturæ &c. Londini 1721. in 4. Tabulis 27. illuminatis. = Amstelodami 1744. in 8. Belgice transla- tæ cum Tabulis aeneis 31. = Has inter nonnullæ sunt, quae mirifice quadam Aves ostendunt.
- BRISSON (A. D.). Ornithologia, sive Synopsis methodica sistens Avium divisionem in ordines, sectiones, gene- ra, species, ipsarumque varietates, cum accurate cuiusque speciei descriptione, citationibus Auctorum de illis tractantium, nominibus eis ab ipsis & nationibus impositis, nominibusque vulgaribus. Parisis 1760. Vol. 6. in 4. opus figuris aeneis adornatum.
- BROWNE (Edwardi). Relatio de Anatome Struthiocameli in Act. Eruditorum Suppl. Tom. I. an. 1692. inserta
- (Io.). Nova & genuina Animalium generatio. Lugduni Batavorum 1686. in 12.
- (Petri). A civil, and natural History of Iamaica in three parts &c. Scil. Historia civilis, & natu- ralis Iamaicæ tribus partibus digesta &c. Londini 1756. in fol. cum Tabulis aeneis 50. nirdissimis, Paris

- Part 2. describit Fossilia, Vegetabilia, Quadrupedes, Aves, Pisces, Insecta; eorumdemque usus Technici, & Medicis describuntur, ibidemque omnia systematica pertractantur.
- BRUCKMANNI (Friderici). Tractatus de Venatione, Pilcatione, & Aucupio. Spirae 1605. in 4.
- (Ernesti Ludovici) Epistolarum itinerariarum Centuriæ tres. Wolffenbutelæ in 4. Censuria 1. 1742.
- Centuria 2. 1749. cui accedit descriptio Musæ Closteriani. Centuria 3. ibidem edita, sed absque anno, neque aboluta ob auctoris mortem. = Epistola 3. Centuria 2. agit de nidozinariae Avis. Epistola 4. de Halcyone Ave. Epistola 5. De nidis Avium petrefactis. Epistola 17. De Avibus Sylvæ Hercyniae. Epistola 18. De Avibus in Germania oboiis. Epist. 50. De Regulo cristato Sylvæ Herciniae Epist. 61. De Ave incognita.
- BUCHNERI (Io. Godofredi). De Ovo Gallinaceo insolite figuræ in Voigtländia excluso. Exstat in Act. Physic. med. V. 6. obs. 81. cum figur.
- De rarioribus quibusdam Animalibus in Voigtländia degentibus. Ibid. Vol. 4. obs. 69.
- BURGHARTI (Godofredi Henrici). Iter Sabothicum. Breslaviae, & Lipsiae lingua Germanica editum 1736. in 8. cum Tabulis aeneis. = A pag. 124. usq. ad pag. 137. Aves Zothembergens enumeransur.
- BURGUNDIUS (Vincensius). Agit de Natura Avium tum Volucrum, tum Aquatilium in Libro XVI. Tom. I. O. peris, cuius titulus est: Speculum Naturale. Duaci 1624. in fol. Vol. 4.
- CAMELLI (Georgii Iosephi). De Avibus Philippensis Tractatus, in Philosophicis Transactionibus. Angl. Vol. 25. n. 305.
- CARCANO (Francesco). Libri tre degli Uccelli da preda, con un Trattato de' Cani. Venezia 1586. edizione seconda.
- CATESBY (Marcus). A natural History of Carolina, Florida, and Bahama Islands containing the figures of Birds, Beasts, Fishes &c. Scil. Historia naturalis Carolinæ, Floridae, & Babamæ Insulae. Londini Vol. 2. in folio Regio cum Tabulis illuminatis textu Anglico & Gallico. Vol. 1. 1731. Vol. 2. 1743 = Ita pulchre, & splendide depictæ sunt buiis Operis figurarum Tabulas, ut si pari diligentia & arte rerum descriptiones continerentur, nullum sane praestantius Opus editum umquam foret.
- Of Birds of passage. Scil. De Avibus migratoris. = Exstat in Anglicis Philosophicis Transactionibus. Vol. 44. n. 483. = Hanc ipsam materiam pertractarunt etiam Derbam, Allen, Stackhouse, Kleinius, Linneus, aliisque.
- De Avibus sedem mutantibus. Exstat in Trans. Angl. n. 483.
- CHARDIN. Voyages en Perse, & autres Lieux de l' Orient. Paris 1723. Tom. 10. in 12.
- CHARLETON (Gualterus). Onomasticon Zoicon, plerorumque Animalium differentias, & nomina propria plurimis linguis exponens &c. Lond. 1668. in 4. cum figuris nonnullis Avium methodico aliquo ordine distributarum.
- Eiusdem. Exercitationes de differentiis & nominibus Animalium &c. Oxoniæ 1677. in 4.
- CHILDREY. Histoire des singularités naturelles d'Angleterre, d'Escosse, & du Pays de Galles traduite de l'Anglois par M. P. B. Paris 1667. in 12. = Agitur inter alia in hac Historia de magna Anatum copia in Scotia Regno degentium, & permagna Bubonum quantitate certis annis in Provincia Effexensi adventante.
- CHOMEL (Noël). Dictionnaire Oeconomique &c. à Lyon 1709. Vol. 2. in fol. cum fig. = Quaedam ad Aves domesticas in hoc opere occurrunt, atque plura circa Aucupii artificia.
- Collectanea nova, & memorabilia Itinerum. Gottingae, Germanice edita, in 8. Volumen primum editum fuit anno 1750.
- Commentarii de Bononiensi Scientiarum & Artium Instituto &c. Bononiae in 4. cum Tab. aeneis.
- Academiae Scientiarum Imperialis veteres, atque novi. Petropoli in 4.
- de Rebus in Scientia naturali, & medicina gestis. Lipsiae in 8. Horum Volumen primum prodit 1752. ac singula Volumina quarum constant partibus.
- Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis. Gottingiae in 4. cum Tab. aeneis.
- Reg. Scient. Academiae Svecicae. Lingua Svecica. Holmiae.
- CONDAMINE [Charles Marie de la]. Voyage dans l'intérieur de l'Amérique Méridionale, à Paris 1745. in 8. rum sit mentio.
- COPPIER [Guillaume Zyonnois]. Histoire, & Voyage des Indes Occidentales, en deux Livres, à Lyon 1645. in 8. = Inter alia insulam Avium in Oceano Americano posfram, nec non plures Americae Aves, licet minus diligenter, nimirumque credulius describitur.
- COUCHE [Franc.]. Relation véritable de l'Isle de Madagascar, & du Brésil. Paris 1651. in 4. = Pluscula ad Historiam Avium Insulae Madagascar perinientia in hoc itinere continentur.
- CRAMER. Elenchus Vegetabilium, & Animalium Austriae. Viennæ 1756. in fol.
- CRANTZ [Henrici lo. Néponuc.]. Materia Medica iuxta systema naturae Tom. 3. Viennæ Austriae 1762. in 8. Clas. 1. Medicamenta cardiaca, & nutritiva describitur, atque examini submittit, inter quae Avium plurimarum species, quae in cibum recipi solent, enumerantur, eorumdemque facultates relate ad usum medicum, nutrimentum, gustum, & sanitatem adsignantur, adieciis plurium Auctorum & nationum nominibus.
- CUBA [Io.] Hortus sanitatis, seu Libri quatuor de Animalibus, de Avibus, & Volatilibus, de Piscibus &c. Argentorati 1536. in fol. cum figuris ligneis.

- DALE, vel DALAEI [Samuelis]. Pharmacologia, sive manuductio ad materiam medicam, in qua medicamenta officinalia simplicia, hoc est, mineralia, vegetabilia, animalia, & cuncte partes in medicinae officinis usitata, in methodum naturalem digesta succinte, & accurate descriptae. Londini 1693. in 12. & 1710. in 8. Vol. 2. = Bremae 1713. in 8. = Londini 1737. in 4. = Lugduni Batavorum 1739. in 4. = In hoc Opere nonnullarum Avium descriptiones, & variae nomina ab Auctoriis mutuatae adveniuntur.
- DAMPIER (William). An account of a new Voyage round the World. London 1697. in 8. Scil. Narratio novi Itineris circa Orbem. &c. Londini 1697. in 8. cum Tabulis aeneis n. 5. = Huius operis extat Belgica versio edita Hagae Comitum 1698. in 4. = Enumerantur Aves in Insulis Avium dictis obvias; insuper describuntur Avis Tropicorum, Pinguis, sive Alca Linnæi, atque alias Promontorii Bonae Spec. — (Guilhelmi). Nouveau Voyage au tour. Rosbomagi 1715. Tom. 5. in 12.
- DAPPER. Description de l'Afrique. Amsteladami 1686. in fol.
- DERHAM (Wilhelmi). Adnotationes in Historiam Avium Albini, quae suo loco describitur. V. Albinum. — Eiusdem. A Letter to Doctor Hans Sloane concerning the migration of Birds. Scil. Epistola ad Dominum Hans Sloanem circa Avium migrationem, quae extat in Anglicis Transactionibus Philosophicis, Vol. 12. n. 271. & Vol. 26. n. 315.
- DESLANDES. Recueil de differentes traités de Physique, & Histoire Naturelle &c. à Paris, & Bruxelles 1736. in 8. avec figures. = Belgica extat versio edita Amsteladami 1737. in 8. = Agit clarissimum hic Author inter alia de Avibus marinis.
- Dictionnaire Portatif d'Histoire naturelle contenant l'Histoire, la Description, & les principales propriétés des Animaux, des Végétaux &c. Francofurti 1762. Tom. 2. in 8.
- Raisonnable, & universel des Animaux. V. Bomare.
- De Trevoux &c. à Nancy 1740. Tom. 6. in fol. = In hoc plurimae Aves, si non omnes, admodum describuntur.
- DODART. Memoires pour servir à l'Histoire des Animaux. à Paris 1676. in 4. Hic Auctor optimas nonnullarum Avium iconas aere incisa in hoc opere dedit.
- EDWARDS (Georg.) A natural History of Birds, most of which have not been figur'd, or describ'd, and others very little Known, or too brief descriptions without figures, or from figures ill design'd. London. Scil. Naturalis Historia Avium, quarum plures vel figuris omnino, vel iisdem bonis carebant, sive accuratae carebant descriptiones. Londini in 4. quatuor Tomis, sive partibus digesta figuris nitidissime illuminatis. Pars 1. 1743. Pars 2. 1747. Pars 3. 1750. Pars 4. 1751.
- Eiusdem extat versio Gallica per Wilhelminus Derham, cuius titulus: Histoire naturelle des divers Oiseaux qui n'avoient point encore été figurés, ni decrits, ou qui n'étoient point connus d'après des descriptions obscures, ou abrégées sans figures fidèles colorées. à Londres Par. 1. 1744. Par. 2. 1748. Par. 3. & 4. 1751. = Adnotandum est in singulis busius operis partibus ad Quadrupedas, Pisces, Insecta, Amphibia, & monstroso aliqua Animalia exprimenta reperi figurae, & integras Tabulas, quae ut reliquæ Avium nitidissime illuminatas sunt; veum & de Avium iconibus præcipue dicendum hoc est, colores, quibus permulta figuræ aeneæ adumbratae sunt, pulchritores, & viridiores esse, quam vera & naturalia exemplaria ferre videantur.
- Eiusdem. De Phasiano Pensylvanico, & Otide minori. = Extat in Transactionibus Philosophicis. Angl. Vol. 48. pag. 499. Tab. 15. & 16.
- Eiusdem. Gleaning of natural History exhibiting Figures of Quadrupeds, Birds, Insects, Plants &c. Scil. Specilegium Historiae naturalis figuræ exhibens Quadrupedum, Avium, Insectorum, & Plantarum, quarum plures vel figuris, vel descriptione non satis cognitis fuerunt &c. Londini 1758. in 4. fig. naturalibus coloribus expressis, textu Anglo-Gallico.
- Eiusdem. Descriprio Avis, quæ a Phasiano, & Gallina Africana prognata creditur. = Extat in Anglicis Philosophicis Transactionibus Vol. 51. Par. 2. ann. 1760.
- Ephemerides Academicae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum &c. Vide Kellnerum, qui didicimus Ephemeridum Synopsis edidit.
- ELLIS (Henrici). Voyage à la Baye d'Hudson fait en 1746. & 1747. Lugduni Batavorum in 8. cum Tabulis aeneis IX. Quadrupedia, & Aves representantibus. = Extat pariter in Vol. I. Collect. nov. & memorabil. Itiner. Germanice edit. Göttingae 1750. in 8.
- England illustrated, or a Compendium of the natural History &c. of England, and Wales &c. Scil. Britannia illustrata, sive Compendium Historiae Naturalis &c. Angliae, & Walliae &c. Londini 1763. Tom. 2. in 4. max. cum fig.
- ERICIVS (Ericus). Epistola de Avibus. Hafniæ 1671. in 8.
- ESPARON (d') Ars Falconaria. Francofurti ad Moenum 1617. in 4.
- FABRICII (Phil. Corn.). De Animalibus quadrupedibus, Avibus &c. Veterinæ indigenis. Helmstedii 1749. in 8. = Satis dures Catalogus cum observationibus medicis.
- FASELTI. De primo Avium Ortu. Wittenbergae 1674. in 4.
- FERNANDEZ (Francisci). Historiae Animalium, & mineralium novae Hispaniae Liber unicus in sex Tractatus divisus. Romæ 1651. in folio, simul editus cum Francisci Hernandez Historia Mexicana.
- FEVILLEE (Ludovici). Journal des Observations Physiques &c. à Paris 1714. in 4. Tom. 2. cum Tabulis aeneis. = Describit inter alia Larum cauda brevissima, Leucomelarus, Aviculam Colibri distam, & Tucumum.

- FEVILLE (Jo. de) Journal de Faconnerie 1567.
- FRANKENAU (Georg. Frider.) Traité curieux sur les ongles , ou l' Onychologie . Jenae 1695.
- FREIGIUS (Jo. Thom.) Quæstiones Physicæ Libris 36. digestæ . Basileæ in 8. = Ex his Liber 32. agit de Avibus , & Ornithologia .
- FREXIER . Voyage de la mer du Sud .
- FRIDERICUS II. Imperator . De arte venandi cum Avibus , cum Manfredi Regis additionibus . Auguftæ Vindelicorum 1596. in 8. = Huc accedit Alberti Magni de Falconibus , Asturibus , & Accipitribus Liber .
- FRISCH , vel FRISCHII [Jo. Leonardi]. Vorstellung der Vogel in Teutschland &c. Scil. Avium Germaniae Prospectus , nec non exterarum quarundam , naturalibus coloribus delineatarum . Berolini 1734. in folio . = Figuras optimæ sunt , & exacte illuminatae .
- Einfdem Observations de Pellicano , sive Ardea rostro cochleari . Extant in Actis Physico-medicis . Vol. 5. obs. 67.
- FROGER . Voyage made in the years 1695. 1697. to the coasts of Africa , strength of Magellan , Brasil , Ceylon , Antilles &c. Scil. Iter institutum annis 1695. & 1697. per Africæ oras , fretum Magellanicum , Brasiliam , Guyanam , Antillas Insulam &c. Londini 1698. in 8. Parisis 1698. in 12. Amstelodami recentiorum 1699. 1715. in 12. = Icons etiam Plantarum & Animalium babet , quorum descriptiones suo modo , ut miles concinnavit .
- GAUTIER (Jo. Antonii) Observations sur l' Histoire naturelle sur la Physique , & sur la Peinture , avec des Planches imprimées en couleur &c. à Paris Tom. 2. in 12. & 4. = In Vol. 2. Observations babet circa Aves praesertim rapaces , atque descriptiones babet de Buteone simpliciter dicto , de Buteone Apivoro , de Milvo aeruginoso , Lanius minore Moluccarum , & Franci Galbuli .
- Eiusdem . Collection de Planches d' Histoire naturelle en couleur &c. à Paris 1757. in 4.
- Gazzettette Americano contenente un distinto ragguaglio di tutte le parti del nuovo Mondo , tradotto dall' Inglese , e arricchito di aggiunte , note , carte , e rami . In Livorno 1763. Tom. 3. in folio = Americanæ quedam Aves in hoc opere tabulis aeneis ostenduntur .
- GESNERUS (Conradus) Historia Animalium Lib. 5. Tiguri 1555. in fol. Tom. 3. cum figuris ligneis . = In Libro 3. agit de Avibus sub titulo De Avium natura , qui seorsim prodiit Tiguri pariter in fol. 1560. = Germanica extat versio , Tiguri pariter edita cum figuris similiter ligneis 1582. = Editio altera Latina prodiit pariter in fol. cum figuris ligneis Francofurti 1585. = Editio altera Germanica Tiguri 1600. Editio pariter altera Francofurtana prodiit 1621. = Praeclarus cuius Helveti Authoris magna extant in Ornithologiam merita . Quoquo Aves Europee videras , distincti conditionis , vite rationis , & alimentorum descriptione perfectus est , illasque alphabetico ordine dispositas tradidit , & carumdem iconas pro illo tempore non contentendas dedit .
- GINANNI (Conte Giuseppe di Ravenna) . Delle Uova , e de' Nidi degli Uccelli , Venezia 1737. in 4. con figure in Rame . Scil. De Nidis & Ovis Avium &c. cum figuris aeneis .
- Prodizioni naturali , che si ritrovano nel Museo Ginanni in Ravenna metodicamente disposte , e con Annotazioni illustrate . In Lucca 1762. in 4. Scil. Specimina Historiae naturalis , quæ Ravennæ in Museo Comitis Ginanni systematicæ distribuita adseruntur , cum adnotacionibus &c. = In secunda parte huius Operis multæ enumerantur , ac describuntur Aves , quarum capita , pedes , & ova , vel nidi in supradicto Museo reperiuntur . Propediem absolutissimam Historiam naturalem Paludum Ravennatum , opus eiusdem postulum cura fratris eius sperare lices cum plurimis figuris .
- GOBIEN (Carolus) . Lettres édifiantes & Curieuses &c. à Paris 1718. usque ad 1743. Vol. 24. in 12. = Alia carumdem extat editio . Parisis in 12. cuius editionis Volumen primum sub anno 1707. praelo prodiit . Italice etiam versæ fuerunt , atque Venetiis editæ 1751. in 8.
- GRANGER . Relation du Voyage fait en Egypte . Parisis 1745. in 12.
- GREW (Nebemiae) . Catalogue and Description of the natural , and artificial Rarities belonged to the Royal Society &c. Scil. Descriptio Musci Societas Regalis Angliae &c. Londini 1681. & 1686. in fol. cum tabulis aeneis .
- A description of the American Tominæus , or Humming Bird &c. hoc est : Descriptio Avis Colibri , quæ extat in Philosophicis Transactionibus Anglicis . Vol. 17. n. 200. & n. 202.
- The comparative Anatomy &c. hoc est : Anatomia comparativa ventriculorum , & intestinorum . Londini 1683. in fol. = De ventriculorum , & intestinorum , inter alia , plurim Avium peculiari structura loquitur .
- GRONOVII (Laurent. Theod.) Animilium in Belgio habitantium Centuria prima , & secunda ; Extant in Actis Helvetiæ Physico-mathematicis &c. figuris aeneis illustratis Vol. 4. Basileas 1760. in 4. = In Censuria prima methodo Linneana disponuntur , & describuntur Aves . Scil. Accipitres , Picæ , Anseres , Grallæ , Gallinæ , Passeræ .
- GRUZMANNI (M. Danielis) Dissertatio de Avibus Paradisiacis , & primario harum Rege . Jenae 1667. & 1688. in 4. cum figuris .
- GUARINONI (Girolamo) . L' Uccellatura Poema . Bergamo 1760. in 8.
- HALDE (Le Pere du) . Lettres édifiantes & curieuses &c. Parisis in 12. Volumina plura .
- HARTMANNI (Philippo Iacobî) . Anatome Caponis inedia enecti , atque Carduelis fame peremptæ Ext. in Miscel. nat. curios. Dec. 2. ann. 7.
- HASSELQUIST (Friderici) Eller Refa til Heliga Landet förrättad ifrån är &c. Scil. Iter per Palæstinam insitum ab anno 1749. ad 1752. &c. Stockholmiae 1758. in 8. = In duas partes divisum , sive descripsi

- ptum est; in priore parte sistitur Itineris diarium, in posteriore Historia Naturalis Palaestinæ, cum descri-
ptione Animalium, ac præcipue Avium; ibi sicutem continetur Philologia sacra, materia medica, com-
mercium &c, atque Epistolæ plures ab Hasselquistio ad Clarissimum Linnaeum datae exhibentur.
- Descriptio Turdi solitarii, & aliorum Animalium, in Actis Upsaliensibus 1744.
- Diffractio de Fulica, in Actis Upl. 1751.
- De Falcone capite nudo, montes Aegypti inhabitante; Act. Svec. 1751.
- HELBIGIUS (lo. Otto). De variis rebus Indicis; puta de rara quadam Africæ Ave, de Ave Manucodiata,
seu Paradisa, de Gallinis Iavanensis &c. In Miscell. curios. natur. Dec. 1. ann. 9. & 10. 1678.
& 1679.
- HELWIGIUS (Georg. Andr.). Nonnulla de Avibus, & signanter de Pelecano Gesneri babet in Actis Breslawien-
sis 1719.
- HERCBBACHII (Conradi). De Venatione, Aucupio, & Piscatione. Coloniae 1573. in 8.
- HERING (M. lo. Ernesti). Diffractio de Orta Avis Britannicae, scilicet de Anfere Scotico. Wittemberg. 1665. in 4.
- HERISSANT. Observations anatomicae in motus capitis, rostri, ac mandibularum in Avibus institutæ. Act.
Paris anno 1748.
- HERNANDEZ (Franciscus). Historia Mexicana. Romæ 1626. & 1651. quæ ab editione nihil differt in fol.
ad calcem Historiae novæ Hispaniae a Fernandez conscripta, cum figuris. = Aves plurimæ Mexicanæ
describuntur.
- HERVIEUX. Nouveau Traité des Serins de Canaries, contenant la maniere de les elever &c. à Paris 1709. &
1713. in 12. = Tractatus hic circa banc materialm accuratissimum dici potest. De incubatu enim barum
Avium, & de abhibendis artificiis ad sagaciorum, pulchritudinem problemati obtinendam, ipsamque inde ad dul-
cissime canendum instruendam fuisse agit, nec non de innumeris morbis, quibus haec aviculae obnoxiae
sunt, ipsorumque remediis plenarie tractat. Germanice etiam prodidit Francofurti, & Lipsiae 1728. in 8.
- HEUNIUS (lo.) Sur l'usage, & l'efficacie des Hirondelles. 1682. in 12.
- HILL (lo.) The History of Animals, containing descriptions of the Birds, Beasts, Fishes, and Insects &c.
Scil. Historia Animalium, in qua continentur descriptiones Avium, Brutorum, Pilicium, & Insectorum &c.
Londini 1752. in fol. cum Tabulis aeneis 28. = Delicissimus ac diligentissimus hic Author a pag. 318.
usq. ad pag. 514. agit de Avibus.
- HILDEGARDES. Hortus sanitatis quatuor libris, quæ subsequntur, complectens, De Animalibus, & Reptilibus;
de Avibus, & Volatilibus; de Pilicibus & Natalilibus. Argentorati 1536. in fol. = Singula capita orna-
ta sunt pulcherrimis schematis, sive figuris.
- Histoire de l'Academie Royale des Sciences de Paris. V. Acta &c.
- HOOCK. Micrographia, seu Physiologicae descriptiones minutiorum corporum factæ per vitra maiorativa (An-
glie). Londini 1667. in fol. In observatione 36. pag. 168. agit Author de Plumarum formarione, una
cum conjectura circa caulas variorum earum colorum, quorum pulchritudinem & fulgorem oriri censes ex
exiguitate partium reflectentium.
- HORSTII (Danielis). Phycia &c. Francofurti 1682. in 12. = Multa babentur in hoc opere de internarum par-
tium Avium structura, atque usu, & nonnullarum in Avibus partium defectu, relate ad Quadrupeda, &
alia animalia, ac præcipue de Iphene, ac vesica urinaria in Avibus deficiens.
- HUGHES (Griffith). Te natural History of Barbados in ten books &c. Scil. Historia naturalis Barbadenis Li-
bris decem comprehensa. Londini 1750. in folio cum fig. aeneis.
- HUTH (Georg. Leonard.). Beschreibung zur Arzney dienlichen Pflanzen &c. b. e. Traductio Itinerum in Pe-
ru, Regno Chilli &c. annis 1709. 1710. sqq. 1711. a Dom. Ludovico Feuillee institutorum &c. Norim-
bergæ 1753. in 4. maior.
- JAMES Dizionario universale de Medicina, Chirurgia, Chimica, Botanica, Notomia, Farmacia, & Storia Na-
turale &c. tradotto dall' originale Inglese da Sigg. Diderot, Eidous, & Toulaint. Venezia T. II.
1753. Edizio Anglica prodidit Londini 1745.
- IACOBÆI [Olingerii]. Museum Regium Friderici IV. Daniae Regis &c. Hauniae in folio absque anno editio-
nis cum Tabulis pluribus aeneis. = In Sectione secunda de Avibus pluribus rarioribus, præcipue mariti-
mis, & Borealis agitur, earundemque plures adnectuntur accuratas icones.
- ILSTROEM [lo.] Mergus Pilces captans. Act. Svec. 1749.
- IONSTON [lo.] Historiae naturalis Avium Libri 6. in fol. cum Tabulis aeneis Francofurti 1649. = Amstelada-
mi 1657. = Amsteladami cura H. Ruyfchi 1718. Heilbruni 1756. = Paulo post Aldrovandi tempora va-
stam Avium descriptionem edidit hic Author, plerumque ex Gesnero & Aldrovando basiliam, atque earum-
dem iconas, quæ ligno in supradictis incisæ fuerant, Tabulis aeneis redditit, quamquam raro accurarioribus.
- LOSSELYN (lo.) New Englands rarities discover'd in Birds, Beasts &c. Scil. Novæ Angliae rarioræ circa Aves
& alia Animalia detexta, ac descripta. Londini 1672. in 8. cum figuris.
- Journal d'Angleterre. Scil. Diarium Anglicum.
- Des Seavans. Hoc est: Diarium Eruditorum totius Europæ a Dom. de Hedouville inchoatum anno 1684. Pa-
ratis in 4. Amsteladami in 12. cum fig. & de rebus ab anno 1665. actis, librissque editis exordium facit.
- Ou Memoires de Trevoux.
- Encyclopedie. Scil. Diarium operum, & rerum ab exteris editis, sive detectis.
- Etranger- Scil. Diarium operum, & rerum ab exteris editis, sive detectis.
- Britannique a la Haye (Scil. Hagae) in 12.

KAEMPERI [Engelberti]. The History of Iapon, giving an account of the Metals, Minerals, Trees, Plants Animals, Birds, Fishes of that Empire &c. Scil. Historia Japoniae, descriptiones continens Metallorum, Mineralium, Arborum, Plantarum, Animalium, Avium, & Piscium, qui in eodem Imperio adueniuntur &c. Londini 1727. in fol. cum Tabulis aeneis. = In Galliæ linguam translatæ edita fuit Haga Comitum 1727. Vol. 2. in fol. & alibi in pluribus Tomis in 8.

KALM (P.) Iter Americanum. Holmiae 1753. Vol. 3. in 8.

KELLNERI [Andreae]. Synopsis observationum Medicarum & Physicarum, quas Decuriae tres, & Centuriaec decem Ephemeridum Acad. Caes. Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum ab anno 1670. ad 1722. publicatarum continent, ordine alphabetico, & ad instar Lexici exposta &c. Norimbergæ 1739. in 4. Synopsis hæc plura ad Ornithologiam, quæ in supradictis Naturæ Curiosorum Academiac Ephebembris, ac memorato annorum cursu continentur, indicat. Praecipua sunt - Anas cornuta - Anatis ferac, sive Clangulae Anatome - Anates auriferae, sive auri grana in ventriculo habentes - Anates in queru narræ - Anates Groellandicae - Anatum mirabilis digestiovis in ventriculo vis - Anatis Amygdalæ amarae letiales - Anser cornutus - Anser cristatus - Anser quadrupes - Anser cranio monstruosus - Anser cum corde tric平ci - Anser masculus ovum excludens - Anser pennis monstruosus - Anser morsu periculosa symptomata excitans - Anseres præ reliquis Avibus monstroso evadentes - Anserum longaevitas, & vivacitas - Aquila alba Polonica - Aquila pisatrix unica intestino caeco rotundo praedita, Aquila vero regalis duobus minimis instruita - Aquilæ fel opbsalmicus ac pinguedo nervinus, & resolvens - Ardeæ vulgaris, & stellaris autosome - Avis rara Africana - Avis rufa edens - Aves aliae in Episcopatu Hildebeimensi, & Sicina, qualis est Aureola, Passer, Hirundo, Corvus &c. - Aves Curlandicae - erectæ incendentes - monstræ - loquaces - earum sermo - quatuor pedibus praeditæ - viviparae - viviporæ, ac viscum progenerantes - non omnes duobus gaudent intestinis coecis - cur in ventriculis lapides, silices, & arenæ habent - Avium singularis digestiovis vis - organa concoctionis & respiratiovis costarum machina - cur tempestatis imminentium proprieæ - morbus epidemicus - considerandum duplex modus cum & sine evaporatione - mirabilia quedam - Manucodiæ, seu Paradisiæ - Corvus loquax - viviparus - cornutus - crocitur horas indicans - eorum crocissimus interitus iumentorum praesagus - Corvo nigro ex ala penas albæ successe excrecentes - Corvi albi - artefacti - versicolores - ipsammodicæ symptomata adscripta esu Corunicum lolio remulento, quo bæ Aves maxima delectantur, saginarum - vera exclusio pullorum Cuculi, atque buius origo - Cygni sterni anatome & skeleton - lingua osca, & craniï figura - de ovo eius nonnulla - Caponis atque Carduelis fame enœtæ anatome - Fulicæ historia & anatome - Gallinarum memorabilia quedam - Gallina ovum edens Pullo solo genere a Gallina distincto, scil. Anate impregnatum, aliaque - Gallina quadrupes - multata reviviscentes - Pallum parient - superficians - morboarum dissectiones anatomicae, & observations plures - intestino caeco gaudent duplaci - plumarum colores mutant - lavanenses - earum focunditas quomodo promovenda - ab Amygdalis amaris ingulariter - deplumatae ac virue cordis regioni applicatae diversis morbis succurrunt - aliarum ipsarum partium usu medico Gallinas Indicæ, cui epidemias obnoxiae - Gallinaginiæ candidæ - quomodo in Curlandia capiantur - Gallus sine corde - cornutus - Indicus hydropicus - monstruosus - quadrupes - oviiparus &c. - Gallorum irritatorum morbus venenati - Gallopanonis ovum rarum, & monstruosum - Hirundo alba - de Hirundinum excoccatio, & restitutio spontanea a Celso descripta - Hirundines sole volari scatent - comedæ epilepticæ non iuvant - earum usus medici polybrevis - Milvi anatome - noctuæ vulgaris ær. saxatilis anatome - earum oculorum mira fabrica - earum virtus antiparalyticæ &c. Ova plura Avium præcipue monstræ, & insolita norma exclusa descripta - Passer albus - Canariensis - tripes &c. Pavonis albi exclusio notabilis - Perdix alba - nonnulla de Perdicis interna struttura, & noxa ab earumdem compositione - Picas glandariae anatome - Pica loquax &c. - Picus major niger, eiusque anatome - Picus uno intestino caeco praeditus - Picus viridis, eiusque anatome - de pullis Gallinaceis plura - de metallis a Struthione deglustris, eorumdemque effectu - Turris anatome - de Turdo saxatili memorabilia quedam - Turdi an extremo visci generationi inserviant - eorum ventriculus ob hyoscyamum, quo vivi vescuntur, non edendi - De Urogalli humoris oculorum aquæ facultate medica .

KIRANUS. Kiranides &c. 1638. Libri 4. in 8. absque editionis loco = In Libro 1. agit de Gemmis, Herbis, Avibus, & Piscibus.

KIRCHMAYER (G. C.) Zoologia physica, & de Basilisco, Unicornu, Phoenice &c. Wittembergæ 1669. in 8. Collectanea.

KIRCHMAIERUS (Georg. Gasp.) De Actæ Paradiſi differit in Libro da Paradiſo, imperio antediluviano, descriptione Diluvii &c. Wittembergiae 1662. in 8.

KIRKERI (Athanasii). Romani Collegii Societatis Iesu Museum celeberrimum. Amstelædam 1678. in fol. — Museum Kirckerianum restitutum, auctum, descriptum, & iconibus illustratum. Romæ 1709. in fol.

In hac editione nonnulla de Avibus agit Bonanus, ac præferit Pendulinum, sive Remix aviculam ab ipso Lithuaniae dictam describit, eiusdemque nidum delineat.

KLEIN (Iacob Theod.) Historiae Animalium Prodromus cum Praefatione de ordine Animalium in generæ. Lubecæ 1750 in 4. cum Tabulis aeneis. Lipsiae 1751. = Opus hoc in tres distinctum est partes, quarum prima agit de origine Avium, utrum e Terra, an vero ex aqua surrexerint. Secunda de ordinibus Avium. Tertia de Avibus erraticis & migratoriis. Avium ordinis Systematici compendium Belgice sistitur in de Vitgez Verhand. Vol. I. pag. 455. Latine vero versum in Commentariis de scientia naturæ validi

- rali , & medicina gestis Lipsiae editis . Gallice pariter redactum prodit ab Anonymo editum in Systeme naturel du Regne animal . à Paris 1754. in 8.
- KNOX (Roberti). Relation of Ceylon . Scil . Descriptio Insulae Zeylanicae , Londini 1681. in fol . = Inter alia animalium etiam buiis felicissimae Insulae non inutilem descriptionem continet .
- KOLBE , vel KOLBEN (Petri) . Description du Cap de Bonne Esperance , avec l' Histoire naturelle du peys . Amsterdam 1741. Vol . 3. in 8. cum figuris aeneis = Germanice Nurembergii 1719. = Belgice Amstelvania , p . 1727. Vol . 2. in fol . = Describuntur in hoc opere plurima naturalia in Promontorio Bonae Spei obvia , praesertim plurimae Aves .
- Histoire general des Voyages .
- KOLBE (Petri) . Itinera . Nurembergae prodierunt Germanice 1719. in folio . = Editum vero est huius Libri compendium , inutilem reieclis , Amstelodami 1741. in 8. = Inter alia Animalia Capensis in hoc opere describuntur . Compendium pariter hoc recusum inde fuit Germanice Norimbergae 1745. in 4.
- KRAMER (Gui'el'mus Henricus) . Elenchus Vegetabilium & Animalium per Austriam inferiorem observatorum , fistens ea in Claves , ordines , genera , & species redacta . Viennae . Prague , & Tergestii in 8. = In hoc opere , si non omnes , plurimae solum Aves Austriae inferioris describuntur .
- LABAT (Pere du) . Nouveau Voyage aux Isles de l' Amerique . Parisis 1721. in 12. Vol . 6. cum figuris , & Tabulis aeneis . = a la Haye 1724. in 8. Vol . 6. cum Tabulis pariter aeneis . Animalia plura , & Aves inter alia in iis Insulis obvias hic describuntur . = Nova & aucta editio 1742. in 8. Vol . 12. = Multa ex P. du Terre , alijsq. excipit , praecipue ad animalium historiam spectantia .
- Nouveau Voyage de l' Afrique Occidentale . Parisis 1728. in 8. Vol . 5. = Multa ex priori itinere , & ex aliis repetita , aliqua ratiōne peculiaria , & in primis ex commentariis Dom . Compagnon & Brue , de Avibus , & Animalibus rariores , nec alibi descripsit adiecit .
- Voyage de Guinée , par le Chev . des Marchais . Parisis 1730. in 8. = Guineae Regna , deinde Guinam describit . In ista in primis varia Animalium , & Avium genera illustrare conatur , sed omnis methodi in Historia naturali ignarus fuit .
- Relation historique de l' Ethiopie Occidentale . Parisis 1732. in 12. Vol . 5. = In primo huius Historiae Tomo aliquo ad Historiam naturalem pertinentia continentur . Eiusdem itinera per Hispaniam , & Italiam instituta . Parisis 1730. & Amstelodami 1731. edita in 10. Vol . in 8. Tacemus , quae praeceps minutissima plurima , & monastici argumenti continent .
- LACHMUND (Frider .) . De Ave Diomedea Dissertatio . Amstelodami 1674. in 12. cum Avis effigie .
- De Cycni lingua osea , & crano Anseris monstruo . In Miscellan . Nat . Curios . Dec . 1. ann . 4. & 5. 1673. 1674. obser . 179. 181.
- De Avibus praeter naturam candidis in Episcopatu Hildesheimensi , & vicinia , qualis est Aureola , Linnaria , Passer , Hirundo , Alauda , Corvus . In Miscell . Nat . Curios . ibid . obser . 184.
- De Ovo ab Anfere a Februario ulque in mensis Septembrem retento . In Miscell . Natur . Curios . ibid . obser . 181.
- De Ausere domestico cristato . In Miscell . Nat . Curios . Dec . 1. ann . 6. & 7. 1675. 1676. obser . 182.
- LADE (Ruperti) . Voyages de l' Afrique , de Asie , & de l' Amerique . Parisis 1744.
- LAET (Jo . de) . Novus Orbis , seu Descriptionis Indiae Orientalis Libri 8. Tabulis Geographicis , & variis Animantium , Plantarum , Fructuumque iconibus illustrati . Lugduni Batavorum 1633. in fol . = Innumerae Aves , praesertim Pstacii , & cictures aliae , sive domeſticas Regni Peruani , Praefecturae Luirensis , & novae Hispaniae describuntur .
- LAET (lo . de) . Descriptiones Indiae Orientalis &c . Amstelodami 1633. in fol . = Quamvis Patria non exceſſat Auctor , usus priorum operibus , ut Herrera , & Ximenez in primis , Historiam Civilem , & Naturalem per regiones descripsit bono ordine , & simplici sermone .
- LAMBERT . [l' Abbé] . Histoire generale , Civile , Naturelle , Politique , & Religieuse de tous les peuples du monde . à Paris 1750. Vol . 15. in 12.
- Lapeyronie sur les petits œufs de Poule sans jaune , qu' on appelle vulgairement œufs de coq . Exstet in Act . Acad . Se . Paris 1710.
- LAUNAY (Carolus) . Nouveau Système sur la generation de l' Homme , & celle de l' oiseau . à Paris in 12.
- LEDELIUS (Samuel) . De Gallo Gallinaceo oviparo . In Miscell . Nat . Curios . Dec . 2. an . 1682. obser . 145.
- LEEUWENHOEK (Antonii a) . Arcana naturae &c . Delpbis Batavorum ex Belgico Larine verfa 1695. in 4. cum Tabulis plurimiis aeneis = Epistola 76. sive pag . 350. huius editionis nonnulla baber de coloribus in plumis Avium . Epistola 74. pag . 313. & seq . de formatione calamorum Avium , & cur quidam dentati findantur ; item de formatione plumarum earundem . In Epist . 67. pag . 213. circuitum sanguinis in Avibus metiri studuit Auctor , sed dignoscere ipsum non potuit ob magnum numerum vaorum sanguiferorum , quae corpus , quod inspiciebat , rubrum faciebant . Atque Epistola 68. pag . 230. de cursu sanguinis , eiusque multiplicibus vasis in palea Galli Gallinacei observations aliquas exponit .
- LEMERY (Nicolai) . Traité universel des Drogues &c . en ordre Alphabetique . Parisis 1699. in 4. = Nova editio aucta , atque Tabulis aeneis exornata 25. prodit Parisis 1714. = De Avibus pluribus in hoc opere sermo habetur , quoad medicas facultates . Operis eiusdem editio altera extat in Italicam Linguan verfa , Venerii cuja 1751. in fol . cum fig .

LERIUS Historia Americana .

Lettres éléantes, & curieuses, écrites de Missions Etrangères, par quelques Missionnaires de la Compagnie de Iesus &c. Parisis in 12. Volumina plura = Nonnulla in hac Epistolarum collectione ad Aves praecipue Indicas, Freti Hudsonis &c. spectantia occurunt. Harum primus Author fuit Hulde [le Pere.]

— Edifiantes, & curieuses &c. Videatur Gobien (Carolus.)

LINOCIER. Historie des Animaux à quatre pieds, des Oiseaux, des Poissons, des Serpents &c. à Paris 1584. in 12. cum Tabulis ligneis.

LINNEI (Caroli). Systema Naturae, sive tria regna naturae. Lugduni Batavorum 1735. in fol. = Holmiae 1740. in 8. editio altera cum nominibus Svecicis. Hulde 1740. in 4. ob longo, cum nominibus Latino-Germanicis, opera lo. Laugen. Parisis 1744. in 8. editio auctior cum nominibus Gallicis a Bernardo Iusliu adiunctis — Hulde Magdeburgicae cum nominibus Latino-Germanicis in 8. editionis secundas tantummodo recensit — Stockholmiae 1748. in 8. cum nominibus Svecicis, editio 6. multo auctior ab auctore edita — Lipsiae 1748. in 8. cum nominibus Germanicis secundum sextam Stockholmiensem editionem — Holmiae 1753. in 8. — Lugduni Batavorum 1756. in 8. editio multo auctior, & emendatione cum nominibus Gallicis — Holmiae editio 10. reformata in tres Tomos. in 8. quorum primus, qui prodit 1758. sistit Regnum Animale. Ab hac editione denominatio Avium Linnaeanas, quas in hac Ornithologia retulimus, desumptissimis, eiusdemque Autoris Systematis Synopticae dispositionem Volumine primo inter reliquias Systematum adumbrationis adposuimus. Celeberrimus hic Auctor usque dum vitam duxerit, quam diuissimam ei preceparum, nullam imponet mutationum finem, quod ad naturae characteres enucleandos, & Systema absurissimum tradendum novis iugiter infinitius experimentis, & adquisitis cognitionibus, quantum faciat quilibet viderit; verum pro extensis a longinquis Scriptoribus molestiae plena evadit res, cum nec Libros omnes huins clarissimi viri adquirere, ac perlegere plures posint, non tantum expensarum gravitate restent; sed etiam difficultate ob distantiem asportationis: quamplures de una vel altera editione, quae sorte a Bibliopolis committitur, illisq. ostenditur contenti sunt. Aliud profecto facere ratus concessum est. Tantumdem fere, & nobis accedit sub removissimo ab Autoris caelo degentibus, qui difficulter & longo tempore multas Linnaei operas poriti fuimus, tandem non paucas inter desideratas habere necessario contigit, ut praecepit de undecima, & duodecima Systematis naturae editione accedit, quas ante operis nostri Ornithologici principium consulere non licuit.

— Systematis naturae editio 11. Lipsiae in 8. quae furtum prodit, & viciose dicitur. Duodecima autem reformata, & ob Auctore recognita prodit Holmiae 1766. in 8.

— Eiusdem editio 12. — Distributio Avium Systematica in hac editione stabilita pluribus in locis quoad genera & species a 10. editione differt, id eoque & de bac notitiam hic dedimus.

— Animalia Sveciae. In Act. Upsal. 1736. — Lugduni Batav. 1743. in 8.

— Fauna Svecica sistens Animalia Sveciae Regni, distributa per classes, & ordines, genera, & species &c. Stockholmiae, & Lugduni Batavorum 1746. in 8. maior cum Tabulis aeneis — Stockholmiae 1761. editio altera auctior.

— Amoenitates Academicae, seu Dissertationes variae Physicae, Medicae, & Botanicae antea seorsim editae sub praesidio eiusdem Linnaei. Holmiae, Lipsiae, Amstelaeadi, & Lugduni Batavorum in 8. cum Tabulis aeneis. Vol. 1. 1749. — In his plura ad historiam, naturam, & descriptiones Avium habentur, quae singillatim recensere longius quidem foret.

— Museum Adolph. Friderici Regis &c. Holmiae 1754. in fol. cum Tabulis 33. nitidissimis aeneis — Describuntur Animalia rara in primis, & exotica quadrupedia, Aves &c. adiectis nominibus Latinis & Svecicis.

— Iter Oelandicum, & Gotthicum. Stockholmiae 1742. in 8. Lingua Svecica.

— Iter Westrogothicum. Stockholmiae 1747. in 8. ac 1750. Lingua Svecica.

— Itineraria per diversas Svecica Provincias, Svecica lingua descriptra, & primum Stockholmiae edita, Germanice inde conversa. Lipsiae 1756. in 8. cum figuris.

— De Pico pedibus tridactylis. Act. Svec. ann. 1709.

— De Palere nivali. Ibidem.

— De Procellaria Ave. Act. Svec. 1745.

— De Palere Indico. Act. Svec. 1750.

— De Ampelide, seu Pico nidum suspidente. Ibidem.

— De Fringilla dorso viridi abdomine fulvo. In Act. iisd. Svecicis.

— De Phryganea alis flavo, nigroque variegatis. Ibidem — Descriptions haec omnes Avium in Actis Svecicis insertae

LISTERI (Martini). Additamentum in Synopsm Avium Raii, Extat in Translationibus Philosoph. Anglicis Vol. 15. num. 175.

— Philosophical Letters bebwinn the learned Mr Ray and Several of the ingenious correspondents, tho which are addet thole of Willugby &c. Scilicet Epistolae Philosophicae inter doctissimum Virum Dominum Rayum, & sapientes variis amicos, quibus adiunctae sunt Willugbei Epistolae. Maxima barum pars de his &c. Londini 1718. in 8. = Opus est posthumum a W. Derbam in lucem editum.

— Historia Animalium Angliae. Londini 1678. in 4. cum figuris.

— Adnotaciones in Caelii Apicis de Opiioniis & condimentis, sive Arte Coquinaria libri decem &c. cum no-
tis

- sis Humelbergii , Bartbii , Reinesii Vander Linden , & aliorum . Editio secunda , longe auctior atque
emendatior . Amstelodami 1709. in 8.
- LITHENIUS , & RORERG . De Lagopode . Upfaliae 1732.
- LOCHERI (Michel. Frider.) De Ananasa , sive Nuce Pinea Indica &c. Norimber. 1716. in 4. cum Tab. acenis.
De Ave Mellifuga , aliter Colibri , vel Ave Mulca nuncupata , accurasam habet descriptionem , atque de
euifdem nido agit magna ex parte materia de Ananasae fractu ab Ave decerta conſtructio .
- LOCK (Io.) a collection of Voyages &c. Scil. Collectio Itinerum &c. Londini 1752. Vol. 8. cum figuris -- In-
ter alia Animalia quadrupeda , Aves , Pisces , Serpentes , Arbores , Flores , & Fruſtus deſcribuntur .
- LOEFLINGI [P.] Iter Hispánicæ . Holmiae 1758. in 8.
- LONG (Iacobus le) . De Scriptoribus Historiæ naturalis Gallie . Vide Scheuchzeri &c.
- LONICERUS (Adamus) . Nonnulla habet de Plantis , de Avibus , de Piscibus , & Metallis in Opere Germanico
cum iconibus in folio . Francofurti ad Moenum 1582. & 1630. -- Ulmae 1737. cum additamentis Balbi . Ebrhani .
- LONGOLIUS . Dialogus de Avibus 1544.
- LOPES [Ferdinandus] . Istoria dell' Indie Orientali . Venezia 1758. in 4.
- LOUBERE . Description du Royaume de Giam . Amstelodami 1714. Tom. 2. in 4. .
- LUCAS [Pauli] . Voyage dans la Turquie , l' Afie , Sourie , Palestine , Egypte &c. Amstelodami 1720. T. 2. in 12.
- Voyage an Levant . Hagae 1709. T. 2. in 12.
- Voyage dans la Grece , l' Afie Mincure , la Macedoine , & l' Afrique . Amstelodami T. 2. in 12.
- LUDOLFI (Iobi) , aliis LEVTHOLE . Istoria Aethiopica . Francofurti ad Moenum . Ann. 1681. in folio cum
Tabul's acenis .
- Commentarius ad Historiam suam Aethiopicam . Francofurti ad Moenum 1691. in fol. cum figur.
- Appendix prima ad Historiam Aethiopicam Iobi Ludolfi , Francofurti ad Moenum 1693.
- Magazin . Bremes Magazin . Hoc est Promptuarium Bremenense . Bremae Lingua Germanica in 4.
- Hamburgisches Magazin . Scil. Promptuarium Hamburgense .
- Hollands Magazin &c. Scil. Promptuarium Belgicum . Harlemi Lingua Belgica exaratum in 8.
- London Magazin &c. V. Urban &c.
- Allgemeines Magazin der natur , Kunst und Wissenschaften . Hoc est: Promptuarium universale naturae , Ar-
tis , & Scientiarum . Lipsiae 1753. in 8. T. 2. -- In volumine 2. agitur de Pafferum noxa , & lo.
Sloani rerum naturalium Thesauro .
- MAII [Io. Henrici] . Istoria Animalium in Sacro in primis Codice memoratorum &c. Francofurti , & Spirae
1686. -- Ab hoc Autore per singula fere capita opus Samuelis Bocharti augeretur , & emendatur .
- MAIER [Mich.] De volucre arborea in Infulis Orcadibus proveniente . Francofurti 1719. in 8.
- MAILLET . Description de l' Egypte , par Mr l' Abbé le Maistrier , in 4. & in 12.
- MARCGRAVIUS [Georgii] . Historia rerum naturalium Brasiliæ libri 8. Exstat post Guilelmi Pisonis de Medicina
Brasilienſis libros 4. in fol. Lugduni Batavorum , & Amstelodami 1648. cum figuris lignis -- Margra-
vii liber 5. agit de Avibus .
- MARSILII (Aloys. Ferd.) Prodromus operis Danubialis . Amstelodami , & Hagae Comitum in 8. absq. anno .
- Danubii Pannonicus Myſicus . Hagae 1726. & seq. in fol. Vol. 6. cuius Prodromus anno 1700. in fol. prodidit .
Historia naturalis , ac praefertim plurium Avium descriptiones , & icones in ultimo Tomo continentur .
Volumen 5. Aves Danubiales ſunt . Vol. 6. observationes nonnullas anatomicas continet in Animalibus ,
inter quae Aquila Melanotos , & Onocrotalus examini ſubiectiuntur .
- [A. P.] Aves Hungaricas inprimis descriptas , & depictas dedit .
- MARTENS [Friderici] . Italies MARTINI . Viaggi di Spizberga , o Groenlanda , fatto da Fed. Martens Am-
burghese l' anno 1671. portato nuovamente dalla lingua Alemana nell' Italiana . Bologna 1683. in 12.
- Germanica prodiit Hamburgi 1675. in 4. & variis aliis linguis , Londini , & Amstelodami recensuſ , e-
gregius sane liber . Diverſarum marinorum Avium illius regionis notitiam tradit , & quarundam etiam
icones exponit . Alia exstat editio Germanica lingua exarata , sed de hac notitiam non habuimus .
- MATTHIOLUS (Petrus Andreas) . Nonnulla habet de Avibus in libro ſecundo Commentariorum Diſcoridis de ma-
teria medica . Innumeræ extant Matthiolis operis editiones , ac in plures linguas verſae , & pluribus etiam
normis ; extant pariter euifdem operi a pluribus addita commentaria , ut a Camerario , & Baubino , &
nonnullæ pariter prodierunt editiones contractæ , ſive operis ipſius compendia ; omnes vero editiones figu-
ris refertifimæ ſunt .
- MEYER [Io. Daniel] . Lingua Germanica , tractat de Quadrupedibus , Avibus , Amphibiosis , & Piscibus . Norim-
bergae 1748. in fol. cum figuris -- Animalia , quæ bic Author exhibet , illa nullo ordine systematico pro-
ponit , ſed ipſorum nitidissimas & coloribus accuratissime illuminatas tradit figuræ , additique Animalium
omnium in opere contentorum proprium Sceleron . Pictor Norimbergensis numeroſa animalia , inter quae
plures Aves , edidit vivis coloribus pittæ , cum ſceleris , ab anno 1749. utili omnino inflitro .
- MELANGES d' Histoire naturelle . Lugduni 1763. Tom. 2. in 12.
- Mémoires pour servir à l' Histoire des Animaux . Parisis ann. 1676. in fol. -- Cuius aliqua pars Parisis
annis 1667. & 1682. in 4. prodierat . Plenior vero , mulisque animalibus aucta editio inferta eft in Mé-
moires de l' Academie avant l' an. 1699. partemq. tertianam conſtituit . Descriptions ſunt , & diſectiones
quadrupedum Animalium , Avium , & Piscium paucorum , qui in Regis vivariis conservati , ab Acade-
miciis

- mies, Perrito maxime, & Duverneyo, disticti sunt. Splendidas icones, dimensiones sollicitae, & anatomie, sed hinc inde paulo virofor, ut in posterioribus monumentis passim corrigi oportuerit. Eas descriptiones Anglice redditit Alex. Pitfield, & edidit Londini 1687. in folio.
- MERREDITI [Christopori]. Pinax serum naturalium Britannicarum &c. Londini 1667. 1677. & 1704. in 8.
- Nonnullae in hoc opere optimae Avium icones ostenduntur.
- Miscellanea Beroliensis ad incrementum Scientiarum &c. Berolini in 4.
- Curiosa, sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum. Francofurti, & Lipsiae in 4.
- MONTI [Casetani]. De Paro minimo, Bononiensium Pendulino. In Actis Scientificis Instituti Bononiensis T. 2. Part. 2. pag. 56.
- De Naluto, sive Rhinocerote Ave, Ibid. T. 3. pag. 298.
- MOEHRINGI [Paul. Henr.] Avium genera. Auricæ 1752. in 8. — Amstelodami 1758. — Belgice versit, & notas adiecit Corn. Nozeman, atque cum notis ulterioribus edidit Arn. Vosmaer — Paulus Henricus Moehringius Avium genera, & species nova methodo a se excogitata tradit, cuius methodi, sive Systematis Synopiscam Tabulam Italice & Latine versa sistitur supra in operis huius Vol. 1. ubi de variis Systematis bus sermo habetur.
- MOULINI. In capitibus Avium observationes anatomicae. Extant in Transact. Engl. num. 137.
- NIEREMBERGII [Io. Eusebii]. Historia naturae maxime peregrinæ libris 16. distincta &c. Antwerpiae 1635. in fol. cum figuris. — In hoc opere rarissima naturæ arcana, & ignota Indiarum Animalia, inter quæ Aves defervuntur. Accidunt etiam de miris & miraculosis naturis in Europa Libri 2. &c.
- NICRISOLII [Franc.] De Onocrotalo. In exercitationibus Ferrariae 1720.
- NORRELIUS [Andreas]. De Avibus Israëlitis in cibum concessis. Amstelodami 1720. in 8.
- De Avibus eis licitis. Upsaliæ 1746. in 4. — Eruditæ est Dissertatione ex antiquitatibus præcipue desumpta. Oeconomisch-Physicalische Abhandlungen &c. H. e. Oeconomico-Physicæ Dissertationes. Lipsiae. Partes plures in 8. diversis annis editæ. Pars 5. 1753. prodit. In hoc quinto operi parte continentur Historia naturalis Columbarum, agiturque de diversis eorumdem speciebus, ritus genere, cibo, concubitu, structura partium, qualitaribus, & proprietatibus.
- OLEARII [Adami]. Gottorfische Kunst-Kemmer, Warinnen allerhand ungemeine sachen, so theils die natur &c. Scil. Museum &c. Slesvici 1666. & 1674. in 4. cum Tabulis aenois.
- OLINA [Gio. Pietro]. Uscelliera, ovvero Discorso della natura, e proprietà di diversi Uccelli, e in particolare di quei, che cantano, con il modo di prendergli, conoscergli, allevargli, e mantenergli, con le figure cavate dal vero, e diligentemente intagliate dal Tempesta, e dal Villamena. In Roma 1622. in 4. appresso Andrea Fei. 1684. appresso M. Angelo de Rossi. — In hoc libro 40. Avium accuratissimæ extant icones.
- OSBECK [P.] Iter Indiae Orientalis. Holmiae 1757. in 8.
- PECKLINI [Io.] De Aeris & Alimenti defectu & vita sub aquis. Kiloni 1667. in 8. — Loquitur de vita Hirundinum sub aquis, quas Aves in Mare demergi, non in alias regiones migrare existimat.
- PENNAT. Explanation of the Plates contained in the first publication of the British Zoology. Scil. Explicatio Tabularum ad primam Zoologiacæ editionem Britannicam pertinentium. Londini 1763. in 8. — Tabulae in hac prima collectione editæ atque distributæ numero fuerunt 24. in folio maximo figuris mirifice ad naturæ normam coloratis, inde aliae prodierunt usque ad numerum 135. in quibus non solum Aves, sed & Quadrupeda animalia totius Britanniae depinguntur. Integrum Opus in 5. dividitur partes, quæ in unico volumine adligari possunt, & ad eisdem pertinent perbreves, atque disjunctas, Anglico sermone exaratae explicationes. Naturalis Historia manussum, & accuratissimus hic Autor duo Volumina in octavo edere quamprimum decrevit, in quorum primo ampliores descriptiones memorati supra operis tradentur, in secundo vero Appendix eorum animalium, quorum species his diebus desperdita in Britanniae, est habebitur. In borum censu ex. gr. Lopus inter Quadrupeda, Oryctes major inter Aves sunt.
- PERRAULT. Memoires pour servir à l'Historie naturelle des Animaux. a Amsterdam, & Leipzig 1758. T. 4. in 4. — Ornithologica in hoc opere contenta sunt, Descriptio, & Anatome Corvi aquatici, Galli Indici, sive Misaporange Macrœvii, Gruis Numidicæ, Meleagridis, Aquilæ, Otidis, Struthionis, Casuaris, Plateæ, Balaericæ, & Vulturis magni Aistrozelis.
- Elsais de Phylque T. 3. Parisis 1680. in 12. — Multa circa peculiares partes Animalium, & signanter de Avium interna, ac diversa structura continet.
- PETINI. Epistola de Avibus Germaniae, praesertim Sylvæ Herciniaæ ad D. Fr. Ernest. Bruckmannum. Papenhein 1745. in 4,
- PETIVERI (Jacob). Muſci Petiveriani Centuriae decem, rariora naturae continentæ, videlicet Animalia, Fossilia, Plantæ, ex variis mundi plagiis advecta, ordine digesta, & nominibus propriis signata. Londini sexta, & septima 1699. Centuria octava 1700. Centuria nona, & decima 1703.
- Gazophylaci naturæ & artis Decades decem, in quibus Animalia quadrupedia, Aves, Pisces &c. descriptionibus brevibus, & iconibus illustrantur. Londini 1702. in folio. — Eiusdem Petiverii extant ad Transactionibus Philosophicis Anglicanis Vol. 20. n. 246.

- PEUCERI [Gaspari]. Appellationes Quadrupedum , Infectorum , Volucrum &c. Lipsiae 1550. in 8. Wittembergac 1551. pariter in 8.
- PHILE [sive PHILETES]. Τον Σφυρατου Φιλη Σπειρα Ιαμβικοι Περι Ζωων θεοτυπων. Versus Iambici de Animalium proprietate , cum Auctario Ioachimi Camerarii . Exposita primum eodem metro exstet verbo latina a Georgio Berfmanno Annaebergensi , Lipsiae 1575. in 4. & Traiecti ad Rhenum 1730. in 4. Quarundam A. Struthione magna , Ardeis , Corvo , Ciconis , Pavone , Pelecano , Cyano , Grubibus , Perdicibus , Gallinaceo , Anate , Anseri , ibi , Lufciniis , Hirundine , Palumbis , Turturibus , Noctua , & Cuculo . Excripsit fere Adelianum .
- PICTORII [Georgii]. Medicina simplex & composita , accessit de natura Leporum , Animalium Quadrupedum , & Avium , item cum Constantini Africani ciudem argumenti Libello , & Appiani Tractatu de Piscibus . Basileae 1560. in 8.
- PIGAFETTA [Filippo]. Relazione del Reame del Congo , e delle circonvicine contrade . Roma 1591. in 4. In hoc opere nonnulla animalia Asiatica , praecipue Aves describuntur . In collectione Asiatica itinerum Theodori de Bry prodis Francofurti 1598. in fol. & accesserunt icones Plantarum , & Animalium .
- LISONIS [Guilielmi]. De Indiae utriusque re naturali , & medica libri 14. Amstelodami 1658. in fol. cum figuris ligno incisis - Agit hic Auctor præter multa alia de Animalibus etiam aquatilibus , volatilibus , & serrestribus edilibus . Hisce subsequuntur nonnulla scripta Margravii , & Bonii .
- Historia naturalis , & medicina Indiae Occidentalis libri 5. Amstelodami 1650. in fol.
- De Medicina Brasiliensi libri 4. simul cum Marci Gravii Historia Brasiliæ a Laetio . Lugduni , & Amstelodami 1648. in fol.
- PITCARNII [Archibaldi]. Dissertatio de Legibus Historiae naturalis . Edimburgi 1696. in 12. Edita inde fait Roterodami 1714. in 4. in eius operibus medicis ; iterum Venetiis cum reliquis Auctoris operibus 1716. in 4. atque Lugduni Batavorum 1737. pariter in 4. -- In memorata hac Dissertatione acerrimam agit Pitcarnius censuram contra Robertum Sibbaldum Scotum , qui Scotiam illustratam , sive Prodromum Historiae Naturalis Scotiae edidit .
- PIVATI [Io. Francisci]. Nuovo Dizionario Scientifico , e curioso ec. Venezia 1749. Tom. 10. in fol. cum fig.
- PLINIUS [Caius Secundus]. Historiam Mundi libris 37. conscriptis . Huius Historiae præcipuas , atque permulatas editiones , & in alias linguis translationes enumeravit ordine Segueri in sua Biblioteca Botanica , nec non Gronovius in Biblioteca Regni Animalis , idoque earumdem notitia supervacuum omnino est , ut hic inferatur , cum præcipue nullus sit , qui in domestica sua Biblioteca Plinianæ Historias aliquæ careat editione . Naturæ hic contemplato omnia , quæ ex scriptis , relationibusque aliorum colligere potuit , Historia sua naturali perscriptis . Huius libro 10. varia de Avibus , eaque lectu dignissima traduntur , exiguo tamen scientiae augmento , siquidem notae Avium characteristicas a rostro , pedibus , pennis &c. desumendae quaesi ubi sunt defunt . Iusuper mirabilium cupidus atque credulns plurima in Historia suis inferuit , quæ perutum naturam scrutatorum , & verum Physicum hanc parum dedecabant .
- PLUCHE . Spectacle de la Nature , ou Entretiens sur les particularités de l' Histoire naturelle in 8. que sunt cum Tabulis aeneis pluribus Voluminibus digestæ . Fluvimae buvis operis extant editiones , nempe Gallica . Parisi Vol. IX. Ultraiecti 1735. Tom. 8. Belgica Hague Comitum 1737. & 1748. Tom. 10. -- Hispanica Meriri 1752. in 4. -- Italica Venetiis 1743. in 8. Tom. 14. Tomus secundus editionis Gallicæ , & Italicas agit de Avibus in genere , & de Avibus rapaciis .
- POMET [Petri]. Histoire générale des Drogues . Parisis 1694. in fol. Plurima de Avibus occurunt .
- PONTOPPIDANS [Enrich]. Verluch einer naturalichen Histoire von Norwegen &c. Scil. Historia naturalis Norvegiae . Hafniæ 1752. in 4. -- Ex Danico in Germanicum versit idiomæ lo. Adolphus Schlieben Hafniæ in 8. Tomis duobus , sive partibus ; pars prior 1752. pars posterior 1754. Anglice pariter versa edita est Londini 1755. in 8. -- Norvegiae Aves hic describuntur , & Tabulis aeneis illustrantur . Animadversiones nonnullæ in hunc Librum leguntur in Gentem . Magaz. Vol. 25. pag. 321.
- PRAETORII [lo.] De Crotalistria tepidi temporis hospite . Lipsiae 1672. in 4. -- Avem hanc byeme non avare , sed latere cum Kleinno doceat .
- PREVOST . Histoire des Voyages . Parisis 1753. & seq. Tom. 64. in 12. cum fig.
- RABANI [Mauri]. Exemplar vetustissimum , absque titulo , ac litteris initialibus , impressum vidit Laurentius Theodorus Gronovius , in 22. libros divisum , de Animalibus , & Fossilibus , ac Mineralibus . In libro 8. agit hic Auctor de Avibus .
- RAII [lo.] Synopsis methodica Avium , & Piscium opus posthumum . Londini 1710. & 1713. in 8. -- Haec Raii Synopsis breves & distinctas plurium Avium descriptiones plausibili ordine dispositas continent , ut videre est in Vol. 1. nostræ Ornithologiae , ubi diverorum Auctorum methodos perstrinximus . Memoratus hic Auctor Aves ex omni Telluris parte in colligendo a Slovio , aliisque huius scientiae amatoribus hanc leviter adiunxit est .
- Collectio itinerum ab eodem institutorum [Anglice] . Londini 1738. in 8.
- A collection of English Words not generally used , with Catalogues of English Birds , and Fishes , metals , minerals ec. Hoc est Collectio nominum minus in Anglia usitatorum cum Catalogo Avium , Piscium , Metallorum , & Mineralium Anglicarum ec. Londini 1671. in 12.
- RAMUSIO [Gio. Batista]. Delle Navigazioni , e Viaggi Vol. 3. edizione seconda corretta , ed ampliata , in fol.

- fol. Venetiis Vol. 1. 1554. Vol. 2. 1559. Vol. 3. 1556. — Volumen enim tertium ante secundum editum fuit. Multa de Avibus Indicis, tum terrestribus, tum maritimis, eorumque per Insulam Cubam ingenti, ae memorabili transitu explanantur.
- RAIMONDI (Eugenio Bresciano) Delle Cacce libri quattro, a Bresciano in 4. con fig. In Napoli 1626. parimente in 4. con figure, nuova impressione coll'aggiunta del quinto libro della Villa. Ab hoc multa mutuata est Olina.
- Rei Accipitriacae Scriptores. Luteriae 1612. in 4.
- REAMUR (Mde) L'art de faire elclorre & d'elever en toute saison des Oiseaux domestiques de toutes espèces ec. in 12. Vol. 2. — Exeat prima, & secunda editio, utraque cum figuris. Parisii, & Hagae Comitum 1750. 1751. Anglice pariter prodit in 8.
- ROBERT (Nicolai) Recueil des Oiseaux les plus rares tirez de la Menagerie Royale du Parc de Versailles, delinez, & gravez d'apres la nature. à Paris 1676. in fol.
- ROBERG, & LITHENIUS. De Lagopode. Upsaliae 1732. in 4.
- ROCHEFORT. Histoire des Isles Antilles. Roterodami 1662. in 4.
- ROQUE [de la]. Voyage de Syrie, & du Mont Liban à Amsterdam 1725. Tom. 2. in 12.
- Zodiacus Medico-Gallicus, sive Miscellaneorum Medico-Physicorum ec. Opera Nicolai de Blegny, & de la Roque. Parisii in 4.
- RORARI [Henrici]. Quid animalia ratione melius utantur. Helmstadii 1728. in 8. cum notis uberrimis I.H.Ribovii.
- RUDECKII. Avium pictura, de quibus frequenter sermonem agit Linnaeus in Fin. Svec.
- RUYSCH [Friderici]. Theatrum universale omnium Animalium. Amstelodami 1718. Vol. 2. in fol.
- Thesaurus Animalium primus Amstelodami 1710. in 4.
- Auctarium Historiarum naturalis ec. Gedani 1745. in 4.
- RUSSEL [Alexandri]. A natural History of Aleppo and parts adiacents &c. Londini 1756. in 4. cum tab. 16. aeneis — Plurima animalia, inter quae & Aves, incognita, & rara describuntur, atque iconibus nisi diffinis illustrantur.
- RUTENSCHIOELD. De Tetraone Spurio. Agt. Svec. 1744.
- RZACZINSKY [Gabrielis]. Historia Naturalis curiosa Regni Poloniae ec. in Tractatus XX. divisa. Sandomiriae 1721. in 4. Omnes fere Aves buius Regni in hoc opere describuntur.
- SCHELHAMERI [Guntheri Christoph.]. Ciconiae Anatome. Miscell. Nat. Cur. Dec. 2. ann. 1. 1682. obs. 130.
- De Avibus erctis incedibus. Miscell. Nat. Cur. Dec. 2. ann. 9. 1690. obs. 145. & 147.
- SCHEUCHZERI [lo. Casp.] Physica sacra. Augustae Vindelicorum 1735. Tom. 4. in fol. cum Tabulis 750. nisi diffinis aeneis — Amstelodami 1735. textu Belgico Tom. 15. — Hisco tabulis plures Aves exhibentur, Describuntur vero Aquila, Gyrfalco, Aletus, Milvus, Vultur, Corvinum genus, Strusio, Noctua, Accipiter, Bubo, Onocrotalus, Ardea, Ibis, Cygnus, Pelecanus, Ardea stellaris, Merops, Vultur aureus. Ardea carules, Pulicis, Milvus aeruginosus, Chrysaetos, Ciconia, Hirundo, Graculus, Falco, Chadorion, Psittacus, Urogallus, Upupa, Pygargus, Grus, Paffer, Pavo &c. — Insuper celeberrimi buius Auditoris exeat Anatome Ardeae Stellaris, & Colimbi maximi caudati, in Actis Breslaviensibus ann. 1725. Anatome Vulturis Boërici in Actis insdem ann. 1726.
- SCHEUCZERI (lo. Iac.) Bibliotheca Scriptorum Historiae naturalis omnium Terrae regionum &c. & Iacobi Le Long Tractatus de Scriptoribus Historiae naturalis Galliae. Tiguri 1716. in 4. Ibid. 1751. in 8.
- SCHOTTI (P. Casp.) Physica curiosa, seu mirabilium naturae. Heribopolis 1667. in 4. — Agitur in hoc opere de Monstris, Quadrupedibus, Avibus, Piscibus &c.
- SCHWENCKFELD [Casp.]. Thero-Tropaeum Sileiae, in quo Animalium, hoc est Quadrupedum, Reptilium, Avium &c. natura, vis, ac usus seu libris perstringuntur. Lignicis 1603. in 4. — Libro 4. comprehenduntur Aves ordine alphabetico. Descriptiones harum optimae sunt, lices nimis compendiariae, paucioresque notas, ut facile distinguantur, attingentes, cum figuris praecipue caret opus.
- SEBA (Albertus). Locupletissimi rerum naturalium Thesauri accurata descriptio &c. Amstelodami 1734. & 1735. Vol. 2. in fol.
- SELIGMANN [I. Mich.] Aves ex Catesby naturali Historia excerpit, & scorsim excusas dedit Norimbergae 1749. & 1750. in fol. adiectis ex Georgii Edwardi iconibus — Plurimae Aves naturalibus coloribus in hoc opere reprobentur.
- SHAW (Thom.) Travels and observations relating to several parts of Barbary and the Levant. Scil. Itineraria & Observationes in diversis Africæ, & Oriens partibus institutæ. Oxonii 1738. in fol. — Vir doctus & veri amans Africæ Septentrionalis, in qua multis annis vixit, Aegypti, & Palestinae Historiam naturalalem tradidit, cum iconibus nonnullis.
- SIBBALDI (Roberti). Scotia illustrata, sive Prodromus Historiae naturalis Scotiae. Edimburgi 1684. atque 1696. in fol. cum tabulis aeneis, rudibus ramen n. 22. — Binae haec editiones omnino eadem sunt, in posteriore anno impressionis tantum mutato. In hunc librum severissimam criticam Archibaldus Pitcaurius conscripsit. Sibbaldus revera, absque criterio & examine omnia ab aliis mutuatus est, & errores innumerous præseque indicio committi, ut quique in Historia naturali vel minimum edoctus ab ipsa operis lectione, vel a Pitcauri censura eruditur facile potest.
- SIDREN. De materia medica, & regno Animali Dissertatio. Upsaliae 1750. in 4.
- SLOANE (Hans). A Voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves, St. Christophers, and Iamaica, with the

- the natural History of the Herbs and Trees, Four-footed Beasts, Fishes, Birds, Insects, Reptiles &c.
Hoc est : Iter ad Insulas Maderam, Barbados, Nivium, S. Christophorum, atque Iamaicanum, cum natura-
li descriptione Herbarum, & Arborum, Quadrupedum, Piscium, Avium, Insectorum, Reptilium &c.
Londini Vol. 2. in fol. cum fig. Tom. 1. 1707. Tom. 2. 1725.
- An account of prodigiously large feather on the Bird Cuntur brought from Chili, and supposed to be a
Kind of Vultur. Scil. Historica Descriprio permagnae Avis, nomine Cuntur, e Regno Chilii allatae,
arque pro specie Vulturis existimatae. Exstat in Transactionibus Philosophicis Angl. Vol. 18. num. 208. p. 61.
- Musci Sloani Index generalis in Anglico Promptuario. Scil. Genit. Magaz. exhibetur in V. 22. p. 101.
STALPARTI VANDER WIEL (Cornelii). Observations rarores medicæ. Leidae 1727. in 8. cum Tabulis aeneis
pag. 403. arque Tab. 1. describitur ostenditurque Indica Avis Topan dicta.
- Storia generale de' Viaggi, o Raccolta di Relazioni di Viaggi per Mare, e per Terra. Venezia 1751.
Tom. 30. in 8.
- TERTVE [Le P. du]. Histoire des Iles Antilles &c. Parisiis 1654. in 4. & plenius 1667. & 1671. in Vol. 4.
Volumen secundum nostris scopis tantum est, reliqua fere Historica sunt, & in minutiss. versantur; volu-
men vero id perustile est, & ex eo reliqui scriptores multa baserunt. Inter naturalia producta, animalia
satis copiose describit, & depingit ex propria observatione.
- TESDORPF [Petri Henrici]. Versuch einer beschreibung von dem &c. Scil. Descriprio Colibri Avis. Lubecae
1753. in 4. — Descriprio buius Avis poetica est, atq. suppresso Auctoris nomine prodit.
- TITIUS [Io. Daniel]. De Paro minimo, Polonorum Remiz, Bononiensium Pendulino; Lipsiae 1755. in 4.
cum Tabulis aeneis — Huius Avis descriptionem dedit pariter doctissimus Caetanus Monti in Commenta-
ris Insituti Scientiarum Bononiensis T. 2. P. 2. pag. 56.
- TOLLOT. Nouveau Voyage fait au Levant dans les années 1731. & 1732. Parisiis 1742. in 12.
- TOREN (O.) Iter Surattense. Holmiae 1757. in 8. cum Obiectis Itinere Indiae Orientalis.
- TOURNEFOR [M. Piron de]. Relation d'un Voyage du Levant fait par ordre du Roy &c. à Paris Tom. 2.
in 4. cum Tabulis aeneis — à Lyon 1727. T. 3. in 8. max. — Diarium sui Itineris in Epistolas 22. di-
vidit Auctor. In Epistola 10. de Atragene loquitur, cuius Avis accuratissimamente addit iconem. In Epi-
stola 6. 9. & 22. de magna arque incredibili Perdicum copia, qua Insulae Scio, Samos, & Nanio
scarent, differit, cum notitia venationis, pretii, & circumscriptionis earumdem apud prædictarum Insularum
inhabitantes. Item in Epistola 19. Avem singularis pulchritudinis Roy des Corbeaus ab ipso nominata-
nam, & in Armenia cum aliis Avibus e genere Ardeae, & Ardeolae usq. aetate describit.
- Transactions (The Philosophical Transactions &c.) Londini in 4.
- Philosophiques de la Société Royale de Londres depuis l'année 1665. jusque en 1735. Paris. T. 11. in 4. cum fig.
- TURNERUS [Wilhelmus]. Avium præcipuarum, quarum mentio fit apud Plinium, & Aristotelem brevis Hi-
storia. Coloniacae 1544. in 8.
- VALENTINI [Mich. Bernard]. Amphitheatum Zootomicum, tabulis aeneis exhibens Historiam Animalium ana-
tomicam. Gisae, & Francofurti 1720. in fol. — Ibidem 1742. editio secunda. — Pars operis secon-
da sistit Anatomicam descriptionem Aquilae, Strubionis, Casuarii, Domicellae, Numidicæ, Tetraonis,
Ardeæ, Ciconiæ, Cycni, Anatæ, atque Anseris, Gallinæ, Meleagridis, Galli Indici, Pavonis, Co-
lumbæ, Psittaci, Cornicis, Picæ, Milvi, Corvi, arque Coracis, Nettæ, Pici, Garruli &c.
- Oder Natur- und Mineralien Kammer &c. Scilicet Museum Museorum Francofurti ad Moenum T. 3. in fol.
cum Tab. aeneis Tom. 1. 1704. Tom. 2. & 3. 1714. — Latine redditum prodit Francofurti 1716.
pariter in fol. — In Vol. primo continentur de Pavone nonnulla, de Avibus Paradisiæ, Monocotylis,
& Regiis — Contenta editionis originalis Germanicæ multum a Latina differunt — In Vol. 2. Germani-
cico ex. g. de Ave Coliby, & aliis Aviculis, de Avibus monstrosois, ac de Ovis pariter monstrosois,
plura continentur, quæ in Latino desiderantur. His accedit recitatio Rariorum, quæ in Muscis Curio-
sorum variis exhibentur.
- Prodromus Historiae naturalis Hassiae. Gisae-Hassorum 1707. in 4.
- VALENTYN [Franc.] Beschryving van oud en Nieuw Oost-Indien. Scil. Descriprio Sylvarum Americae, sive In-
diarum Occidentalium Amstelodami 1724. & 1726. in Tom. V. Tomus tertius buius operis Historiam na-
turalem totius Indiae Occidentalis pertractat, ac plures aves inter alia describit, earumdemque aliquas ta-
bulis repræbescens.
- VALVASONE [Ersimo]. La caccia ricorretta, e ampliata Libri V. in ottava rima, con annotazioni di Olim-
pio Marcucci. Venezia 1602. in 8. — Nel libro V. si ragiona degli Uccelli di rapina, delle regole di
ammæstrarli, di servirsene, e di medicarli, con più, e diverse notizie sopra i Cani da penna.
- VARGETIN [Petrus]. Noannula Ornithologica babet in Actis Acad. Svecicæ Vol. 13. pag. 167.
- VOIGTII [M. Godofredi]. Curiositates Physicae &c. Lipsiae 1698. in 12. — Inter alia de canu Cyneo, an Cy-
nus suaviter cantet, & præ primis cum morbi est vicinus, agit.
- VOTTON [Eduardi]. De differentiis Animalium Libri decem, in quibus omnium Animalium nomenclaturæ,
item singulæ eorum partes recententur tam Grecae, quam Latine. Lutetiae Parisiorum 1552.
- ULLOA [Antonius de]. An account of the Condore a monstrous Bird in South America. Scil. Historia Condo-
ris monstruosæ Avis (Vultris species) Americas Meridionalis. Exstat ex Hispanico sermone in Angli-
cum verba in Genit. Magaz. Vol. 23. Editionem Hispanicam videre non licuit, ut eiusdem normam,
& editionis annum indicare posuimus.

- URBAN [*Sylvani*]. The London Magazine , or Gentleman Montly intelligencer . Scil . Promtuarium Londonense , sive nobilibus viris dicatae Chimerides singulis mensibus prodeuntes . Londini in 8. maiori - Quamplurima ad Historiam naturalem spectantia in hoc Promtuario , sive Diario habentur , cuius duodecim particulae , una singulis mensibus prodeunte , Volumen confidunt . Volumen primum anno 1730. prodiit , ac deinceps usque ad hanc diem alia volumina periodice quotannis edita sunt .
- WAGNERI [*lo. lac.*]. Historia Naturalis Helvetiac curiosa , in 7. Sectiones digesta . Tiguri 1680. in 12. cum fig.
- De Fringilla candida . Miscell . Nat. Cur. Dec. 2. ann. 8. 1689. obs. 147.
- WALLER (Ricardi). Observations made in the dissection of a Poroquet . Scilic . Observationes in anatome Psittaci minoris , vel Psittaculae insitustae . Extant in Transactionibus Philosophicis Anglicis Vol. 18.n. 211.
- WALLIN [*Georg.*] De Hirundine alba . Upsaliæ 1733. in 4.
- WATSON [*Frider.*] The Animal World . Scil . Regnum animale . Londini 1734. in 8. cum Tab. aeneis . Expositiones proprietas , & nomina Avium , Piscium &c. ibidemque ad eorumdem cognitionem & pluribus Autobiis multa decerpit , & errores quamplures detexit , atque corredit .
- WEGNER . Dissertatio de Avium origine .
- WILLIUS (*Io. Valentinus*). De ovariis & ovis Animalium . Exstat in Act. Habseniensibus Vol. 2. pag. 147.
- WILLUGHBY [*Franc.*] Ornithologiae Libri tres . Londini 1676. in fol. cum Tabulis aeneis -- Ibidem 1678. An-
- glese , & Tabula una praecedente editione auctior -- In hoc opere Aves omnes ad ea usque tempora co-
- gnitæ in methodum naturæ suis convenientem reditæ accurate describuntur . Descriptiones iconibus maxi-
- ma ex parte Aves ad naturam experimentib⁹ illustrantur . Totum opus recognovit , digestis , supplevit *Io. Raius* . Willughbeus maximum Europæ parsim cum fecit Raio studiosissimus peragravit , Aves ex aiorum
- descriptione cognitas suis ipse oculis observando , novas adclaratoresque descriptiones compoedit , atque ipsas
- ordinis naturalis in aliquot species distribuit , & specierum subdivisionem addere tentabat , licet saepius cri-
- teria constantia querere nequivisset . Raius vero post obitum Willughbei Ornithologiam reformatam , &
- Synopsis suam methodicam eduxit .
- WITZELIUS [*Io. Ludov.*]. De Corvis albis . Miscell . Nat. Cur. Dec. 1. ann. 3. 1672. Observ. 57.
- WORMII [*Olaè*]. Museum Wormianum , seu Historia rerum rariorū tam naturalium , quam artificialium &c.
- Variis & accuratis iconibus illustrata . Lugduni Batavorum , atque Amstelodami 1655. in fol. -- A capi-
- te 16. ad 21. inclusive de pluribus Avibus loquitur Auctor , ac nonnullarum figuræ proponit , nunc ligno ,
- nam arte incisæ .
- ZIEGRAE [*Costantini*]. Dissertatio physica de Rege Avium Aquila . Wittembergæ 1667. in 4.
- De Halcyone . Wittembergæ 1677. in 4.
- ZORNII (*Io. Henrici*). Epistola de Avibus Germaniae , præsertim Sylvæ Herciniae . Pappenheim 1745. in 4.

BUONFANTI (*Prete Locpa Antonio* .) Del Pollaio , e della Colombaria Trattato Rustico Economico ec . Livorno 1768. in 8. = De

alendis , ritue custodiendis Gallinæ , & Columbis , atque maxima , quæ ex iis in economicis usibus obtineri potest , utilitate

comprobatis , firmisque regulis agit Auctor .

Description (*Anonymi*) philosophe de la nature des Oiseaux . Roven 1541. in 12. -- varus sane liber , sed inconcinnus .

CAVALERIUS (*Is. Bapt.*) Aves aeneis typis incisæ . Romæ 1595. in 4.

CORTES (*Geronimo*) Tratado de los animales terrestres y volátiles . Valenciea 1672. in 8.

LANGOLIUS (*Gibertus* .) Dialogus de Avibus cum nominibus Graecis , Latinis , & Germanicis . Coloniae 1544. in 8.

LONICERUS (*Adamus* .) Historia naturalis , ubi de Volatilibus &c. Francofurti 1551. in fol. cum fig.

MARSCHALEUT (*Nicolaus* .) Aquabilium , & Piscium Historia . Roßlachii 1520. in fol. cum fig.

TURNERUS (*Gul.*) Historia Avium , quarum apud Plinium , & Aristotelem fit mentio . Coloniae 1542. in 8.

Acciocchè il presente Catalogo non comparisse una Biblioteca quasi universale , si sono a bella posta tralasciati non pochi Autori , e Libri , come sono : molti Dizionarioj , o Lessici , inclusive il grandioso Lessico intitolato l' Encyclopedio tanto dell' Edizione di Parigi , che di Lucca , con splendifissimi rami , perchè non anco ultimato ; parimente molti Viaggiatori , alcuni Giornali , e ogni sorta di Gazzetta ; siccome diversi Cataloghi di Musei , e le opere che trattano d' Agricoltura , o della Villa , e per conseguenza degli Animali ad essa attinenti ; parimente ogni Trattato di materia cibaria , o solita a cucinarli per le mense ; diverse Farmacopee , e Trattati di materia medica , tutti i Filologi , e quasi tutti i Poeti , nell' opere de' quali si trattano molte cose che attengono agli Uccelli , e specialmente intorno alla loro origine , scelta , e prerogative . Finalmente abbiamo omesso di citare tutti i manoscritti , tutti i disegni , e tutte le carte miniate , molte delle quali si trovano in diverse Libretie tanto di Università , o d' Accademie , che di Sovrani .

Ne Bibliothecæ potius universalis nomine Catalogus hic salutaretur , permultos Auctores , arguere Libros consilio omisimus , ut Dictionaria fere omnia sunt , illo percolebri excepto sum Parisiis , cum Lucæ , nitidissimis & accuratissimis adiectis figuris , & sub Encyclopediac titulo edito , quia typis non adduc absoluто ; multis pariter peregrinantur Relationes , sive Itineraria ; Diaria extera , vel nostra , aliisque huius generis periodica Opera ; Museorum aliquot Catalogos ; de agricultura , atque ruris economia , & animalibus ad ipsam facientibus Exercitationes ; De re cibaria , vel culinaria , atque alimentorum facultatibus Traictatus ; Pharmacopœas nonnullas , & de materia medica Libros ; Philologicos omnes Auctores , & Poetarum per multa opera , in quibus non paucæ describuntur , laudantes , qualitates & facultates Aves , quoad ortum , turque . Tandem opera omnis manuscripta , Chartas , & Tabulas manu delineatas , vel depictas , quarum copia in Academiarum , & Principum Bibliothecis afferatur , prætermisimus .

STORIA AVIUM DEGLI UCCELLI HISTORIA

La quale comprende non solo una sommaria notizia di quelli che vengono rappresentati dalle Figure, o Tavole di quest' Opera, ma che si stende ancora a descrivere, e similmente illustrare tutti gli altri finora cogniti, e statici descritti da' più celebri Autori.

I numeri Romani indicano le specie, e le spiegazioni di quegli Uccelli, le figure de quali qui ritrovansi aggiunte; gli Arabici appartengono alle specie, e varietà non state figurate, ma che trovansi tuttavia descritte, e aggiunte sotto i respectivi loro Generi.

Quae Aves illas non solum ab Operis binisce Iconibus, sive Tabulis demonstratas breviter illustrat, verum earum etiam omnium, quarum a celebrioris notae Avioribus ad hanc usque diem noritiam habemus, concinnam descriptionem, atque non absimilem comprehendit illustrationem.

Romani numeri ad Aves Tabulis demonstratas, ipsarumque historicas illustrations designandas inserviunt; Arabici autem illas Avium species ac varietates indigitant, que Iconibus non ostenduntur, sed singulis, sive tamen generibus adiunctae & descriptae adinveniuntur.

T. CXXL B. - 10. 1. $\frac{1}{2}$.

PAPPAGALLO col capo giallo, e rosso. — *Pistacius luteo, ac rubro capite.*

Vien questo da alcuni annoverato tra i Paruccetti egualmente che gli altri delle Tav. CXXII. e CXXVII. e appresso gl' Indiani portano tutti indistintamente il nome di *Scincio*, e di *Sciabisi*, e tutti questi sono nativi dell' Indie.

I Paesi dove trovansi originalmente i *Pappagalli* sono la nuova Spagna, l' Isola di Banda, l' Isola Ternata una delle Molucche, il Brasile, il Malabar, la China, il Giappone, specialmente presso Giava, il Regno di Calecut, la Guiana, l' Etiopia, il Senegal, la Guinea, e più Provincie dell' America, specialmente Meridionale. Nel Regno di Calecut spesso dalla loro quantità sono divorate le femente del Riso. Trovansi parimente un paese nell' America, che dalla quantità de *Pappagalli*, che vi si trova, ha preso il nome di *Terra de Pappagalli*. Quei *Pappagalli*, che nel Brasile sono chiamati *Marganas*, vi sono in quell' istessa quantità, che appresso di noi si vedono i *Piccioni*, e perciò non sono ivi molto stimati. Se ne trovano alcuni nel Messico di colore verde chiaro, col becco nero, che abitano intorno le cime de' Monti, e stanno sugli alberi più alti, e particolarmente su i Pini. Questi di Montagna sono meno belli di corpo, e non si addomestcano, nè si rilevan per le case, e schiamazzano molto forte, e continuamente. Nel Messico trovansene però altri tutti rossi, fuorchè nel primo tratto dell' ala, e nella coda, dove

Intra Psittaculas ab aliquibus hic quoque ponitur, una cum reliquis Tabularum CXXII. & CXXVII. appellaturque indiscriminatim ab Indis, apud quos nidificant, Scincialo, ac Scibisi.

Psittacorum feraces Regiones, sive nativa loca sunt Hispania nova, Insula Banda, Ternata Moluccarum una, Brasilia, Malabar, Cibina, Iaponia, praesertim circa Iavam, Regnum Calecut, Guiana, Aethiopia, Regnum Senegae, Guinea, aliaeque Americae Meridionalis praecepit Provinciae. In Regno Calecut ab ipsorum copia saepius Oryzae sata depascuntur. Regio in America pariter est, quae tanta Psittacorum copia scaterit, ut Psittacorum Terra dicta fuerit. Psittaci speciei illius a Brasilianis Marganas dicti non minus Brasiliæ frequentes sunt, quam apud nos Columbae, ideoque non magno in pretio illic sunt. Nonnulli in Mexico reperiuntur virore diluto tincti, rostro nigricante, qui iuxta Montium cacumina vivunt, excelsisque in arboribus degant, praesertim Pinis. Hi Montani minus formoso sunt corpore, nec cicurantur, aut domi aluntur, sed clamitant veberenter, atque iugiter. Mexicanii alii adinveniuntur toti rubri, praeter bumeros, & caudam, quae cyanea sunt,

sono di color blù, i quali benchè si rilevino, ed imparino a parlare, non ostante vi riescono malamente. Se ne trova de' tanto belli in Giava, e in altre Isole dell' Indie Orientali, che più belli non si possono dipingere, i quali sono molto apprezzati anco in quei paesi, e molto più ancora farebbero apprezzari ne' nostri, se ci fossero portati, ma essendo molto delicati non reggono ad esser trasportati in Europa, come i Portughesi hanno più volte, per afferzione di Linscot, fatto sperimento. Dagli Olandesi però essendo state raddoppiate le diligenze n'è stato alcuna volta portato qualcuno vivo a Amsterdam. Uno di questi, sebbene non fosse de' più scelti, fu venduto 170. Fiorini d' Olanda. I Pappagalli delle specie maggiori vanno a coppie, i piccoli volano molti insieme.

qui licet cicurentur, & humanum sermonem imitentur, incondite ramen id ipsum agunt. In Iava, aliisque Orientalibus Indiae Insulis elegantissimi adiunguntur Psittaci, qui venustiores depingi non possunt, & apud Indos ipsos magno in pretio sunt, plurimique aestimarentur pariter a nostris, si transferrentur, sed delicatuli nimium sunt, ac difficilime vivi in Europam transferri possunt, ut plures, Linscotto teste, Lusitanis pericolo de ipsis factio contigit. A Batavis tamen tanta adibita est quandoque industria, ut aliquis ipsorum vivus adlatus Amstelodamum sit. Horum unus, tametsi non esset e selectissimis, Florensis Hollandicis 170. venundari potuit. Psittaci maiores fere omnes bini incedunt, minores turmatim volant.

T. CXXII. B. - II. -

PAPPAGALLO giallo, nelle ale e nella coda verdeggianti — *Psittacus flavus*, alis & cauda viridescentibus.

Secondo il Cadamosto appendono i *Pappagalli* i loro Nidi a rami degli alberi più alti, e gli costruiscono di figura tonda con una molto piccola apertura per impedirvi l'accesso de' Serpi; per altro quelli delle specie minori, per osservazione del Clusio, gli fanno di figura tonda, e molto stabili, e gli accomodano dentro le buche degli alberi.

SI Cadamusto credimus Psittaci Nidos ad processum arborum ramos peniles construant, exiguo foramine relicto, ut Serpentum insidiis viam praeccludant; verum Psittaci minores illos ponunt in ipsarum arborum cavis, eosque orbiculari forma, sive in pilae modum rotundos, satisque firmos struunt, Clusii observatione.

T. CXXIII. B. - 12. -

PAPPAGALLO minore, o Parruchetto verde, con il collare, o collana. — Perrucchetto dell' Olina — *Psittacus*, *Psittacula viridula torquata dictus*. — *Psittacus torquatus macrourus antiquorum* Aldrov. & Willugh. — *Psittacus macrourus* Infton. & Charlet. — *Psittacus Alexandri macrourus viridis, collaris pectoraque rubro, gula nigra* Linn. Syst. Nat. sp. 9. — *Psittaca torquata* Brisf. Sp. 55. — Gall. Perruche a collier, ou Perruche a collier noir — Angl. Perroquet.

LA specie osservata e descritta da Linneo appartiene piuttosto alla nostra descritta più sotto al num. 79, come si potrà ivi vedere, e questa da noi in questa Tavola rappresentata si crede una varietà di quella. Questo Pappagallo appunto, cioè di color verde col collare rosso, fu portato dall' Indie in Europa per testimonianza di Plinio al tempo della spedizione di Alessandro Magno, e per tal ragione è stato da diversi chiamato *Pappagallo d' Alessandro*. Le susseguenti osservazioni hanno fatto vedere, che la patria di questo sia la China, Bengala, e l' Etiopia. L' Ionston dice, che ritrovisi anco nell' Isola Spagnuola, e il Brisson in più altri luoghi dell' America.

Species a Linnaeo observata, ac descripta potius ad speciem infra a nobis descriptam num. 79. pertinere videtur, quam loco indicato vide; ea vero, quae a Tabula bac nostra ostenditur, illius tantum varietas videtur.

Psittacus hic torquatus [scilicet totus viridis torque minato] omnium primus in Europam ex India allatus fuit, ac Plinio teste, sub expeditione Alexandri Magni innotuit, ideoque ab aliquibus Psittaci Alexandri nomine insignitus fuit. In Cibina, Bengala, atque Aethiopia habitare subinde compertus est. Teste Ionstono in Hispaniola etiam Insula reperitur, & Brissonii asserto in aliis Americae regionibus.

T. CXXIV.

T. CXXIV. B. - II. -

PAPPAGALLO, detto Parrucchietto, con collana, di capo e petto vinato. — *Psittacus, Psittacula torquata, capite & petto vinaceo dictus.*

L Il Pappagallo di Bengala dell' Albino da noi descritto al num. 77. e l' Indiano nostro col collar nominato al num. 76. non differiscono gran cosa da questo. Senza dubbio alcune varietà non da altro procedono, che dalla diversità del fesso, e da altre casualità, e però non meritano di esser registrate tra le specie reali, o legittime.

T. CXXV. B. - 16. -

PAPPAGALLO, detto Parrucchietto d' America, tutto verde, di coda lunga. — *Psittacus, Psittacula Americana dictus, rorus viridis macrourus.* — *Psittacus minor macrourus rorus viridis* Aldrov. Willugh. Rai. & Sloan. — *Psittacus minor viridis, cauda producita* Brown. — *Psittacus minor viridis, cauda longiore* Edw. — *Psittaca Briss. sp. 54. — Psittacus rufirostris macrourus viridis, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice cæruleofuscis* Linn. Syst. Nat. sp. 13.

Dice il Ximenes, che nell' Isola Spagnuola si trova una gran quantità di Pappagli verdi macchietti di rosso, o di color di porpora, e ve ne sono de' grandi, de' mezzani, e de' piccoli. I maggiori son chiamati in Indiano *Higuarae*, i quali differiscono dagli altri per avere una macchia bianca alla radice del becco, e questi quando vengono instruiti riescono molto parlatori. I mezzani sono chiamati *Xaxavis*, e sono di un verde più carico, e pochissimo tramezzati da penne di altro colore. Questi sono più inquieti, e colericci, continuamente gracchiano, e mai non impaurano a parlare. Dieci di questi assaltano, e mettono in fuga cento de' maggiori, essendo fra di loro una nimicizia continua. I piccoli sono muti, e più degli altri manfueti.

In Hispaniola Insulis, inquit Ximenes, innumeri sunt Psittaci virides rubro vel purpureo maculatos, maiores, minores, & minimi. Maiores ab Indis dicuntur Higuarae, qui in ea disperant ab aliis reliquarum Insularum, quod maculam album supra rostrum gestent, & valde loquaces sint si humanos intruantur sermonem. Minores autem dicuntur Xaxavis, qui intensius virideſcunt, paucisque miniatis plumis interſtinguntur. Hi inquieti, turbulenti, mordaciores, iracundiores, & garruli sunt, sed humanis loqui vocibus nunquam discunt. Decem ex his incedunt & fugani centum Higuararum, sive maiorum, cum quibus nulla est pax. Minimi silent, & pacatores sunt.

T. CXXVI. B. - 9. -

PAPPAGALLO, detto Parrucchietto, verde scuro, con la fronte roſſiccia. — *Psittacus Psittacula dictus, ex fusco viridis, fronte rufescente.*

LIl Brasile è la patria di questo, dove vive in compagnia d'altri molti della sua specie, ed ivi è chiamato *Maitaccha*. Tra i Pappagli molti ve ne sono, che non solo imitano l'uomo nella voce, ma superano di gran lunga gli altri uccelli tutti nell' ingegno, come si può rilevare da molte istorie riportate intorno a ciò dall' Aldrovando, dal Gesnero, e dall' Ionſton. A voler che facilmente ed esplicitamente impari a parlare, bisogna instruirli prima che abbiano passato i due anni. I più inguardi sono instruiti a forza di esser battuti con una verghetta di ferro sul capo, essendo duri di senso. Le femmine tutte d'ogni specie, siccome i Pappagli delle specie minori, e tra le quali poi son muti sempre.

Habitat in Brasilia, ubi turmatim volat, distingue ab incolis Maitaccha. Psittacorum plurimi non solum humoram vocem imitantur, verum etiam ingenio aliis omnibus Avibus excellunt, ut bistorii & exemplis permultis probat Aldrovandus, Gesnerus, & Ionſtonus. Facilius accipiunt verba, & articulate fere omnia pronunciant, si eos intra alterum aetatis annum docueris. Seigniores ferrea in caput verberantur virgula, aliter id est non sentiunt propter duritatem. Psittacorum omnium foeminae, pariterque species minores, & maiores, Aratae dictae, raro, vel nunquam humanas reddunt voces; minimi autem cetero nunquam.

i maggiori le Arare, non sono, che raramente

T. CXXVII. B. - . 6. 2.

PAPPAGALLO, minore, o Parrucchietto, con la sommità del capo blù, e la fronte gialla. — *Psittacus*,
Psittacula dictus, *vertice caeruleo*, *fronte lutea*.

Alla campagna si cibano i *Pappagalli* d'ogni specie di frumento, e di legume, ma particolarmente di seme di Cartamo, detto da noi volgarmente *Grogo*, che gl' ingraffa, tuttchè a riguardo dell'uomo sia purgativo; parimente non recusano qualunque frutto tanto di scorsa tenera, che dura. Nell' Isola di Banda sono molto avidi delle Noci moscade. Gli addomesticati poi mangiano tutto ciò che venga loro dato, come pane e carne, e soprattutto gradiscono lo zucchero. Bevono acqua, ma più volentieri assai il vino, per il di cui uso non solo divengono lascivi, e più loquaci del solito, ma non diversamente che gli uomini s' imbracano ancora.

T. CXXVIII. B. - . 13. --

PAPPAGALLO detto Parrucchietto nero del Madagascar, — *Psittacus Psittacula nigra Madagascariensis* di Gus. — *Psittacus ex nigro caeruleus rostro brevissimo* Klein. — *Psittacus Madagascariensis niger* Briss. sp. 53. Gall. *Perroquet noir de Madagascar*. — Angl. *Black Parrot from Madagascar*.

VERuno de' *Pappagalli* è di carne buona a mangiarsi, essendo nera, e di cattivo sapore. Vero è che l' Imperatore Eliogabalo diede alcuna volta a' suoi commensali de' capi di *Pappagallo*, ma ciò non fu fatto per ragione di gusto, ma per lusso, e divertimento, essendo egli dietro al lusso perduto, e di null' altro trovandosi contento se non delle rarità, delle cose nuove, e di sommo prezzo, secondo che c' informa Lampridio. Per questa medesima ragione vedevansi sulle mense di questo Imperatore anco delle fiere, come Leoni, Pantere, e altre. Siamo per altro accortati da diversi, che gli Americani un tempo fa gli mangiavano, mentre dagli Orientali erano soltanto apprezzati come sacri.

T. CXXIX. B. - . 10. 2

PAPPAGALLO minore, o Parrucchietto dell' Indie Orientali col capo turchino. — *Psittacus minor*, *svoo*
Psittacula Orientalis, *capite ex caru'eo violaceo*. — *Psittaca cyanocephala* Briss. sp. 70. — Gall. *Perroquet*
ou Perruche à tête bleue.

LE penne de' *Pappagalli* sono in grande uso appreso gl' Indiani. Di esse ne formano diverse figure, e pitture, farfalle, fiori, erbe, cappelli, e parati, inoltre le rapportano, e le tessono nelle robe de' loro vestimenti, degli strati, e tappeti, siccome oltre a molte altre galanterie, e utensili ancora, che con esse fanno formare, o con esse abbelliscono, se ne servono per ornato delle loro scimitarre, e cimieri.

¶ *Vltius Psittacis adhuc feris, frumentacea omnia semina, & leguminia sunt, praesertim semen Cartabini, vulgo apud nos Grogo, quo pingueſcunt, cum bono purgetur, fructus insper omnigeni, cum molli tum duro corice teſti. In Insula Banda ad Nucem etiam myriſticam avide advolant, Cicuribus vero quidquid porrigitur, caro, panis, ſaccharum imprimis. Bibunt aquam, sed vinum multo libentius, cuius potu non ſolum laſcivi, & ſolito loquaciores redduntur, ſed & humano inebriantur more.*

¶ *NULLius Psittacorum caro eſt edulis, nam & atra eſt, & gustus iniucundi. Heliogabalus capita ipſorum in convivis exhibuit, non guſtus cauſſa, ſed luxus, & oblectamenti appa- ratu, cum in luxu perditifimus eſſet, nibilque niſi rarrum, novum & pretiosum ſibi placereſt, teste Lampridio; bac ipſa de cauſa Leones, Pantherae, aliaque fera animalia in eiusdem convivis imponebantur. Apud Occidentales tamen in cibo uſum olim babuiffe, apud Orientales vero ſacros exiftimatos Psittacos fuiffe a non nullis intelligimus.*

¶ *INDIS Psittacorum pennae in magno ſunt uſu. Ex biſ imagines varias, papilioſes, flores, berbas, pileos, & perifromata conficiunt; veſtes, aulaea, & rapetes contecunt; enſes & clypeos excornant, aliaque utenſilia miro artificio conficiunt, vel excornant.*

PAPPAGALLO minore, o sia Parrucchietto, dell' Isola di Lucon — *Psttacus minor*, sive *Psttacula*, *Lucionensis* — *Psttacus Lucionensis*, *Incolis Kilakil* Briff. sp. 41. — Gall. *Perroquet de l' Isle de Luçon*.

+ T. CXXXI. B. - 7. 1.

PAPPAGALLO detto Parrucchietto col ciuffo del Messico. — *Psttacus Psttacula Mexicana cristata* dictus: vario colore Seb. cum ione, licet non satis accurata. — *Psttacula Mexicana cristata* Briff. sp. 95. — Gall. *Perle Perruche huppée du Mexique*

+ T. CXXXII. B. - 10. -

PAPPAGALLO minore, o sia Parrucchietto col capo rosso del Regno di Gingi. — *Psttacus minor*, vel *Psttacula Ginginiana erythrocephalos*. — Gall. *Perruche à tête rouge de Gingi*.

Trovati nel Regno di Gingi nell' Indie O-
rientali. Un' altra specie che trovati pa-|| H Abitat in Ginginiano Regno in India Ori-
entale. Alia eiusdem Regni species videatur
rimente in questo paese si vedrà descritta al ∞ infra sub num. 88.
num. 88.

T. CXXXIII. B. - 5. -

PAPPAGALLO piccolissimo con la fronte, e la gola rossa. — *Psttacus minimus fronte ac gula rubris* — *Psttacus viridis minimus fronte & gula rubris* Frisch. & Klein. — *Psttacus minimus* Cluf. & Auct. ac Nieremberg. — *Psttacus pusillus viridis Aethiopicus Rai*. — *an Psttacula Guineensis* Briff. sp. 85. — Gall. *Petito Perroquet verd des Indes Orientales*; ou *Perruche de Guinée*. — Engl. *Little red-headed Parakeet*; *Guinea Perroquet*; *Smallest green and red Indian Perroquet*; *Small green Perroquet from East-India*.

Forse è una varietà di quella specie detta da Linneo *Pappagallo pullario* sp. 35. mentre quest' Autore non distingue il minimo del Clusio, che si crede questo nostro, dal suo in tal maniera detto. La specie propria Linneana si troverà descritta al num. 111. Il Pappagallo piccolo verde, e femmina, d' Etiopia del Raio, differisce dal maschio per la fronte più sbiadita di colore, e per il bordo del ali giallo. Il nostro fu portato dall' Isola di S. Tommaso.

AN *Psttaci pullarii* Linn. sp. 35. varietas? Linnaeus enim minimum Clusii, qui nostrae hic descriptae specie respondeat, a suo pullario non distinguit. Linnaea species videatur infra sub num. 111. descripta. *Psttacus pusillus viridis Aethiopicus foemina Rai* discrepat a mare capite anteriori non ita vivide rubente, & marginibus alarum luteis. Noster ab Insula S. Thomae delatus fuit.

T. CXXXIV. B. - 4. 2.

PAPPAGALLO piccolissimo con la fronte, e la grotta rossa. — *Psttacus minimus fronte ac dorso inferiore rubris*. — *Psttacus minimus viridis & ruber Indicus* Edw. — *Psttacula Indica* Briff. sp. 86. — *Avisette la Cechini Aldrovandi*. — *Psttacus Galgulus brachyrurus viridis*, *uropteryx pectoraque coccineis*, *vertice carunculatus* Linn. Syst. Nat. sp. 36. — Gall. *Perle Perruche des Indes*, ou *Perroquet Indien verd & rouge de la plus petite espèce*.

DA Linneo è stato dato a questa specie di *Pappagallo* l' epiteto di *Galgulo*, o sia *Rigogolo*, perchè ha il costume di dormire come quello con un piede alzato. Non arriva alla grandezza di una *Passera*, e quello, che fu descritto dall' Aldrovando gli era stato mandato dall' Isola di Malacca da Martino Cechini di Ravenna, che trovava si a viaggiare in quelle parti, e di particolare aveva il becco, e i piedi bianchicci.

∞ *A Linnaeo Psttacus Galgulus dicitur, quia per de altero suspenso dormit Galgulorum more. Magnitudine Paserem non adaequat, & qui ab Aldrovando describitur, missus illi fuit ex Malaca Insula a Martino Cechino Ravennate illuc peregrinante, & rostro, pedibusque erat candicantibus. Variedades aliquas buius dari com- per dieno*

dieno delle varietà è cosa manifesta. Quello ^a pertum babemus. Qui a Linnaeo describitur, per descritto da Linneo differisce per il petto cre-^b misi, e la sommità del capo celeste. E credibile però, che una tal varietà nasca partico-^c larmente dalla diversità del sesso.

+ T CXXXV. B. - 10. -

PAPPAGALLO minore verde e cremisi d'America — *Psittacus minor* e *coccineo viridis Americanus* — *Psi-*
ttaeus viridis minor occidentalis Edw. — *Psittacus autumnalis brachyrurus viridis*, fronte remigumque macula coccinea, vertice remigibus primoribus caeruleis Linn. Syst. Nat. sp. 31. — *Psittacus Americanus* Briss. sp. 40. — Gall. *Perroques d' Amerique* — Engl. *Lesser green Parrot*.

Nella grandezza si accosta appresso a poco ^a *Columbam magnitudine circiter aequat*.
a quella di un Piccione.

37. PAPPAGALLO detto Arara di Giamaica. = *Ara lamaicensis*. Briss. sp. 2. *Idem est ac Brasiliensis a nobis di-*
gus Tab. CII. & in Guiana, Brasilia, & Jamaica habitat.
38. PAPPAGALLO detto Arara blù, e gialla di Giamaica. = *Psittacus Ara ex luteo & caeruleo varia lama-*
icensis dictus. = *Ara lamaicensis cyaneo croceo* Briss. sp. 3. = *Psittacus caeruleo luteus* Klein. = *Superioris*, sive Tab. CII. *varietas, reputaturque eius foemina*.
39. PAPPAGALLO detto Arara di color vario dell' Isole Mollucche. = *Psittacus Ara Moluccensis varia dictus*. =
Ara Moluccensis varia Briss. Sp. 5. = *Psittacus Orientalis exquisitus Loeri dictus* Seb. cum accurata Icone,
licet perparata ibi depicta cum digitis tribus antec. = *Psittacus capite nigro collaris viridi, Lorii, dictus Klein.*
= *Longicaudus* est, superne saturate cyaneas, inferne saturate viridis rubro variegatus, capite superne nigra, collo
superiore torque viridi ex rubro cincto, collo inferiore & pectore dilute rubris, retricibus viridibus subbus ru-
bris, marginibus nigricantibus. = *Craffitae Columbam domesticam maiorem*, sive Romanam circiter aequat.
40. PAPPAGALLO detto Arara verde del Brasile descritto dal Brisson. *Ara Brasiliensis viridis* Briss. sp. 6. =
Psittacus severus macrourus viridis, genis nudis, remigibus, retricibusque caeruleis subbus purpurascensibus
Linn. Syst. Nat. sp. 5. = *Plurimum cum specie sub Tab. CI. depicta convenis*, si non eadem. *Synicipse in-*
signatur, & tamen utrinque secundum maxillam inferiorem castaneo purpurascensibus; *vertice caeruleo, mar-*
ginibus alarum coccineis, calcaneis rubro circumdati; *genis nudis, candidis, lineis plumosis nigris striatis*;
retricibus superne in escutis viridibus, apice caeruleis, subbus obscure rubris; oculorum iridis, rostro, &
unguis nigris, pedibus vero fuscis. *Longitudu bujus ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem Pa-*
risensem, & quinque pollices aequat.
41. PAPPAGALLO detto Arara verde, e rossa del Brasile. *Psittacus Ara Brasiliensis ex viridi, & rubro varia.*
Ara Brasiliensis Erythrocephala Briss. sp. 7. = *Maracana Brasiliensis* Marceg. Willughb. = *Maracana Ara-*
rae, id est *Macar species minor* Rai. = *Psittacus minor prolixa cauda, maculis flammeis conspersus* Barr. =
Columbam domesticam maiorem craffitae aequalis, & in Jamaica, Guiana, & Brasilia habitat dicuntur. *Sa-*
turate viridis est macula in synicipte fusa, vertice viridi caerulefusca, macula in alarum exerto miniatæ;
genis nudis, candidis, lineis plumosis nigris striatis; retricibus superne prima medietate viridibus, altera
cyanis, subbus saturate rubris. *Rostro nigro, pedibus fuscis*.
42. PAPPAGALLO detto Cacatua tutto bianco. = *Psittacus Cacatua tota alba dictus*. = *Cacatua* Briss. sp. 8. =
Psittacus albus cristatus Aldrov. Ionst. Charlet. Willugh. Rai. & aliorum. = *Kakatoeba tota alba* Klein.
= *Est varietas tantum nostræ Tab. CXVII. Toto corpore & crista niveus est, remigibus tamen maioribus,*
& retricibus lateralis interius prima medietate sulphureo colore imbus; *rostro, pedibus, unguibusque ni-*
gris. In Moluccis habitat.
43. PAPPAGALLO cremisi dell' Isola di Ceram, con le ale e la coda di diversi colori. *Psittacus Ceramensis*
coccineus, remigibus, retricibusque varie pictis. = *Psittacus coccineus*, alis ex nigro & viridi variis Willugh.
= *Psittacus coccineus Orientalis*, alis ex viridi & nigro variis Rai. = *Psittacus purpureus* Charlet. = *Lory*
Rai. = *Negra Clus.* Ionst. Nieremberg. = *Psittacus rufus, femoribus aliquo viridibus* Frisch. & Klein. =
Lorius Ceramensis Briss. sp. 13. = *Psittacus Aurora brachyrurus coccineus*, alis viridibus nigrisque, retricibus
fusis medietate posita virescensibus Linn. Syst. Nat. sp. 22. = *Hic Turturem craffitae adasquas Brissonis tententia*,
& rostro donatur rubro, pedibus fuscis. *Rauis idipsum decribit rostro flavo*. *Linnæi vero iudicio Turdum non*
superat. Ergo hanc plures obseruantur varietates, sive plures quæ existant diversæ species ab Autoribus per-
substantur. A Brissonio Psittacus rufus, femoribus aliquo viridibus Frischii non sciungitur a suo Ceramen-
si; Linnæus vero eundem facit cum Psittaco suo gallulo sp. 21. qui dicitur Psittacus brachyrurus ruber,
scriptio brevicanus est, coccineus, retricibus alarum superioribus minimis luteis, remigibus maioribus ex-
sursum superne viridibus, inferne cinereo albis, interius coccineis, apice saturate cinereo; retricibus quaruor
Moluccensi nostro Tab. CVI quem vide. Ergo Moluccensis noster idem ac Garrulus Linnæi.

44. PAPPAGALLO cenerino sbiancato con le ale e la coda rossa. = *Psiittacus* *sordide albus ad cinereum vergens*, *bris* Briss. sp. 12. = *Psiittacus erythrocephalus* Aldrov. Willugh. & Charlet. = *Cacatua alba* & *cauda ru-*
Sylt. Nat. sp. 19. *Galimum crassifrons adaequatur*, *sordide albus*, *ad cinereum vergens*, *uroptygio*, *restricibus remigibusque* *caccineis* Linn.
restricibusque minicais; *rostro nigro*, *pedibusque subnigris* *donatur*.
45. PAPPAGALLO rosso e nero del Brasile. = *Psiittacus* *coccineus* & *nigro varius* *Brasiliensis*. = *Paragua* *Mareg-*
venit, *brevicaudus*, *capite*, *collo superiore*, *imo ventre*, *alba*, & *cauda nigra*; *coccineus* *in reliquis*; *rostro*,
pedibusque obscure cinereis.
46. PAPPAGALLO rosso con collana gialla, e coda porporina. = *Psiittacus coccineus*, *collari luteo*, *cauda purpu-*
rafcante. = *Lorius torquatus Indicus* Briss. sp. 18. = *Psiittacus capite cyaneo*, *collari luteo* Alb. & Klein. =
Brevicaudus ac Tururus crassifrons; *uroptygio* & *imo ventre* *ex albo* & *rosto variegatus*, *rostro flavescens*, *pe-*
dibus cinereis, *unguis nigris*. *Brasilium frequenat Albini iudicis*; *In India positus Orientalis cum inveniri*
47. PAPPAGALLO superiormente di color cremisi pieno, e di sotto di color violetto cupo d' Amboina. = *Psiittacus*
superne saturate coccineus, *inferne obscure violaceus* *Amboinenesis*. = *Lorius Ambainenensis* Briss. sp. 19. = *Psi-*
tacos omnes Loriis dictis crassifrons superat. *Brevicaudus est*, *ac rostro donatur obscure rubro*, *pedibus fuscis*,
unguis nigris.
48. PAPPAGALLO di testa e petto giallo, di Giamaica. = *Psiittacus capite & pectori luteis*, *Iamaicensis*. =
Psiittacus melanorinchos Charleth. -- *Psiittacus viridis melanorinchos* Aldrov. Willugh. Ioston. & Barr. = *Psi-*
ttacus Iamaicensis *leucocephalus* Briss. sp. 20. = *Psiittacus viridis*, & *luteus Barbadensis* Alb. = *Psiittacus Gui-*
nenensem *cinereum crassifrons circiter acumulatus*; *brevicaudus*, *viridis*, *inferne ad luteum vergens*, *fincipite &*
guttura caeruleo-viridis, *capite & pectori luteis*, *marginibus alarum*, & *restricibus caudae inferioribus coccineis*,
restricibus viridi-luteis; *rostro*, & *unguis nigris*, *pedibus fuscis*. *Conferatur Psiittacus num. 62.*
49. PAPPAGALLO col capo celeste del Brasile. = *Psiittacus capite caeruleo Brasilensis*. = *Psiittacus Brasilensis* *cyano-*
cephalus Briss. sp. 21. = *Aiuru-curaia Rai*. = *Aiuru-curaia Psittaci tertii species* Mareg. = *Præcedentem*
crassifrons adaequatur, *brevicaudus*, *viridis*, *capite superius caeruleo*, *nigra mixta*, *vertice & maculis infra oculi*
luteis, *guttura caerulea*; *restricibus superne dilute viridibus*, *inferne viridi-luteis*; *rostro ad basim cinereo*,
ad apicem nigro, *pedibus cinereo-caeruleis*.
50. PAPPAGALLO verde e giallo dell' Isola di Barbados. = *Psiittacus viridis & luteus* *Barbadensis* -- *Psiittacus*
viridis & luteus, *capite cinereo* *Barbadensis* Klein. -- *Psiittacus Barbadensis* Briss. sp. 22. = *Crassifrons Colum-*
bam domesticam maiorem simulatur, *sotto corpore luteus*, *fincipite dilute cinereo*, *remigibus intermediis pri-*
ma medietate exterioris rubris, *restricibus viridibus*; *rostro colore carneo imbus*, *pedibus cinereis*.
51. PAPPAGALLO verde, giallo, e celeste dell' Isola di Caienna. = *Psiittacus viridis luteus*, *ac caeruleus Ca-*
yanensis = *Psiittacus*, *subrus flavescens*, *superne ex viridi caeruleus* Barr. = *Psiittacus minor viridis* Edw. =
Psiittacus Cayanensis Briss. sp. 23. = *Psiittacus agilis submacrourus viridis*, *restricibus remigum primorum caeru-*
lescentium fulvis, *cauda subrus rubra* Linn. Syst. Nat. sp. 15. Linnaeus bunc magnitudine facit *Coccocephalus*,
Edwardus vero, & Brissotius idipsum Columbae crassifrons dicunt. *Cauda constat parum elongata cunei-*
formi, *rostro*, *pedibusque dilute cinereis*, *atque in Cayana*, *variisque Americanae locis habitat*.
52. PAPPAGALLO col capo rosso del Brasile. = *Psiittacus capite rubente* *Brafiensis*. *Psiittacus Brasilensis* *erythro-*
cephalus Briss. sp. 24. = *Tarabe* *Brafiensis* Mareg. Ionit. Willugh. & Rai. = *Magnitudine Columbam do-*
mesticam maiorem superat, *brevicaudus*; *viridis capite*, *guttura*, *collo inferiore*, *pectore & restricibus super-*
ioribus minimis alarum rubris; *rostro pedibusque obscure cinereis*.
53. PAPPAGALLO di coda rossa, o col collare, di Giamaica. = *Psiittacus Iamaicensis* *gutture rubro*, *feu torquea-*
tus. = *Psiittacus minor*, *collo miniaeo* Rai. = *Psiittacus minor*, *collo*, *feu torque miniaeo* Sloan. = *an Xa-*
kabes Oviedi. = *Psiittacus Iamaicensis* *gutture rubro* Briss. sp. 25. = *Psiittacus collaris* *brachyurus*, *viridis*,
collo rubente Linn. Syst. Nat. sp. 34. *Articulare loquitur*; *canda est lata*, *ac brevi*; *crassifrons vero Co-*
lumbam ferme adaequatur.
54. PAPPAGALLO collo fronte bianca della Martinica. *Psiittacus fronte alba Martinicanus*. = *Psiittacus Marti-*
nicanus Briss. sp. 26. = *Psiittacus leucocephalus brachyurus* *viridis*, *remigibus caeruleis*, *fronte alba* Linn. Syst.
Nat. sp. 26. = *Psiittacus leucocephalus* Aldrov. = *Psiittacus viridis fronte alba*, *collo rubro* Frisch. = *Psi-*
ttacus viridis, *capite albo* Edw. = *Magnitudine cum Turture convenit* Brissotius *observatione*, *fincipite est albo*,
vertice caeruleo, *rubris maculis vario*, *corpore viridi*, *medio ventre rubro mixto*, *genis*, *guttura*, & *collo in-*
feriore coccineis, *restricibus lateralis rubris*, *apice viridibus*, *rostro pallide carneo*, *pedibus saturate fuscis*.
55. PAPPAGALLO della Martinica con la gola rossa, o sia il Pappagallo descritto dall' Olina. = *Psiittacus Mar-*
tinicanus *gutture rubro* Briss. sp. 27. = *Psiittacus maior* Ionit. Willugh. & Rai. = *Psiittacus maior albicans* *ca-*
pite luteo Barr. Histor. = *Synonimis a Linnaeo* *Psiittaco leucocephalo appositis*, *bunc varietatem superioris ef-*
se apparet. *Columbam domesticam maiorem magnitudine sequare dicit* Brissotius, *pennis in apice nigro mar-*
ginatis; *fincipite albo*, *collo inferiore dilute rubro*, *pennarum marginibus albis*; *ventre obscure purpureo*;
restricibus quatuor utrinque extimus interius prima medietate rubris, *altera luteis*, *viridis luteo terminatis*, *exti-*
ma exterioris caerulea; *rostro pedibusque carneo colore imbus*, *unguis griseis*. *In Martinica non solum ha-*
bitat, *sed etiam in Guiana*, & *Iamaica*.
56. PAPPAGALLO della Martinica con la testa celeste. = *Psiittacus Martinicanus* *cyanocephalus* Briss. sp. 29. =
Crassifrons cum Columba circiter convenit, *brevicaudus fincipite albo*, *vertice cinereo-caeruleo*, *ventre rubris*,
maculis vario; *restricibus interius ex rubro & luteo noratis*; *rostro albo*, *pedibus griseis*.

57. PAPPAGALLO con la testa turchina della Guiana. = *Psittacus Guianensis Cyanocephalus* Briss. sp. 28. = *Craffitio Turcicum* non multum antecellis, brevicaudus, viridis, pennis in collo superiore, ♂ dorso supremo nigricantibus, in pectore caeruleo-violaceo marginatis, capite, gutture, & collo inferiore caeruleo-violaceis; rectricibus quatuor uringue extimus interius prima medietate rubris, altera viridibus, caeruleo superne terminatis, tribus extimus superne exterius caeruleo-violaceis; rectricibus ex viridi caeruleis; rostro cinereo-nigricans, macula superius quadrata pallide rubra, pedibus carnis. In Guiana, aliisque Americae locis habitat.
58. PAPPAGALLO con la fronte rossa del Brasile. *Psittacus Brasiliensis* fronte rubra Briss. sp. 30. = Idem ac *Psittacus variegatus Brasiliensis noster* Tab. CXV. quem vide.
59. PAPPAGALLO del paese delle Amazzoni. = *Psittacus Amazonicus* Briss. sp. 31. = *Psittacus viridis*, capite luteo fronte caerulea Frisch. cum accurate Icone. *Psittacus viridis*, capite croceo, fronte cyanae Klein. = *Aurru*. = *Curau* *Brasiliensis* Marcgh. Ionit. Willugh. & Rai. = *Columbam domesticam maiorem* craffitie circuerat, brevicaudus, viridis, sincipite caeruleo ad violaceum inclinante; vertice, genisque luteis, remigibus 5. intermediis exterius superne prima medietate rubris, rectricibus 3. uringue extimus interius rubris, taenia transversa saturata viridi notaris, apice viridi-luteis, 4. extimus rubra macula uringue exterius insignis, rostro cinereo, pedibus cinereo-albis. In regione Amazonum, & Brasilia habitat.
60. PAPPAGALLO del Paese delle Amazzoni con la fronte gialla. = *Psittacus Amazonicus* fronte lutea Briss. sp. 32. = Cum precedente craffitie corporis, & caudae longitudine convenient; viridis sincipite pallide flavo, vertice, genisque luteis, taenia supra oculos caerulea, remigibus 4. intermediis prima medietate rubris, caudae uringue extima caeruleo-violacea, tribus uringue proximis rubra macula insignitis, rostro in exortu lutescente, apice cinereo, pedibus cinereo-albis, unguibus nigricantibus.
61. PAPPAGALLO del Paese delle Amazzoni con la gola gialla. *Psittacus Amazonicus* gutture luteo Briss. sp. 38. = *Psittacus viridis* alius capite luteo Frisch. -- *Psittacus capite, humeris, & femoribus luteis* Klein. = Rostro est candicans, pedibus cinereo-albis, unguibus cinereis.
61. * PAPPAGALLO del Paese dell'Amazzoni variegato, o sia macchiato di giallo, e di rosso. = *Psittacus Amazonicus varius*, sive ex luteo, & rubro maculatus. *Psittacus major viridis maculis luteis, & rubris* Frisch. cum accurate Icone. = *Psittacus viridis major*, maculis rubris, luteisque, fronte caerulea Klein. = *Psittacus secunda species* Marcgr. = *Psittaci maioris*, seu mediae magnitudinis Marcgr. sp. 2. Willugh. & Rai. = *Psittacus viridis major occidentalis* Edw. = *Psittacus Amazonicus varius* Briss. sp. 37. = *Psittacus aetius brachyrurus* viridis, fronte caerulea, humeris sanguineis Lin. Syst. Nat. sp. 27. = *Craffitio Columbam Romanam*, sive domesticam adaequat, rostro est nigrum, vel cinereo, dorsi pennis luteo adspersis. Habitat in America, praecepit in Amazonum regione, & Brasilia. = *Lianaeus aetius* cum *Psittaco Olinae superius a nobis indicato num. 55. cum Psittaco viridi melanorhynchos Aldrov. num. 48. & viridi ac luce Barbadense num. ipso 48. arque idem est ac noster* Tab. CXV. depictus.
62. PAPPAGALLO del Paese delle Amazzoni meno macchiato di giallo e di rosso, della specie antecedente. = *Psittacus Amazonicus*, minus speciei superioris ex luteo, ac rubro maculatus. = *Psittacus Amazonicus Brasiliensis* Briss. sp. 35. = *Craffitio* cum specie superiori convenient, rostro est cinereo, basi mandibulac superioris rostra, pedibus cinereo albis, unguibus nigricantibus. In Amazonum regione & Brasilia habitat.
63. PAPPAGALLO del paese delle Amazzoni, e della Giamaica del Briss. sp. 36. = *Psittacus Amazonicus Iamaicensis* Briss. sp. 36. = Cum *Psittaco nobili* Linn. sp. 4. convenient, arque idem est ac noster Tab. CVIII. sive *Psittacus viridis* alarum costa superne rubente Aldrov. Ionit. Charlet. Rai. & Barr. qui in Amazonum regione, Guiana, Brasilia, & Iamaica.
64. PAPPAGALLO del Paese delle Amazzoni col becco variegato. = *Psittacus Amazonicus* rostro variegato. = *Psittacus Amazonicus poikilorynchos* Briss. sp. 34. = *Psittacus poikilorynchos* Aldrov. Ionit. Charlet. Willugh. & Rai. = In hoc mandibula rostris superior ex viridi ad caeruleum, ad basim, inclinat, ad latera obovae est colore, versus vero apicem taenia transversa candida notatur; mandibula vero inferior in medio lutescente, in circumferentia plumbeo colore tingitur.
65. PAPPAGALLO della China. *Psittacus Cibensis* Briss. sp. 39. = *Craffitio Gallinam* mediocrem aemulatur, viridis, lateribus & rectricibus alarum inferioribus rubris, marginibus alarum caeruleis; oculorum iride virende aurantia; mandibula superiore in exortu rubra versus apicem flavicante, mandibula vero inferiore nigra, pedibus nigris. Habitat tum in Sina, tum in Amboinensi Insula.
66. PAPPAGALLO della Guadaluppa. = *Psittacus Aquarum Lupiarum Insulae* Briss. sp. 44. = *Columbam craffitie similis*, brevicaudus, superne viridis, inferne cinereo-caeruleo-scapularis; capite & collo cinereo-caeruleo-scapularis, viridi & nigro variegatis; alis viridibus luceo & rubro variegatis, cauda viridi.
67. PAPPAGALLO scuro del Messico, o della nuova Spagna. = *Psittacus fuscus Mexicanus*, vel novae Hispaniae. = *Psittacus fuscus* Edw. = *Psittacus novae Hispaniae* Briss. sp. 45. = *Psittacus Sordidus brachyrurus subfuscus*, gula caerulea, alis caudae viridibus, rostro quoque rubris Linn. Syst. Nat. sp. 18. = Praecedenter craffitie circutor aemulatur, rostri basi lutea, mandibulae superioris medio nigro, reliquis rostri partibus coccineis; pedibus plumbatis, unguibus nigris. Habitat in Mexico & in illa Americae parte Hispania nova dicta.
68. PAPPAGALLO celeste della Guiana. *Psittacus Guianensis caeruleus* Briss. sp. 46. = *Psittacus versicolor*, seu erythrocyanus Aldrov. Willugh. & Rai. = *Psittacus violaceus* Barr. = *Psittacus caeruleocephalus brachyrurus*.
69. PAPPAGALLO giallo del Messico, e del Brasile. = *Psittacus luteus Mexicanus*, & *Brasiliensis*. = *Psittacus*

- luteus Brifs. sp. 47. -- Cum Columba domestica maiore crassitie convenit, brevicaudus, luteus, marginibus alarum, & remigibus maioribus in medio rubris; rostro, pedibus, & unguibus candidis.
70. PAPPAGALLO giallo dell' Isola di Cuba. -- *Pstittacus luteus Insulae Cubae* Brifs. sp. 48. -- *Pstittacus mediocris*, pectore & ventre rubello mixtis, veritate albo Brown. -- *Pstittacus Paradisi ex Cuba* Catesb. Klein. *Pstittacus [Paradisi] brachyurus luteus*, angulo abdominis, rectricibusque basi rubris Lin. Syst. Nat. sp. 28. -- *Parumper Pstittaco Guineensis cinereo* Tab. CXII. crassitie cedit; brevicaudus, luteus, pennis in apice rubro marginatis, gutture, collo inferiore, & ventre coccineis, remigibus maioribus albis, rectricibus lateralibus prima medietate rubris, rostro, pedibus & unguibus albis. -- Huius certe varietas *Pstittacus superior* 69.
71. PAPPAGALLO di Guinea con le ale rosse. *Pstittacus Guineensis alis rubris* Brifs. sp. 49. variet. -- A *Pstittaco* Tab. CXI. alis tantum rubro maxime variegatis discrepat. Hic aeque ac *Pstittaci* Tab. CXII. & CXIII. non articulata loquitur, sed fortiter sibilat, nonnullisque animalium voces effingit.
72. PAPPAGALLO verde del Messico col petto bianco. -- *Pstittacus viridis Mexicanus pectore albo* Brifs. sp. 42. *Pstittacus [melancephalus] brachyurus viridis*, subtus luteus, pileo nigro, pectore albo Lin. Syst. Nat. sp. 33. -- *Turturum crassitie circiter acuminatus*; macula infra oculos viridi; genis & collo inferiore luteis; collo superiore & imo ventre aurantiis, rectricibus viridibus; rostro carneo colore imbuo, versus apicem obscuriore; oculorum pupilla nigra, iridibus saturate avellanensis; pedibus cinereo fuscis, unguibus nigricantibus.
73. PAPPAGALLO cenerino del Brasile. -- *Pstittacus Brasiliensis cinereus* Brifs. sp. 50. -- *Maracana Brasilienibus [prima]* Marcg. Ionst. Willugh. & Rai. -- *Magnitudine Guineensem* Tab. CXII. antecellit, brevicaudus, in toto corpore cinereo-caeruleofuscens.
74. PAPPAGALLO scuro. -- *Pstittacus fuscus* Brifs. sp. 51. -- *Pstittaco Guineensis nonnihil crassitie cedit*, brevicaudus, in toto corpore cinereo fuscus; rostro pedibus, & unguibus griseo fuscis.
75. PAPPAGALLO bruno. -- *Pstittacus nigricans*. -- *Pstittacus Mascarinus* Brifs. sp. 52. -- *Pstittacus obscurus macrourus niger*, genis nudis, vertice cinereo-nigrescente vario, cauda cinerea Linn. Syst. Nat. sp. 3. -- In Africa batire creditur.
76. PAPPAGALLO verde (festofo) di coda corta, porporino in fronte, di color celeste ne' sopraccigli e nella gola, di color sanguigno nel dorso. -- *Pstittacus (festivus) brachyurus viridis*, fronte purpurascente, super ciliis gulaque caeruleis, dorso sanguineo Linn. Syst. Nat. sp. 29. -- *Indicus est*, magnitudine Columbae.
77. PAPPAGALLO verde di coda lunga, col becco bianco della Guadaluppa. -- *Pstittacus viridis, longicaudus Aquarum Lupiarum Insulae* Brifs. sp. 58. -- *Aiuru-eatinga Brasilienibus* Marcg. Ionst. & Willugh. -- *Aiuru-Aparo* Rai. -- *Magnitudine Pullum mediocrem adaequat*. In Brasilia, & Aquarum Lupiarum Insula habitat.
78. PAPPAGALLO minore della Guiana. -- *Pstittacus minor Guianensis*. -- *Pstittaca Guionensis* Brifs. sp. 59. cum optima Icone. *Turturum crassitie circiter adaequat*, longicaudus, viridis, inferne dilutis genis rubro maculatis, calcaneis rubro circumdati, rectricibus alarum inferioribus minoribus coccineis, maioribus luteis; rectricibus superne saturate viridibus, inferne obscure luteis; rostro candide apice cinereo.
79. PAPPAGALLO minore, giallo, d'Angola, e di Guinea, con la coda lunga biformata. -- *Pstittacus minor Angolensis & Guineensis luteus*, cauda longa forficata. -- *Pstittacus Angolensis* Alb. -- *Pstittacus croceus cauda longa*, oculis in circulo rubris, extremis remigibus, & penna infima caudae caeruleis Klein. -- *Pstittacus luteus cauda longa* Frisch. -- *Pstittaca Angolensis lutea* Brifs. sp. 76. -- *Pstittacus [Solfatilis] macrourus luteus*, alarum rectricibus viridibus, cauda forficata Linn. Syst. Nat. sp. 7. -- *Turturis magnitudine, in excelsas arbores nidum fruit*; turmatim volat, magnum voce edens strepitosum; arte manuficit, & humanas aliquas voces, sive vocabula exprimere addicit. Albinus figura parum accurata videtur, neque eiusdem Autoris descriptioni respondens.
80. PAPPAGALLO detto Parruccheto d' America di coda lunga, col capo rosso, e celeste. -- *Pstittacus*, *Pstittacula Americana dictus*, longicaudus, capite et coccineo-caeruleo. -- *Pstittacus minor capite et coccineo caeruleo occidentalis* Edw. -- *Pstittaca Brasilensis fronte rubra* Brifs. sp. 62. -- *Tui-apute-iuba* Macgr. -- *Pstittacus [caerulealis] macrourus viridis*, fronte rubra, occipite, remigibusque extimus caeruleis Linn. Syst. Nat. sp. 11. -- Cum *Pstittaco* Tab. CXXV. magnitudine & forma convenit, excepto sincipite coccineo, vertice caeruleo, cauda tota viridi, ac remigibus extimis caeruleofuscis. In America habitat, signanterque in Brasilia.
81. PAPPAGALLO minore, o Parruccheto con collana, dell' Indie. -- *Pstittacula torquata Indica*. -- *Pstittaca Indica torquata* Brifs. sp. 56. -- *Pstittaculum* Tab. CXXIV. crassitie fere duplo antecellit, longicauda, dilute viridis, ad flavum inclinans, vertice viridi caeruleofuscens, sorque purpureo, gutture nigro, collo inferiore & pectore roseis, rectricibus dilute viridibus ad flavum inclinatis; mandibula superiore aurantia, inferiore nigra; pedibus dilute cinereis, unguibus nigris. -- Videtur vera *Linnacana species Pstittaci Alexandri* Syst. Nat. sp. 9. cuius varietas tentu est *Pstittacus torquatus a nobis expressus* Tab. CXXIV. *Linnacana pariter*, aliique nec in sequente num. 80. ab ipso specie distinxerunt.
82. PAPPAGALLO minore, o Parruccheto con collana, di Bengala. -- *Pstittacus minor*, sive *Pstittacula torquata Bengalensis*. -- *Pstittacus Bengalensis* Alb. -- *Pstittaca Bengalensis* Brifs. sp. 66. -- *Pstittaculum torquatum* Tab. CXXIV. crassitie paululum antecellit, longicaudus, viridis, inferne ad flavum inclinans, vertice roseo, occipite caeruleo, gutture & torque nigris, macula in aliis obscure rubra; rectricibus superne caeruleis, inferne obscure flavantibus, mandibula superiore crocea, inferiore nigra, pedibus & unguibus cinereis Brissonii observatione; Kleiniana vero descriptione dicitur sub mento niger, capite rubro, cervice purpurea, pedibus caeruleis.
83. PAPPAGALLO minore, detto Parruccheto con collana, dell' Isola di Borbone. -- *Pstittacus minor*, *Pstittacula torquata Borbonica dictus*. -- *Pstittaca Borbonica torquata* Brifs. sp. 57. cum icono. -- Cum *Turturum crassitie circiter convenit*, longicaudus, viridis, inferne ad flavum inclinans, torque roseo, tænia transversa sub

- guttura lutea , ad colli latera nigra , mandibula superiore coccinea , apice nigricante , inferiore ad basim obscure rubra , ad epicem nigra , pedibus plumbeo colore infectis , unguibus nigris .
84. PAPPAGALLO minore , dell' Isola di Caienna .. -- *Psiittacus minor Cayanensis* . -- *Psiittaca Cayanensis* Brifs. sp. 60. -- *Sturnum crassirostrum non superat* , longicaudus , viridis , inferne dilutius , remigibus intermediis candidis apice luteo adumbratis ; rostro candicans , pedibus & unguibus griseis .
85. PAPPAGALLO minore del Brasile . -- *Psiittacus minor Brasiliensis* . -- *Psiittaca Brasiliensis* Brifs. sp. 61. -- Cum *Psiittaco torquata* Tab. CXII. circiter convenit , longicaudus , viridis , inferne dilutius , & ad flavum inclinans , vertice virente aurantio , collo inferiore viridi-flavicans rubro obscuro mixto , remigibus intermedii caeruleis , rostro nigro , pedibus rubescens , unguibus nigricantibus .
86. PAPPAGALLO verde minore , di coda lunga , coe ali rosse , e gola cremisi , dell' Indie . -- *Psiittacus minor viridis* , longicaudus , alis rufescens , gula coccinea Indicus . -- *Psiittacula Indica* Brifs. sp. 63. -- *Crafstiae Alaudam cristata non multum antecellis* ; rostro , pedibus & unguibus pallide carnis .
87. PAPPAGALLO minore , o Parruccheto , della Carolina . -- *Psiittacus minor* , vel *Psiittacula Carolinensis* . -- *Psiittacus capite luteo* , fronte rubra , cauda longa Klein . -- *Psiittacus viridis capite luteo* , & fronte rubra Fritsch . cum fatis accurata Icone . -- *Psiittacus Carolinensis* Gatesb. & Klein . -- *Psiittaca Carolinensis* Brifs. sp. 67. -- *Psiittacus (Carolinensis) macrourus viridis* , capite , collo , genibusque luteis Linn. Syst. Nat. sp. 8. -- *Psiittacum torquatum* , sive *Psiittacula* Tab. CXIV. *crassirostrum paullulum superat* , longicaudus , viridis , capite anterius , marginibus alarum , & calcaneorum ambitu aurantis , occipito , gurgure & collo supremo luteis ; remigibus maioribus in exorte luteis , deinde viridibus , apice ad caeruleum vergentibus , rectricibus viridibus ; rostro alto intescente , pedibus & unguibus cinereo-albis . *Varietas certe Psiittaci Tab. CXIII.*
88. PAPPAGALLO minore , o Parruccheto del Regno di Gingi . -- *Psiittacus minor* sive *Psiittacula Ginginiana* . -- *Psiittaca Ginginiana* Brifs. sp. 64. cum Icone fatis accurata . -- *Psiittacum torquatum* Tab. CXII. *crassirostrum non multum superat* , longicaudus , viridis , ad flavum inclinans , paucum rubro obscuro in dorso mixto , gurgure & collo inferiori nonnihil ad cinereum vergentibus ; rectricibus alarum superioribus minoribus corpori finitim obscurae rubris ; rectricibus subitus pallide luteis ; rostro coccineo , pedibus rubescens , unguibus cinereis . *Habitat in Regno Ginginiano in India Orientali .*
89. PAPPAGALLO minore o Parruccheto di coda lunga , verde , e macchiato di giallo . *Psiittacus minor* , vel *Psiittacula macroura* , viridis , aurantio colore maculata . -- *Psiittacus viridis cauda longa malis croceis* Klein . & Fritsch . cum accurata Icone . -- *Psiittaca Illiniaca* Brifs. sp. 68. -- *Psiittacus [persinax] macrourus viridis genis fulvis* , remigibus rectricibusque canescens Linn. Syst. Nat. sp. 10. -- *Tui Apule Iuba* Marcgr. Willugh. & Rai . -- *Apud Brasilienses Tui idem sonat ac Psiittacus minor* , vel *Psiittacula apud Latinos* , atque Parruccheto apud Italos . *Merulam crassirostris circiter adaequat* , superne viridis , inferne viridi-lucus , sincipite , genis & gurgure aurantiis , collo inferiore cinereo-viridi , ventre maculis aurantiis vario , rectricibus subitus obscurae luteis , superne viridibus , lateralibus interius dilute luteo marginatis ; rostro dilute cinereo , pedibus saturatus cinereis , unguibus fuscis . *In Brasilia , & Illinorum Regno habitat .*
90. PAPPAGALLO minore , o Parruccheto della Martinica con la fronte , e la gola scura . -- *Psiittacus sive Psiittacula Martinicana* Brifs. sp. 69. -- *Psiittacus minor* gutture fuso occidentalis Edw. -- *Psiittacus [aeruginosus] macrourus viridis* , vertice remigibusque primoribus caeruleis Linn. Syst. Nat. sp. 12. -- *Psiittaca Martinicana* Brifs. sp. 69. -- *Crafstiae cum praecedente convenit* , longicaudus , superne viridis , inferne viridi-fuscus , satubrunc ver gente macula utrinque ante , & pone oculos caerulea , remigibus intense caeruleis ; rectricibus intermedii viridibus , lateralibus rubris ; rostro rubro , pedibus & unguibus nigerrimis ,
91. PAPPAGALLO minore , o Parruccheto del Giappone . -- *Psiittacus minor* , sive *Psiittacula Iaponica* . -- *Psiittacus erythroclorus macrourus* Aldrov. Willugh. Carlet. & Rai . -- *Psiittaca Iaponensis* Brifs. sp. 71. -- *Merulam crassirostris adaequat* , cauda longa , superne viridis , inferne rubro sinuosa , gutture ferrugineo ad subrubrum saturate caeruleis , ventre supremo saturate viridi maculato , rectriebus superne splendide , inferne sordide viridibus ; rostro ex albo flavescens , pedibus & unguibus nigerrimis ,
92. PAPPAGALLO minore variegato d' Amboina . -- *Psiittacus minor Amboinenensis varius* . -- *Psiittaca Amboinenensis varia* Brifs. sp. 72. -- *Superiore paululum crassirostrum superat* , longicaudus , superne viridis , capite anterius saturate caeruleo , collo superiore torque luteo cincto , collo inferiore & pectore rubro-aurantiis , marginibus pennarum saturate caeruleis , ventre supremo saturate viridi maculato , rectriebus superne splendide , inferne sordide viridibus ; rostro ex albo flavescens , pedibus & unguibus nigerrimis ,
93. PAPPAGALLO minore variegato dell' Indie Orientali . -- *Psiittacus minor Indicus varius* . -- *Psiittacus minor* e coccineo viridis Orientalis Edw. . -- *Avis Paradisiaca Orientalis* vario colore elegansissima Seb. -- *Avis Paradisi Orientalis* Klein . -- *Buteo Moerh.* -- *Psiittacus [ornatus] macrourus luteo-viridis* , occipite gula pectore que rubris , vertice auribusque caeruleis Linn. Syst. Nat. sp. 14. -- *Psiittaca Indica varia* Brifs. sp. 73. -- *Merulam crassirostris adaequat* , longicaudus , viridis , marginibus pennarum in dorso & ad latera ventris luteis , capite superius , & macula ad aures nigro-caeruleis , occipite , genis , gutture , collo inferiore , & pectore coccineis , marginibus pennarum in pectore viridi-nigricantibus , taenia utrinque longitudinalis in collo lutea ; rostro dilute aurantio , pedibus & unguibus saturate cinereis .
94. PAPPAGALLO minore giallo del Brasile . -- *Psiittacus minor luteus Brasiliensis* . -- *Psiittaca Brasiliensis lutea* . Brifs. sp. 74. -- *Qui Iuba Tui Brasiliensis* Marcgr. Icnston. Willugh. & Rai . -- *Guaiauba* Io. de Laet . griseo , pedibus unguibusque incarnatis .
95. PAPPAGALLO cremisi dell' Isola di Borneo . -- *Psiittacus coccineus Bonarum Fortunarum Insulæ* . -- *Psiittacus coc-*

- coccineus cauda longiore Edw. -- *Psiittacus (Borneus) macrourus ruber*, remigibus retricibusque apice viridibus, alis macula caerulea Linn. Syst. sp. 6. -- *Psiittaca coccinea* Brifs. sp. 77. -- *Craffitie Merulam paululum* remigibus apice viridibus, tribus corpori finissimis caeruleis, retricibus fordide rubris, apice viridescentibus, extima utrinque viridescente; rostro aurantio, pedibus & unguibus nigricantibus. In India, & praesertim in Bonarum Forunariarum Insula habitat.
96. PAPPAGALLO minore cremisi dell' Indie. -- *Psiittacus minor coccineus* Indicus. -- *Psiittaca Indica coccinea* Brifs. sp. 78. cum Icone satis accurata. -- Praecedentem craffitie multum superat, longicaudus, coccineus, superne saturatus, inferne dilutius, fuso & caeruleo violaceo variegatus, capite & collo superioribus, petiore, & taenia pone oculos caeruleo-violaceis; remigibus maioribus dilute fuso, minoribus fuso-violaceo terminatis; retricibus fuso-violaceis, lateralibus interius coccineis; rostro rubescens, pedibus, & unguibus fusis.
97. PAPPAGALLO minore cremisi d' Amboina. *Psiittacus minor Amboinensis coccineus*. *Psiittaca Amboinensis coccinea* Brifs. sp. 79. -- Turturem craffitie nonnihil antecellit, longicaudus, superne caeruleo-violaceus, inferno coccineus, capite & collo coccineis, remigibus saturate viridis, retricibus saturatis violaceis, lateralibus nigris; rostro rubicundo uno nigricante, pedibus & unguibus rubris.
98. PAPPAGALLO minore cremisi col ciuffo dell' Iola di Giava. -- *Psiittacus minor Iavensis*, cristatus, coccineus. *Psiittaca Iavensis* Brifs. sp. 80. -- *Psiittacus parvus* Bontii, Willugh. & Rai. -- Alaudam craffitie aemulatur, longicaudus, cristatus, coccineus, gutture griseo, collo inferiore & petiore dilute roseis, remigibus, viridibus luteo & roseo colore variis, retricibus binis intermedii coccineis, lateralibus dilute roseis apice caeruleis, viridi mixtis; oculis nigris, cutes nuda albo-argentea cincti, rostro griseo ad basim cute nuda candida cincto, pedibus & unguibus cinereis. Verticis penas, sue cristam, nunc erigit, nunc deprimit.
99. PAPPAGALLO assai piccolo, o Parrucchettino, col capo rosso del Brasile. -- *Psiittacus parvus*, sive *Psiittacula Brasiliensis erythroccephala*. -- *Psiittaci minoris* Marcegravi septima species. -- *Tui para Tupinambis* Willugh. Ionst. & Rai. -- *Psiittacula Brasiliensis* Brifs. sp. 82. -- *Magnitudine & craffitie* cum Alauda convenient, brevicaudus, dilute viridis, sincipite rubro, macula in aliis lutea; rostro incarnato, pedibus & unguibus griseis. Nidificas in arborum foraminibus a formicis relitum.
100. PAPPAGALLO assai piccolo, o Parrucchettino tutto verde del Brasile. -- *Psiittacus minimus*, vel *Psiittacula Brasiliensis omnino viridis*. -- *Psiittacus minimus torus viridis* Brow. -- *Psiittaci minoris tercia species* Marcegravi Willugh. -- *Tui tirica* Willugh. & Rai. -- *Psiittacula Brasiliensis* Brifs. sp. 81.
101. PAPPAGALLO assai piccolo, o Parrucchettino del Brasile col codrione celeste. -- *Psiittacus minimus*, vel *Psiittacula Brasiliensis uropygio cyaneo*. -- *Psiittaci minoris* Marcegravi sexta species (*Brasiliensis* *Tuiete*) Willugh. -- *Psiittacus [Pafferinus] brachyurus luteo-virens*, macula alarum aliquae subtilis caeruleis Linn. Syst. Nat. sp. 37. -- *Psiittacula Brasiliensis uropygio cyaneo* Brifs. sp. 83. -- *Craffitie Pafferem domesticum non excedit*, brevicaudus, viridis uropygio cyaneo, retricibus alarum superioribus maioribus saturate caeruleis, retricibus viridibus; rostro, pedibus, & unguibus aurantiis.
102. PAPPAGALLO assai piccolo di Malacca. -- *Psiittacus parvus*, vel *Psiittacula Malacensis*. -- *Avicula ex Malaca Insula*, sive *Psiittacus marinus* Aldrov. -- *Psiittacula Malacensis* Brifs. sp. 84. -- Hic quoque ad Pafferem domesticum craffitie vis accedit, brevicaudus, viridis, vertice cyaneo, retricibus caudae superioribus coccineis; rostro, pedibus, & unguibus candicantibus.
103. PAPPAGALLO piccolo, o Parrucchettino, dell' Isole Filippine. *Psiittacus parvus*, vel *Psiittacula Philippensis*. -- *Psiittacula Philippensis* Brifs. sp. 87. -- Ad Edwardo in opere, cui titulus Glaunes dicitur Perrique couronnée de Saphir Part. II. cum optima Icone Tab. 293. fig. 1. -- *Craffitie Pafferem domesticum non multum antecellit*, brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens, sincipite, gutture, collo inferiore & uropygio rubris, taenia transversa infra occipitum aurantio-rubra, retricibus superne viridibus, inferne caeruleo beryllinis; rostro, pedibus & unguibus rubris. Foemina sincipite & uropygio rubro minus virido tingitur, & maculam utrinque inter rostrum & oculum viridi-caeruleam habet. Qui ab Edwardo describitur, differt in eo quod in sincipite nil rubri habet, sed in capitis vertice macula eleganter caerulea notetur; pedes unguesque nigricantes obirent. Habitat in Philippensis Insulis, praesertim in Lucionensi Insula, circa Manillam ubi appellatur Coulacissi. Qui vero ab Edwardo describitur, pingiturque, captus fuit in Insula Sumatra.
104. PAPPAGALLO piccolo, o Parrucchettino del Madagascar. -- *Psiittacus parvus*, vel *Psiittacula Madagascariensis*. -- *Psiittacula Madagascariensis* Brifs. sp. 88. cum accurata Icone. -- *Craffitie* cum praecedente convenient, brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens, capite, gutture, & collo inferiore cinereo-albis ad viridem inclinantibus, retricibus dilute viridibus, taenia transversa nigra notatis; rostro pedibus, & unguibus cinereo albis.
105. PAPPAGALLO piccolo, o Parrucchettino colla gola gialla. -- *Psiittacus parvus* gutture luteo. -- *Psiittacula* Brifs. sp. 89. -- Alaudam cristatum craffitie non multum excedit, brevicaudus, viridis, inferne dilutius & ad luteum inclinans; macula sub gutture aurantia; taenia in aliis transversa castaneo-aurea ad viride vergente; retricibus alarum inferioribus luteis; retricibus viridibus, oris interioribus ad luteum inclinantibus; rostro dilute griseo, pedibus, & unguibus griseis.
106. PAPPAGALLO piccolo, o Parrucchettino con la testa gialla, del Brasile. -- *Psiittacus parvus* *Brafiensis Ikeroccephalus*. -- *Psiittacula* Brifs. sp. 90. -- *Psiittaci minoris* Marcegravi quarta sp. Willugh. -- *Tui quarta species* Marcegr. Ionst. & Rai. -- *Magnitudine & craffitie* cum *Sturno* convenient, brevicaudus, superne viridis, inferne viridi-luteus, sincipite aurantio; oculorum ambitu luteo; rostro nigro.
107. PAPPAGALLO piccolo, giallo del Brasile. -- *Psiittacus parvus* *Brafiensis luteus*. -- *Psiittacula* Brifs. sp. 91. -- *Psiittaci minoris* Marcegravi quinta species, *Iendaya* Willugh. & Rai. -- *Merulam craffitie adaequat*, bre-

- vicaudus, superne viridis, inferne luteus, imo ventre viridi, capite & collo luteis; remigibus maioribus apice ad nigricantem colorum vergentibus, retricibus viridis; rostro, pedibus, & unguibus nigris.
108. PAPPAGALLO piccolo del Senegal. — *Pstittacus parvus Senegalensis*. — *Pstittacula Bris. sp. 92.* cum accusata Icone. — *Crafatia Merulam* non multum antecellit; brevicaudus; superne viridis, inferne aurantius, ad latera luteus, capite & gurne cinereis; collo viridi, retricibus superne saturate cinereis ad viridem vergentibus, viridi marginatis; rostro, & unguibus cinereo-nigricantibus, pedibus cinereo-rubescens.
109. PAPPAGALLO piccolo bruno del Brasile. — *Pstittacus Brasilensis fuscus*. — *Pstittacus minor vulgaris Barr.* — *Anata Brasiliensis* Marctg. Ionst. Willugh. & Rai. — Magnitudine & crafatia Alaudam aemulatur; brevicaudus, superne viridis, inferne fuso rufescens; vertice saturate castaneo; oculorum ambitu fuso; gurne cinereo marginibus alarum sanguinit, extremis rubris; macula in dorso, dilute fuso, retricibus pariter dilute fuscis; rostro fuso adunco, pedibus cineris, unguibus nigricantibus. Habitat in Guiana, & Brasilia; elegans plane Avis.
110. PAPPAGALLO piccolo, o Parrucchettino col ciuffo. — *Pstittacus erythrochloros cristatus* Aldrov. Ionst. Rai. & Willugh. — *Pstittacus erythrochloros torquatus cristatus* Charleth. — *Pstittacula Bris. sp. 94.* — Ad Merulam crafatieri accedit; brevicaudus, viridis; crista, alis, & canda rubris; de colore rostri, ac pedum necnon de regione in qua habitet, nulla apud Autores mensio facta est.
111. PAPPAGALLO minore, o Parrucchettino verde, con la fronte rossa, e una fascia nera nella coda. *Pstittacus minor viridis*, fronte rubra, cauda fascia nigra notata. — *Pstittacus [pullarius] brachyurus*, viridis, fronte rubra, cauda fulva, fascia nigra Linn. Syst. Nat. sp. 37. — *Pstittacula Guineensis* Bris. sp. 85. — Linnaeus ad speciem hanc refert *Pstittacum parvum* viridem ex Indis Orientali Albini Av. III. Tab. 15. *Pstittacum minimum* viridem cum fronte & gula rubra Fritsch. Av. III. Tab. LIV. *Pstittacum pusillum* viridem Aerbiopicum Rai. *Pstittacum minimum* Clufii, & *Pstittacum minorem* versicolorem Seb. Mui. II. Tab. XL. Fig. I. additur habitare hunc in Asia asque Aerbiopia. Conferatur depitius & descriptus a nobis sub num. CXXXIII. ad quem synonima plura a Linnaeo pullaris suo apposita resulimus, licet varietas tantum non distincta species suisset. *Pstittacus pusillus* viridis Aerbiopicus Rai, dicitur a Rai ipso magnitudine Fringillae, in ventre viridi colore dilutiore, in dorso saturatore tincto.

T. CXXXVI. B. 2. 8. —

EMEU, o Casuario — Emeu, sive Eme, Casuarinus aliis. — *Emes* Dodart. Rai. Clus. Bont. Willugh. Nieremberg. Ionthon — *Eme* Aldrov. — *Caluarus* Olear. Alb. Klein. — *Struthio Casuarinus* pedibus tridactylis, vertice paleaceusque nudis Linn. Syst. Nat. sp. 2. — *Cela Moerh.* — Gall. *Le Casoar* — Engl. *Cassowary*, or *Casowary*.

Quest' Uccello è grande quanto lo Struzzo, di penne scure, o quasi nere di una tessitura delicata, che osservate di lontano compariscono pelo. Nel vertice del capo è corredato di un'elevazione callosa, che gli fa la figura di un diadema. Le sue ale sono cortissime, e appena accennate. Quantunque inghiottisse tutto ciò che gli vien presentato, come Arance intiere, e simili cose; per altro il suo cibo ordinario è il Panc, che a grossi pezzi egli ingerisce, per afferzione del Clusio mangia avidamente le uova fresche di Gallina tutte intiere col guscio. Facilmente si addomestica. Le sue uova sono molto grandi, e molto belle di 15. pollici in giro, misurate per la parte più lunga, e di 12. in circa a traverso, il guscio delle quali non è si grosso e bianco come quello dello Struzzo, ma di un color cenerino sbiadito, e alperse d'innumerabili punti verdicci, alcuni de' quali sono più grandi, e tondi, altri minori, e di colore più smorto. La femmina è minore assai del maschio, e di un color più chiaro, o sia di color d'oliva scura. Manca questo di lingua, come l'Onocrotalo, e perciò inghiottisse intiero

Corpus huic grande Struthionis par, plumis fuscis seu nigricantibus rarioris texturae vestitum, quae longinquo intuentibus pili potius quam plumae videntur. Collo elevato quasi diametraliter in medio capite instruitur. Alae brevissimae huic sunt, quae potius rudimenta dicimenteruntur. Licet quaecumque obiciuntur vorer, ut Aurantia mala integra & similia, ordinarius tamen eius cibus est Panis, quem in magna crassaque fragmenta divisum vorat; maxime autem, teste Clusio, recentibus Gallinarum ovis delectatur, quae integra cum ipsa testa deglubit. Mansuetus facile. Ova edit maxima ac pulcherrima per longitudinem dimensa 15. unciam ambito, per transversum vero 12. aut paulo plus, quorum testa non valde densa nec albavet: ovorum Struthiocamelii, sed cinerei diluti coloris, & cerebrimis punctulis viridescentibus, aliis maioribus ac rotundioribus, aliis minoribus, atque colore dilutioribus conspersa. Foemina multo minor est mare, colore pallidior, sive ex fuso olivaceo donata. Lingua, ut Onocrotalus caret, ideoque quidquid edit integrum degluerit, e i suoi

piedi sono di una gran robustezza , a segno che a forza di calci si difende molto bene , come il Cavallo .

Trovali in Asia nell' Isole Molucche , in Sumatra , e in Banda , e in Africa , nell' Abyssinia , e nella Guinea . Il Sig . Perrault nelle Memorie per servire all' Istoria degli Animali ne descrive uno , che visse quattro anni nel Serraglio degli Animali del Re di Francia , e ne riporta la sezione anatomica , aggiungendovi di esso un' esatta figura . Il da noi rappresentato per i caratteri sopra accennati è dunque il maschio . Sebbene poi la figura , che di essa abbiamo data , comparisca variare da alcune figure , e dalla descrizione ancora data di esso da diversi Autori , a riguardo di quei condoli membranosi rossi , che gli pendono anteriormente dal collo , e di certe penne lunghe filiformi al principio del petto , che mancano nel nostro ; la figura però data da noi corrisponde esattamente a quella , che abbiamo trovata nell' originale del Marchese Gerini , il quale la fece disegnare da un individuo , che a suo tempo viveva in Firenze , e che appunto così fu osservato .

glutit. Cruribus, pedibusque crassis gaudet, quibus Equorum more se defendere ntitur.

Habitat in Asia, Sumatra, Molucca, atque Banda, necnon in Africa, in Abyssiniae Regno, atque Guinea. Dom. Perrault unius, qui in Ornithotropio Regio Parisii quatuor annos vixit, descriptionem & Anatomiam dissectionem exposuit, optimamque iconem adiecit in opere, cuius titulus: Memoires pour servir a l' Histoire des Animaux. Quem nos igitur ostendimus ex supra relatis characteribus, buius speciei marem esse manifeste coniicitur. Figura, quae a nobis exhibetur, licet membranis rubris, quibus in anteriore colli parte dependentibus ornatur, necnon pennis nonnullis praelongis filiformibus et pectoris superiore parte ortis, differre videatur; a Geriniana tamen originali figura nec minimum ablidit; sciendum est insuper Auctorem nostrum Marcionem Gerini illum diligenter delineandum coloribusque pingendum tunc temporis curavisse, defumpta imagine ab una buius speciei Ave, quae sua aetate Florentiae vivebat, nec diversa prorsus ab efficta sic avis forma observata fuit.

T. CXXXVII. B. 3. 15. 2.

STRUZZO o Struzzolo nero . Struzzo Africano , o Struzzo della Libia . — *Struthio niger* . *Struthio-Camelus niger* ; *Struthio Africanus* ; *Struthio Lybicus* Oe . — *Struthio Camelus pedibus didactylis* Linn. Syst. Nat. sp. 1 . — *Struthio pennis nigris in toto corpore vestitus*, *albis*, *O nigris quandoque admixta*, *remigibus maioribus*; *reticulisque candidis* Bris. sp. 1 . — Gall. l' Austruche noir . — Angl. The Ostrich .

Questo è il maggiore di tutti gli Uccelli , eccettuato il sopradescritto Emeu , il quale quantunque in altezza ceda allo Struzzo , non ostante a riguardo della mole del corpo non si può dire di esso minore . Nel capo sembra una specie d' Oca ; egli è corredata di palpebre , la superiore delle quali è molto mobile , e bordata di peli come quella degli uomini ; la sua lingua poi è corta , piuttosto schiacciata , e per la parte inferiore attaccata , a guisa di quella de' Pefci . Inoltre lo Struzzo è voracissimo , cibandosi di tutto ciò che incontra , come d' erbe , di biade , di pietre , d' osso d' animali , di minerali , di pezzi di ferro , e altre cose , servendo nel suo ventricolo le più dure alla tritazione , e digestione delle altre , dopo di che restano intiere o poco corrose restituite per la via delle fecce ; ed è mera favola , che lo Struzzo si diletta di mangiare il ferro , e che facilmente lo digerisca , e sciolga .

Qui in Firenze nel Serraglio Reale degli Uccelli da lungo tempo ne sono stati alimentati diversi , ed alcuni essendone morti , sono sta-

A viuum maximus est, si unum forte supradescritum Emeu excipias, qui quamvis proceritate ei cedat, corporis tamen mole fere aequalis est. Capite speciem Anseris refert; palpebris inter alites forte solus instruitur, superiori valde mobili, pilisque ciliaribus humano more ornata; lingua autem donatur brevi planiuscula, atque, Pisces more, inferna parte valde adbeat. Voracissimus insuper est, editique quidquid offendit, herbas, semina cerealia, fructus, ossa animalium, silices, mineralia, ferrum, aliisque, in cuius ventriculo quae duriora sunt, uti silices & ferrum, aliarum rerum triturationi, sive digestioni inserviunt, integra inde, vel saltem paullulum corroja ab eius intestinis egrediuntur; fabulamque sapit alitem bunc ferro praecipue ut idoneo cibo deleclari, illudque ventriculi humorumque in ipsum defluentium viribus facilissime, atque exacte solvere posse.

Hic Florentiae a longo tempore plures huius generis Aves in Regio Aviario enutritae semper sunt, nonnullaeque superioribus annis interemptae dissecatae fuerunt, in quarum ventriculis multa silicum, & metallorum frustula, praeser-

stati aperti, con essere stati trovati nel loro stomaco de' pezzi di fasso, e di metallo, ma particolarmente di Bronzo, di Ottone, e di Ferro, con questa differenza, che i pezzi di Ferro erano rugginosi, e molto corrosi, e gli altri con i sassi tutti intieri, e illesi.

Se ne trovano de' neri, de' cenerini o grigi, de' bianchi, e de' mictchiat. I maschi sono generalmente neri, o bianchi, mentre gli altri de' soprammentovati colori sono femmine, le penne delle quali per eser meno delicate, meno larghe, e di peggior colore, sono sempre assai meno stimate.

Sertum Aeris, Oricbalebi, & Ferri reperta fuerere, hoc tantum discrimine, quod Ferri fragmenta suo croco fuerint obducta, plurimumque corroso, metallo vero reliqua, & sassa omnino integra, penitusque intacta observata fuerint.

Nomnulli pennis omnino nigris instructi ad inveniuntur, alii pennis cinereis, sive griseis, candidis alii, alii tandem pennis coloribus diversis tintiis, sive mixtis. Mares communiter nigri vel candidi sunt, ex alii supra memoratis coloribus foeminae, quarum pennae utpote rudivores, angustiores, minusque venustiori colore praeditae, multo minus in pretio sunt.

T. CXXXVIII. B. 3. 10. -

STRUZZO, o Struzzolo grigio, ovvero cenerino. — *Struthio Camelus griseus, sive cinereus.*

GLi *Struzzi* moltiplicano prodigiosamente, e covano le loro ova più d' una volta all' anno, e non ne covano meno di quindici, o sedici alla volta, le quali sono molto grandi, e quasi della grandezza del capo di un ragazzo, bianche, e di guscio durissimo e denso, come se fosse di fasso, o d' avorio. Quelle uova, che da essi sono state partorite in Firenze, si son trovate del peso di cinque libbre in circa, mentre il Willughby, e altri ne hanno trovate di quelle del peso di 15. libbre.

Molti sono quelli, che hanno scritto, che gli *Struzzi* abbandonano nella rena le loro uova, e che queste senza eser covate nascano per la sola forza del Sole, e ciò sembra ad essi conforme alle leggi di natura, perché questi animali sono abitatori di paesi cuocentissimi, e perchè l' animale è troppo grave di corpo per doversi posare e trattenere sopra di esse. Linneo pure quantunque scrupoloso esaminatore delle cose naturali, approva questo fatto. Per altro trovandosi molti *Struzzi* al Capo di Buona Speranza, dove il caldo non è molto grande, e le uova loro essendo quasi tonde, e di guscio durissimo, gli Autori, che sono stati del sopraddetto parere, dovevano perciò congetturate il contrario, e credere, che anco gli *Struzzi* covassero le uova loro come fanno tutte le altre specie di Uccelli.

I Sigg. Kolbe, e Adanson per altro tolgoni intorno a simil fatto ogni dubbio, mentre sono stati testimoni oculari, che gli *Struzzi* non diversamente dalle *Galline*, covano benissimo le uova loro, e che solamente nelle interiori e cuocentissime parti d' Africa le abbandonano qualche poco fra giorno, e questo forse è stato ciò che ha dato motivo d' inganno a non pochi; il soprammentovato primo Autore è stato per lungo tempo al Capo di Buona

Struthiocameli mirum in modum speciem multiplicant, atque plures in anno ovarum incubationi operam dant, quorum ad minimum quindecim, vel sexdecim pro quavis vice sovent, quae magna sunt utpote capitinis infantis magnitudine plus minus, candida, durissima, & quasi lapidea, sive eburnea crux munita. Communiter quae bic Florentiae ab iisdem emittuntur, libras quinque, vel paulo minus pendent, Willugbeius vero, aliique ipsorum nonnulla 15. libras pendentia observarunt.

In arena baec condita, & deserta, Solis calore soveri, & excludi plurium sententia est, naturaeque consentaneum hoc pluribus videtur cum in ardentissimis mundi plagis huiusmodi Aves degant, nimiamque corporis gravitatem ad eis incubandum a natura obtinuisse. Linnaeus quoque, lices naturalium rerum seruator sedulus, banc tuerit sententiam. Verum Struthiocameli cum ad Caput Bonae Spei, ubi Solis calor non ita adurens est, magna copia occurrant, eorumdemque ova cum figura subrotunda, durissimisque cortice donentur, Auctoribus iis, qui supradictam sovent sententiam, pro manifesto indicio haberi potuerat, eorumdem ova non secus ac reliqua Avium omnia incubatu indigere.

Sed controversiam omnem plenarie dirimunt Dom. Kolbe, atque Adanson rerum naturalium scrutatores diligentissimi, quorum primus in Capitis Bonae Spei regione longam egit mansionem, secundus in Senegalitia innumeratas instituit observationes, amboque certiores nos faciunt, aequae ac Gallinae in Europa, aliarumque omnium Avium more, Struthiomelos ovis suis incubare, atque tantum in ferventissimis Africæ inter-

na Speranza ; il secondo al Senegal per farvi espresamente delle osservazioni naturali.

Le uova degli *Struzzi* si mangiano , e non sono ingrate , ma sopra tutte le altre più dure di softanza , e meno facili a digerirsi. Galeno scrisse , le uova migliori essere quelle delle Galline , e de' Fagiani , e fra le peggiori esser quelle di Oca , e di Struzzo .

terioris Provinciis interdiu aliquantisper ea deserere , quod plures circa rei veritatem decepit .
Harum Avium ova esui apta sunt , nec gustu ingrata , sed prae reliquis crassioris substantiae , arque digestioni duriora . Galenus optima , bonique succi , ova Gallinarum & Phasianorum dicit , Anseris & Struthiocameli deteriora .

T. CXXXIX. B. 3. 6. -

STRUZZO , o Struzzolo , bianco — *Struthio Camelus albus* . — *Struthio pennis candidissimis lanuginosus* Barr. Ornith.

Quantunque lo *Struzzo* sia impotente al volo , non ostante correndo , a forza di muovere le sue ale , rompe in tal maniera l'aria , e corre tanto rapidamente , che non cede agli Uccelli nello sparire assai facilmente di vista , dimanierachè non è possibile , senza qualche artifizio , con cani , e cavalli arrivarlo . Gli Arabi alcune volte consumano due giorni di tempo , prima di dargli addosso di proposito , seguitandolo semplicemente a vista , moltrando di abbadare a tutt' altro , servendo loro soltanto in questo tempo di cominciare a stancarlo , e d' impedire che mangi , poichè se con troppo impeto gli desero subito addosso , e questo prendesse i luoghi elevati e scoscesi , non potrebbero giungerlo mai più .

Trovasi nella Siria , in Arabia , nella Libia , e in Africa ; particolarmente in Etiopia o Abissinia , al Senegal , e al Capo di Buona Speranza . Ne' Deserti della Libia se ne trovano alcune volte tanti insieme , che paiono a chi gli vede di lontano un accampamento di Cavalleria . I paesani di tali luoghi , e specialmente gli Arabi , e gli Etiopi , trovano non poco profitto alla caccia di essi , e nel prendergli particolarmente vivi , perchè gli addomesticano , essendo a ciò molto disposti , e gli vendono a Mercanti , che gli mandano in Europa . Quelli poi che vengono da essi ammazzati , sono sformati , e spogliati di tutte le penne , le quali sono da essi vendute piuttosto care a Mercanti delle Città più vicine .

L' uso di esse è molto grande per tutto il mondo , ma dall' altra parte essendo questo tanto noto , è totalmente superfluo che da noi ne sia qui fatta una specifica menzione . In diversi luoghi , e particolarmente in Inghilterra le Dame ne facevano un tempo fa dei ventagli , e i militari quasi per tutto il mondo , ma particolarmente gli Orientali , se ne servono per ornamento de' loro cimieri , e turbanti . Appresso i Turchi però , per quanto vien riferito , non è permesso con esse adornarsi , che a' soli Giannizzeri . Trovansi degli *Struzzi* anco in America , ma sono di specie affatto diversa , e tale è quella , che qui ora sarà descritta .

* *Struthio-camelus licet volatus impos sit , currens tamen alas agitando aerem assidue dividit , rapideque currit ac si volatu se se per aerem subtraheret , ita ut nec a cane , nec ab equo , sine artificio , superari queat . Arabes aliquando ultra dies duas tempus consumunt , persequendo Struthionem , quem prius quasi aliud agendo agitant , ut impedian , ne escam ante capiat , quam severiori venatu prosequantur ; nimis impetuosi nunquam attingerent Aven ad montuosa & praerupta loca praecepit fugientem .*

Habitat in Syria , Arabia , Lybia , Africa , praesertim in Aethiopiae , sive Abyssiniae Regno , in Senegallia , atque ad Caput Bonae Spes . In Desertis praecipue Lybiae ranta eorum copia quandoque conspicitur , ut procul intuentibus velut equitum quaedam acies appareant . Huius regionis incolae , pariterque Aethiopes , aliquique Africæ indigeni homines non mediocrem proventum adinveniunt in iis persequendis , vivisque captandis ; in iis enim circrandis , quos vivos capiunt , omnem impendunt operam ; nam facile mansuetunt , ipsorumque Mercatoribus vendunt , qui ad Europeos mittunt ; quos vero interficiunt , pennis atque pelle idipso exunt , pennasque vicinarum Civitatum Mercatoribus utilissime vendunt .

Earum usus in omnibus terrae Provinciis maximus est , omnibusque tam notus , ut de ipso verba facere supervacaneum prorsus sit . Pluribus in locis , in Anglia praesertim , nobiliores matronae ventilabre ex iisdem olim conficiebant , omnesque mundi gentes , milites praesertim Orientales , ad conos , & galeas adornandas iis utiuntur . Apud Turcas tamen idipso solis Janizaris concessas esse relatum est . In America etiam Struthiones adinveniuntur , sed species omnino diversae . Horum species una est , quae statim bic a nobis describetur .

4. Struz-

4. STRUZZO, o Struzzolo d' America = *Struthiocamelus Americanus* Rai. = *Iandou Ionst.* & *Charlet.* = *Nban-dugucu Brasiliensis* Marçgr. & Pil. = *Ardea Americana cinerea*, terrivora, capite calvo Barr. Ornith. = *Struthio [Americanus]* digito postico rotundato mucro Linn. Syst. Nat. sp. 3. = *Struthio Notbus Klein.* = *Rhea Mochr.* & Brisl. = *Grus cinerea ferrivora* Barr. Hist. = *Habitat in America Australi, praecipue in Guyana & Brasilia in Serigipas & Fluviis magni praefecturis.* Minor species *Struthione Africano*, & *Cassiaris*, sive *Emeu* similior, quam *Struthioni*; quatuor enim in pede digitos habet, tres anterius, unum posterius, crassum, rotundum, ungue non armatum. Collum gestat incurvatum ut *Cycnus*, sive *Ciconia*, longior, circiter duorum pedum. Oculi nigros habet pulcherrimos, rostrum compressum non admodum latum, duos & semis digitos longum, alas aequae ac *Struthio Africanus* ineptas ad volandum habet, cistifineque ut ille tamem currit, ut vix, ac ne vix quidem a cane venatico superari posset. Caudam vero non us ille crisiiformibus pennis praeditam habet, sed plumas fert griseas per dorsum expansas ad annum usque. Vescitur fructibus, & carne. Caro vero eius bona ad comedendum dicuntur.
5. STRUZZO cappellino, e Struzzo dell' Isola di S. Maurizio. = *Struthio [cucullatus]* pedibus tetracyclitis, omnibus unguiculatis Lian. Syst. Nat. sp. 4. = *Gallus Gallinaceus peregrinus* Cluf. = *Cygnus cucullatus* Nieremberg. Rai. & Willugh. = *Dronte Bont.* = *Dodo Lufitanorum* *Cygnus cucullatus* Carl. = *Raphus Moehr.* & Brisl. = *Bonitii testimonia hae Avis magnitudine est media inter Struthionem Africanum, & Gallum Indianum;* capite magna membrana quadam cucullum referente setto; oculis magnis nigris: Rostro praelongo valido ex caeruleo albicans, exceptis extremis atibus, quarum inferior nigricans, superior flavescens. Corpore est obeso, rotunda, quod mollibus plumis griseis Struthionem aemulus vestitur. Ab utroque latere exiguis alis plumatis, loco remigium, ex flavo cinereis, & pone uropygium, loco caudae, quinque pennis crispis eiusdem coloris decoratur. Cruribus est flavescitibus crassis, atque admodum brevibus; pedibus solidis quatuor digitis longis, quasi squamosis, rotundisque unguibus nigri validis munitis incidit. Ceterum tardigrada est Avis, & stupida, atque facilis preda venatoribus. Habitat in India, praesertim in Insula Cyrena, seu Cerne Lufitanis, dicta S. Mauriti Insula Batavis. Lapilli diversae magnitudinis, ut in Struthione, in ventriculo barum Avium repiciuntur. Caro carum, in primis petoris, est pinguis, non ingrata, adeoque multa, ut tres quatuorve buis speciei Aves centem sociis saturandis aliquando sufficerit. Si non probe elixentur, vel veteres sint, difficilioris sunt concoctionis; salitra etiam in penu reconduntur. Struthio volans, de quo sermo est apud aliquos Peregrinatores fictilia omnino existimatur Avis,

T. CXL. B. -- 18. --

CORVO, o Corvo maggiore, e volgarmente anco detto Corvo reale. — *Corvus*, sive *Corvus maior* — *Corvus major* Frisch. — *Corvus* Gesn. Aldr. Ionst. Willugh. Charl. Moehr. — *Corvus simpliciter* Klein. — *Corvus*, seu *Corax* Rzac. — *Gall. Corbeau*. — *Angl. The Raven*.

DE *Corvi* se ne trovanq in qualunque parte del mondo, e in copia ancora, soffrendo essi qualunque mutazione d' aria, nè temendo il caldo, o il freddo, onde facilmente si traggono in qualunque luogo, purchè non manchino di trovarvi alimento; e quantunque sieno detti amanti della solitudine, tuttavolta si vedono anco nel mezzo delle Città, e vi fanno il nido, come lo attesta l' Aldrovando, e lo conferma l' osservazione.

Nidificano su gli alberi più alti, e nelle vecchie torri sul principio della Primavera, e anco prima ne' paesi più caldi. Depongono quattro, o cinque uova per volta, e sei ancora, le quali sono di un colore tra il verde e il celeste sbiadito, assai mischiata, e molto punteggiate di color nero. Se i *Corvi*, si possono addomesticare, e addestrare per la Caccia, se ne terra discorso poco più sotto.

Corvi non una aliqua orbis plaga, aut regione, sed ubique terrarum abundant, quasvis etiam aeris mutationes facile tolerant, nec frigus, aut calorem reformidant, sed ubicumque alimenti copia reperiuntur, degere facile sustinent; & quavis solitudinis amici dicuntur, in mediis tamen Urbibus non raro degunt, & nidificant, ut Aldrovandus tradit, & experientia ipsa confirmat.

Nidificant autem in excelsis arboribus, aut turribus verutiss, primo Vere, initio videlicet Martii, & in calidioribus locis citius etiam nonnumquam. Ova pariunt una vice quatuor, quinque, & interdum sex; ex viridi pallide caerulea, maculis, & ductibus crebris nigricantibus varia. An *Corvi* cicurari, & ad Aucupium institui facile possint, infra videbimus.

T. CXLI. B. -- 16. 2.

CORVO reale bianco. — *Corvus albus*, sive *Corvus maior albus*. — *Corvus albus* Schwenck. — *Corvus candidus* Brisl. sp. 1. *varietas*. *Gall. Le Corbeau blanc*.

Diversi sono stati quelli, che hanno veduto de' *Corvi* bianchi, e fra gli altri l' Aldrovandus.

Corvos albos observarunt plures Auctores, sicut Aldrovandus, Willughbeius, & Kleinius,

vrando , il Willughby , e il Klein , ma sono bensì molto rari nelle parti meridionali trovandosi essi per il solito ne' luoghi montuosi , e coperti quasi tutto l' anno di neve , ne' quali luoghi anco molt' altri animali mutano in bianco i loro originali colori , come accade alle Volpi , alle Lepri , Orsi , Pernici , Merle ec.

Il Klein osservò vicino a Lubeca una Cornaccchia bianca , e a Dresda delle Gazzere tutte bianche . Gio. Caio del 1548 vedde nella Provincia di Cumberland due Corvi bianchi , stati rilevati per la Caccia , e stati così trovati nell' istesso nido . Quelli , che vengono infatti a predare , sogliono esser portati a predare le Pernici , e gli altri Corvi salvatici , e non di rado i Fagiani . Uno di questi Corvi intieramente bianco fu ammazzato a Tavolara Isola contigua alla Sardegna , e un altro fu ammazzato a Palaia Castello in Toscana .

T. CXLII. B. -- 18. --

CORVO d'Alemagna detto ivi Krè , secondo altri Cornacchia d'Alemagna . — *Corvus Germanicus vulgo Krè , aliis Manedula Germanica* .

Facilmente sogliono i Corvi significare una grossa burrafca , allorchè urlano molto , e in forma , che sembrino singhiozzare , specialmente sul far del giorno ; siccome se stanno pendenti dagli alberi , e dibattono le ale . Serenità poi predicono se guardando la mattina il terreno passeggiando per i rami degli alberi a penne e ale larghe ; se in principio scompagnati gracchiano leggermente , poi ridotti in branco stridono forte , ovvero se sulla sera si mantengono in branco , o scompagnati che sieno , si ritirino al nido gracchiando fortemente .

Il Sig. Kolbe nella descrizione del Capo di Buona Speranza cita diverse specie di Corvi , che si trovano in tal luogo , e fra queste una ne descrive bianca nel ventre , e mista di bianco , e nero nel capo . Anco nel Messico per affermazione del Nierembergio , e del Fernandez vi sono de' Corvi mischiati di bianco .

T. CXLIII. B. I. --

CORVO Imperiale . — *Corvus calvus seu Loripes* Ger. Ornith. autogr.

In un Castello della Francia , chiamato Corvato , dice Alberto , che i Corvi vi campano più di 100. anni ; Esiodo scrisse , che vivono l' età di nove uomini , non so però con quali fondamenti . Che campino per altro lungamente è credenza universale .

Gli Uccelli di questo genere si cibano promiscuamente di carne , d'infetti , e di bade ; alcuni fra essi sono quasi affatto carnivori , e volentieri si cibano di bestie morte , e di

nus , sed rari bū sunt in regionibus Europae Meridionalibus ; in montuosis vero , ac Borealis bus plagiis per maximam anni partem nivibus obteletis reperiuntur facilius : nam & alia animalia ibi nativos suos colores in album mutant , ut Vulpes , Lepores , Ursi , Perdices , Merulae ec.

Propri Lubecam Cornicem niveam , in Silesia , & Dresdae vero Picas albas observaravit Kleinius . In Cumbria anno 1548. Corvos duos candidos , ex eodem nido , & ad Aucupium factos ut Accipitres observaravit Io. Caius . Venatici qui evadunt Perdices & Corvos ferros venantur , quandoque etiam Phasianos . Horum unus omnino candidus interfecit fuit Tavolarae (quae est parva ac finitima Sardiniae Insula) alter apud nos prope Etruriae oppidum vulgo Palaia .

*T*Empestatem plenam praeagiunt facile Corvi , si cum singulu quodam diu , multumque matutino praesertim crepusculo ululent ; & si de arbore pendentes alas frequenter motent . Serenitatem , si contra Solun biantes mane per arborum ramos plumas , & alas expandant ; si privatim primo crocstantes , mox turmatim congregati liberius vociferentur , aut si sub nocturnum crepusculum gregatim versentur , & dum separantur summe crocicando ad nidos advoalent .

D. Kolbe in Descriptione Capitis Bonae Spei plures Corvorum species ibi degere affirmat , quas inter una que donatur ventre albo , capite vero ex albo & nigro vario . In Mexico etiam sunt Corvi , teste Nierembergio & Fernandez , pennis quibusdam candidis variegatis .

*I*n Galliae Oppido , quod Corvatum nominant , Corvos annos plusquam 100. egisse Albertus refert ; Hesiodus novem hominum aetates vivere dixit , qua vero fide nescio : ipsos tamen longevos fatentur omnes .

*C*orvini generis Avibus viclus ex carne , infestis & frugibus promiscuus . Nonnullae etiam car-

cadaveri, per la qualcosa sono questi da alcuni chiamati semirapaci, come particolarmente il Corvo, e la Cornacchia volgare. Alcune volte ancora danno addosso a degli animali vivi, essendo stati veduti dar la caccia, e predare le Allodole, e le Passe. Nell' Islanda per asserzione di Mr Anderson, e nell'Isole vicine trovansi Corvi di una grandezza considerabile, i quali seguivano, e danno addosso anco a piccoli Agnelli, e quando non sieno scacciati da' guardiani, cavano ad essi gli occhi, e poi coraggiosamente, e avidamente gli maninettano, e gli mangiano.

Quantunque si possa dire, che il Corvo sia un Uccello piuttosto salvatico, e fiero, non ostante si addomestica, e impara a parlare non diversamente dal Pappagallo, e dalla Gazzera. Acciocchè più facilmente egli possa in questo rieffrire, gli si taglia il freno sotto la lingua; mediante questo taglio ne rilevò uno Olao Borrichio, per quanto è registrato negli Atti di Coppenaghen, che discorreva assai bene. Contraffaceva egli sì bene la voce del Padrone, che più volte avanti tempo, chiamando per nome il servitore, lo fece alzare dal letto. Un altro Corvo salutò Cesare, che tornava vittorioso dall'Epiro, dicendogli spiccatamente: *Vix Cesare vincitorem et Imperatorem.*

Uno ne fu sotto il Principato di Tiberio, che ogni mattina volava da' Rostri al Foro per dove dovevano passare Tiberio, Germanico, e Druso, e nominatamente ad uno ad uno, allorchè passavano, salutavali. Essendo questo stato ammazzato gli furono fatte, secondo Plinio, sontuofissime esequie, e fu fatto ammazzare l'uccisore di esso. Altri esempi ancora sopra di ciò potrebbon si addurre, ma per brevità si tralasciano.

carnivorae prorsus sunt; morticinis praecipue, & cadaveribus vescuntur, unde a nonnullis semirapaces appellantur, ut Corvus proprius dicitur, & Cornix vulgaris. Quin nec a vivis animalculis abstinent: Alaudas & Passe res ali quando devorasse visae sunt. In Islandia, vicinisque Insulis, referente Andersonio, prægrandes adinveniuntur Corvi, qui Agnos recens editos adoriri non timent, & si a Pastoriibus non impedianter, illos rostro oculis orbant, ipsos frenue dilaniant, ipsorumque carne avide vescuntur.

Licet vero fera potius Avis dici mereatur cicuratur tamen, & ad humana reddenda verba, non secus ac Psittacus, & Pica, instrui potest. Ut Corvus facile efficere hoc possit, linguae ei frenum resecare oportet; bac freni sectione unum Olao Borrichius, ut in Abis Hafniensis legimus, ad sermocinandum optimè eruditivit. Henri vocem ita bie simulabat, ut Borrichii famulus pluries ab eo nomine vocatus, ac deceptus, ante diem & horam, qua exergisci solebat, e lecto surrexerit. Alter Augustum ex Alia Victoria reducem verbis: Ave Caesar, viator, Imperator, salutavit.

Quidam sub Tiberio Principe singulis matutinis e Rostris evolans, in Forum versus, Tiberium, deinde Germanicum, & Drusum Caesares nominatim mox transeuntes salutabat. Occisi funus, teste Plinio, innumeris elatum est exequis, imperfectisque qui cum occiderat. Alia quae extant similia exempla brevitatis causa tamen.

Uno ne fu sotto il Principato di Tiberio, che ogni mattina volava da' Rostri al Foro per dove dovevano passare Tiberio, Germanico, e Druso, e nominatamente ad uno ad uno, allorchè passavano, salutavali. Essendo questo stato ammazzato gli furono fatte, secondo Plinio, sontuofissime esequie, e fu fatto ammazzare l'uccisore di esso. Altri esempi ancora sopra di ciò potrebbon si addurre, ma per brevità si tralasciano.

T. CXLIV. B. - II. ~

CORNACCHIA; o Cornacchia comune. — *Cornix Gesn. Aldr. Wiliagh. Rai. Ionit. Alb. & Briff.* — *Corvus minor Charl. & Sibb.* — *Corvus [Corone] atro caerulefens, cauda rotunda, rectricibus acutis Linn.* — *Syst. Nat. sp. 2.* — *Gall. Corneille.* — *Angl. Crow; Cmon Crow; Carion Crow.*

LA Cornacchia, secondo il Guarino Veronese nel suo Vocabolario, ha preso dal corno il nome, perchè a guisa di esso è rumorosa, e quanto esso in vita durevole. Trovansi le Cornacchie intorno le Città, le fabbriche, i lidi marini, le rive de' fiumi, e gli sfoghi delle cloache. In Inghilterra evvène gran copia, perchè nel terreno umido di essa vi è gran copia di vermi. Per la medesima ragione appreso di noi se ne trovano molte a Pisa, anco in Città, dove in tutto l'anno tanto la mattina a buon' ora, che la sera ne' giorni sereni, e per tutto il corso della giornata ne

Cornix Guarini Veronensis iudicio in suo Vocabolario, dicitur a cornu, quod sis clamosa ut cornu, & quod ut cornu durat, vivat. Versantur Cornices circa urbes, domos, maris littora, fluminum ripas, & sterquilinia. In Britannia ingens ipsarum copia occurrit, quoniam in pabulo humidio eius soli vermes abundant. Apud nas, ipsa eademque, qua in Britannia, ratione, degunt Pisces, in ipsa etiam urbe, ubi toto anno matutino, ac vespertino tempore diebus serenioribus, diebus vero pluviosis tota die, supra princeps templum, & proxima giorni piovosi vedonsi volare tanto sul Duomo, che

che sulle alte fabbriche ad esso vicine. Vivo-
no di biade, di noci, di olive, di vermi, e
di carne.

Realmente la *Cornaccchia* volgare, quale è
quella appunto qui rappresentata, è molto car-
nivora, e dedita a cibarsi di carogne. In man-
canza di queste s'accheggia poi i seminati. In
Svezia, siccome in altre Provincie del Nort, è
rara; frequente poi ne' Paesi meridionali, e
marittimi specialmente. Un'altra *Cornaccchia*
devastatrice de' seminati, ma di color ceneri-
no, si troverà descritta al num. 7.

*edita, atque antiqua aedificia versantur. Vi-
tiant frugibus, nucibus, olivarum fructibus,
vermibus & carne.*

*Species vero, quae *Cornix vulgaris* dicitur,
ut ea est, quae hic depingitur, carnivora pro-
prie est, ac morticinis plerunque vescitur; bo-
rum vero inopia sata depopulatur. Rara *Avis*
in Svezia, aliisque septentrionalibus Provinciis,
copiosa in calidioribus praecipue maritimis. Cor-
nix alia frugilega, sed cinerea, videatur infra
descripta num. 7.*

T. CXLV. B. - 12. -

CORNACCIA frugilega nera, o devastatrice de' seminati, detta volgarmente *Mulacchia*, e *Corvacchia*. — *Cornix frugilega* Rai. & Brifs. sp. 3. — *Cornix nigra frugilega* Klein. — *Cornix nigra*, seu *Cornix fru-
givera* Aldr. — *Cocis Alberti Rzac.* *Cornix frugivora*, seu *frugilega* Willugh. — *Corvus (frugilegus) ater*,
fronte cinerascente Linn. Syst. Nat. sp. 3. — *Corvus Calvus nigricans* Barr. Ornith. — *Corvus Spermologus*
Charl. — *Spermologus frugivorus* Sibbal. — Gall. *Corneille moissonneuse*. — Engl. *The Rock*.

E propria dell' Europa, vola in branco, e
vive di lombrichi, e di biade, e perciò
è dannosa alle campagne. Alle *Cornaccie* di
molta età tutte le penne, che restano tra la
base del becco e l' occhio, per il continuo
grufolare fra la terra per cavare i lombrichi,
loro si vedono confumate. Questa parte, che
resta sprovvista di penne, diventa alla vista
bianchiccia, e mutata in callo, o coperta di
una specie di forfora.

Dalla *Cornaccchia* comune si distingue spe-
cialmente dall' esser di essa maggiore, e per
le sue penne celesti-nere lucenti.

*IN Europa habitat, gregatim volat, & lum-
bricis, frugibusque vicitat, ideoque plurimum
agris infesta. Cornicibus aetate procellioribus
plumae, quae circa basim rostrorum ad oculos usque
sitae sunt, crebro rostrorum ad terram attritu, abra-
sae observantur, rostrum enim in terram pro-
fundius saepè intrudunt ad lumbricos extrahen-
dos. Pars autem illa plumis spoliata, albicans
& furfuracea substantia, vel callo obducitur.*

*A Cornice vulgari distinguuntur praesertim
magnitudine, qua illam superat, & pennarum
nitore nigro-caeruleo.*

T. CXLVI. B. - 18. -

CORNACCIA, detta *Mulacchia nera*. — *Cornix Monedula*; *Lupus*; *Graccula*; *Scurra* &c. — *Mon-
edula*, sive *Lupus* Aldrov. & Willugh. — *Gracculus vel Monedula*, *Lycos Arisototelis*, *Gefu*. — *Cornix ger-
ula* Klein. — *Monedula* Brifs. sp. 6. — *Monedula torquata* Charl. — *Corvus [Monedula] fusca*, *occipite in-
cavo*, fronte alis caudaque nigris Linn. Syst. Nat. sp. 5. — Gall. *Choucas*. — Engl. *Lack. Daw*; *The
Gack-Daw*.

Il capo di questa, in paragone del corpo, è
affai grande, il che spiega esser ella affai
astuta, e ingegnosa. Vive in compagnia con
le altre della sua specie, e abita nelle più ele-
vate rupi de' monti, e nelle alte torri ancora,
o antiche muraglie, e ne' disabitati fortilizi,
e suol fare il nido, almeno in Italia, nelle
buche, o squarci di questi tali luoghi. Non
lascia però di covare qualche volta anco ne'
gli alberi, e pone sul principio di Maggio da
tre fino a cinque uova, minori di quelle de'
Corvi, siccome più sbiancate, e meno mac-
chiate anco di quelle.

Nell' Autunno scende al piano; è dotata di un ventricolo molto robusto; e si ciba di
diversi noccioli, e noci, siccome di ciliege, di semi, e di biade, non lasciando anco di

*Huius caput, corporis respectu, est grandius,
quod eam calidi & sagaci ingenio esse ar-
guit. Gregaria pariter est, & altissimas montium
rupes, quandoque etiam desertas surres, muros
antiquos, & arcas ruinosas habitat, saltem in
Italia, in guarum foraminibus nidulatur. In
arboribus etiam interdum nidificat, & ova tria,
vel quinque corvinis minora, pallidiora, &
rarioribus maculis insignita primo Maio ponit.*

*Ad planities in Autumno descendit. Ven-
triculo admodum musculofo instruitur, vescitur
que nucibus, cerasis, granis, aliisque frugibus,*

pu-
ci-

cibarsi d'infetti, i quali per poter più facilmente rintracciare, e attrappare, suole, almeno presso di noi, seguitare i Bifolchi nel tempo, che arano i campi. Nella Svezia fu l'Autunno parte dalla Smolandia; nell'Uplandia poi resta tutto l'anno, e la notte alberga nelle torri.

Perchè ella suol nascondere, e sotterrare i tritumi delle biade, che fasia essendo le avanzano, e raccogliendo nel seguente anno nuovo cibo dalle spighe, che indi ne nascono, perciò si dice, che abbia ella insegnato agli uomini l'arte del seminare. Ella è poi molto portata a rubare l'oro, e l'argento, e dall'aver ella trafugato delle monete si crede, che abbia acquistato il nome di Monedula.

pluribusque vescitur insectis, quae animalcula ut devorare, ac colligere facilius possit, Agri colas vomere terras inarantes, saltim apud nos, inseguuntur. In Svecia Autumno migrat e Smolandia, in Uplandia vero remanet, & per hyc men in turribus pernoctat.

Quia frumenti aliorumque granorum, ubi satiata fuerit, reliquias terra recondit, & spicas sub sequenti anno ex iis ortas colligit, ideo frumentum serendi rationem hominibus ostendit. Auri praesertim, & Argenti furacitas in ea mira, unde a moneta, quandoque erupta, & abscondita, Monedula dicta creditur.

T. CXLVII.

CORNACCHIA, o Mulacchia scherzosa, o sia mischiata di nero e di bianco. — *Cornix altera*, sive *Monedula ex albo, & nigro varia; naturae lusus*. — *An Cornix varia* Friesch. & Briss. sp. 2. variet. A, vel *Cornus vericolor Feronensis* Worm. Mus.

L'Aldrovando, e il Gesnero ne descrivono una con una specie di collare bianco, la quale egualmente che la qui descritta non si deve reputare, che un' accidental varietà della specie comune.

Quella descritta dal Brisson era bianca nel basso delle guance, nella gola, nel collo inferiormente, nel ventre, e nelle penne maggiori delle ale. Ne sono state anco osservate altre variegate diversamente, a macchie, o strisce, minori, e fitte.

Aldrovandus, & Gesnerus Monedulam describunt, torque albo circumdatam, quae ut supra descripta, pro fortuita tantum varietate speciei communis baberi debet.

Cornix varia Brissonii insima genarum parte, gutture, collo inferiore, medio ventre & remigibus maioribus albis instructa erat. Aliae etiam observatae sunt diverso modo variegatae, maculis, vel zonis, minoribus, crebrioribusque.

+ T. CXLVIII.

CORNACCHIA, Mulacchia del Capo di Buona Speranza. — *Cornix Monedula Capitis Bonae Spei*. — *Monedula Capitis Bonae Spei* Briss. sp. 10. — Gall. *Le Choucas du Cap de Bonne Esperance*.

Si è creduto ben fatto ritenere i nomi generici di *Corvo*, di *Cornacchia*, e di *Coracina* attribuiti a questi Uccelli da diversi Autori, a motivo di qualche differenza in essi osservabile, e perchè non si venisse a caricare un numero troppo grande di specie di un genere solo.

I *Corvi* si distinguono per ragione del becco grande, e superiormente inarcato, e a coltello.

Le *Cornacchie* son più piccole, e sebbene abbiano il becco simile a quello de' *Corvi*, non ostante è un poco più dritto, o meno convesso di quello.

Le *Cornacchie* poi lo hanno rotondetto, meno grosso, e tutto un poco arcato.

Orvi, Cornicis, & Coraciae generica Auctorum nomina libenter retinimus, habita ratione differentiae aliquantisper in his Avibus observandae, & ne specierum quantitate unicum tantum genus minis oneraremus.

Corvi rostro donantur magno crasso, ac superius fornicato, & cultrato.

Cornices minores sunt corpore, rostro vero Corvinis aemulo, licet plerunque rectiore, sive minus convexo.

Coraciae autem rostro donantur teretiusculo, lo, minusque crasso, & parumper arcuato.

6. CORNACCHIA interiormente bianca. = *Cornix candida* Schwenck & Briss. sp. 2. variet. B. quae non solum pennis in universo corpore donatur albis, sed rostro, pedibus, & unguibus candidatis.
7. CORNACCHIA frugilega, o devastatrice de' seminati cenerina. *Cornix cinerea frugilega* Aldrov. Ionst. Schw. ench.

- ench. Klein. Rzac. = *Corvus cinereus* Barr. Ornith. = *Corvus semicinereus* Charl. & Sibb. = *Corvus varia*, marina, biberna Geln. = *Cornix cinerea vel varia* Rzac. = *Cornix*, sive *Corvus cinereus* Erlich. = *Corvus niger* Linn. Syst. Nat. sp. 4. = *Corvus [Cornix] cinerascens*, capite, gula, alis caudae ad vivide inclinantibus a gula ad medium collum subbus nigra, rostro, pedibus & ungibus pariter nigris. Accipitare in altissimis montibus habitat & nidificat; per Hyemem vero in planisierem descendit. Ova quatuor purgat pectora & prata a vermis, qui foenum consumunt; futurae tempestatis & venti nuncia in massimis; edit etiam Limaces & Ranarum capita; eradicat gramina sub quibus larvae latentes; respicit sedens adversum ventum.
8. CORNACCHIA tutta nera di Giamaica. = *Cornix in toto corpore nigra Iamaicensis*. = *Corvus garrulus* ater Brown. = *Cornix nigra garrula* Sloan. & Raii. = *Noribus amplis* Klein. = *Cornix Iamaicensis* Briss. sp. 5. = *Perrus garris voce fatis diversa a voce nostrorum Cornicium Europeanum*. Baccis visitat sicut & Scarabeis. In Iamaica habitat, praesertim in Insulae Septentrionali parte, cuius montes incolit.
9. CORNACCHIA Mulacchia col collarc. = *Cornix*, *Monedula torquata*, = *Monedula torquata* Charl. & Briss. = *Monedula altera* Aldr. = *Aliud Monedulæ genus longi*. = In omnibus cum *Monedula* Tab. CXLVI. convenit, praeterquam quod collum labecula albo torque circumdatum. In Helvetia invenitur.
10. CORNACCHIA Mulacchia tutta bianca. = *Cornix Monedula candida* = *Monedula candida* Schwench. & Briss. sp. 6. variet. B. = *A Monedula vulgari differt colore in toto corpore albo, ac rostro subflavescente*.
11. CORNACCHIA Mulacchia tutta nera. = *Cornix Monedula nigra*. = *Monedula nigra*; *Spermologus*, sive *frugilega* Frisch. cum satis accurata Icone. = *Cornix* Charlet. & Sibb. = *Monedula nigra* Briss. sp. 7. = *Monedula vulgari paululum crassitie cedit, splendide nigra, punctulis albis oculos ambientibus, rostro, pedibus & ungibus nigris*. *Turriam* destrutiarum muros frequens, in quarum foraminibus nidificat.
12. CORNACCHIA Mulacchia dell' Alpi. = *Cornix Monedula Alpina*. *Pyrhocorax* Geln. Aldrov. Ionst. & Briss. sp. 8. = *Monedula vulgarem crassitie circiter aequat, in toto corpore nigritas, rostro recto, non admodum crasso, luteo, quo colore eiusdem etiam pedes insciuntur*. Habitat in Alpibus.

T. CXLIX. B. -- II. ~

CORACIA, o Corvo corallino. *Coracias* Aldrov. & Sibb. = *Coracias Pyrrhocorax* etiam dicta Rai. = *Coracia* Ionst. & Briss. sp. 1. cum optima Icone. = *Coracias*, sive *Pyrrhocorax* Willugh. = *Coracias Arisotelis*, *Pyrrhocorax* Charl. = *Graculus tertium* genus Geln. = *Graculus Coracias rostro & pedibus rutilis* Geln. = *Cornix rostro, pedibusque rubris* Klein. = *Monedula Pyrrhocorax* Hafselq. = *Upupa (Pyrrhocorax) atra*, *rostro pedibusque rubris* Linn. Syst. Nat. sp. 4. = *Gall. Coracias*; *Choucas*; *Chouquette rouge*, & *Cornicelle*, ou *Choucas de Cornovaille*. = *Angl. Cornish-Chough*; *Cronwall-Kee*; *Killegray*.

Per ragione del becco specialmente, che è lungo, mediocrementi appuntato, e inarcato differisce da *Corvi*. Abita nelle rupi, sopra le Chiese, su i fortizli dirocatti, e su gli scogli; nelle Maremme frequenta il lido del mare, e dentro terra si tiene alla montagna. È un Uccello piuttosto comune in Inghilterra, nè solamente trovasi nella Cornovallia, ma nella Wallia ancora, e in tutta la parte occidentale dell' Isola su i lidi declivi e scoscesi alla marina.

Quella, che qui viene rappresentata, fu più volte mandata al Marchese Giovanni Gerini tanto da' monti di Bergamo, che dalle nostre montagne delle Panie sopra a Pontremoli, e sempre fu trovata molto più piccola di quella, che trovasi alla Tav. CLII.

L' Aldrovando vuole, che quella specie d' Uccello, detto *Pirracorace*, sia diversa dalla *Coracia*; il Bellonio però fa questi due nomi fra loro semplicemente sinonimi, e significanti un individuo solo. Realmente si deve confessare, che sia una specie diversa, se tale si ritrovi, quale dall' Aldrovando, e dal Brisson ci viene descritta, e tale è quella da noi accennata, e descritta sopra al num. 12. scilicet rostro atque pedibus gialli.

Rostro praecipue rubro, longiore, modice acuto & inflexo a Corvis differt. Rupes, tempora, arces dirutas, & scopulos habitat, marisque littora, in maritimis, frequentat, in interraneis vero montes. Apud Anglos obvia avis, nec in Cornubia tantum, sed in Wallia, totogenit occidentali Angliae latere ad maris littora declivio, & praerupta invenitur.

Quae depicta sic observatur Avis pluries e montibus Bergomensis, & Alpibus nostris Apuanis ad Marchionem Ioannem Gerinum misera fuit, ac semper magnitudinem illa, quae sub Tab. CLII. ostenditur, longe inferior.

Aldrovandus Pyrrhocoracem Avem a Coracia diversam esse contendit; Bellonius vero nomina baec eiusdem Avis synonima facit. Fattendum equidem est diversam esse, si modo talis reperiatur, qualis ab Aldrovando describitur, nec non a Brissonio, quae a nobis indicata supra fuit inter Corlices num. 12. scilicet rostro atque pedibus gialli.

Il Willughby pure, e altri stimano, che la *Coracia*, e la *Pirrocorace*, o *Pirrocacia* dell'Aldrovando, sieno un Uccello solo, ma con poco fondamento, come fra le altre cose la grossezza, e la forma del becco, oltre al colore, a sufficienza lo dimostrano. Se il colore solamente facesse tutta la diversità, questo potrebbe probabilmente dipendere dal diverso sesso, dall'età, dal paese, e da altri accidenti, come è credibile, che da questi unicamente dipenda la differenza, che si vede nelle specie seguenti, le quali per non aver poi il becco di forma diverso da qualche specie di *Corvo*, o di *Cornacchia*, non si possono dire specie vere, e legittime di *Coracia*.

T. CL. B. - II. -

CORACIA col becco, e gambe di color carnicio. — *Coracias rostro*, *pedibusque carneo colore infectis*: —
An *Pyrrhocoracis* Aldrov. Gesn. & Ionst. varietas?

Questa specie di *Coracia* nominata *Pirrococare*, non si trova solamente nelle montagne d'Inghilterra, e nelle Alpi degli Svizzeri, ma nell'Isola di Creta ancora, e nelle Cicladi. Appresso i Grigioni si vede soltanto d'Inverno. Devasta questa i campi seminati di Grano. Grida altamente, e fa un verso non dissimile da quello della *Merla*, ma più alto e sonoro a guisa di acuta trombetta,

Coracias quae *Pyrrhocorax* appellatur non solum in montibus Angliae, & in Alpibus Helveticis invenitur, sed etiam in Creta, & Cycladibus Insulis. Apud Rhaetos hyeme dumtaxat cernitur. Agros frumento satos depascitur. Altum vociferat, & vocem Merularum acutam, ac ad fistulæ sonum nonnihil accidentem, imitatur.

T. CLI. - II. -

CORACIA col becco, e gambe nere. — *Coracias rostro pedibusque nigris*.

Varietà dell'antecedente, e soltanto probabilmente diversa a motivo dell'età, o del sesso. Dalla maniera colla quale gli Uccelli di questa specie si portano nel volo, arguiscono alcuni le variazioni, che sovraffanno nell'aria a motivo del freddo; imperochè se volano molto alto dicono, che significa accrescimento di freddo, se poi volano basse, diminuzione di esso. Quelle che si cavano dal nido sono mangiate dalla poveraglia,

Superioris varietas, & forte sexu, vel aetate tantum diversa. *Coracias*, quae *Pyrrhocorax* dicitur apud Rhaetos Hyeme dumtaxat cernitur. Agros frumento consertos depascitur. Ex his species *Avis* alto volatu frigus augeri, bimili vero minui quidam colligunt. *Harum Pulli* in cibum pauperum mensis cedunt.

T. CLII. B. - II. -

CORACIA di montagna, o alpiana. — *Coracias montana*, vel *Corvus sylvaticus*.

Il Gesnero, e l'Aldrovando nominano una specie di *Corvo* salvatico, ma lo descrivono corredato di un ciuffo, onde comparirebbe alla prima per diverso dal nostro. Altri però pretendono, che ciò nasca da un mero accidente, e lo stesso Gesnero aggiunge, che un tal ciuffo non apparisce ne' giovani. E' probabile dunque, che tutte le denominazioni che si troveranno aggiunte alla *Coracia* col ciuffo, citata poco più sotto al num. 7. competano

Gesnerus, & *Aldrovandus* *Corvum* habent *sylvaticum*, sed *cristatum*, ideoque a nostro bis depicto primo intuitu diversum. Nonnulli autem *Corvum* *cristatum* pro fortuita tantum varietate existimant, additique ipse *Gesnerus* talem *cristatum* non apparere in junioribus. Probabile igitur videtur synonima omnia, quae ad *Coraci* *cristatum* infra num. 7. apposita sunt huic quo-

pu-

pure a questa nostra. Questa fu ammazzata intorno a Volterra antichissima Città della Toscana.

Il Corvo montano descritto dalla maggior parte degli Autori trovasi particolarmente nelle montagne degli Svizzeri, nella Baviera, nella Lorena, nella Stiria, e nell' Ungheria lungo il Danubio. Si trattiene ne' luoghi aspri, e forti sulle montagne, e suol covare nelle fabbriche e torri defolate di tali luoghi. Due, o tre fogliono esser le uova, che ella produce. Alle pianure non scende mai, e si ciba tanto di biade, che di vermi, e di diversi insetti, come di Cavallette, Grilli, Scarabei, e simili. Si può allevare, e rendere anco agevole, e allora si nutrisce di latte, di diversi semi, di pane, e di carne.

Per asserzione del sopracitato Gesnero la Caccia di questa specie di Corvo è molto gradita da' Principi, ed i teneri sono anco graditi alle loro tavole, come una delicata vanda, per avere una carne di gustoso sapore, e le ossa assai tenere. Coloro, che gli cercano, e cavano di nido, fogliono in ogni nido lasciarne uno, perchè non si sdegnino, e tornino volentieri a covare nel medesimo posto l' anno, che segue.

T. CLIII.

CORACIA cerulea, o celeste; altrove anco detta Gazzetta marina, Ghiandaia marina, Cornacchia celeste, e Picchio marino femmina. — *Coracias caerulea*; *alii Cornis caerulea*, *Pica marina*, *Picus marinus* [femina] — *Pica marina* Aldr. — *Cornis caerulea* Gesn. Aldr. Schwenck, Ionft. & Worm. — *Garrulus Argentoratensis* Ionfton. & Willugh. — *Garrulus caeruleus*, seu *Pica caerulea* Fisch. — *Garrulae vel Picae glandariae genus alterum* Gesn. — *Pica*, seu *Garrulus Argentoratensis*; *Cornis fera picta, caerulea* Klein. — *Pistacius Germanicus* Schwenck. — *Corvus dorso sanguineo* (mas) *remigibus nigris, rectricibus viridibus* Linn. Fn. Svec. edit. 1. — *Coracias* [garrula] *caerulea dorso rubro remigibus nigris* Linn. Fn. Svec. edit. alt. & Synt. Nat. sp. 1. — *Galbulus* Bris. sp. 1. — Gal'. Le Roller. — Angh. The Roller.

Tra gli Uccelli Europei è il più vago, che si trovi per i colori, e perciò da qualcuno ha ricevuto anco il nome di Pappagallo. Sul tempo della mietitura si posa sulle barche di Grano, cibandosi de' suoi granelli, e d' insetti ancora, che trova ne' campi. In altri tempi poi va per le campagne tanto in cerca d'Insetti, che di coccole salvatiche, ordinario cibo, di esso, e de' suoi figliuoli.

La Ghiandaia del Capo di Buona Speranza dell' Albino non poco a questa si rassomiglia. Questa nostra specie di *Coracia*, detta di Trasburgo, ha la lingua corredata di due appendici biforcate, e di due tubercoli scoperti di piuma intorno all' occhio. Secondo l' Ionfton la femmina è diversissima dal maschio, vale a dire di un color castagno rosiccio nel capo, collo, petto, e basso ventre. Fu detta *Garrulo* dal continuo gracchiare che fa, e di Trasburgo dal luogo intorno al quale massimamente si trova. Alcune volte passa nell' Isola di Malta, e in Francia.

quogne competere posse. *Coracias montana nostra occisa fuit circa Volaterram antiquissimam Etruria Civitatem.*

Corvus sylvaticus *Auctorum in montibus praecipue Helvetiae, nec non in Bavaria, Lotheringia, Stiria, & Hungaria ad Danubium habitat.* In locis praecipue montanis & desertis degere solet, ubi in rupibus, turribus & arciūm destrictarum muris nidificat. Bina, autem ova parit. Ad planitem non descendit; edit fruges, vermes, Locustas, Grillos, Scarabeos, & alia plura Insecta. Cicutari etiam & instrui potest, atque tunc lacte, granis pluribus, pane, aequo ac carne saginatur.

Ipsò Gesnero teste buius speciei Corvi extetuntur a Regibus in ipsorum Venationibus & mensis, eorumdenque pulli in cibis, & in delicis babentur, survi cum scateant carne & ossibus mollibus. Qui e' nidis eos auferunt, in singulis singulos relinquere solent, ut anno sequente libentius redant.

AVis maxime variegata, pictaque coloribus variis inter Europeas, unde nomen Psittaci adepta est. Messis tempore frumento congesito infidet, granis vescens, & insectis in agris delitecentibus. Extra vero messem, se, prolemque baccis sylvestribus, variisque insectis nutrit. *Pica glandaria Capensis* Albini proxime ad banc accedit. *Coracias nostra caerulea, Argentoratensis dicta, linguam babet duabus bifurcatis appendicibus instructam, nec non tuberculis, seu verrucis nudis ad oculos positis donatur.*

Ionfton teste foemina tota coelo a mare differt, scilicet capite, collo, petto, & ventre ex castaneo ad leucophaeum vergentibus. *Garrulus dicta bacae fuit a garitu, & Argentoratensis a loco, in quo maxime degere solet. In Melitam Insulam, & in Galliam interdum migrat.*

In
II

Il Sig. Linneo c' informa ; che si trova anco in Svezia , nella Smolandia , nella Scania , e in altre Provincie . Il Wormio poi dice , che costruisce il nido a forma di quello della *Bubbola* , che è Uccello puzzolente , e che dimora ne' boschi , e luoghi disabitati . È molto simile alla *Gbiandia* , che si trova alla Tavola CLXIV. anzi per quanto io credo è l' istessissima specie ,

In Smolandia etiam , Scania , aliisque Sveciae Provinciis habitat adserente Linnaeo . Wormii testimonio nidum ut Upupa construit , foetere semper solet , atque in sylvis , locisque non frequentatis degit . A Pica marina sub Tabula CLXIV. depicta vix differt , immo meo iudicio ipsa , atque unica Avis est species .

T. CLIV.

CORACIA dell' Isole Filippine . — *Coracias Philippensis* , — *Monedula Philippensis* Brifs sp. 9. — Gall. Lo Choucas des Philippines .

Apnea è più grossa di una *Merla* , e canta **M**erulam paullulum crassitie superat , optima-
ffai bene , onde si può dire affai distinta || que sibilat , vel potius canit ; unde pluri-
specie da tutte le altre . **M**um ab aliis speciebus diversa .

7. CORACIA col ciuffo , o Corvo alpino col ciuffo , detto anco in qualche luogo d'Italia Corvo spelato , o Corvo marino . = *Coracia cristata* , sive *Corvus alpinus cristatus* . *Coracia cristata* Brifs. sp. 2. = *Corvus Sylvaticus* Gessn. Aldrov. Willughb. = *Corvus alpinus* Schwench. = *Uraza montana* , ♂ *Eremita montanus* Helveticus Klein . = *Arquata sylvatica nigra* Barr. Ornith. = *Upupa [Eremita] viridis* , capite flavo , cervice im-
bata Linn. Sylt. Nat. sp. 3. = *A Brissotio describitur rectricibus suprime ex nigro ad viridis vergentibus , sub-
tus nigris , cauda brevi , rostro rubicundo , longiusculo , pedibus obscuro rubentibus , pennis occipitis ceteris lon-
gioribus , ♂ cristata retro dependente efformatisbus . A Kleinio autem dicitur profunde viridis , capite ,
luteo , passim maculis sanguineis notato , crista prout iuba equina , plumis luceasibus , rostro rubro , pedibus
fuscis . Ex aliatis igitur descriptionibus plures busus Avis reperiuntur species , vel saltem varietates desumere li-
cet . Quae a Brissotio describitur , in montibus Helvetiae habitare , in aliis arcium destrutiarum muris nidifica-
re , ♂ bina , vel terna ova parere dicuntur . **

T. CXLV. B. - 61. -

GAZZERA comune , detta anco in diversi luoghi d'Italia Gazza ; Gazza con la coda lunga ; e Putta ; ap-
presso di noi volgarmente Cecca . — *Pica varia* , sive *caudata* Gessn. Aldr. Ionst. Willugh. Rai. Alb. ♂ Frisch .
— *Pica Brifs. sp. 1.* — *Pica Rusticorum vulgaris* Klein . — *Cressa atro ventre ♂ alarum extremis albis* Barr.
Ornith. — *Corvus [Pica] albo , nigroque varius , cauda cuneiformi* Linn. Sylt. Nat. sp. 10. — Gall. Pie ; La-
quette ; Dame ; Agasse . — Angle Pie ; Piaret ; Magpye ,

Questa specie di Gazzera è particolare del-
l' Europa , ed è anzi tanto generalmente
conosciuta , e sì comune intorno Firenze , che
credo superfluo il parlarne minutamente . Non
teme neppure i paesi freddissimi , perchè ella
è comune anco in Inghilterra , e per afferzio-
ne di Linneo comunissima pure in Svezia .

Partorisce da cinque fino in sette uova ,
nè quasi mai di più , più piccole di quelle de'
Corvi , più sbiancate di colore , e asperse di
minutissime macchie , in un nido fabbricato
fugli alberi con maraviglioso artifizio , tessuto
in giro , sotto e sopra di spine , e tutto chiu-
sto alla riserva di un piccol foro lasciatovi
per l' ingresso .

Il suo vitto è lo stesso affatto di quello
della *Cornacchia* , e della *Mulaccia* nera ; al-
cune volte dà dietro alle *Passeye* , e altri uc-
celletti , i quali se gli mangia . Né nostri
luoghi stanzia tutto l' anno , e pone il nido
sopra i Pioppi , e sopra i Pini . Si rileva , e

Europaea est , atque apud nos in Etruria ,
immō circa Florentiam Urbem adeo frequens ,
omnibusque ita nota Avis , ut in ea describen-
da diutius innorari minime necessarium dux-
erimus . Climata nec frigidissima tinet , nam in
Anglia , & Svecia teste Linnaeo vulgatissima
est .

Ova parit una vice quinque , vel sex , in-
terdum etiam septem , vis unquam plura , Cor-
vinis minora , ac pallidiora , maculis creberrinis
pietla , nidumque in arboribus magna solertia
construit , in circuitu supra , infraque horrida
spinis artificiosissime munitum , unico dumtaxat
foramine , eoque angustissimo pro introitu sibi
reliquo .

Vetus busus idem , qui Cornici , & Mon-
edulae . Passeres , aliaque Aviculas quandoque
etiam invadit & devorat . Apud nos toto anno
degit , nidumque sfruit supra Populos nigros ,
vel

si rende domestica facilmente , e allora si suol nutrire con pane inzuppato , con pappa , e altri domestici cibi .

Impara poi a parlare tanto bene , che non solo scolpisce a perfezione le parole , ma qualche discorso ancora , in maniera che se non fosse visto l'animale , farebbe facilmente preso e scambiato per qualche uomo . Si rileva poi nella maniera stessa che la Gbiandaria , della quale farà tenuto discorso alla T. CLXI.

vel Pinos . Mansuefit facillime & cicuratur , tumque pane madido , panatellis , aliisque domesticis ferculis nutritur .

Sermonem humananum optime addiscit ita , ut non solum articulatas voces , sed integras sententiias proferat , tanta saepe similitudine , ut nisi Avis observaretur manifeste , pro nomine loquente facillime acciperetur . Cicuratur autem eadem norma , qua Pica Glandaria , de qua sermo erit sub Tab. CLXI.

T. CLVI. B. - 14. I.

GAZZERA bianca . — *Pica caudata alba* . — *Pica alba* Worm. Mus. — *Pica candida* Briss. & Rzac. — Gall.

LA Gazzera bianca è stata sempre reputata una rarità , ed una cosa molto insolita , a segno che Scaliger volendo esprimere la difficoltà di trovare a suo tempo un Giudice giusto , e incorrotto , disse : ma un Giudice buono è più raro d'esso d'una Gazzera bianca . Una ne fu mandata al Wormio dalla Norvegia , un'altra si conservava ultimamente a Parigi nel Museo di Mr de Reaumur tutta bianca , e macchiata un poco di nero soltanto nella cima del becco . Un'altra parimente è quella , che qui si vede , stata ammazzata in Toscana .

Pica alba pro re insolita ac rarissima habita semper fuit , unde Scaliger de Iudice iusto haec pronunciarvit : sed Iudex bonus est Pica nunc rarior alba . Una ex Norvegia ad Wormium missa ab amico fuit , altera nuper afferbatur Parisiis in Museo Realmuriano tota candida , excepto rostri apice , maculis quibusdam nigricantibus notata ; alia pariter interficita apud nos fuit , & ea est , quae hic depicta observatur .

T. CLVII. B. - 7. -

GAZZERA minore di Bengala , specie di Storno secondo altri . — *Pica minor Bengalenfis* Edw. — *Saularis Maderapatanus* Rai . — *Lanius Bengalenfis niger* Briss. sp. 19. — *Lanius Bengalenfis Alb.* — *An Fringilla albissima* Linn. Syst. Nat. sp. 5. — Gall. *Petite Pies des Indes* . — Angl. *Saulary* ; *Cock Saulary* ; *Dialbrid*.

Secondo Edward il maschio di questa specie è di color nero lucido , e cangiante in celeste e porporino , e soltanto biancheggiano alcune poche penne delle ale , fra le minori . L'intermedie della coda sono nere , e bianche le laterali , per la qual cosa si vede che questa nostra deve essere il maschio .

Dal Raio il maschio è descritto della grandezza di uno Storno , mischiato di bianco , e di nero , bianco cioè nel petto , ventre , cosce , nel di sotto della coda , e per un piccolo spazio nelle ale , e in tutto il restante nero . La femmina poi si distingue per esser mista di bianco , e di scuro , e per aver la coda specie nel Regno di Bengala .

Secundum Edwardum in buius speciei mare color niger est splendidus , purpureoque , & cæruleo varians . Ex minoribus alarum remigibus quaedam tantum albant . Caudae rectrices intermediae sunt nigrae , laterales vero candidas , ideoque nostra mas dici potest .

A Raio autem mas dicitur ex albo nigro que mixtus , magnitudine Sturni , cum pectore , ventre , femoribus , parte caudæ inferiore , & areola in alis albissima , ceteris partibus nigricantibus ; foemina vero fusco , alboque varia , distinguiturque etiam a mare cauda acuminata . In Asia habitat praesertim in Bengalenfis Regno .

T. CLVIII. B. - 8. I.

GAZZERA Americana nera e gialla . — *Pica Americana luteo nigra varia* Edw. — *Pica luteo nigra varia* Sloan. & Rai . — *Pica ex luteo O' nigro varia* Kl. num. 10. — *Picus pullus , cirtatus cauda lutes* Linn. Syst. Nat. edit. 6. — *Cissa Americana , nigra , cirtata , cauda lutes* Barr. Ornith. — *Turdus oculis caeruleis* Kl. num.

num. 20. — *Turdus luteo niger*, gutture pilosa, capite, gula, rostroque, dorso, caudae nigris; cervice, uropygio, & toto ventre luteis, aliis nigris, rectricibus albo fimbriatis, rostro unciali Kl. num. 33. — *Pica uropygia*, & toto ventre luteis, aliis nigris, rectricibus albo fimbriatis, rostro unciali Kl. num. 33. — *Pica ex luce nigro varia Catesb.* — *Avis de Banana Alb.* — *Picus Americanus* nidum suspendens *Gura-Tangema* ex luce nigro varia Catesb. — *Picus Americanus* maior, pullus, circratus, cauda lutea, nidum suspendens *Brafiensium* Marcgravio Willg. — *Picus Americanus* maior, pullus, circratus, cauda lutea, nidum suspendens *Brafiensium* Marcgravio Willg. — *Picus Americanus* maior, pullus, circratus, cauda lutea, nidum suspendens *Rai*. — *Gura-Tangema Brafiensium* Marcgravii, seu *Picus* nidum suspendens *Rai*. — *Gura-Tangema Brafiensibus* Marcgr. Ionst. — *Ilerus Brisi* sp. 1. — *Xanthornus maior nigro varius* Brow. — *Ceratias* [*Xanthornus*] *flava*, capite, remigibus primoribus nigris Linn. Syst. Nat. sp. 6. — Gall. *Le Tropiale*; *Oiseau de Banana*; *Pie jaune & noire*. — Angl. *Large Banana Bird*; *Yellow and black Pie*; *Yellow Wood-pecker*.

Trovati nella Carolina, alla Giamaica, alla Martinicca, a Caienna, e in tutto il Brasile, siccome nella Guiana. Si dice essere Uccello assai docile, e sospendere il suo nido di figura cilindrica all'estremità de' rami, artificiosamente fatto di fuscelletti, come appunto fa ancora il Rigogolo. Habitat in Carolina, Iamaica, Martinica, Cayana, Brasilia, & Guiana tota. Avis dicitur valde docilis, atque nidum egregium extruit cylindraceas figurae, quem e virgultis construet, in arboribus, extremitatibus ramosum, ut Oriolus, seu *Picus* nidum suspendens vulgaris, appendit.

+ T. CLIX. B. - 19. 1. $\frac{1}{2}$

GAZZERA Orientale. — *Pica Orientalis* . — *Pica Orientalis* cauda duabus pennis longissimis Edw. — *Maccidata cristata* ex albo nigroque varia Rai. — *Avis Paradisiaca Orientalis*, ex albo & nigro varia Seb. — *Pica ex albo & nigro varia*, duabus caudae pennis simplicibus praelongis Kl. — *Pyrrhocorax* Moehr. — *Pica Papoenis* Briss. sp. 6. — *Corvus* [*Paradisi*] albo, nigroque varius, cauda cuneiformi, remigibus intermedialis longissimis, capite nigro cristato Linn. Syst. Nat. sp. 11. — Gall. *La Pie de l' Isle Papoe*, — Angl. *The Pie bird of Paradise*.

Nella grandezza del corpo è poco maggiore Corporis crassitie Merulam non multum superat. Habitat in Insula Indiae Orientalis Papoe dicta. Gossypium furatur, cuius seminibus inter alia vesci delectatur. di una Merla. Trovati nell'Indie Orientali nell'Isola di Papoa. Ella tra le altre cose, delle quali suol cibarsi, ruba il Cotone, mangiando volentieri i suoi semi.

6. **GAZZERA del Senegal.** = *Pica Senegaleensis* Briss. sp. 2. cum optima icona. = *Picae vulgaris paullulum* crassitie cedit; colore nigro-violacea; remigibus maioribus, rectricibusque fuscis; rostro, pedibus & unguibus nigris.
7. **GAZZERA di Giamaica.** = *Pica Iamaicensis* Briss. sp. 3. = *Ipsius* longitudo ab apice rostri ad caudam extre-
mam undecim pollices Parisiensis & novem lineas aequat. Mas nigro violaceo colore inficitur; remigibus ma-
ioribus superius, & subbus nigris. Foemina in toto corpore fufca est, superne saturatus, inferne dilutius.
Oculi grisei sunt, rostrum, pedes, unguisque nigri. *Pica nigra Iamaicensis* plumis interpersis purpureis Kl. num. 12. nec non *Merops niger* iride subargentea Brow. vel *Monedula purpurea* Catesb. atque Izaneti Fernand. & Rai. non aliam exprimit *Aven*, ac signanter huius speciei foemina, cuius pennae fufcae & splendentes sunt ad rufum tendentes. Mas vero pertinet ad *Monedulam* totam nigram Sloanii. A Linnaco
dicitur *Gracula* [*Quiscalu*] nigro-violacea, cauda subcuneiformi Syst. Nat. sp. 6.
8. **GAZZERA maggiore del Messico.** = *Pica Mexicana* maior Briss. sp. 4. = *Hocitzanatl* Rai. quae *Monedulam* nostratem corporis crassitie superat, colore & nigro ad caeruleum vergente, remigibus maioribus interius, & subbus nigris; rostro, pedibus & unguibus pariter nigris. *Garrula* est *Avis*, altaque vocis & sonorae. Ha-
bitat in Mexico, versusque circa Urbes.
9. **GAZZERA piccola, o minore del Messico.** = *Pica Mexicana minor* Briss. sp. 5. *Tzanaboei*, seu *Pica Mexicana Hernandezii* Rai. = *Picom vulgarem* magnitudine & crassitie circiter adaequat, colore nigricante, capite & collo ad fulvum colorem inclinantibus, cauda prolixa, ut in caudata Europaea; rostro, pedibus, & unguibus nigris. Habitat in Mexico, & ut nostra humanas voces facile disicit.

T. CLX. B. - 7. -

GARRULO di Boemia, detto altrimenti Beccofrusone, e Galletto di Bosco. — *Garrulus Bohemicus* Aldr. Gefn. & Willug. — *Bombicilla Bohemica* Briss. T. II. p. 333. ad *Turdus* genus relata. — *Turdus cristatus*, rostro brevi ad orum latu Europeus Kl. — *Turdus cristatus*, aut *Bohemicus* Frisch. — *Bombicilla incendiaria* Schwenck. — *Gnaphalus* Gefn. — *Picae Glandariae* genus Ionst. — *Microphenix* Fabr. — *Ampelis* Moehr. remigibus secundariis apice membranaceo colorato, cauda integra Linn. Fn. Svec. edit. pr. — *Lanius* [*Garrulus*] 10. — Gall. *Le Jaser de Boheme*. — Angl. *The Bohemian Gaylor Chatterer*.

LE maggiori penne dell' ale in quest' Uccello dall' undecima fino alla decimasettima terminano in una sorta di membrana di color cremisi. Affermano molti, che sia originale, e proprio della Boemia. Altri però l'hanno ritrovato anco in altre Province della Germania, siccome in Svezia, particolarmente all' entrata dell' Inverno.

Per asserzione di Linneo nell' Estate se ne parte, e probabilmente nidifica in Paesi più Settentriionali. Sta ordinariamente nelle selve, e si ciba di frutti, fra quali in modo particolare ama l' Uva, e le coccole di Ginepro. E' Uccello di gran pasto, e facilmente si alleva.

Chi desiderasse di questo una più ampia descrizione, la potrà vedere nelle Miscellanee del Padre Balbino attenenti al Regno di Boemia Decade I. lib. I. cap. 71. Un altro se ne descrive dal Klein proprio della Carolina, e detto dal Catesby *Turdus Garrulus Carolinensis*, il quale per i colori non vale a un gran pezzo quello d' Europa. L' esatta descrizione delle parti interne del *Garrulo Boemico* si può anco vedere appresso l' Aldrovando.

Quello stato in quest' Ornithologia dipinto era una femmina, ed aveva l' uova quasi perfionate, stata ammazzata in Febbraio. Dopo tal tempo non se ne sono quâ mai più veduti.

T. CLXI. B. -- II. --

GHIANDAIA comune, altrove detta ancora Gazza Ghiandaia, Berta, e Bertina. — *Pica Glandaria*, Del Garrulas Avis Gefn. — *Pica Glandaria* Aldrov. Schwenck. Ionif. Willugh. Rai. Charl. — *Gadgulus rostro nigro, cinereus, ad alarum latera caeruleus* Bart. Ornith. — *Garrulus Bris. sp. 1.* — *Corvus [glandarius] electricibus alarum caeruleis, lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato* Linn. Syst. Nat. sp. 7.

LA lingua di quest' Uccello è membranacea, e divisa in due; è naturale d' Europa, e comunemente stà nelle Querce, cibandosi esso ordinariamente di ghiande, volendo anche alcuni, che, come la formica, per l' Inverno se le serbi in luoghi ascioti, e sicuri. Quantunque egli abbia fortito il nome dalle ghiande, che suol comunemente mangiare, non lascia però di mangiare altre cose, come sono i lampponi, l' uva spina, le ciliege, e altri frutti, e mandorle, o nocciole.

Fa il nido su gli alberi molto alti, e specialmente rivestiti di folta ellera, facendo quattro, o cinque uova, e alcune volte anco fino a sette, le quali sono d' un guscio assai sottile, del color di terra d' ombra, e spruzzate minutissimamente di punti più oscuri in molta vicinanza fra di loro. Ella le partorisce sul principio d' Aprile, e al principio di Giugno ne suol deporre altrettante. Fabbrica il nido esternamente tessuto di sterpi robusti,

* *REmiges in bac Ave ab undecima ad decimam septimam terminatae sunt membranula oblonga coccinea. Bohemiac peculiare esse banc dicunt plures! In aliis vero Germaniae Provinciis ab aliis reperta, pariterque in Svecia, instante praesertim Hyeme.*

Teste Linnaco Aestate migrat, & nidificat in Boreales terras. Habitat in sylvis, ac fructibus vicitat, delestatque praecepue Uvis, & Iuniperi baccis. Maxime est vorax, & curatur facile.

*Qui Avis busius amplam desiderat descriptionem, bistoriam eius videat in Miscellanearum Regni Bohemiae P. Balbini Decad. I. lib. I. cap. 71. Huius varietas a Kleinio proponitur, quae dicitur *Turdus Garrulus Carolinensis Cattebey*, & coloribus non uset quantum Europaea. Garruli Bohemici interiorum partium, & viscerum descriptio apud Aldrovandum videatur.*

Quae depicta hic conspicitur Avis, foemina erat, ovis quasi ad exclusionem proximis omusta prope Florentiam Februario mensi occisa. Avis haec nullo alio tempore observata amplius fuit.

Quae depicta hic conspicitur Avis, foemina erat, ovis quasi ad exclusionem proximis omusta prope Florentiam Februario mensi occisa. Avis haec nullo alio tempore observata amplius fuit.

Avis haec nullo alio tempore observata amplius fuit.

* *Lingua donatur membranacea bifida; Europaea est Avis, ac communiter in Quercubus habitat, e quibus glandes pro una, maximeque usitata cibi specie decerpit, & quas etiam, nonnullorum auctoritate, fornicularum consimilis more nec ab simili praevidentia, pro Hyemali tempestate in latebris, tutisque locis recondere, & adservere solet. Licer Picae Glandariae nomen a glandibus ei inditum sit, tamen fructus Rubi idaci, grossularias, & cerasa, aliasque fructus, & nucleos avidissime vorat.*

In proceris ac densis arboribus praecepue antiqua obvallatis bedera nidificat, & ova quatuor vel quinque, quandoque etiam septem in nido ponit; quae cortice sunt tenui, colore terreo imbuta, punctis creberrimis obscuriore colore tinctis adpersa. Excludit ea incunte Aprili, totidemque iterum sub principio Iunii deponere solet. Nidus externe virgulis varie contextis, interne flexilibus & siccis herbarum

internamente di radichette secche, e flessibili & radiculis extructis communiter observatur. De di erbe. Intorno all' educazione di questa si buius Avis educatione ad articulum sequentem veda l' articolo seguente, dove di ciò si par adnotata vide.

T. CLXII. B. - 11. -

GHIANDAIA bianca. — *Pica glandaria alba*. — *Garrulus albus* Briss. variet. A.

Non differisce dall' antecedente, che nel colore, la qual varietà per altro in questa specie d' Uccello è stimata cosa assai rara.

Allevandola di nido, fino che non abbia passati i due anni è atta a imparare non solo a contrarfare il fischio, e il canto di diversi Uccelli, ma i versi ancora, e la voce del Cane, del Gatto, della Gallina, il pianger de' Fanciulli, la Trombetta, ed a scolpir bene qualche parola umana. Accio possa in ciò riescire le si taglia a buon' ora lo scilinguagnolo, o freno della lingua, e allorchè si alimenterà nelle case, farà il suo cibo cuore, pane, zuppa, o pappa, e frutti.

Il Conte Ginanni vuole, che questa impari più facilmente, e parli meglio della *Gazzera*; tutti almeno la riconoscono più proclive di essa a gracchiare. Finalmente ella è portata nelle case a rubare, e nascondere diverse cose, come ornamenti femminili, monete, e altre piccole bagattelle, egualmente che la *Gazzera*, e la *Mylaccchia*,

A*Pica Glandaria vulgari superius ostensa non nisi colore albo differt; haec ramen coloris varietas in bac Avis specie admodum insolita existimat.*

Si e nido ereptam domi ipsam educare volueris, intra biennium potis est non solum sibilum, vel cantum quarundam Avium aemulari, verum etiam voces Canum, Felium, Gallinorum, Puerorum gemitus, & minuscule Tubae sonum; etiam voces humanas alias plane articulatas edicit. Ut vero ad id aptius adfuerat, prima aetate linguae ei frenum resecare oportet, domique dum nutritur, eius cibi cor bubulum, panis madidus, sive elixus, & variis fructus erunt.

Comes Ginannius banc humanum sermonem addiscere, & articulate loqui Pica varia caudata melius afferit; saltem pro Ave magis garrula banc venditant omnes. Tandem non secus, ac Pica caudata, & Monedula dum in dominibus habitant, minora utensilia varia, foeminarum plura ornamenta, nummos, & similia furari, & abscondere solet.

T. CLXIII. B. - 10. -

GHIANDAIA nucifraga, volgarmente detta Ghiandaia Nocciaiola. — *Pica nucifraga*, vel *nucifragus* Klein. — *Nucifraga* Schwenck & Briss. sp. 1. — *Offfragus* Gefn. — *Coccothraustes* Char. — *Turdeta faxatilis* Aldr. Rz. — *Caryocatactes* Gefn. Turn. & Willug. — *Merula faxatilis* Ionst. — *Pica Abietum nigra punctata*, *furcata*, *alboque punctatus*, *alis caudaque nigris*, *restricibus apice albis*, *intermediis apice detritis* Linn. Syst. Nat. sp. q. — Gall. *Le Caffenoix*; *Pie Grivelée*. — Engl. *Nut-Breaker*; *Nut-Cracker*.

IL Kleino osservò due varietà di questa specie. Una tutta macchiata di scuro, e di sbiancato, sul far dello Storno, col becco robusto, e angolare, con la lingua più lunga di quella della *Cornaccchia*, e divisa, sul fare delle altre *Gazze*. L'altra, che era minore di corpo, con la lingua molto corta, e situata tutta nelle fauci, e più fessa dell'altra, col becco lungo quali due pollici trasversi, rotondetto, e con la mandibula superiore che sopravanza l' inferiore. La prima schiaccia perfettamente, l'altra animacca, e apre le nocciola, e tutte due si cibano di noci, di mandorle, di ghiande, di varie coccole salvatiche, e d' infetti ancora. Pongono il nido nelle buche degli alberi, e nell' Autunno, egualmente che la *Ghiandaia*, ripongono nelle buche de-

Kleinius duas buius Avis novit varietates. Alterius totum corpus fuscis & albentibus maculis varium ad instar Sturni, rostro valido angulo, Cornicis lingua, prout omnium Picarum, nonnihil divisa, & longiore. Alterius, quae minor, lingua brevissima, quasi in gula posita, & ad angulum mandibularum terminata, magisque fissa instructa est, rostro duas fere uncias longo, teretiusculo, mandibula superiore longiore. Illa exquisite frangit, haec pertundit nucem avellanam, amvae vero nucibus variis, amygdalis, glandibus, & baccis variis sylvestribus, immo & insectis etiam vescuntur. Nidificant in cavis arboribus, & Autumno nuces glandefque, pro-

me-

medesimi alberi tali cose . La voce di questa *Ghiandaia* è simile a quella della *Gazzera* . In Toscana per altro non si trova , bensì è comune ne' monti del Bergamasco , e trovasi anche in Austria , e in altre parti della Germania . Per relazione del Brisson una gran quantità di questi Uccelli fu osservata in Francia il 1753.

prout *Pica Glandaria* in arboribus recondunt .
Vox *Picis caudatis* similis . In Etruria non invenitur , verum vulgaris est in montibus Bergomensibus ; habitat etiam in Austria , aliisque Germaniae regiones quandoque frequentat . Anno 1753. teste Brissonio buis speciei Aves magno numero in Gallia observatae fuere .

T. CLXIV. B. - II. I.

GHIANDAIA marina. — *Pica marina* ; vel *Pica Glandaria marina* .

Quantunque nella raccolta originale del Mar-
chese Gerini trovisi questa figura come una
specie distinta , e per tale sia qui stata intro-
dotta , ed espresa da' nostri incisori , tuttavolta
ella non è diversa da quella , che si vede al-
la Tav. CLIII. cioè l'istessa *Coracia celeste* ,
con questa sola differenza , che quella è stata
disegnata e mostrata per la parte di sopra ,
questa per di sotto . Non è quest'Uccello mol-
to raro fra di noi ; viene di Maggio , e par-
te d' Ottobre . Più altre cose attenenti a que-
sta specie d' Uccello si posson vedere sotto l'accennata Tav. CLIII.

Icer in Geriniiano autographo codice ut genui-
na , ac distincta *Avis* species bacē demon-
stretur , & a nostris sculptoribus pro diversa ab
aliis omnibus sculpsis depictisque inserta sic sit ,
eadem revera est *Avis* , quam sub Tab. CLIII.
descripsimus , scilicet Coracias caerulea , illa de-
super tantum , bacē vero ex inferna parte ob-
servata . Non infrequens est apud nos , men-
seque Maio adventat , medio vero Autumno
evadit . Reliqua ad Aven. hanc pertinentia sub
indicata Tab. CLIII. videantur .

5. **GHIANDAIA di Caïenna.** = *Pica Glandaria Cayanensis* . = *Garrulus Cayanensis* Bris. sp. 2. = *Picam Glandariam vulgarem crassissime circiter aequat* , superne dilute violacea , inferne alba , capite anterius & collo in-
griseis . In Cayana habitat .
6. **GHIANDAIA scura del Canada.** = *Pica Glandaria fusca Canadensis* . = *Garrulus Canadensis fuscus* Bris. sp. 3.
cum accurata icona . = *Picam Glandariam vulgarem quasi crassissime adaequat* , superne fusa , inferne cinc-
reo-alba , capite anterius forde albo-flavicante , rectricibus apice albis ; rostro , pedibus , & unguibus nigri-
cans . Habitat in Canada .
7. **GHIANDAIA blù col ciuffo del Canada.** = *Pica Glandaria caerulea cristata Canadensis* . = *Pica Glandaria cri-
stata* , *purpureo-caerulea* Klein . = *Garrulus Canadensis caeruleus* Bris. sp. 1. = *Crassissime Merulam non mul-
tiatis , ansecellis* , superne caerulea , inferne cinereo-alba , torque nigro , rectricibus caeruleis , nigro transversum
fasciat , lateralibus apice albis ; crista in capite elevata plumosa ; rostro , pedibus , & unguibus griseo fuscis .
Habitat in Carolina & Canada . *Foemina* buis , coloribus non ita splendensibus , discrepat . Alias nonnullas
Avium species , sub *Garruli* nomine ab Autoribus indicatae , ad *Galgulū* , & *Turdi* genera videantur .

T. CLXV. B. - II. -

PICCHIO verde , volgarmente detto Picchio Gallinaccio . *Picus viridis* Gesn. Ionft. Willugh. Rai. Sibb.
Swenck. Kl. Frich. & Bris. sp. 1. = *Picus viridis* ; *Picus arborarius* , vel *arborum carator* . — *Picus Mar-
tius* maior Bellonio , Gesn. — *Pluvia Avis veteribus* Rai . — *Picus arborarius* Plinio . — *Picus Martius*
Festo Rzac . — *Galgulus* Ionft . — *Picus* [*viridis*] *vervise coccineo* Linn. Syst. Nat. sp. 7. — Gall. Le *Pic*
verd . — Angl. *Green-Wood-Spide* ; *Green-Wood-Pecker* ; *Rain-Fowl* ; *Heyboc*.

Veri *Picchi* , e specialmente Marzuoli , hanno
il becco dritto , robusto , angolare , acuto , e
molto a proposito per forare gli alberi ; la loro
lingua lunghissima , e tonda , che termina in
una spina ossea acuta , e rigida , da ambe le
parti dentellata , è adattata a iniettare e pren-
dere molte specie di vermi , e d' insetti , poi-
chè a piacimento vien questa messa molto in
fuori dal palato , e profondamente insinuata
ne' buchi , e nelle spaccature degli alberi , do-

Pici proprie diisti , ac praesertim *Martii* , ro-
strum babent rectum , robustum , angulosum ,
acutum ad perforandas arbores admodum adcomodatum ; linguam longissimam tereten , in spi-
nam offican , acutam , rigidam , utrinque denta-
tam desinentem , ad vermiculos aliquae insecta
lancinanda : eam autem pro libito exserere , in-
que rimas & foramina arborum profunde immi-
ttere possunt ad insecta ibidem latitania trans-
figen-

ve simili infetti dimorano; hanno inoltre i piedi corredati di quattro diti, due d'avanti, e due di dietro, la qual conformazione di diti è molto atta a salire su gli alberi; e questi diti sono anco molto accosti per poter più fortemente nel salite che fanno attenersi. La coda loro è tesa, e dura, sebbene voltata alquanto a basso, con le penne in cima rigide e nude, mediante le quali pure nel salire si aiutano, e si reggono. Si cibano d'infissi.

Nidificano ne' buchi degli alberi, e le uova di tutte le specie di *Piccbi* sono bianche, e di guscio tanto sottile, e diafano, che facilmente vi si vede dentro il torlo, e ne sogliono partorire cinque in Aprile, e cinque altre dopo d'aver rilevati i figli nati dalle prime.

La specie per altro rappresentata in questa Tavola non cova che una sol volta, e partorisce sei, sette, e otto uova ancora. Da se medesimi fanno questi un buco negli alberi volendo trovarsi il nido, e lo fanno sì esattamente tondo, che appena così tondo potrebbe farlo un Geometra con le feste. Scaliger, e Alberto Magno dicono, che i *Piccbi* imparino a parlare, ma le osservazioni di altri sono a questo piuttosto contrarie.

Il *Picchio* verde da noi indicato non solo si ciba di Formiche, e delle uova loro, ma volentieri divora i bruci, e le ruche degli alberi, e più d'ogni altra specie di *Picchio* sta anco in piana terra, dove pure va cercando i suddetti animaletti.

Il Bellonio fa menzione d'un *Picchio* verde, detto da esso maggiore, o massimo, che pretende essere il terzo nominato da Aristotele. Ei lo descrive per molto maggiore del *Picchio* verde comune soprammentovato, e lo fa contro il solito degli altri *Piccbi* di becco curvo, la qual varietà quando si dia, non serve certamente a stabilire una specie distinta, ma è probabilmente una mera e accidental differenza del medesimo sopra descritto, o comune verde,

& figenda & extrabenda; digitos in pedibus binos ante, & toridem retro habent, quae conformatio arborum scandoni admodum est idonea: sunt vero digiti valde approxinatis, ut arborem quam scandunt firmius apprebendant. Caudam habent rigidam & duriusculam, deorsum paullulum inflexam, & caudae pennas in extremitatibus suis ferme nudas, quibus inter scandendum innituntur, & se sustentant. Insectis vescuntur.

*In cavis arborum nidulantur, & ova alba pariunt omnes, corrisse tenuissimo, & adeo dia-
piana, ut intro vitellus facile distinguatur;
Ova quinque ut plurimum Aprili mense, to-
tidemque alia cum primi pulli educati fuerint,
deponere solent.*

*Species vero sub bac Tabula designata ova ponit & pullos educat una vice sex, septem, & octo etiam quandoque. Locum in quo nidula-
turi sunt in arboribus ipsi excavant, foramine adeo affäre factō, ut vel admoto circino rotundus reddi ab experientissimo Geometra vix posset.
Picos bunano sermoni assuecere Scaliger & Al-
bertus tradunt, quod aliorum observationibus minime respondet.*

*Picus hic noster viridis non tantum Formi-
cis, earumque ovis vescitur, sed Erucas etiam & Cossos devorat, terraeque saepius insidet,
quam alii Pici, & in ea etiam memorata ani-
malaqua quaerit.*

*Bellonius Picum babet viridem maiorem
seu maximum, quem pro tercio Aristotelis ob-
trudit. Pico viridi vulgari supra descripro lon-
ge maiorem facit, ac rostrum ei tribuit incur-
vum, præter normam aliorum buius generis;
quæ Avis differentia licet aliquando observata
sit, ad veram tamen ac peculiarem constituendam
speciem aegre admodum meo iudicio sufficeret po-
test; non alia certe erit Avis, quam fortuita & minime constans Pici viridis communis supra
descripti varietas.*

ma è probabilmente una mera e accidental dif-

T. CLXVI. B. - 7. 2.

PICCHIO vario, altrimenti detto *Picchio* fatto mezzano, e anco in diversi luoghi d'Italia *Pigozzo*, *Pipo*, e *Culrosso*. — *Picus varius medius*. — *An* *Picus varius maior* Willugh. & Charlet. — *Picus varius ex albo & nigro Gesn.* — *Picus varius Briss.* sp. 14. *Picus [major] albo, nigroque varius, ano verticeque rubris* Linn. Syst. Nat. sp. 10. — Gall. *Le Pio varie*; *Pic rouge*; *Epeische*; *Cul rouge*; — *Angl. French-Pie*.

DI grossezza è maggiore, o non inferiore di una *Merla*; il maschio porta sul capo, come si vede nel nostro, un tratto di color rosso allegro, e bello, posto a traverso tra bianco e bianco in tutte due le guance. Nella femmina tanto la gola, che il petto è di co-

Merulae pars est vel maior; mari infra veri-
cem ductus, ut in nostro, observatur minia-
ceus pulcherrimus transversus, qui ab albo ad
album in utraque maxilla producitur. Foeminæ
gula & pectus ex albo sordide flavent. Venter
in-

lore giallo fulicio. Il basso ventre presso la coda è di color cremisi assai bello , dimanierachè è stato perciò anco nominato *Culorosso*. Le dita d' avanti sono insieme attaccate fino a tutto il primo internodio ; il quarto dito poi è lunghissimo , e cortissimo il primo , Quella specie è propria d' Europa .

in inferior sub cauda colore phoeniceo seu miniacio pulcherrimo tinctur ; binc Avis Podex flammatus dicta fuit. Digits antici ad primum usque articulum connectuntur ; digitus quartus longissimus , primus brevissimus . Species haec Euro-

T. CLXVII. B. - 7. 2.
PICCHIO vario maggiore , volgarmente Picchio fatto maggiore (maschio) — *Picus varius maior* Rai. — *Picus niger , occipite , & uropygo coccineis* Barr. Ornith. — *Picus discolor* Frisch. — *Picus varius maior* Bris. sp. 13. — Gall. *Le grand Pic varié* ; Grand Grimpeureau , ou Prover bigarré . — Angl. Great Spotted Wood-Pecker ; Greater Spotted Wood-Pecker ; Wirwald .

LA femmina si distingue dal maschio per non aver ella sul capo macchia alcuna di color rosso , Egualmente che l' antecedente si

Femina a mare diserepat in eo quod in occipito nil rubri habeat. Insectorum ut superior vistitatem , & in arborum foraminibus nidificat , nibilque in nido pro ovorum fulcro substernit .

gli alberi senza porvi cosa alcuna , che serva di letto , e sostegno delle uova .

T. CLXVIII. B. - 7. 1. 2.

PICCHIO vario maggiore con le penne del petto mutate , o sia inferiormente giallo . — *Picus varius maior , pennis in pectore mutatis , scilicet inferne luteis* .

IL *Picchio* è un Uccello , che ha uso in medicina , specialmente appresso il popolo ignorante . Alcuni applicano la polvere di esso , seccandolo in forno , con l' aggiunta del sale sulle moroidi . Viene stimato poi valevole a disincantare gli affascinati , mangiato arrostito , o lessato , e ad accrescer la vista portato addosso ; e parimente a togliere il dolore de' denti , della gola , e della natura muliebre , portato che sia il suo becco legato al collo ; ma sono queste visioni di vecchierelle . È stato parimente detto , che portandolo addosso si può sciaramare e cavare il miele dagli Alveari senza esserne danneggiati dalle Api ; che non si possa fissare un chiodo , o una bietta in quell' albero dove il *Picchio* ha il nido , e che avendo qualcuno turato l' apertura del suo nido con un safo , o con del legno , egli accorrendovi , con l' applicazione di un' erba , che si pretende sia la *Linaria* maggiore , o l' *Etiopide* , immediatamente lo riapra ; le quali cose sono egualmente favolose .

Picorum usus in medicina frequens est , apud vulgus praecipue . Cum sale Avenam banc torrefactam quidam ad hemorrhoidas applicant . Asfaram autem vel elixam incantatione ligatos solvere ; oculis gestantibus visum acuere , restrinxere et collo suspensum dentium , vulvae , & tonsillarum dolorem curare fertur , sed anieularum sunt delirantia . Eamdem ferentes ab Apibus , etiam si favos & mella earum eximant , nou ferri : clavum & cuneum arbori in qua nidificant infixum diu non baerere . Foramen vero nidi lapide vel ligno obstructum , herba apposita , seu Linaria maior , seu Aethiopis illa sit , eamdem operire pari fide affirmatur .

T. CLXIX. B. - 9. 2.

PICCHIO vario massimo , volgarmente Picchio fatto massimo . — *Picus varius maximus* .

Chiamazzando il *Picchio* più del solito fu creduto anticamente , che predicesse pioggia , e perciò fu anco nominato Uccello della pioggia . Tra gl' infetti , e i vermi , de quali il *Picchio* si nutrisce , sono da esso molto ricercate le Ruche , che sogliono stare sotto la forza degli alberi . Mediante il fortissimo rumore che egli fa col becco le spaventa , e le

Alidius quam soleret stridens pluviam praefigere , antiquitus tamen , credebatur , binc est Pluviae Avis apud veteres nomen . Inter insecta & vermes , quibus maxime Pici delestantur , sunt Cossi , qui sub lignorum corticibus degunt . Rotri met-

mette in qualche moto, e lo stesso produce a riguardo d'ogni altro insetto, sicchè appoggiatovi sopra il becco, e applicatovi anco l'udito si accorge se vi hieno, e conosciuto di sì, col becco, che attivissimo è per segare e trivellare le trova, e introdottavi la lingua, che è lunghissima e con una punta acuta, ossea, e dentata, le investe, e le tira fuori. Questa lingua viene esattamente descritta negli Atti dell'Accademia Reale di Parigi per l'anno 1709, e nelle Transazioni d'Inghilterra ancora. Tutta l'Anatomia poi di questo Uccello si può vedere appresso l'Aldrovando.

** Istris sono terrefaciente ipsos, quod & aliis insectis accidit, in motum agit, ipsosque ad morte rostro, & auditu percipit, indeque rostro secante, & terebrante ipsos detegit, praecepueque ipsos lingua praelonga, & in exitu aculeo osse dentato munita invadit ac deponit. Picorum lingua in Actis Academiacae Regiae Scientiarum Parisiensis anni 1709. neconon in Transactionibus Anglicanis describitur. Eiusdem pariter linguae structuram, neconon universam Pici Anatomie Aldrovandus exhibet in sua Ornithologia.*

T. CLXX. B. - 4. 2. - 4. 1.

Fig. 1. PICCHIO vario minore, volgarmente Picchio fatto minore [maschio.] — *Picus varius minor mas.*

Appena è del peso d'un' oncia. La femmina in questa specie si distingue dal maschio per aver essa sul capo una macchia bianca, dove egli l'ha rossa. L'Aldrovando aveva detto, che questa specie tanto nel capo, che sotto la coda non era macchiata di rosso, ma questo non si verifica, come abbiamo avvertito, che nella femmina. Trovasi in Toscana, e in tutto l'anno facilmente, nè mai si parte da quei luoghi, nè quali abita, come sono le nostre montagne di Pistoia,

** Pondere vix unciali est. Huius species foemina a mare differt, quod vice maculae rubrae in capite, macula alia alba instratur. Aldrovandus huic speciei maculas illas rubras in vertice & uropygio deesse scribit, quod de foemina tantum ut diximus verum est. In Etruria habitat, totoque anno obvius est, nec a montibus nostris Pistoriensibus, in quibus praeceps degit, ut observare licuit, unquam discepit.*

Fig. 2. PICCHIO vario, o fatto minore bianco; mera varietà, o scherzo di natura, della specie antecedente, femmina. — *Picus varius minor albus; speciei superioris simplex varietas, arque naturae lusus; foemina forte?*

Tutte le sopra accennate specie di Piccib ritrovansi in quasi tutte le diverse regioni d'Europa, e particolarmente in Italia, se bene Plinio abbia scritto, che non si trovano Piccib nel territorio di Taranto, lo che fa specie. Ritrovansi egualmente in questa parte di mondo ne' Regni anco più freddi, come la Svezia: tutta volta sono rari ne' Paesi bassi, e particolarmente in Olanda.

** Superiores omnes Picorum species in quibusvis fere Europae Regionibus reperiuntur, praesertim in tota Italia, quamvis Plinius scribat in Tarentino agro negari Picos, quod mirum videtur. Reperiuntur etiam in frigidissimis eiusdem Europae Regnis, ut Svecia est: rari tandem in Belgio sunt, & privatim in Hollandia.*

T. CLXXI. B. - 8. --

PICCHIO vario Indiano. — *Picus varius Indicus.*

SAlgono i Piccib per gli alberi come le Tantoie, o secondo l'interpretazione di Plinio, come i Gatti, non solamente arrampicandosi per l'insù, ma per l'indietro ancora degli alberi, e per la parte di sotto de' rami, con i piedi e il corpo voltato in alto, e il dorso verso la terra, come in questa medesima Tavola sta espresso.

** Scandunt Pici per arbores tanquam Stelliones, seu, ut Plinius vertit, Feles, non modo sursum per arbores reptando, sed deorsum etiam, & sub ipsis ramis, pedibus & ventre sursum, tergore deorsum terram versus converso, ut ab ipsa hac Tabula ostenditur.*

PICCHIO nero, altrimenti detto Picchio Corno. — *Picus niger* Frisch. & Bris. sp. 6. — *Picus niger maximus* Willugh. & Rai. — *Picus maximus* Aldrov. & Ionft. — *Picus niger maximus nostrus* Klein. — *Picus niger*, seu *Formicarius* Schw. — *Tertia species Dryocaptae Aristotelis* Gesn. — *Pyrrhocorax Agricolae* Schw. & Kl. — *Picus [Marsius] niger pilos coccineo* Linn. Syst. Nat. sp. 1. — Gall. *Grimperau noir*. — Angl. *Great Black Wood-Pecker*.

Il maschio di questa specie secondo l'età, per quanto dice il Klein, è nel capo più o meno rosso, e la femmina è tutta nera; dal Brisson poi si vuole, che il maschio sia nero con tutto il di sopra del capo rosso, e le penne della coda nere, e la femmina non nera, ma bruna, e rossa soltanto nel didietro del capo, con le penne della coda parimente brune.

Questa specie pure di Picchio è d'Europa, e particolarmente trovasi in Svezia, in tutta la Germania, e negli Svizzeri, e molto ama di stare sugli alberi morti, che egli apre e spacca in traccia dei formicolai, de' quali formicolai simili legnami ne foglion sempre abbondare.

In Francia, e nell'Inghilterra, per quanto ci è noto, non annida, e quello che fu descritto di questa specie dal Willughby, l'aveva osservato a Ratisbona nel suo viaggio, che fece per la Germania, e per l'Italia, e l'aveva comprato in quel mercato da un Cacciatore, che l'aveva ammazzato.

T. CLXXIII. B. - 6. 1.

PICCHIO d'alto volo di Guinea. — *Picus altivolans ex Guineae*.

DI quest'Uccello nella Raccolta Gerini, pre-scindendo dalla figura, e dal nome, non altra notizia vi era. Parimente molti di quelli, che nelle seguenti Tavole si vedranno, non faranno accompagnati da istoria veruna, perchè tolte alcune esterne differenze, che a sufficienza dalla stessa figura sono dimostrate, non altro hanno, che si sappia di particolare, e che meriti ne sia fatta menzione.

Huius Avis praeter imaginem & nomen, non aliam in Geriniana Ornithologia invenimus notitiam; Plurimae pariter ex iis, quae sequuntur, nullam babebunt adiunctam istoriam, quam praeter externam partium differentiam ab ipsa imagine quam satis ostendat, non aliam peculiarem, & ab aliis discrepantem, atque commentatione dignam, nobisque cognitam obtinent naturam.

T. CLXXIV. B. - 10. -

PICCHIO nero col ciuffo di Caienna. — *Picus niger Cayanensis cristatus* Bris. sp. 12.

Anticamente, per quanto si legge, la carne de' Picchi non si mangiava: sebbene per quanto venghiamo accertati da de' Cacciatori, non sia dispiacevole. A Bologna, almeno al tempo dell'Aldrovando, che di questa cosa lasciò notizia nelle sue opere, vendevansi i Picchi al mercato per tutto l'Autunno, e in Inverno, nelle quali stagioni titrovansi grassi, e da molti per quanto egli dice, erano comprati, e mangiati.

Picos antiquitus in cibum venisse nunquam legimus: caro tamen eorum, ut ex Aucupibus intelleximus, baud ingrata babetur. Bononiae, Aldrovandi saltem aestate, qui notitiam banc scriptis suis inferuit, tota fere Flyeme & Autumno in foro vendebantur, quo scilicet tempore pinguiores sunt, & a multis ad mensum expetebantur.

T CLXXV B. - 9. 1.

PICCHIO del Capo di Buona Speranza. — *Picus capitis Bonae Spei Bris. sp. 30.* — Gall. Le Pic du Cap de Bonne Esperance.

T CLXXVI B. - 8. -

PICCHIO col capo e collo rosso di Virginia. — *Picus capite, colloque rubris, Virginianus.* — *Picus capite colloque rubris Kl.* — *Picus capite roto rubro Catesb.* — *Picus Virginianus erythrocephalus Bris. sp. 19.* — *Picus [erythrocephalus] capite roto rubro, alis, caudaque nigris, ab omnino alto Linn. Syst. Nat. sp. 13.* — Gall. Le Pic à tête rouge de Virginie; Procer à tête rouge; — Angl. Red-Headed Wood-Pecker.

Facilmente trovasi intorno i luoghi abitati, & si ciba anco di biade, & di frutti. E' co-
mune nella Carolina, nella Virginia, & nel Canada.

T. CLXXVII. B. - 10. 1. $\frac{1}{2}$

PICCHIO verde col capo grigio di Norvegia. — *Picus viridis capite cinereo Norvegicus.* — *Picus capite griseo Edw.* — *Picus viridis supra uropygium lutescens, ad radicem rostrum, & ab inferiori mandibula ad latera capitis nigra linea curva, remigibus alarum nigro-fuscis, albis punctis transversalibus, rectricibus flagrantibus Kl.* — *Picus viridis Norvegicus Bris. sp. 4.* — Gall. Le Pic verd de Norvege.

T. CLXXVIII. B. - 10. 1.

PICCHIO maggiore variegato del Messico. — *Picus varius Mexicanus maior Bris. sp. 21.* — *Pica Mexicana Seb.* — *Pica Mexicana alia Kl.* — *Laculator cinereus Kl.* — *Cornis Moch.* — Gall. Le grand Pic varie du Mexique.

T. CLXXIX. B. - 10. -

PICCHIO brizzolato di Bengala — *Picus Bengalensis maculatus.* — *Picus varius Bengalensis Kl.* — *Picus Bengalensis Alb. & Edw.* — *Picus viridis Bengalensis Bris. sp. 2.* — *Picus [Bengalenjis] viridis, occipi- te rubro, nucha nigra, subrufa anteque albus, nigro maculatus Linn. Syst. Nat. sp. 8.* — Gall. Le Pic verd de Bengale; Grimpereau de Bengale; — Angl. The Bengal Woodpecker; Spotted Indian Wood-Pecker.

T. CLXXX. B. - 8. 1. $\frac{1}{2}$

PICCHIO con i piedi a tre dita — *Picus tridactylus, albo, nigroque varius Linn. Syst. Nat. sp. 13.* — *Picus tridactylus Edw.* — *Picus tridactylus anomalus Mus Petrop.*

Di questa specie, e struttura uno se ne trova in Europa, uno in America. L' Europeo è naturale della Svezia, e vive nelle Alpi della Lapponia, e della Daleckarlia, e trovasi ancora nella Siberia, e si distingue per aver la sommità del capo gialla. L' Americano poi in tal posto è colorito di rosso, e trovasi nella Baia d' Udfon, e nell' Isola di Caïenna. Nell' Americano vi è pure della differenza tra il maschio, e la femmina, mancando questa del sopraddetto colorito rosso nel capo, e non essendo punto macchiata di bianco tanto nel dorso, che nel codrione come il maschio; per la qual cosa quello che da noi è stato rappresentato è sicuramente d' America ed è il maschio. Una minuta descrizione di quello d' Europa l' ha data il Sig. Linneo, ed è inserita negli Atti dell' Accademia di Stockholm.

*Huius species, sive structurae Avis invenitur Europaeus & Americanus. Europaeus habi-
tat in Svecia ad Alpes Lapponicas & Dale-
karlicas, nec non in Siberia, ac vertice flavo
distinguitur. Americanus vero vertice est rubro,
arque frequens est ad Sinum Freti Hudsonis, nec
non in Cayana. Facina pariter Americana &
mare discrepat capitis vertice nequaquam rubro,
& dorso uropygioque maculis albis desitatis;
quapropter mas est, & Americanus, qui a no-
bis ostenditur. Accuratam Europaei descriptionem
dedit Linnaeus in Actis Academiacis Stockolmen-
sis insertam.*

T. CLXXXI.

T. CLXXXI. B. - 8. -

PICCHIO Indiano in gran parte scelte, specie forse di Barbuto? — *Picus Indicus sotus ferme caeruleus; an Bucconis species?*

IL genere di Barbuto fu stabilito dal Sig. Brisson, e comprende sotto di se quelle specie d' Uccelli totalmente simili al Picchi, fuorchè nel becco, il quale in essi è alquanto torto all' ingiù, superiormente convesso, e compresso ne' lati, con delle penne a forma di peli presso l' angolo della mandibula rigidi, e voltati in avanti.

Bucconis genus a Brissone statutum, illas comprehendit Aves, quae per omnia Picos aemulantur, excepto rostro modice deorsum inflexo, superne convexo, lateraliter compresso, eiusdemque rostri basi pennis rigidis piliformibus antorufum versis obsoita.

+ T. CLXXXII. B. 6. I. ½

BARBUTO, o Boccalone. *Barbutus, vel Bucco.* — *Bucco* Briss. Tom. IV. sp. 1. — Gall. *Le Barbá.*

Boccalone è stato detto dalla grandezza della bocca, e grossezza del capo: Barbuto poi dalle piume sottili, e rigide come setole, o peli, che ha intorno all' angolo dell' istessa bocca. Per la struttura de' piedi si assomiglia molto al Cuculo, ma poi non poco da esso differisce per quest' accennata sua grandezza di capo, e per avere alla base del becco queste piume a foggia di pelo, che totalmente mancano nel Cuculo. Tutte quasi le specie di questo genere hanno la coda di dieci pen-

Bucco a Brissone dictus fuit, a buccarum, si-
ve generum, & capitis crassitie: Barbutus autem a plumis filiformibus rigidis, quibus ad rostri basim & prope mandibularum angulum barbam quasi mentientibus instruitur, dictus quoque est. Structura pedum cum Cuculo admodum convenit, ab eo tamen differt, & capitis indi-
cata crassitie, nec non basi rostri pennis illis filiformibus obsoita, quibus Cuculus destituitur.
Huius generis specierum fere omnium cauda decem tantum retricibus conflatur.

T. CLXXXIII. B. — 6. I.
— 6. —

Fig. 1. BARBUTO di Caienna. — *Barbutus Cayanensis*, — *Bucco Cayanensis* Briss. Tom. IV. sp. 2. — Gall. *Le Barbá de Cayenne.*

Fig. 2. BARBUTO di Caienna brizzolato. — *Barbutus Cayanensis naevius*, — *Bucco Cayanensis naevius* Briss. Tom. 4. sp. 3.

Sono quasi della grossezza di un' *Allodola*. Trovansi nell' Isola di Caienna, d' onde il Sig. d' Effars gli mando al Sig. de Reaumur per il suo Museo, e furono descritti, e anco illustrati con figure assai buone dal Sig. Brisson. Siccome poi questi Uccelli sono stati scoperti di certo, niente possiamo dire de' loro instin-
ti, vitto, e qualità.

Crassitie Alaudam cristatam circiter aemulan-
tur. Habitat in Cayana, unde in Museum
Realmuriandum missi fuerunt a Dom. Effars, &
a Dom. Brissone descripti, atque figuris perquam
optimis demonstrati. Cum autem huius generis
Aves nuperrime detellae atque observatae sint,
nullam earum instincus, visus, & qualitatum
positum recensere possumus.

4. BARBUTO dell' Isole Filippine. = *Barbutus Philippensis*, = *Bucco Philippensis* Briss. T. IV. sp. 4. cum ac-
curata icona. = Passerem domesticam crassitie non multum superat; superne obscure est viridis, interne for-
dide flavicans, maculis longitudinalibus obscuris viridibus variis; sincipite & taenia transversa in summo pe-
store rubris, genis, gaster & collo inferiore luteis; retricibus superne obscure viridibus, subbus cinereo-ca-
eruleis; rostro, unguibusque fascis, pedibus flavicanis. Foemina nonnihil mari crassitie cedit, atque ab illo
discipit capite & pectore rubro desitatis; genis, gaster, & collo inferiore albo-flavicanibus.
5. BARBUTO di Maynas = *Barbutus Maynanensis*, = *Bucco Maynanensis* Briss. sp. 5. cum optima icona. Prae-
cedentem crassitie circiter aequat. Superne viridis est, inferno albo flavicans, maculis longitudinalibus viridi-
bus variis, vertice & gaster rubris, taenia dilute cæruleis circumdat; collo inferiore & pectore luteis;
macula in imo pectore rubra; retricibus viridibus; rostro cinereo, mandibularum tamen marginibus & apice
albo-flavicanibus; pedibus unguibusque cincereis.

T. CLXXXIV. B. 7. I. 1.

GALBULA detta da Brasiliiani Iacamaciri. — *Galbula, Brasiliensis Iacamaciri.* — *Galbula Moehr.* ♂ Briss.
sp. 1. — *Iacamaciri Pifon.* — *Iacamaciri Brasiliensis Marcgr.* — *Picus Brasiliensis, Iacamaciri Marcgr.*
Willugh. & Klein. — Gall. *Le Icamar.*

E' grosso quanto un' *Allodola*. Alcune specie di questo genere hanno la coda formata da dieci penne, altre da dodici. La specie da questa nostra Tavola dimostrata trovasi al Brasile, e nell' Isola di Caienna.

A Laudam crassitie circiter aequat. Nonnullae buius generis species decem tantum rectricibus, aliae duodecim praeditae sunt. Quae bipinnigintur, in Brasilia, & Cayana habitat.

T. CLXXXV. B. - 12. -

GALBULA di coda lunga del Surinam. *Galbula longicauda Surinamensis.* — *Galbula longicauda Briss.* sp. 2. *Ispida Surinamensis cauda longissima duabus pennis excurrentibus furcata Klein.* — *Ispida Surinamensis binis plumis in cauda longissimis Edw.* — Gall. *Le Martin-Pêcheur à queue d'Hirondelle : Le Icamar.* — Angl. *The Swallow-tail à Kingfisher.*

Tutte le penne della coda in quest' Uccello sono di lunghezza ineguale. Per la disposizione unicamente delle dita, poste due d' avanti, e due di dietro, differisce da altri, che per il resto delle parti si potrebbero dire molto consimili, e tali sono fra gli altri le specie d' Uccello *Santa Maria*, o *Alcione*.

O Mnes caudae pennae in bac Ave inaequalem obtinent longitudinem. Digitorum tantum dispositione, duobus scilicet anticis, totidem posticis a pluribus aliis Avibus, quoad alias partes non multum difformibus, differt, ut inter alias Ispidae species sunt, sive Alcyones.

T. CXXXVI. B. - 6. -

TORCICOLLO, altrove Collotorto, Tortocollo, Stortocollo, Capotorto, e Verticella. — *Torquilla Gesn.* Schwenck, Frisch. & Briss. — *Iynx, Torquilla, Turbo Hermolai ; Vericella ; Verticolla Scaligeri.* *Collotques Chirlet.* Rai. Gesn. & Aldrov. — *Picus Torquilla Klein* — *Iynx Torquilla Linn. Syst. Nat.* sive *Cuculus subgriseus maculatus*, *restrictus nigris fasciis undulatis ciuifd.* Fn. Svec. — Gall. *Le Torcol*; *Turcot*; *Tercot*; *Torcon*; — Angl. *The Wryneck*; *Emmet-Hunter*.

Uguglia in grossezza l' *Allodola* comune, o poco di essa è minore. La sua lingua è lunghissima e tonda a forma di quella del Lombroco, che termina in una specie di spina, o punta di consistenza ossea, la quale mette molto in fuori, e ritira a forma de' Piccib. Alza pure le penne della testa come la *G bianchetta*. Torce il capo curiosamente fin dietro le spalle, e da questo è stata detta *Torcicollo*. Si ciba di Formiche, le quali prende colla lingua, investendole cioè con la punta di essa. La femmina è di color cenerino, o di color più chiaro del maschio. L' Aldrovando osservò che il maschio distinguevasi da una macchia nera, e lunghetta posta dietro l' occhio.

Pone il nido ne' fori degli alberi, e al più vi partorisce cinque uova, le quali per osservazione del Ginanni sono di guscio bianco, sottilissimo, e diafano. Difficilmente si rileva. Si mangia, ma non è di carne troppo buona. Trovasi in qualunque regione, e nella Primavera canta.

A Laudae vulgari par est, aut tantillum minor. Lingua huius admodum longa, & Lumbriformis est, sive rotunda, in spinulam osseam definens, quam in longum exerevere iterumque Picorum more retrahere potest. Plumas capitae cristae fere in modum interdum erigit, ut Pica glandaria. Caput ridicule contorqueat & ad numeros circumagit, unde Torquilla dicta est. Formicis vescitur, quas exerta lingua velocissime transfigit, aculeo nimurum linguae. Foemina mare pallidior est, magisque cinerea. Aldrovandus retro oculos maculam atram oblongisculam in mare observauit.

Nidulatur in foraminibus arborum, & ova quinque ad summum uno partu observatione Ginanni excludit, quae candida, & tenuissimo pellucidoque cortice sunt. Aegerrime cicuratur. Ipsius usus in cibis est, licet carne minus bona. In quarvis quasi regione conspicitur, & Vere canora est.

T. CXXXVII.

+ T. CLXXXVII.

CURUCU del Brasile . — *Togon Brasiliensis viridis* Brifs. sp. 4. — *Trogon Moehr.* — *Avis anonyma tertie dictus Marcgr. Willugh.* — *Pistatus flammus viridis* ♂ *cinereus rostro ferrato* Fevill. — *Tzintzian* [Mexico-nis] Rai. — Gall. *Le Couroucou verd du Brésil.*

SI accosta molto per la grandezza , e grossezza ad una Gazzera . La coda di questo è lunga cinque pollici e mezzo . Le specie di questo genere trovansi in paesi caldi presso il mare Australe , vivono di frutti , e campano anco in gabbia .

Magnitudine & crassitie ad Picam accedit . Caudam babet quinque pollices cum semisse longam . Huius generis Aves in calidis regionibus vivunt iuxta Oceanum Australem ; fructibus vescuntur , & aluntur etiam in caveis .

+ T. CLXXXVIII. B. - II. -

CURUCU cenerino di Cajenna . — *Trogon Cayanensis cinereus* Brifs. sp. 1. — Gall. *Le Couroucou cendré de Cayenne.*

SUpere di poco in grossezza la Merla . Non abbiamo di questi Uccelli altre notizie per essere stati scoperti e osservati ne' Musei d' Europa assai di corto .

Merulam crassitie paullulum antecellit . Noticias alias barum Avium non babemus , cum recenter detectae , & in Musea Europea misse sint .

T. CLXXXIX. B. -- 10. I. 1/2

CURUCU di Caïenna verde . — *Trogon Cayanensis viridis* Brifs. T. IV. pag. 168. sp. 2. T. XVII. fig. 1. — Gall. *Le Couroucou verd de Cayenne.*

4. CURUCU di Caïenna verde nel dorso e nelle altre parti superiori , e bianco nella pancia . = *Trogon Cayanensis viridis* , ventre candido Brifs. sp. 3. = Precedenti paullulum crassitie & longitudine cedit . Superne viridi-aureus , inferne albus , capite superiore & collo caeruleo-violaceis , viridi-aureo colore variantibus , genis & gutture nigris ; raenia transversa in pectore viridi-aurea ; rectricibus nigris , binis intermediis viridi-aureo mixtis , duabus utrinque sequentibus exterior viridi-aureis , tribus utrinque extimis apice oblique albis ; rostro cinereo-albo ; pedibus ad exortum usque digitorum plumulis nigricantibus vestitis ; digitis cinereo-albis , unguibus cinereo-fuscis . In Cayana habitat .
5. CURUCU del Messico = *Trogon Mexicanus* Brifs. sp. 5. = *Tzanototol* , seu *Avis similis* , aut *congener Tzanal* Fernand. Hist. Nat. nov. Hilp. = Cum Sturno nocte crassitie convenit ; superne albo , nigro , & fulvo variegatus , inferne rubescens ; capite nigrō ; rectricibus nigris , tribus utrinque extimis apice albis ; rostro pedibusque cinereis .
6. CURUCU del Messico variegato , = *Trogon Mexicanus variegatus* Brifs. sp. 6. = *Quaxoxototorol* [Mexicanis] Fernand. & Rai. = *Columbam crassitio circiter aquat* ; cyaneo , luteo , viridi , & nigro variegatus ; vertice cyaneo ; rostro nigrō .

T. CXA. B. -- 12. 1.

CROTOFAGO . — *Crotophagus* Brifs. T. IV. pag. 177. sp. 1. — *Crotophagus nigro-violaceis ciuifd.* — *Crotophagus ater* , rostro breviori compreso , superne arcuato cultivato Brow. — *Monedula tota nigra* Catesb. — *Monedula tota nigra maior* , *garrula* , mandibula superiore arcuata Sloan. — *Cornix garrula maior* Klein. — *Pica nigra Iamicensis* , plumis interspersis purpureis , e viridi resplendentibus , rostro noctulæ formi Klein. — *Pistatus congener* , *Ani Brasiliensis* Marcgr. Willugh. ♂ Rai. — *Ani Brasiliensis* Marcgr. — *Cacatototol* , seu *Avis Corvina* Fernand. — Gall. *Bout de Petun* . — Angl. *Great Black Bird*.

LA specie descritta dal Willughby , dal Bronw , & altri , intieramente nera , sembra una varietà molto distinta , sebbene altri la reputino l' istessa , e soltanto cangiabile di colore a motivo dell' età , e della stagione . Uguaglia in grossezza la Merla .

Species , quam describunt Willugbeius , Brown , aliqui totam nigram , varietas valde distinguenda videtur , licet ab aliis pro una eademque specie , coloribus nempe pro aetate vel anni tempestate variantibus , statuatur . Corporis crassitie Merulam circiter aemulatur .

T. CXI.

CROTOFAGO maggiore — *Crotophagus major* Bris. sp. 2. — Gall. Le grand Bout de Picun.

Queste specie d' Uccelli, e in specie l' antecedente, gridano con alta voce *illi* d' un tuono solo, ma più alto in mezzo. Se ne trova quantità nell' Isola di Caienna, e formano nidi vastissimi nelle siepi, ponendovi, e covandovi da 50. uova per volta; per altro non sono buoni a mangiarsi.

Huius generis Aves, ac praesertim speciei superioris, clamant elata voce *illi* uno tono, in medio elevationi. Frequentes sunt in sylvis omnibus Cayanae Insulae, & amplissimos in sepibus nidos construant, & quinquaginta simul in uno eodemque nido ova ponunt, iisque incubant; verum cibo inutiles sunt.

CROTOFAGO vario Indiano, — *Crotophagus varius Indicus* nobis. — *Picus Indicus* Gerin. Ornith.

Trovavasi questo un tempo a Versagli, — *Versaliae* olim vivebat haec Avis, ubi depo d' onde dipinto fu fatto venire; ivi era *Sitta* fuit, atque sub Pici Indici nomine demonstrato per un Picchio dell' Indie.

Fig. 1. PECIOTTO, altrimenti Picchio piccolo grigio, o cenerino, detto a Ravenna Raparino. — *Sitta* seu *Picus minor cinereus*. — *Sitta*, seu *Picus cinereus* Aldrov. & Rai. — *Picus cinereus* Ionst. Sibbald. & Frisch. — *Picus cinereus*, vel *subcaeruleus* Gesu. — *Picus Pyrenaeus cinereus*, pusillus Barr. Ornith. — *Parus facie Pica* Klein. — *Sitta* Bris. T. III. sp. 1. pag. 588. vel potius *Sitta minor ciuif. superioris* varietas pag. 592. — *Sitta* [Europaea] *rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis* Linn. Syst. Nat. sp. 1. — Gall. *Torchepot* Grimpereau, *Torchepot*, — Angl. Nut-Hatch,; Nut-löbchen.

Secondo il Willughby è qualcosa minore di un Fringuello, e appena del pelo d' un' oncia. Altri però come il Brisson lo fanno grosso quanto un' Allodola; ma siccome quest' Autore ne descrive una varietà, che egli chiama minore, da esso però non veduta, perciò è credibile, che questa nostra sia la minore. Trovansi in Toscana, dove dimora tutto l' anno.

Cova una sol volta, ma quando gli sia guastato il nido, torna a covare per la seconda volta. Cova negli alberi, e con terra ride asfai piccolo l' ingresso del nido, qualora fosse la buca molto grande, e lo riempie con foglie di Quercia. Pone sei, o sette, e anco otto uova, le quali sono di guscio finissimo, tutto sparso di macchiette rotonde, e di spruzzi di color di cannella,

Fringilla paulo minor est, atque unciae vix pondere Willughbeii observatione; alii vero, ut Brissonius eamdem faciunt ac Alaudam crassie; cum vero Brissonius aliam huius varietatem describat, quam minorem dicit, ab ipso tamen nunquam visam, manifestissime banc nostram huic varietati a Brissonio descriptae respondere eruitur. In Etruria per totum anni decursum habitat.

Nidum unica vice struere solet, tamen iterum nidum aedificat, cum primum destruendum perierat, illumque in arborum foraminibus ponit; ostium autem, per quod introitus est, si nimis amplum fuerit, partem eius artificiose luto oppleret, angusto tantum aditu sibi relitto, cavitatem autem reliquam & internam foliis Quernis fulcit. Ova autem sex, vel septem, quandoque octo deponit, quae tenuissimo sunt cortice maculis rotundis, punctisque castaneis aspersa.

Fig. 2. PECIOTTO del Canada, — *Sitta Canadensis*. — *Sitta an Canadensis* Bris. sp. 2.?

La descritta dal Brisson non è inferiormente di color di roba si vivo, ma per la sua descrizione languidamente rossiccia, il qual colore mostra di dover essere piuttosto simile al castagno rossiccio. Trovansi nel Canada, e come i Picchi sale per i tronchi, e rami degli alberi.

Quae a Brissonio describitur inferne minus roso ac vivido colore tintæ describitur, diciurque in iis partibus rufo diluto tintæ, qui color ad castaneum potius rufescens pertinet. Habitat haec in Canada, & truncos ac ramos arborum Picorum norma scandit.

T. CXCIV. Fig. I. Fig. II. B. - 3. 1.

Fig. 1. PECIOTTO, altrimenti Picchio minimo celeste di Ceilan. — *Sitta*, sive *Picus minimus eazruleus*

Fig. 2. PECIOTTO, o Picchio minimo dell' Indie. — *Sitta*, vel *Picus minimus Indicus*.

L'Uccello mostrato da questa seconda figura per la posizione delle dita, due d'avanti, e due di dietro, e per la coda rigida, mostra d'essere propriamente un *Picchio*, e che così debba chiamarsi. Quello poi della figura prima sembra d'un genere affatto diverso, e che dovesse essere collocato tra le *Passeere*, o tra altri piccoli Uccelletti; ma siccome nella Raccolta Gerini trovavasi posto qui, e difficile essendo dalla piccola e sola figura ricavare tutte le segnature, che necessarie erano a determinare il vero suo genere, perciò neppur noi lo abbiamo rimosso.

*A*Vem banc figura secunda ostensam, digitorum dispositione, duobus scilicet anticus totidemque retro positis, atque cauda rigidula, ad Pici proprium genus pertinere, nec aliter appellari debuisse manifestissimum est. Quae vero sub prima icone ostenditur, ad aliud forte genus inter minimas Aves, sive Passeres pertinet. Hoc loco tamen in Geriniana collectione cum inventissemus, nos pariter hic posuimus, cum difficile fuisset a sola, & pusilla ione omnes characteres ad proprium certumque stabilendum genus necessarios eruer.

5. PECIOTTO, o Picchio piccolo cenerino col capo nero della Giamaica. = *Sitta*, vel *Picus minor cinereus* capite nigro lamaicensis. = *Sitta*, seu *Picus cinereus*, maior, capite nigro Sloan & Rai. = *Baristus major subcinerous*, capite nigro Brow. = *Merops major capite nigro* Barr. Hist. = *Merops Americanus*, *cinerous*, capite nigro Barr. Ornith. = *Sitta lamaicensis* Brifs. sp. 3. = Cum Alauda crassirostris convenit; superne cincera, inferne alba, vertice nigro, restricibus lateralibus nigricantibus, apice linei transversis albis notatis; rostro, pedibus, & unguibus nigris. *Huius speciei maior*, & minor inventur. Minor a Sloanio in Hist. nat. Iamaicæ dicitur *Baristus minimus pullus*, vertice nigro; nec nisi magnitudine, qua ei cedit, a praecedente differt.

6. PECIOTTO, e Picchio piccolo della Carolina. = *Sitta Carolinensis* Brifs. sp. 4. = *Baristus minor subcinerous*, vertice nigro, pectore albido Brow. = *Parus facie Pici* Klein. = *Sitta capite nigro* Catesb. = *Lamaicensis* distae nonnihil crassirostris cedit, superne cinerea, inferne candicans; imo ventre rufescens; capite & collo superius nigris; restricibus lateralibus albo & nigro varatis; rostro nigro, pedibus & unguibus fuscis. *Transcos & ramos arborum scandit*; in lamaica & Carolina habitat, ibique pullos educat, & per totum annum manet.

7. PECIOTTO, o Picchio piccolissimo della Carolina. = *Sitta Carolinensis minor* Brifs. sp. 5. At *Sitta*, seu *Picus cinereus maior rostro curvo* Sloan. = *Sitta capite fuscō* Catesb. = Praecedentibus multum crassirostris cedit; superne cinerea, inferne fuscō alba; capite & collo superius fuscis; macula in occipito fuscō alba; restricibus lateralibus nigris; rostro nigro, pedibus & unguibus fuscis. *Inscriptis visitat*, rorique anno in Carolina habitat.

T. CXCV. Fig. I. B. - 3. - Fig. II. B. - 3. 1.

Fig. 1. CERZIA cenerina, altrimenti Picchio paesino, volgarmente Rampichino. — *Certhia grisea*, seu *Picus cinereus minimus*. — *Certhia*, vel *Certhius Arifstoteli* Gesn. — *Scandulaea arborum* Schwenk & Rzac. — *Falcinellus arboreus nostris* Klein. — *Certhia* Aldrov. Ionst. Rai. Willugh. & Charlet. — *Certhia* Brifs. sp. 1. — *Certhia pusilla* [aquæ ac ea, quæ sub Tab. CXCVI. Fig. 1.] Linn. Syst. Nat. sp. 2. — Gall. Le Grimpereau, ou petit Grimpereau. — Angl. Creeper, or Tree-Creeper; or Eye-Creeper.

E' Un Uccelletto assai piccolo, e appena più grosso d'un Re di mazzchia. Secondo l'Aldrovando cova come i Picchi ne' fori degli alberi, e depone un gran numero di uova, cioè qualche volta fino a 20. la qual cosa non sembra probabile, essendo così piccolo, e impotente perciò a riscaldarle. Secondo però l'osservazione dell'accuratissimo Conte Giannini ne depone soltanto cinque, e sono di guficio piuttosto duro, di color cenerino, punteggiate, e striate per lo lungo di color più cupo.

*P*Exigua est *Avicula*, & Regulo tantillum maior. In cavis arborum referente Aldrovando more Picorum nidificat, & ovorum maximum numerum, viginti nempe quandoque parit, quod improbabile videtur, cum *Avis* bac tam parva sua corporis mole sovare ea non possit. *Ginanni accuratissimi viri* observatione numero tantum quinque ab bac deponuntur cortice durisculo, colore griseo, & colore obscuriore simul punctata, atque longitudinaliter striata.

Fre.

E' un Uccello, che in Inghilterra si trova frequentemente, ma appreso di noi è raro. Continuamente passeggiava per i tronchi, e rami degli alberi, come i Picchi, mediane la disposizione de' suoi piedi, e della coda, e non stà fermo se non quando dorme.

Fig. 2. CERZIA scura minore Indiana. — *Certhia minor fusca Indica.* — *Certhia fusca minor Edw.* — *Falcinellus fusca ventre albente Klein.* — *Certhia Indica Briss. sp. g.* — *Certhia [fusilla] supra grisea , subetus alba , rectricibus fuscis , extimus spicis albis Linn. Syst. Nat. sp. 2.* — *Gall. Le Grimpereau des Indes.* — *Angl. Honey Thief; or the little brown, and White Creeper.*

Questo è proprio dell'Indie Orientali, e alcune specie di questi, o genere, si voglion confondere con i Colibri per avere il becco sottile, lunghetto, e alquanto arcato. Questi Uccelletti per testimonianza del Klein cantano, con qualche modulazione non molto diversa da quella del Rusignolo, laddove i Colibri non cantano,

IN India Orientali habitat, nonnullaque eiusdem Avis species cum Mellisugis confundi solent rostro praesertim tenui, producتو aliquantulum falciformi. Aviculae bae referente Kleinio canorae sunt, vocesque Lusciniae pronunciantur cum Mellisugae, sive Colibri, non sunt canorae.

T. CXCVI. Fig. I. B. — 4. I. Fig. II. B. — 3. I.

Fig. 1. CERZIA volgare maggiore, altrimenti Picchio Pascerino maggiore, e Rampichino maggiore. — *Fal- cinellus arboratus nostras Klein.* — *Certhia major Frisch. Klein.* — *Certhia major Briss. sp. 1. variet. A — Certhia [familiaris] supra grisea , subetus alba , remigibus fuscis , decem macula alba Linn. sp. 1.*

Per i costumi, e per le qualità conviene molto con la specie dimostrata dalla Tav. CXCV. Fig. 1. e differisce solo nella grossezza, essendo di quella minore. Alcuni dicono, tra' quali il Klein, e Lianeo nel suo Sistema della Natura dell'edizione decima, che partorisce 20. uova; si dice pure che stà sugli alberi, negli spaccati de' quali va in caccia delle uova e crisalidi degl' infetti, e che teme l'uomo meno di qualunque altro Uccelletto.

Uno di questi, detto della specie maggiore, fu preso con le proprie mani dal Klein passeggiando per un bosco, allorchè saliva sul tronco di un albero.

Cum Certhia Tab. CXCV. Fig. 1. plurimum in qualitatibus & moribus convenit, nec nisi magnitudine, qua ei cedit, ab ipsa discrepat. Hanc ova ponere viginti referunt nonnulli, inter quos Kleinius, & ipse Linnaeus in suo Naturae Systemate editione decimae; dicitur in arborum truncis habitare, inque eorum rimis legere insectorum ova, & larvas, hominesque minus metuere quam aliae Aviculae.

Hanc maiorem proprie dictam, truncum arboris ascendentem, manu prebendit per syllam ambulans Kleinius.

Fig. 2. CERZIA blu del Surinam. — *Certhia Surinamensis caerulea Edw.* — *Falcinellus gula, aliisque nigris Klein.* — *Falcinellus Papilio eiusd.* — *Certhia Cayanensis caerulea Briss. sp. 12.* — *Certhia [caerulea] remigibus rectricibusque nigris Linn. Syst. Nat. sp. 3.* — *Gall. Le Grimpereau bleu de Cayenne, ou du Surinam.* — *Angl. The blue Creeper.*

Varia questa per le penne delle ale, e della coda, ora scure, ora brune, ora nerissime. Per la grossezza supera qualche volta la specie, che si vede sotto la Figura prima.

REmigibus rectricibusque nunc fuscis, nunc nigritibus, nunc nigerrimis variat. Certhiam autem sub Fig. 1. depictam sive nostratem crassitie aliquando etiam superat.

T. CXCVII. B. — 6. —

CERZIA muraiola, o Picchio muraiolo. — *Certhia muralis Briss. sp. 2.* — *Picus murarius Aldrov. Ionst. Chalet. Rai & Willughb.* — *Picus muralis Gmel. & Schwenk.* — *Meros pirenaicus, cinereus, alarum costis coecineis, reptatrix Barr. Ornith.* — *Gall. Le Grimpereau de Muraille, ou Pic de Muraille.* — *Angl. The Spider-catcher.*

Qualche volta è grossa quanto uno Storno, ma comunemente è poco più grossa di una

STurni fere crassitierem quandoque adaequat, ut plurimum vero Passere domestico paullo maior

una *Passera ordinaria*. L' Aldrovando , che fra gli altri scrittori delle cose degli Uccelli, descrisse diligentemente questa specie d' Uccello , la cita per molto ovvia nel Bolognese : anco intorno Firenze, ne' luoghi però non tanto salvatici, più volte è stata osservata, e ammazzata . Cova per altro ne' fori degli alberi . Dal Willughby , e dal Raio mai non è stata veduta in Inghilterra , sebbene altri asseriscono ritrovarvisi . Nel volo somiglia molto la *Bubula* , imperocchè come essa scuote sempre le ale, nè mai sta ferma . Sale sopra le muraglie, e sopra le scoscese rupi de' monti , come appunto fa le il *Picchio* sugli alberi , e ti ciba degl insetti , che in tali luoghi ritrova . Nell' Inverno si vede anco nelle Città sulle mura-glie delle torri .

E' un allegro Uccelletto , e canta anco soavemente . La femmina differisce dal maschio per avere la gola bianca , che nel maschio è nera . La lingua di questo animaletto è molto appuntata , verso la base poi più larga , e corredata ne' lati di due appendici , come paratamente dall' Uccello è stata delineata .

T. CXCVIII. Fig. I. B. - 2. 2.

Fig. II. B. - 3. 1. Quae sub signo * ad Tab. CCXXXIV. videatur .

Fig. 1. CERZIA minore Indiana bianca , nera , e rosa . — *Certhia minor ex albo , nigro , & rubro varia Indica* . — *Certhia minor ex albo nigro & rubro varia* Edw. — *Falcinellus Bengalensis* Klein . — *Certhia Bengalensis* Briss. sp. 31 . — *Certhia [cruentata] nigro-caerulestems*, subitus alba , vertice , cervice , dorso , uro-pygioque rubris Linn. Syst. Nat. sp. 4 . — Gall. *Le Grimpereau de Bengale* ; *Peris Grimpereau des Indes* , noir , blanc , & rouge . — Angl. *The little black , white , and red Indian Creeper* .

Propriamente il becco di questa deve essere più lungo, o sottile di quello che dalla figura si dimostra , e trovasi nel Regno di Bengal .

Fig. 2. quae ad Tab. Tomi buius CCXXXIV. signo * notata videatur .

CERZIA scura , o nera , e gialla d' America . — *Certhia ex fusco vel nigricante , & luteo colore varia Americana* . — *Luscina* , sive *Philomela* e *fusco & luteo varia* Sloan. Rai. Klein. & Edw. — *Certhia* , sive *Saccrivora Iamaicensis* Briss. sp. 33 . in supplem . — *Certhia [flavola] nigra , uryppigio , pectoraque luteo , superciliis , macula claram , reticulique apicibus albis* Linn. Syst. Nat. sp. 5 . — Gall. *Le Grimpereau noir & jaune* ; *Le Grimpereau , ou le Sucrerie de la Lamaique* . — Angl. *Black and yellow Bird* .

QUella , che si vede riportata in questa Tavola , e sotto questa figura è stata sbagliata , ed è una *Capinera di Giamaica* , o sia una *Passera Scopaiola* di tal Paese , da descriversi altrove .

Realmente la *Cerzia* per grandezza , colore , e formazione di becco è molto da questa diversa , come dalla citata Tav. CCXXXIV. sotto il segno * dove è stata riportata , si potrà ricavare . Trovasi questa alla Giamaica , alla Martinica , e in altri luoghi ancora d' America . Martiniaca , e in altri luoghi ancora d' America . Un' altra di questa specie , e forse la femmina di questa , si troverà più sotto al numero 36 .

ior est . Aldrovandus , qui inter alios Ornithologos satis accurate Avem banc describit , camdem in agro Bononiensi satis obviam dicit : apud eos eram in montibus prope Florentiam minus sylvestribus , pluries reperta , & occisa fuit . Nidulatur tamen in foraminibus arborum . In Anglia nunquam a Willughbeio & Raio conspecta fuit , licet ab aliis insibi inveniri dictum fuerit . Upupas in volatu similis , quoniam alas ut illa semper motitat , nec uno loco residere novit . Muros & montium scopulos scandit eodem modo , quo Pici per arborum truncos ramosque ascendunt , & insectis in ipsorum rimulis habitantibus vivit . Brumae tempore in Urbibus etiam ad turrium muros conspicitur .

Avicula est bilaris , & suavem vocem edit . Foemina a mare discrepat gutture albido , quod in mare nigrum est . Aviculae buius lingua apice valde acuta , ad basim vero dilatata , & appendicibus ad latera instructa , seorsim in ipsa nostra Tabula , ut ab Ave avulsa fuit , depicta observatur .

si vede in questa medesima Tavola , dove se-

rebatur .

Huius rostrum longius , ac tenuius revera est , quam ab ione demonstratur , bac autem Avis in Bengalensi Regno habitat .

Fig. 3. Cerzia minore Indiana bianca , nera , e rosa . — *Certhia minor ex albo , nigro , & rubro varia Indica* . — *Certhia minor ex albo nigro & rubro varia* Edw. — *Falcinellus Bengalensis* Klein . — *Certhia Bengalensis* Briss. sp. 31 . — *Certhia [cruentata] nigra , uryppigio , pectoraque luteo , superciliis , macula claram , reticulique apicibus albis* Linn. Syst. Nat. sp. 5 . — Gall. *Le Grimpereau noir & jaune* ; *Le Grimpereau , ou le Sucrerie de la Lamaique* . — Angl. *Black and yellow Bird* .

Quae errore depicta Avis fuit sub bac Tabula Currucu Iamaicensis est , sive *Psalter Separius Iamaicensis* , alio loco describenda .

*Certhia autem magnitudine , coloribus , & rostri configuratione multum ab bac discrepat , ut in indicata Tabula CCXXXIV. sub signo ** videre est . In Iamaica , Martinica , nonnullisque aliis Americae locis habitat . Alia valde buic similis , & forte specie buius foemina , describetur infra sub num. 36 .

P T. CXCIX.

T. CXCIX.

Fig. I. B. - 3. i. Fig. II. B. - 4. i. $\frac{1}{2}$

Fig. 1. CERZIA cenerina e gialla dell' Isole Filippine. — *Certhia superne grisea inferne lutea Philippensis*. — *An Certhia minoris Philippensis Brissonii sp. 6. varietas? quae infra sub num. 18. videri potest. — Gall. Le petit Grimpeau gris & jaune des Philippines.*

Fig. 2. CERZIA di color violetto del Senegal. — *Certhia Senegalenfis violacea Briss. sp. 29. — Gall. Le Grimpeau violet du Senegal.*

Non è molto più grossa d'un Re di macchia, ed è di coda lunga, come dalla figura si rileva, ma il becco non è si grosso alla base, come è stato espresso. Alcune di queste specie d' Uccelli da altri sono state nominate diversamente, e collocate fra i Colibri, o Trochili di Linneo, e anco tra le Cutrettelle. Il preciso loro carattere si desume dal becco. La Cerzia lo ha sottile, inarcato, e andando verso la punta sempre sottile di più. Ne' Colibri, o Trochili è sottile egualmente, e inarcato, ma verso la cima piuttosto si allarga, come meglio si rileverà al suo luogo, allorchè si mostreranno, e descriveranno alcuni individui di quest' ultimo genere.

COrporis crassitie Regulum non multum superat, caudaque satis longa, ut ab ione ostenditur, donatur, rostro vero aequo longo, sed minus versus basim crasso. Nonnullae buius speciei Aves aliter a diversis Auctoriibus appellantur, colloquunturque inter Mellisugas, sive Trochilos Linnæi, atque inter Motacillas. Earum præcipua distinctio in rostris residet. Certhiae rostrum filiforme est, arcuatum, & versus apicem crassitie sensim, aequo sensim minuitur; in Mellisugis autem, sive Trochilis rostrum filiforme pariter est, & arcuatum, sed per totam ferme longitudinem aequo crassum, immo versus apicem parumper ampliatum, ut melius cognosci suo loco poteris, in descriptione & ostensione nonnullarum postremi buius generis Avium.

T. CC. Fig. I. & II. B. - 3. i. $\frac{1}{2}$

CERZIA, detta porporina, dell' Isole Filippine, maschio, e femmina. — *Certhia purpurea dicta Philippensis mas, & foemina. Figura vero 1. non ut in inscriptione ipsius Tabulae legitur marem ostendit, sed foemina. Figura autem 2. morem demonstrat. — Falcinellus colore Paseris Hispanis Klein. — Troglodytæ adhinc Mochr. — Certhia Philippensis purpurea Briss. sp. 27. — Gall. Le Grimpeau pourpré des Philippines.*

IL Klein afferisce, che totalmente si rassomiglia alla specie più comune dimostrata dalla Tav. CXCVI. e dice che canti come un Rusignolo. Veramente la nostra per la lunghezza della coda, e per il becco, che è molto lungo e grosso, siccome per i colori delle penne, come a sufficienza vien dimostrato dalla figura, non pare, che si possa prendere sbaglio a stabilir diversa dalla specie indicata dell' Isole Filippine.

Tota facie cum nostrate sive vulgaris Tabulae CXCVI. banc convenire afferit Kleinius, eamdemque canoram dicit, & Lusciniae voces pronunciare. Revera Certhia vulgaris nostras, caudae & rostri longitudine, quod maximum est, & coloribus, ut a pictura luculenter ostenditur, ab hac Philippensis dicta satis discrepare videtur.

T. CCI. Fig. I. B. - 8. — Fig. II. B. - 6. i.

Fig. 1. CERZIA di coda lunga del Capo di Buona Speranza. — *Certhia longicauda Capitis Bonae Spei Briss. sp. 22. — Gall. Le Grimpeau à longue queue du Cap de Bonne Espérance.*

IN questa specie dall' una e l'altra parte sotto il forte dell' ala trovasi una macchia grande gialla, che ad ale serrate, come sta la nostra, non si vede. Quella rappresentata dal Brisson ha pure una piccola striscia nera di piuma come il velluto tra il becco, e l' occhio, la quale pure manca nella nostra.

In

In bac infra bumeros maiuscula macula eleganter lutea, utrinque adest, quae alis complicatis, ut nostra in imagine posita est, nequam conspicua erudit. Quae a Brissonio quoque ostenditur in utroque capitum latere exigua exrat rostrum inter & oculum taenia longitudinalis nigra, & villosa, ut holofericum splendens, quae in nostra deficit.

Cor-

In grossezza è simile al Beccafico. Dell' *Corporis crassitie* Ficedulam circiter ac istessa Regione, e parimente di coda lunga un' quar. *Huius speciei, & Regionis, minor quoque* altra se ne trova descritta, detta *minore*, del *invenitur, quae sub num. 31. describetur.*

Fig. 2. CERZIA di coda lunga del Senegal. — *Certhia longicauda Senegalensis.* — Briss. T. III. sp. 21. pag. 645. — *Avicula Amboinenensis, discolor ♂ perpulchra* Seb. — *Sylvia versicolor Klein.* — Gall. *Le Grimpereau a longue queue du Senegal.*

Trovati nel Senegal, ed è poco più grosso IN Senegalensi Regione habitat, corporisque d'un Re di macchia. *cerassitie* Regulum non multum antecellit.

T. CCII. Fig. I. B. — 4. 2. Fig. II. B. — 4. —

Fig. 1. CERZIA nerastra, o sia superiormente scura, e inferiormente di più colori, del Brasile. — *Certhia Brasilensis nigricans, vel porius fulco-nigricans, inferne varie picta Brasilensis.* — *Certhia Brasilensis nigricans* Briss. sp. 28. T. III. pag. 658. — Gall. *Le Grimpereau noirâtre du Brésil.*

Fig. 2. CERZIA porporina di Virginia. — *Certhia Virginiana purpurea* Briss. sp. 26. T. III. pag. 654. — *Avis Virginiana phoenicea* Seb. — *Falcinellus phoeniceus* Klein. — Gall. *Le Grimpereau pourpré de Virginie.*

E' Poco più grossa di un Beccafico. Realmente queste specie di Uccelli devono essere descritte fra le Passere, o altri piccoli Uccelli; ma siccome la nostra Ornitologia originale le aveva qui collocate, e lo stesso Raio le descrive dopo i Picchi propriamente così detti, neppur noi abbiamo fatto diversamente, tanto più, che tramezzando degli Uccelli piccoli, e de' grandi, è stata valutata da alcuni una miglior disposizione, specialmente per contenere la vista. La riunione di molti consimili, per quanto ci è stato detto, non era accetta alla maggior parte.

Crassitie Ficedulam paullulum antecellit. *Huiusmodi Aves revera inter Passeres, alias que Aviculas describendas ad locandas erant; sed cum Ornithologia nostra eas bic loci ostenderet, ipseque Raius post Picos proprie dictos easdem describat, non aliter & nos facere decrevimus, eo magis cum nonnullas minores Aves maioribus interfuscando melior, & visus oblectamento praestantior dispositio pluribus visa fuerit. Similium enim, & affinissimum multius innumeris, ut intelleximus, displicuit.*

16. CERTIA dell'Isole Filippine. = *Certhia Philippensis* Briss. sp. 4. = *Certhiae pusillae nostrati, sive minori sub Tab. CXCV. Fig. 1. demonstratae crassitie aliquantulum cedit; superne griseo-fusca, ad viridefcentem colorum inclinans, inferne alba ad sulphureum vergens; rectricibus binis intermedis nigris, oris exterioribus viridi- auro colore variantibus, lateralibus nigricantibus apice albidos; rostro, pedibus, & unguibus nigris.*
17. CERTIA dell'Isole Filippine, cenerina. = *Certhia Philippensis grisea* Briss. sp. 5. cum optima icona. = *Praecedente crassitie etiam minor; superne griseo-fusca, inferne albo-flavicans; collo inferiore taenia longitudinali saturate violacea insignito; rectricibus alarum superioribus violaceo-calybeis, rectricibus nigris, exterioris violaceo-calybeis fimbriatis, lateralibus apice albis; rostro, pedibus, & unguibus nigris.*
18. CERTIA dell'Isole Filippine minore. = *Certhia Philippensis minor* Briss. sp. 6. cum optima icona. = *Praecedenti crassitie multum cedit; superne griseo-fusca, inferne lutea; gurgite macula saturate violacea insignito; rectricibus saturate fuscis, binis utrinque extimus apice albo-flavanticibus; rostro, pedibus, & unguibus nigricantibus.*
19. CERTIA del Capo di Buona Speranza. = *Certhia Capitis Bonae Spei* Briss. sp. 7. cum accurata icona. = *Regulum crassitie circiter aequalis; griseofusca, superne saturatus, inferne dilutius; rectricibus nigricantibus, oris exterioribus griseofusca, extima exterioris albo fimbriata; rostro, pedibus, & unguibus nigricantibus. Coloribus nullo modo lucidis perlustratur, forsitan cuiusdam speciei foecina est.*
20. CERTIA dell'Isola di Baama. = *Certhia Babamensis* Briss. sp. 8. = *Luscinius pectoris flavo* Klein. = *Parus Babamensis* Catesb. = *Parvula est Avis, rostro aliquantisper curvato, pectore, colloque inferne lutei coloris, superne fusca, taenia supra oculos candida; marginibus alarum tuteis; cauda producta ex fusco & albo varia; rostro nigrum, pedibus & unguibus fuscis.*
21. CERTIA di color d'oliva dell'Isola Filippino. = *Certhia Philippensis olivacea* Briss. sp. 10. cum accurata icona. = *Crassitie cum Regulo converit, superne obscure olivacea, inferne lutea; collo inferiore & pectore splendide ac saturate violaceis, rectricibus fuscis, oris exterioribus obscure olivacis; rostro nigrum, pedibus & unguibus saturate cinereis.*
22. CERTIA di color d'oliva del Madagascar = *Certhia Madagascariensis olivacea* Briss. sp. 11. cum icona. = *Crassitie*

- Craffitie a superiorre vix recedit ; superne obscure viridi-olivacea, vertice obscuriore, inferne griseo-fusca ; oculorum ambitu candicante, restringibus fuscis, oris exterioribus obscure viridi-olivaceis ; rostro nigricante ; pedibus, & unguibus fuscis.*
23. *CERZIA blu del Bräile.* = *Certhia Brasiliensis caerulea* Briss. sp. 13. cum accurata icone. *Falcinellus de Guirquit* Klein. = *Avicula de Guirquit ex Insula Cuba* Seb. = *Colius Moehrt.* = *Guira-coereba* *Brasilienibus* *Maregr. Willugh. & Rai.* = *Certhiam vulgarem nostram minorem craffitie nonnihil excedit ; splendide cyanea, collo superiori, dorso supremo, & scenia per oculos splendide nigris ; vertice cyaneo-bryllino, remigibus extenuis & apice nigris, interius sulphureis ; restringibus nigris ; rostro nigro, pedibus rubris, unguibus nigricansibus.*
24. *CERZIA verde del Bräile.* = *Certhia Brasiliensis viridis* Briss. sp. 14. = *Sylvia viridis capite cyaneo* Klein. = *Quae inter Passeres, sive Aviculas minores, atque sub nomine Sylviae, vel Muscicapac describetur, & cum icone insegnante n. 25. ostenderetur.*
25. *CERZIA verde con testa nera del Bräile.* = *Certhia Brasiliensis viridis atricapilla* Briss. sp. 15. quae suo loco inter Aves minores, cum superiori, sub *Sylviae*, vel *Muscicapae atricapillae* nomine videatur.
26. *CERZIA verde con capo nero d' America.* = *Certhia Americana viridis atricapilla* Briss. sp. 16. *Avicula Americana altera* Seb. = *Sylvia*, *Avicula Americana altera* Seb. Klein. = *Fringillam circiter craffitie acumulatur ; superne splendide viridis, inferne saturate caerulea ; capite & gurgute splendide nigris ; restringibus saturatis viridis ; rostro candicante.*
27. *CERZIA verde di Caïenna.* = *Certhia Cayanensis viridis* Briss. sp. 17. cum optima icone = *Certhiam nostratem minorem craffitie circiter acumulatur ; superne splendide viridis inferne lincolis longitudinalibus albis, viridibus, & caeruleis varia, fasciola urinque secundum maxillae inferioris longitudinalis caerulea ; gurgute, & macula urinque narem inter & oculum rufescensibus ; restringibus viridis, lateribus interiori nigricansibus ; rostro nigro, pedibus & unguibus griseis. Parisis in Museo Dominse de Baudeville quaedam servantur buiuis speciei individua in universo corpore caeruleo varia, caeruleo in aliis maius, in aliis minus spatium occupante. Foemina a mero discrepar coloribus non ita viridis, & in eo quod colore rufescente in gurgute & capite careat, nibilque caerulei habeat.*
28. *CERZIA di color violetto del Madagascar.* = *Certhia Madagascariensis violacea* Briss. sp. 18. cum accuratis maris & foeminae iconibus. = *Craffitie Regulum non antecellit ; superne splendide viridis ad violaceum inclinans, inferne pallide flava, dorso infimo & uropygio fuso-olivaceis ; taenia dupli transversa in pectore, una caeruleo-violacea, altera castanea ; restringibus nigris, extima ultima medietate oblique griseo-fusca, proxime sequenti apice griseo-fusca ; rostro, pedibus, & unguibus nigris. Foemina magnitudine paullulum craffitie cedit, & coloribus minus viridis perlustratur. In universo enim corpore superne fuso-olivacea est, aliis vero & cauda ut in mero.*
29. *CERZIA verde del Madagascar.* = *Certhia Madagascariensis viridis* Briss. sp. 19. cum maris & foeminae accuratis iconibus. = *Avis Ceilonica omnicolor* Seb. = *Falcinellus omnicolor Zeylanicus* Klein. = *Virore fulvo elegansissima omnifarri coloris missione evibrat, aurum mixta diuersis ; rostro, pedibus, & unguibus nigris. Ad Ficedulam craffitie accedit. Mas inferne, pariterque in aliis & cauda splendide niger est ; foemina inferne Jordie albo nigro maculata, aliis caudaque non ita, ut in mero, splendide nigris.*
30. *CERZIA del Capo di Buona Speranza col collatino.* = *Certhia torquata Capitis Bonae Spei* Briss. sp. 20. cum accurata icone. = *Præcedens mulsum craffitie cedit ; superne viridi aurea, cupri puri colore varians, inferne grisea ; pectore rubro ; taenia transversa collum inter & pectus calybea, viridi colore variante ; pectore infimo, & lateribus luteo notatis ; restringibus splendide nigricansibus oris exterioribus viridi-aureis, cupri puri colore variansibus, marginibus in apice griseis, extima exterius grisea ; rostro nigricante, pedibus vero & unguibus nigris.*
31. *CERZIA di coda lunga del Capo di Buona Speranza, minore.* = *Certhia longicauda minor Capitis Bonae Spei* Briss. sp. 23. cum optima icone. = *Maior buius Regionis sub Tab. CCL. ostensa fuit. Haec minor digna Certhiam nostratem minorem non multum craffitie antecellit ; superne splendide violacea ad viride inclinans, inferne splendide crocea ; dorso infimo & uropygio fuso-olivaceis ; restringibus fuso-nigricansibus oris exterioribus olivaceis, duabus intermediis longissimis ; rostro, pedibus, & unguibus nigricansibus.*
32. *CERZIA rossa del Messico.* = *Certhia Mexicana rubra* Briss. sp. 24. = *Trochilus coccineus* Linn. Syst. Nat. edit. 6. sp. 3. = *Falcinellus Mexicanus* Klein. = *Avicula Mexicana* Seb. = *Troglodites adfinsis* Moehrt = *Præcedentem craffitie paullulum craffitie antecellit ; saturate rubra, capite superius dilute rubro ; gurgute viridi ; restringibus saturate rubris, apice subcaerulefasciatis, rostro, pedibus, & unguibus dilute luteis.*
33. *CERZIA rossa del Messico col capo nero.* *Certhia Mexicana rubra atricapilla* Briss. sp. 25. = *Avicula de Tarac, ex nova Hispania, Pasteris magnitudine, rostro longo* Seb. = *Sylvia rubra rostro longiori* Klein. = *Colius Moehrt.* = *Ficedulam circiter craffitie acumulatur ; dilute rubra ; capite nigro ; restringibus alarum superioribus aureo colore intus ; remigibus, restringibusque saturatus rubris.*
34. *CERZIA di color violetto del Bräile.* = *Certhia Brasiliensis violacea* Briss. sp. 30. cum optima icone. = *Cum præcedente craffitie convenit ; nigra plurimum est, vertice viridi aureo ; gurgute splendide violacea ; pectore castaneo-purpurecente ; dorso infimo & uropygio ex violaceo ad chalybis polisi colorem vergentibus, restringibus nigris, oris exterioribus violaceo-chalybeis ; rostro nigricante, pedibus & unguibus griseo-fusca.*
35. *CERZIA variegata d' America.* = *Certhia Americana varia* Briss. sp. 32. = *Avicula Americana variis coloribus picta* Seb. = *Sylvia versicolor* Klein. = *Fringillæ craffitie est ; superne ex caeruleo, subnigro, albo, unguibus satis longis.*

36. CERZIA detta Mangia zucchero della Martinicca . = *Certhia Martinicana*, sive *Saccharivora Brift.* sp. 3. = *Vis a nostra Tab. CXCVIII. fig. 2. differt*; *taenia enim supra oculos in hac alboflavicans adest, in altera candida; bacca guttura alba, altera vero icona ostensa, gutture & collo inferiore nigra donatur. Magnitudine autem exacte convenienti; utraque ad *Certhiam flavolam* Linn. Syst. Nat. sp. 5. pertinent, forte ex sexu tantum varietates.*

T CCIII. B. 1. 3. 1.

TUCANO Mangiapepe. — *Tucana Piperivora*. — *Tucana Charl.* — *Tucana*, quam *Lerius* & *Thevelius* vocant *Toucan* *Io. de Laet.* & *Ionist.* — *Avis Piperivora Aldrov.* — *Pica Brasiliensis Alb.* — *Nasutus Klein.* — *Rhomphastos*, *Hipporynchos* & *Burynchos* alias *Klein.* — *Pica Barbara* & *Piperivora nonnullis.* — *Bucco Mochr.* — *Toucan Brasiliensis* *Marcgr.* — *Rofrata Americana nigra* *Barr. Ornith.* — *Tucana Brasiliensis* & *Cayenensis* gutture luteo *Brifs.* sp. 2. & 5. — *Ramphastos* [*piperivorus*] *rostro nigro carina crassissima* *Linn. Syst. Nat. sp. 1.* — *Gall. Le Toucan; Pie du Bresil; Le Toucan a gorge jaune du Bresil, ou de Cayenne.* — *Angl. Green Beaks Pie of Brasil, or Pepper Pie; The Brasilian Pie.*

SI contano almeno dodici differenze di quest' Uccello, riguardo alla grossezza dell' animale, riguardo a' colori, e riguardo alle varietà del becco. Questo *Tucano*, siccome quello di Caienna citato dal *Briffon* sp. 2. hanno diverse penne delle copritrici della coda, tanto di sopra, che di sotto, di color cremisi; e quello del Brasile sp. 5. del medesimo *Briffon* ha le suddette penne di color giallo, differenza in vero assai piccola, che non deve formare una diversa specie, e perciò queste differenze devono dirsi accidenti d' una specie sola.

Hanno questi i piedi simili a quelli de' *Piccbi*; e il becco lungo e grosso quanto il capo, e dentato più, o meno, a foggia di sega, e la lingua della figura di una penna. La sostanza del loro becco è sottilissima, quanta una membrana, ma di sostanza cornea, o d' osso, diafana, levigatissima, vuota, e pacifissima ad esser ripiena d' aria.

Per ragione di questo becco così grande, e più ancora per esser curvo differisce il *Tucano* da' *Piccbi*; non usa neppure l' istesso cibo, non potendone far uso, a cagione della descritta conformazione del becco. Per quanto si fa il *Tucano* non prende infetti, ma va dietro a' semi delle piante, alle bacche, e altri frutti, e particolarmente è avido del Pepe, che suol rendere per escremento intiero, e non alterato. I Paefani, che suppongono per questa ragione domata in esso molta della sua acrimonia, antepongono questo a quello colto dalla pianta.

T. CCIV. B. — 16. 1.

TUCANO del Brasile detto Aracari. — *Tucana Aracari Brasiliensis*. — *Cucus Brasiliensis, Aracari Marcgr.* *Klein.* — *Aracari Pil.* — *Aracari Brasiliensis* *Marcgr. Ionist. Willugh. & Rai.* — *Tucana Brasiliensis viridis* *Brifs.* sp. 9. — *Gall. Le Toucan verd du Bresil; Oiseau des Terres neuves.*

E'Questo un Uccello della grandezza del *Piccia Marzuolo*, che si vede alla T. CLXXII. ed ha la lingua come l' antecedente, lunga da quattro pollici, nera, e della figura appunto di una penna. Trovansi nel Brasile, al Surinam,

P Ici Martii sub Tab. CLXXII. expositi magnitudine est Avis. Linguam babet ut superior laevissimam, quatuor digitos longam, nigrum, & aspectu plane pennam referentem. Habitat haec species in Brasilia, Surinama, & Cayana. Eius.

Q

nam ; e a Caienna . Forse è una semplice varietà del descritto più a basso sotto il num. 4.

Alcuni di questi Uccelli hanno le narici collocate fuori della sostanza cornea , che forma il becco , preso la base di esso , e ricoperte dalle piume ; altri le hanno situate sulla sostanza stessa del becco , e scoperte .

Eiusdem forte sub num. 4. descriptae tantum varietas .

In nonnullis buius generis Avibus nares prope mandibulae superioris exortum & extra materiam corneam sunt collocatae , & plumis copertae ; in aliis supra ipsam materiam corneam , & conspicuae sive nudae .

3. TUCANO comune . = *Tucana* Bris. sp. 1. = *Pica Brasiliensis* Gesn. Aldrov. Willugh. & Rai. = *Pica Brasiliensis* , aliis = *Ramphastos Hipporychos* , & *Burinbos* , aliis *Barbara* , & *Piperivora Ionft.* = *Rostrostrata Americana* , nigra , ventre & uropygio coccineis Barr. Ornith. = *Avis Piperivora nonnullis* Willugh. & Rai. = *Ramphastos* [*Picatus*] *rostro rubro* , apice nigrum , carina compressa Linn. Syst. sp. 3. = *Superne nigro-viridis* est , dorso infimo & uropygio ad cinereum vergentibus ; pectore aurantio ; ventre & testricibus caudae inferioribus coccineis ; testricibus superne nigro-viridianibus , subitus nigri , apice coccineis . Rostro inter congregatus magno donatur , basi nigricante , nunc rubro apice nigrum , nunc flavicante viridi obscurato apice rubescere ; Guineae , & Brasiliæ indigena .
4. TUCANO di gola e collo inferiormente bianco del Brasile . = *Tucana Brasiliensis* gutture & collo inferiore candidis . = *Aracari* Marçgr. = *Picus Americanus* Hernand. = *Postris longirostris* Nicremb. = *Xochitenacatl terria* Rai . = *Tucana Brasiliensis* Edw. = *Tucana Brasiliensis* gutture albo Bris. sp. 3. = *Ramphastos* [*Aracari*] *rostro nigro* , maxilla superiore lateribus alba basi triloba Linn. Syst. Nat. sp. 4. = *Columbam domesticam* crassissim imitatur ; nigro viridans ; genis , gutture , & collo inferiore candidis ; raenia transversa in summo pectore coccinea , uropygio , & testricibus caudae superioribus albis , inferioribus pallide rubris ; rostro parum conspicue denticulato , luteo-viridescere , exceptis marginibus aurantiis , & exiguis taeniis transversis nigricantibus insignitis , & excepto quoque apice per unius circiter pollici intervallum splendide coccinea , in mandibula superiori ; inferiori vero apice coccinea , in reliqua vero sui longitudine caeruleo imbuta colore , exiguis taenias transversis nigricantibus ad margines . Aracari altera species sub Tab. CCIII. ostenditur .
5. TUCANO di gola , e collo inferiormente bianco di Caienna . = *Tucana Cayanensis* gutture & collo inferiore albis . = *Tucana Cayanensis* gutture albo Bris. sp. 4. cum optima icona = *Plurimum* cum superiori convenit , exceptis testricibus caudae superioribus sulphureis , inferioribus coccineis , rostri tamen ad basim nigra , altera in flavicante , altera in sequente nigra , & altera tandem usque ad apicem flavicante , in mandibula saltem superiori . Pedibus donatur plumbesis , unguibus nigris . Cumq[ue] sibi oblate devorat .
6. TUCANO del Messico col collare . = *Tucana Mexicana* torquata Bris. sp. 6. = *Cochitenacatl* Fernand. = *Superne nigra* , inferne viridis ; torque coccineo ; collo inferiore in infra parte dilute luteo , rubris maculis atrofus lineis vario , ino venete & testricibus caudae inferioribus rubris ; testricibus nigris ; mandibula superiore candicante , inferiore nigra , pedibus et cinereo virescentibus . Habitat in Mexico circa Maris littora , & Piscibus vistis .
7. TUCANO verde del Messico . *Tucana Mexicana* viridis Bris. sp. 7. = *Xochitenacatl* Fernand. = In toto corpore est viridis , rubro & pavonino colore variegata ; rostro luteo ac nigro colore vario ; pedibus & unguibus nigris . Magnitudine *Tucanam* Tab. CCIII. aequalatur . Habitat in Mexico , ibique regiones maritimæ frequentat .
8. TUCANO verde di Caienna . = *Tucana Cayanensis* viridis Bris. sp. 8. cum accurata icona . = *Merulam* crassissim corporis non multum superat ; superne obscure viridis , inferne sulphurea , capite & gutture nigris ; uropygio coccineo ; testricibus superne obscure viridibus , inferne viridi-cineris ; mandibula superiore lutea lateribus rubris , duos istos colores raenia exigua utrinque distinguente longitudinali nigra ; mandibula vero inferiore nigra , ad basim rubra ; pedibus plumbesis , unguibus nigris . Foemina in hac specie discrepat capite , gutture , & collo inferiori parte guturi finissima eleganter caestanei , quae partes in mare nigras sunt .
9. TUCANO di gola gialla di Caienna del Brisson . = *Tucana Cayanensis* gutture luceo Bris. sp. 2. = Videatur *Tucana* Tab. CCIII. quae ab hac via differe , immo una eademque *Avis* a nobis credita . *Brasiliensis* Brissonii donatur testricibus caudae superioribus sulphureis , inferioribus coccineis , *Cayanensis* vero superioribus , inferioribusque coccineis , *Brasiliensis* insuper raenia transversa in summo pectore distinguens coccinea , *Cayanensis* autem in toto pectore & supra ventris parte coccinea colore imbuitur , in reliquo vero partibus & coloribus exatque convenienti , ideoque consimilatae prorsus varierates . Etiam mandibularum margines dicuntur rubrae in *Cayanensi* ; cum reliquo rostri colore , scil. nigro , concolores in *Brasiliensi* , quae partium discrepantia varietatem santonum , non speciem diversam constitutre valent .
10. TUCANO di Caienna col collare . = *Tucana Cayanensis* torquata Bris. sp. 10. cum optima icona . = *Rostra Americana* viridans rostro nigro parvum rubro Barr. Ornith. = *Pica minor* rostro denticulato vario Barr. = *Ramphastos* (*Tucanus*) *rostro rubro* , carina obscura alba Linn. Syst. Nat. sp. 2. = *Corporis crassissim* pediore & medio ventre nigro-calybeis ; macula ad aures flavo-aurcea , collo superiore torque flavo-aurantio cincta conspicue denticulata ; Mandibula superiore exiguo intervallo ad basim rubra , in reliqua vero longitudine nigra , inferiore vero a basi usque ad medium rubra , a medio ad apicem nigra ; pedibus plumbesis , unguibus nigris .

11. TUCANO giallo . = *Tucana lutea* Bris. sp. 11. *Xochitenacatl* Ionst. & Charlet. = *Alia Xochitenacatl* Nieremberg. & Willugh. = *Magnitudine* & *craffis* Columbam *adaequat*. *Dilute lutea* est, *taenia urinque longitudo* a *rostro ad pedes usque nigra*; *testicibus alarum superioribus minimis luteis*; *testicibus albo* & *nigro variis*; *rostro nigro*, *pedibus fuscis*, *unguis vero ex alvo nonnihil lutescentibus*. *Habitat in Mexico*, Ionst. = *Altera Xochitenacatl* Nieremberg. & Fernand. = *Magnitudine* & *craffis* cum *precedente convenit*; *in rovo corpore caeruleo* & *cinerino variegatur*; *oculi sunt nigri*; *iporum irides ex luce rubescentes*; *mandibula superior lutea*, *inferior vero subnigra*, & *in purpureum colorem vergens*. *Habitat in Mexico*, ubi *Xochitenacatl* *appellatur*, *ibique Maris littora frequens*, & *Piscibus visitas*.

T. CCV. B. - 10. -

UPUPA volgarmente BUBBOLA, e in qualche luogo d'Italia detta anco Galletto di Marzo, e Galletto di Maggio. — *Upupa* Gesn. Aldrov. Ionst. Willugh. Rai. Schwend. Charl. Sibbald. Rzac. Frisch. Moehr. Klein. — *Upupa*; *Epopa* Gesn. — *Upupa varia*, *crista rufa*, *in summo nigra* Barr. Ornith. — *Upupa* Plini; *Gallus luteofus*; *Gallinaceus stercorarius* Rzac. — *Upupa* [*Epopa*] *cristata variegata* Linn. Synt. Nat. sp. 1. — Gall. *Hupe*; *Purpur*; *Lupoge*; *Pupur*. — Angl. *Hoop*; *Hoopoo*.

UGuaglia in grossezza quasi la Merla, o il Tordo, e suol pefare tre once. La sua lingua è cortissime, e riposta assai indentro, non appuntata, e non intagliata, ma di forma triangolare. Si ciba di vermi, formiche, bruci, e altri insetti. Mangia pure avidamente diverse bacche di alberi, e full'entrare dell'Autunno si fazia d'uva, come offservarono diversi degli antichi, e fra gli Autori nostri Italiani l'Olinia, il quale anco ci ha lasciato scritto, che partorisce tre o quattro uova nelle buche degli alberi, o delle murgaglie, le quali secondo l'Ionston sono simili a quelle di Pernice, sebbene più piccole, più dure, e alla vista più brutte. Il Willughby vedde delle Bubbole in quantità presso Colonia, e in altri luoghi della Germania superiore. Il Turnero aveva detto, che quest'Uccello non trovavasi punto in Inghilterra; ma ciò non è vero, perchè in Northumberland, e nel territorio di Surrey alcune volte si vide, per quanto almeno fu riferito al medesimo Willughby, e da osservatori degni di fede.

Aristotele, e Olao Magno asseriscono che incrosta il nido con lo sterco, e particolarmente con l'umano, in vece di servirsi di terra, e che ciò faccia per allontanare col fetore di esso, o gli uomini, o gli animali velenosi. Assai di rado posa su gli alberi, ma quasi sempre in terra, specialmente dove sono immondezze. Ha la Bubbola un volo molto tardo, e vola a salti. Una gran parte dell'anno sta celato nelle buche degli alberi, e in altri nascondigli, e perciò nella Primavera comparsa spelato.

Per asserzione del Sig. Linneo trovasi ancora ne' boschi della Svezia, dove per osservazione dello stesso depone nelle buche degli alberi due sole uova di color cenerino. Con la voce pronunzia quasi il nome che ha, cioè *bu bu*, ovvero *pu pu*, per la qual cosa facilmente si distingue dagli altri Uccelli. Vogliono alcuni, che nell'Estate cantì alquanto diversamente dall'Inverno; se produce una specie di gemito indica-

Crasse Merulam *circiter*, vel *Turdum* *acquat*, *penditque uncias tres circiter*. *Lingua buxic brevissima* *in profundo latitans*, *obtusa*, *integerrima*, *triquetra*. *Vermibus*, *Formicis*, *Eruca*, *aliisque insectis* *vescitur*. *Uvis* etiam, *aliisque baccis* *sab Autumno* *eam se saturare* *tradiderunt vereres*, *obseruavitque* *inter Italos Auctores* *Olinz*, qui *candem ova tria*, *quatuor* *in arborum*, *murorumque* *cryptis* *parere* *scriptis*, *quae* *Perdicum similia*, *sed minoria*, *duriora*, *& aspectu deformiora* *dixerat* *Ionstonus*. *Circum Coloniam* & *alibi in Germania* *superiore* *frequentes* *Upupas* *obseruavit* *Willugbeius*; *Turnerius* *in tota Britannia* *nusquam* *reperiri* *banc* *Avem* *dixit*; *verum falsum hoc est*, *nam in Northumbria*, & *agro Surreiano* *interdum* *cerni ab idoneis testibus memorato* *Willugbeio* *relatum* *fuit*.

Aristoteles, & *Olaus Magnus* *nidum*, *luti* *vice*, *stercore humano porissimum*, *circumlineare* *testantur*, *seu ut intolerabili odoris foeditate* *homines ab eodem fugent*, *seu ne venenata ad eundem animalia accendant*. *Rarius arboribus insidet*, *saepius in terra*, *maxime ubi immundities est*. *Lente admodum volat atque interrupit*. *Plurimo anni tempore* *in montium angustissis*, & *arborum cavis locis latitat*; *ideo Verno tempore* *deplumis conspici solet*.

Teste *Linnaeo* *in Sveciae etiam vestissimis* *sylvis* *babbit*, *cuius Auctoris testimonio* *ova duo in cavis arboribus ponit cinerea*. *Sono proprium* *quasi nomen recitat*, *scilicet bu bu*, *vel pu pu*, *unde facile dignoscitur*. *Vox vero per Aestatem*, *ut asserunt quidam*, *ab illa quam per Hyemem edita diversa est*; *si gemis pluviam*,

fi
piog-

pioggia ; se alza la voce indica esservi nella macchia vicina la Volpe ; se canta avanti la stagione delle viti, vogliono, che significhi abbondanza di vino ; ma per i contadini Svedesi è augurio di Guerra. Grand' uso è stato fatto di essa in medicina, particolarmente dagli antichi, e dagli Arabi, ma circa a queste sue mediche virtù, credo senza errore di poter dire che sieno tutte favole. Si dice che la femmina sia sempre più grande del maschio. Per testimonianza dell'Oolina vive da tre anni o poco più. Da questo autore si può apprendere la maniera di farla campare, e suffistere in gabbia.

Nel manoscritto di quest'Ornitologia trovansi registrate alcune osservazioni del Sig. Marchese Giovanni Gerini, stimate non dispregevoli, e perciò si fono qui aggiunte, e sono le seguenti.

La Bubbola si vede in Toscana sulla fine di Aprile, e tra l'Agosto e il Settembre sparisce, passando forse in altri paesi. Coya due, e tre volte all'anno facendo quattro, o cinque uova, e alcuna volta anco sei, ponendo il suo nido nelle buche degli alberi, o delle fabbriche desolate, e intonacandolo internamente di sterco di Vacca. Questo medesimo Illustrissimo ed esattissimo osservatore delle cose attinenti all'Istoria degli Uccelli vedde pure nel nostro mercato una Bubbola con le penne che formano la sua cresta colorite in cima di celeste pieno, e un'altra volta tornò a vedere una Bubbola simile a questa nelle Alpi del Mugello presso a Ronta. Questa pure nell'originale trovasi dipinta, ma per non allungarci poco necessariamente l'abbiamo lasciata.

T. CCVI. B. - 10. ~

UPUPA, o BUBBOLA Americana gialla. — *Upupa Americana lutea*. — *Upupa crocea* Linn. Syst. Nat. edit. 6. gen. 45. sp. 2. quae in edit. 10. deest. — *Upupa Americana, crocea, faxatilis* Barr. Ornith. — *Gallos ferus, faxatilis, croceus, cristatus et plumis constructam gerens* Barr. Hist. — *Rupicola* Brifs. T. IV. gen. 55. pag. 437. — Gall. Le Coq-de-Roche. — Angl. Widdehop; Hoopoe Hen.

PEr ragione del becco corto, grosso, e verso la cima lateralmente compreso, e non lungo, né sottile e alquanto inarcato, come nella specie antecedente, si deve questa rimuovere dal genere di *Bubbola*, e col Brisson riportare ad un genere distinto, quale è quello di *Rupicola*. Il Brisson la disse latinamente *Rupicola* dall'abitare essa nelle rupi de' monti. Per questa medesima ragione altri l'avevano chiamata *Gallito salvatico*, e *saffaiole*. In grossa uguaglia un *Piccion grosso*. Trovasi al Surinam, e per tutta la Guiana. Linneo cita alcune altre specie di *Bubbola*, quali sono le appresso.

ROstro brevi crasso versus apicem laterali compreso, nec ut in superiori specie longo, gracili, ac parum arcuato, revera ab Upupae genere disiungenda haec Avis videtur, & cum Brissonio ad aliud distinctum genus¹, nempe ad Rupicolam reducenda. Ob habitationem eius in rupibus optime Rupicolae nonen a Brissonio inditum hic fuit. Hac ipsa eademque ratione aliis ipsam Gallum serum, & faxatilem appellarunt. Crassitie cum Columba Romana convenit. In Surinama, & Guiana tota habitat. Linnaeus alias Upupae species habet, & quae sequuntur sunt,

3. UPUPA, o BUBBOLA di Paradiso. *Upupa [Paradisea]* reffricibus dibus longissimis Linn. Syst. Nat. sp. 2. = *Avis Paradisiaca Manucodiata cristata Orientalis* Seb. = *Upupa Manucodiata* Klein. = Cauda mediocri do-natur, sed ex uropygio procedunt super caudam duas fulvae pennae, trunco Avis quadruplo longiores, unde cinereo; rostro pedibusque plumbeis. *Habitas in Asia.*
4. UPUPA, o BUBBOLA Eremita. *Upupa [Eremita]* viridis, capite flavo, cervice iubata Linn. Syst. Nat. sp. videnda.
5. UPUPA, o BUBBOLA, detta Pirrococare = *Upupa (Pyrrhocorax)* atra, rostro pedibusque rubris Linn. Syst. Nat. sp. 4. = *Hanc quoque ad Coraciam reduximus*, ideoque eius varia nomina & qualitates videri posse.

T. CCVII. B. I. 4. -

GALLO comune, o domestico. — *Gallus vulgaris*, sive *Gallus Gallinaceus* Gesn. Ionst. Carleth. — *Gallus domesticus* Schwen. & Brifs. sp. 1. — *Gallus versicolor vulgaris* Bart. Ornith. — *Gallus cauda erecta*, cristata Brown. — *Ales Iacis Martialis* — *Ales praeannula lucis Ovidii*. — *Phasianus (Gallus) cauda comprefsa* adscendente Linn. Syst. Nat. gen. 90. sp. 1. — Gall. Cog; Gau; Gean; Gal; Gog; Poule commune. — Angl. Cok; Dunghill-Cock; Huse-Cock; Roost Cock.

Gli Uccelli di questa Famiglia hanno il becco corto, forte, e alquanto curvo per raccorre comodamente i granelli de' quali in specie sogliono cibarsi; il corpo grosso, e molto carnoso; le ale corte, e concave, per la qual cosa non volano molto alto, né molto lontano; il ventricolo armato di robusti muscoli per triturare i granelli anco durissimi, specialmente con l'aiuto di qualche sassuolo, che sogliono per tale effetto ingoiare; l'intestino ceco lunghissimo; la carne di color bianco, particolarmente quella del petto, e più che mai quando è cotta. Questa proprietà è affatto particolare agli Uccelli di questa Famiglia, e ciò significa esser la loro carne molto sana, e d'ottimo sugo.

Partoriscono moltissime volte. Nidificano in piana terra, e ciò nasce dal non essere alimentati dalla madre, ma bensì rostochè sono nati, dall'essere in stato di lasciare il nido, e seguendo dovunque la madre, di beccare, e alimentarsi da se stessi. Essendo poi questi per quanto si è detto corpulenti, né molto atti al volo, si cibano passeggiando, e beccando sul terreno, e però hanno le dita larghe, mediante le quali meglio si sostengono, e corrano vigorosamente. La maggior parte, se non tutti, usano aspergersi di polvere. Non a tutte le specie di questa Famiglia, ma bensì al solo genero del Gallo la natura ha conceduto gli sponni.

Il Willughby distinse gli Uccelli di questa Famiglia in mansueti, o domestici, e in fieri, o salvatici; questi poi in quelli, che trovanfi corredati del dito di dietro, come il *Otarda*; finalmente distinse quelli corredati del dito posteriore, in granivori, e in erbivori, o baccivori, i quali possono essere distinti da un contrassegno anco più manifesto, come è quello d' avere i sopraccigli rossi, o cremisi. Il resto si troverà citato più a basso.

R

T. CCVIII.

Allinaceae Familiae Aves rostrum habent breve, validum, & nonnihil incurvum ad grana colligenda, quibus praecepit vicitans, perquam idoneum; corpus crassum carne multa; alas breves, & concavas, quapropter alitrolas non sunt, brevesque volatus faciunt; ventriculum crassis musculari instructum, quorum actio est grana duriora comminuere, calculorum adminicula, quos haec Aves subinde deglutiunt; intestina caeca longissima; carnem albam, praecepit muscularum pectoris, qui color a coctione se prodit manifestius. Haec nota huic Avium familiae peculiaris est, quod indicium praebet carnem earum saluberrimam esse & optimi succi.

Multiparae sunt. Hurni nidificant, cuius & ratio est, quia Pulli recens exclusi non aluntur a matribus, verum nidum deserunt, buc illuc curstantes mares sequuntur, atque ipsi se ipsos pascunt, cibum rostellis colligentes. Quoniam ut diximus corpulentae sunt Aves, nec ad modum volaces, in terra plerumque obambulantes vescuntur, atque ideo latos obtinent digitos ad ei firmius insitendum, & plerumque etiam cursu valent. Pulveratrices sunt pleraque, si non omnes. Gallinaceo generi soli, non omnibus aliis huius familie speciebus calcaria conceduntur.

Aves basice distinxit Willughbeius in manusuetas seu domesticas, & feras seu sylvestres; sylvestres ulterius in postico digito donatas, ut Phasianus, & postico digito carentes ut Tarda; denique postico digito donatas in granivorus & ptycivorus seu bacciferas, aut certiori nota supercilii rubris coccineisve insignes. Reliqua vide infra.

Fagiano, e in quelli, che ne sono senza, come il *Fagiano*, *e in quelli, che ne sono senza, come* il *Otarda*; *finalmente distinse quelli corredati del dito posteriore, in granivori, e in erbivori, o baccivori, i quali possono essere distinti da un contrassegno anco più manifesto, come è quel-*

T. CCVIII. B. I. 8. --

GALLO con la cresta a paniera. — *Gallus Gallinaceus crista in calathi modum efformata.*

Tutte le specie di Gallo domestico, o sia di *Gallina*, non sono specie reali, ma piuttosto varietà; imperocchè tutte quelle differenze, per le quali si vedono gli uni differire dagli altri, si trovano alcuna volta riunite in un solo individuo. In questo genere di Uccello la coda è di una forma particolare, dimaneggiachè ella potrebb' essere un sufficientissimo carattere per distinguergli da tutti gli altri generi, quando una simile struttura si trovasse costantemente in tutte quante le specie, ma vi è qualche Gallo, che non ha punta coda.

Questa coda, che vien portata sempre alta, è composta da 14 penne, delle quali 7, sono inclinate per un verso, e 7. per l' altro in maniera che fra di loro formano un angolo molto acuto; una tal direzione di penne caudali è totalmente particolare agli Uccelli di questo genere, e non trovasi in altro genere finora conosciuto. I Galli hanno le ali corte, e che non oltrepassano l' attaccatura della coda. I maschi hanno in ciaschedun piede uno sprone, che non di rado diviene molto lungo & acuto. Il Gallo si può certamente dire l' orologio de' contadini, il maestro di tutti gli uomini, il modello de' Principi nel governare, l' immagine di un vero padre di famiglia, un valoroso militare.

T. CCIX. B. $\frac{1}{i} \frac{10}{5}$

GALLO Padovano. — *Gallus Patavinus* Aldrov. & Briss. — *Gallus cristatus* Barr. — *Gallus maior exoticus* Schnweck. — Gall. Poule de Caen,

I Galli, e le Galline, che si dicono Padovane, vengono propriamente da Polverara Borgo distante poche miglia da Padova. Queste non differiscono dalle nostrali, che nella grandezza, e nel color delle penne più vago; e quando sieno altre portate insensibilmente degenerano e riduonsi alla grandezza delle comuni, s' intende sempre la loro figliuolaanza, non già quelle state di là trasportate.

Il Gallo solamente fra gli Uccelli diurni, tolto il Rusignuolo, canta di notte, cioè dopo la mezza notte due o tre volte avanti il far del giorno, a diverse distanze. Il Klein lo chiama Alector, perchè ci risveglia, e ci fa

Alli, sive Gallinacae, quae Patavinae dicuntur, e Pulverara vicino aliquot milliaribus a Patavio distante, mittuntur. Hac vulgaribus maiores tantum sunt & speciosiores, & si in alias regiones transferantur, degenerant paulatim, & ad indigenarum magnitudinem brevi contrabuntur; earum vero progeniem, non ipsas translatas intellige.

Gallus Gallinaceus e diurnis Avibus solus, si Philomelam excipias, internodii cantat, post medianam scilicet noctem, duabus tribusve vicibus per intervalla ante lucis ortum. A Kleinio dicitur Alector, quia nos a lecto resuscitat.

T. CCX. : :

GALLINA Padovana barbuta. — *Gallina Patavina barbiger*. *Gallina magna Longobardica, vel Italica quorumdam.*

Quelle Galline, che quasi tutto l' anno, e quasi ogni giorno fanno l' uovo, come fra

Gallinacae quae per maximam anni partem ac dietim plerumque ova edunt, ut Patavinae, in.

le altre sono le Padovane , non durano però lungo tempo in simile fecondità , ma dopo tre anni , o quattro al più , si riducono sterili , perchè venendo loro a cadere dal fondo dell'ovaia tutti i principj dell'uova , che in origine si erano generati , e non formandosene di nuovo , cessano di partorire .

L'età di questi animali non è certa , quantunque l'Aldrovando la stabilisca di dieci anni . Non si tengono dagli uomini che per frutto e guadagno , e siccome le Galline divengono sterili assai presto , ed i Galli con gli anni diventano poco buoni a mangiarsi , perciò non son lasciati invecchiare . Quella grand'età che da alcuni viene a Galli attribuita la credo favolosa , imperocchè in questo genere d'animale , desistendo la Gallina tanto presto , come si è detto , dal partorire , e il Gallo svervandosi per la falacità , e intemperanza vene-rea , che sicuramente deve debilitarlo , sono argomenti da far credere , che senz'altro debbano tali animali invecchiar presto , e vive-re non troppo lungamente .

La descrizione , e anatomia dell' ovaia delle Galline , e delle altre parti inservienti alla generazione , siccome l'istoria della genera-zione , dell'esclusione , e cova dell'uova , si può distesamente vedere nell'Aldrovando , nel Gesnero , nell'Arveo , nel Malpighi , e in altri ancora .

Dell'allevare poi e mantenere questi Uccelli , per quanto riguarda l'economia , e l'utile , che può ricavarsene , ne ha di corto e minutamente parlato il nostro Sig. Abate Bonfanti in un libro da noi stato citato nel Cata-logo degli Autori nel supplemento di essi posto alla fine .

Se avessimo voluto raccorre , e ammazzare quanto di questi Uccelli vien raccontato , o detto dagli Autori , certamente avremmo molto tediato i Lettori , tanto più che la maggior parte delle cose , che avremmo potuto dire , è già nota universalmente , perciò se ne toccheranno soltanto alcune , e alla staccata negli articoli che ne succederanno .

T. CCXI. B. 1. 2. -

GALLINA detta la vergognosa . — *Gallina verecunda dicta.*

SI dice questa vergognosa a motivo di quella gran cresta che le pende dal capo , e le ricopre la fronte , e gli occhi . Il primo Au-tore di questa Raccolta trovò molte di queste Galline in Romagna , e benchè avessero gli occhi coperti dalla spaziosa cresta , osservò che mediante la loro industria nel portare il capo , e nel camminare , arrivavano a veder molto bene . Questa pure deve dirsi mera va-rietà , e non specie .

Della maniera di nutrire le Galline , i Gal-

inter alias sunt , tot partibus non diu sufficiunt , sed post tres quatuorve plurimum annos steriles & effetae sunt : delapsis enim quae ovario ab initio inerant ovarum rudimentis , parere destinat necesse est , cum nova inus non suboriantur .

Quamdiu vivant haec Aves non constant , quamvis Aldrovandus decennio earum aetatem circunscrivat . Emolumenti enim causa tantum a-luntur , & cum intra paucos annos ad genera-tionem ineptae foeminas evadant , & mares valde carne deteriores sunt , ab hominibus diu-tius non aliuntur . Aetatem quam Gallis nonnulli longissimam tribuunt , fabulosam arbitror , nam in suo genere Gallina cum admodum cito , ut di-ximus , effeta fiat , Gallus vero a salacitate , & veneris intemperantia , quae corpus , viresque enervant , debilitetur , sollicitam ut expe-diant haec Aves senectutem recte arguitur .

Ovarii , & reliquarum partium generationi in Gallinis inservientium anatome & descriprio , pariterque de generatione , incubatu , & ovarum exclusione exactissima historia babebitur apud Aldrovandum , Gesnerum , Harveum , Malpighium , aliasque .

De barum autem custodia , atque utilitate in domestica economia , nuperrime & abunde scripsit apud nos Dom. Abbas Bonfanti , cuius libri notissimum in Auctorum Catalogo prope finem , sive in supplemento , adiecinus .

Si omnia , quae de Ave haec dicta sunt , & a praecipuis Auctoriis indicantur , perfringere voluissemus , Lectores certo certius , cum plurima praecipue nota omnibus sint , saedio ni-mium afficeremus ; ideoque nonnulla tantum , atque separatim , in sequentibus describemus .

*V*Erecunda haec dicitur a magna & propen-

deniente crista , quae buic frontem & oculos regit . Ornithologiae nostrae primus Auctor ba-rum copiam per Romandiolas pagos , & rura ob-servaverat , quae licet magna crista oculos omni-ino teles habuissent , recte admodum adhibita industria , peculiari incesu , & capitis gestatio-ne oculis utebantur . Mera & haec varietas non species dicenda est . Da Gallinarum , Gallorum , & Caponum

Galli, e i Capponi, non occorre che molto ne parliamo, essendo cosa alla scienza di tutti; e i precetti, che appartener possono all' ingraffamento loro, spettano piuttosto che a quest' opera ad un Trattato d'Economia. Aviamente si cibano d' Uva, e di Fichi, ma con loro danno, imperocchè le Galline cessano di far uova, e i Polli tutti si ammalano di pituita, o pipita. Faranno bensi le Galline molte uova se si darà loro del feme di Canapa, e più grosse ancora le faranno dandole dell' Orzo mezzo cotto, o feme di Nasturzio impastato con Crucca e Vino; per ingraffarle poi ottimo è il Grano cotto nell' acqua, siccome il Gran Siciliano, il Miglio, il Pano, l' Orzo, la Vena, e tutte quante le ci-viae, e molto ancora si loda il Citiso.

Vien costantemente creduto che le uova lunghe e acute sieno atte a produrre delle Pollastre, e che quelle che sono più tonde, o otuse in quella parte, nella quale fogliono esser più acute, portino d' maschi. L' ingegno ha superato la natura, dice l' Ionston, imperocchè avrai sempre delle Pollastre, se porrai a covare delle uova che sieno nate a Luna piena. Si alegnano di cova fino al nascimento de' Pulcini giorni 21. dalla maggior parte degli osservatori, ma di qual cosa si abbrevia tal tempo, se l' aria sarà tiepida. Principiansi a porre le uova terminato l' Inverno, e ne' luoghi d' aria più temperata e molto fecondi a primi anco di Gennaio. Migliore fra tutte è la covatura avanti l' Equinozio di Primavera; quelle che nascono dopo il Solstizio non producono tanto frutto, o Polli si grossi, e sempre peggio vanno le covature, quanto più tardi faranno poste.

Nascono i Pulcini non tanto mediante la covatura delle Galline, ma con arte ancora senza di else, con porre l' uova dentro il concio, o come si usa in Egitto tenendole per alcuni giorni in certi fornelli; ma di questo metodo ne parlerà sotto la Tav. e num. ccxxxii. poichè questo artifizio può egualmente servire per far nascer tutte quante le uova, specialmente d' Uccelli domestici,

T. CCXII. B. I. 4. -

GALLO calzato. — *Gallus pedibus birsutis, sive pedibus plumosis. — Gallus plumipes Bris. — Gall. Le Coq paru.*

Anco in questa forte d' Uccelli se ne danno alcuni tanto maschi, che femmine, con i piedi vestiti di piume, come è l' effigiatò in questa Tavola. La femmina suol essere in tutto il corpo di color più giallognola del maschio, e suol avere la cresta piccola, i bargigli più corti, e il becco con i piedi gialli.

Tra i mali a' quali fogliono esser soggetti i Polli, uno è la Pipita, o catarro del capo, e l' altro il morbo pedicolare, o sieno i pollini, che sono per essi infestissimi mali.

* *victu non est quod multa dicamus, cum nosissima omnibus res sit, maximeque praecepta basi Aves saginandi ad oeconomiam pertineant. Uvis & Ficibus impense, sed infelicitate vesuntur, steriles enim Gallinac evadunt, & piritosae omnes fiunt. Si semen Cannabis apposueris numerosorum ovorum partu gaudebunt, si vero Hordeum semicoccum, vel Nasturtii semen cum Furfure & Vino subactum exhibueris, maiora depontent; ad saginandum Triticum cum aqua coquum, poru interdicto, tum Mays, Milium, Panicum, Hordeum, Avena, Legumina omnia, atque Cypris maxime laudantur.*

Gallinarum ova oblonga & acuta excludere foeminas fertur, quae vero obtusa vel rotunda in ea parte sunt, quae acutior esse solet, mares. Auxit naturae dotes ingenium, inquit Ionstonus, nam foeminas babueris, si Luna plena nata supposueris. Dies ter septem exclusione adscripterunt plurimi; minuuntur vero si tepidus aer accesserit. Confecta bruma ponit incipiunt; circa Calendas Ianuarii etiam locis tepidiioribus, & fecundissimis. Opirima foetura ante Aequinoctium Vernal editur, post Solstitium nata, magnitudinem non implet, tantoque minus, quanto serius educitur.

Excluduntur etiam Pulli absque Gallinarum incubatu artificio hominum industria adbibito fotu; collectis scilicet turnatim in terra ovis, & fino infra supraque teclis, vel in fornicibus, ut in Aegypto mos est, ad plures dies detentis; sed de hac methodo sub Tab. & num. ccxxxii. cum ad omnia domesticarum praecipue Avium ova extendi aequa haec possit sermonera babebimus.

* *Sunt quoque in hoc Avium genere pedibus quandoque birsutis, quales sunt, quos damus, Gallus & Gallina. Gallina vero in toto corpore flavescere plus minus solet, cristamque minimam gerere, paleas pariter breves, rostrum, & pedes luteos.*

Inter affectus corporis quibus Gallinaceum genus infestatur, Pituita, sive Coryza, quae ipsis pecularis ac inimicissima est, & piritasis, seu la Pituita, volgarmente Pipita è un umore, che

che procede in esi dal cervello , e attacca le narici , le fauci , e la lingua togliendo loro l'appetito , e la facoltà ancora si di bere , che di mangiare . Il Palladio caratterizza questa malattia per una membrana bianca che involge la lingua , non senza pericolo alcuna volta di morte . La lingua divien loro dura , e restano molto danneggiate tutte le funzioni di essa , e delle parti contigue . Si vuole che nasca dall' impura bevanda ; e per asserzione di Columella ciò accade specialmente allorchè è freddo , e manchino di cibo . Perchè restino esenti da questo male si dia loro a bere acqua limpidissima . Leontino macerava dell' Origano nell' acqua , che dava loro a bere . Columella poi vuole , che si profumino i Polli , e ogni tanto si ripuliscano da tutti gli escrementi .

Il costume praticato comunemente di trapanare una penna per i fori del nafo , e giornalmente smuoverla , piuttosto serve a cagionar loro la morte . Molti sono i rimedi prescritti dagli Autori per questa malattia , e fra gli altri dall' Aldrovando , che volendo si può sopra di questo consultare . Quando il male abbia preso molto possesso , è d'uopo qualche rimedio assai gagliardo ; soprattutto è espiciente strappare con le unghie la membrana , e con strumento ancora dar esito a certe suppurazioni , che si formano nelle guance , e intorno gli occhi , e poi con appropriati medicamenti risanar la piaga e la ferita fatta .

Il morbo poi pedicolare , che è l' altro , di cui abbiam sopra fatto parola , consiste nell' empiria esi di pidocchi , e anco di pulci , e specialmente le Galline allorchè covano , la qual malattia produce in esse una gran magrezza , e insensibilmente le confuma , ma è molto più facile dell' altro a medicarsi , anzichè i Polli medesimi , ammaestrati dalla natura , se ne liberano da se stessi coll' aspergerfi di polvere . Per altro gli antichi scrittori delle cose della Campagna tanto Greci , che Latini , più rimedi hanno ordinato per questo male . Molti dicono , che si guariscono mediante un' unzione d' olio di Lino ; il Palladio prescrive una polvere di Staphisagria , e Comino tostato per equal peso , difficoltà con Vino ; e quando il male abbia preso possesso nel più folto e interno delle penne , loda il decotto nel

Vi sono alcuni , che instruiti dall' esperienza affermano , che facilmente guariscono se si fanno impolverare con arena marina , e meglio ancora con la cenere de' saponai , che avanza alle loro rannate . Varrone pretende , che si liberino da tali animaletti se finita la cova si tolga subito il letto , o altro loro posatoio , e affatto si rinnuovi . Patiscono ancora d' Epilepsia , specialmente i Capponi , ma di questa , siccome delle altre malattie , alle quali sono i Polli e

seu pedicularis morbus , peculiares sunt . Pituita est humor e cerebro in naribus , nec non in fauces destillans , edendi , bibendique cupidinem eis auferens linguaeque officiens . Palladius albam pelliculam vocat extremam lingua vestientem . adeo ut saepe periculo non careat id malum , & interimas etiam . Lingua eis indurescit , omnesque ad vitam linguae & vicinarum partium functiones labefactat destruitaque . A folido plerumque oritur potu ; atque , teste Columella , quum frigore & cibi penuria laborant . Ut ab hoc malo praeserventur , purissimam illis aquam porandam dato . Leontinus Origanum in aqua macerabat , eamque ita bibendam offerebat . Vult autem Columella Gyllinaria funigari , & ab excrementis aliquoties repurgari .

Penna per transversas naribus inserta , ac quotidie mota , ut vulgus facit , plures interficit potius . Remedii plura ad hunc morbum facientia Autores proponunt , atque inter alios Aldrovandus , quem consule . Cum morbus alias egerit radices fortioribus indiges remediis ; membrana unguibus rescindi debet , atque sancti collectiones , quae saepius circa genas & oculos oriuntur , ferro aperiri debent , ac postmodum infictam plagam ad sanationem perducere apertis remedii oportet .

Ptiriasis morbus alter , de quo superius verba fecimus , illis accidit , quum pediculis , atque pulicibus nimium obruuntur , maximeque Gallinae quum incubant , qui morbus illas extenuat consumitque . Sed pituita valde facilis curatur , quin imo saepenumero sibi ipsis magistris eo se pulverando liberant . Ceterum & hoc malo affectis veteres , tum Latini , cum Graeci Geponici remedia plura praescripsere . Multi linimenta Oci e feminis Linis facilime curari tradunt : Staphisagriam , & torrefactum Cupinum pavi pondere cum Vino consumum Palladius prouidit ; si vero pennarum secreta penetraveris malum , Lupinorum decoculum laudat .

Sunt qui proprio experimenlo edociti Gallinas arena littorali , aut quod praestantius esse aiunt , cineribus saponariorum a lixivio relatis , si se pulverant permittantur , isto malo ocyus liberari referunt . Vavro ab iisdem animalculis praeservatum iri tradit , si in cubilibus cum perperim , aspergatur substramen , & recens aliud subiiciatur . Epilepsia etiam Galli laborant , praec-

Galli soggetti, quelli che abbiano questa curiosità, potranno restar pienamente informati da diversi Autori, che ne trattano, come fra gli altri è l'Aldrovando, a' quali intendiamo rimettergli.

T. CCXIII. B. 1. 3. 1.

GALLO cornuto. — *Gallus cornutus*. — *Gallus cornibus armatus*.

Quello, che in questa figura è rappresentato, è totalmente mostruoso, e così ridotto per arte degli uomini. Se si taglieranno ad un Gallo adulto, e fornito di lunghi sproni, cotesti sproni, e tagliata la pelle del capo ad un altro Gallo giovine, o Gallero, accomodati sieno in tal ferita, e diligentemente legati, per forza di natura gli si attaccano, e talmente si consolidano, che formano una continuazione così esatta di questo nuovo corpo, come se la natura glieli avesse accordati dalla nascita. Gli sproni adunque in questa maniera accomodati in capo di un Pollastro col crescere di esso, anch'essi crescono, e col tempo vengono a comparire verissime corna.

Si crede da molti, che il Gallo quando è assai vecchio faccia alcuna volta un uovo, e che da quest'uovo ne nasca un Serpente, ma questo è dimostrato falso dall'esperienza. Che poi sia ciò uno spacciato error popolare, e un mero sogno di alcuni lo prova l'insufficienza medesima delle parti, anzi la mancanza totale ne' Galli dell'organizzazione a produr ciò necessaria. Quantunque vi sieno degli Autori, i nomi de' quali per rispetto si tacciono che credono, e difendono quest'uovo di Gallo, a sufficienza vien ciò dimostrato falso da diverse esperienze, che furono fatte a Montpellier.

cipue Capones; sed de hoc morbo, alrisque quibus obnoxii interdum sunt, plures sunt Autores, qui curiosos instruere possunt, praeincipue Aldrovandus, ad quos ipsos mittimus.

Cuius picturam hic damus, monstruosus prorsus est, atque hominum arte efformatus. Si Gallo seniori, longioribusque calcaribus instrito calcaria ipsa resecantur, atque in alterius iunioris pulli vertice, discessa arte & cultri ope prius cute implantentur, ac rite deligantur, naturae viribus adbaerent & adglutinantur ita ut unum ac continuum corpus efficiantur, nec non ut membrum a natura eidem a nativitate impertitum videantur. Hac norma calcaria illa inserita pro acetate iunioris Galli, cui adiuncta sunt, augmentum capiunt, & vera inde cornuta simulant.

Gallum ad magnam praeципue senectutem perventum ovum quandoque parere, atque ex eodem ovo Serpentem ortum ducere assertunt quamplurimi, sed falsum experientia hoc satis superque demonstrat. Hoc autem ut falsum magis magisque ostendit ipsa partium in Gallis ad ovum generandum insufficientia, immo absentia, atque ideo pro vulgarissimo errore, & nonnullorum somnio baberi id debet. Plures licet Autores, quorum nomina veneratione racemos, Gallorum ova adprobent defendantque, Montpellier tamen institutae observationes & experientiae fuere, quae contrarium testantur, atque demonstrant.

T. CCXIV. B. 1. 4. -

GALLO nano. — *Gallus pumilio* Aldrov. — *Gallus pedibus brevissimis* Bris. — *Gallus Gallinaceus pumilio* Rai. — Gall. Le Coq nain. — Angl. Creeper.

La carne di Pollo, specialmente di Pollastro, che non oltrepassi l'anno, ovvero di Cappone bene ingrassato, ha per sentimento universale il primo credito nelle mense, e non cede punto in bontà al Fagiano, né alla Pernice.

Il Cappone quantunque non differisce in specie, non ostante da alcuni Ornithologi è stato descritto e dimostrato con disegno separamente. La differenza che cade in esso consiste nella qualità diversa della sua carne, e

Caro Gallinacea, Pulli praesertim anniculi, aut Caponis bene saginati, omnium fere iudicio primum in cibis dignitatis locum sibi vindicat, nec Phasiani, aut Perdicis carnibus bonitate cedit.

Capo licet specie non differat, separatum & nonnullis depictus ac descripctus fuit. Differencia, quae interest unica, in carnis mutata tempore, & testiculorum privatione, ob quam propagationi baud idoneus redditus est, consistit. Quot enim

nella mancanza de' genitali, per la quale è inetto alla propagazione. Quante specie e varietà vi possono esser di *Galli*, tante ve ne possono esser di *Caponi*; imperocchè tutte quante le varietà de' *Galli* si possono castrarre, e per ciò unicamente ridursi *Caponi*. Non ostante però ne' *Caponi* le penne del collo, e della coda si fanno più lunghe e grandiose, e qualche volta anco gli sponni divengono più lunghi che ne' *Galli*, mentre però la voce loro si fa più bassa e roca. Negli uomini castrati però succede tutto il contrario, mancando in questi la barba, e la voce facendosi più acuta.

I *Galli* si castrano unicamente per utile della tavola, cioè per la squisitezza della carne, che mediante tale artifizio, e accomodatura mantengono oltrepassando ancora la tenera età, ma anzi la perfezionano di più in delicatezza, e sapore, divenendo più grassi. Gli antichi castravano i *Galli* diversamente da noi, castrandoli con un ferro infuocato, come attesta Varrone, Columella, e Plinio, e si può credere, che non pochi in tale operazione morissero, giacchè qualcuno ne muore anco adesso, quando qualcosa venga trafurata, o sbagliata nell'accomodargli col metodo nostro. Siccome poi la norma di quest'acconciatura è notissima cosa, stimiamo superfluo il farne parola.

T. CCXV. B. 1. 6. 2.

GALLO ricciuto. — *Gallus cincinnatus*. — *Gallus plumis crispis* Barr. — *Gallus Gallinaceus eripus* Will. — *Gallus eripus* Bris. & Linn. Syst. nat. — *Gall. Le Coq frise*.

LA *Gallina* di Frislandia citata dal Willughby si deve considerare per una varietà di questa specie, e si chiama di Frislandia non perchè da tal Regno sia in origine a noi venuta, ma per essersi alcuni dati a credere nel vederla di piuma assai crespa, poter esser nativa d'un paese assai freddo qual è la Frislandia, e che l'effetto dell'increspatura, e arricciatura delle sue penne proceda unicamente dall'orrido freddo di quelle contrade.

La propensione, che hanno i *Galli* nel combattere fra loro, è notissima cosa. Gl' Inglesi specialmente mediante una particolar maniera di cibargli, e d'instruirgli si occupano in ciò con mirabil riuscita. Di questi combattimenti molti ne accadono nelle maggiori Terre, non in giorni fissi, mà secondo le occasioni, e secondo che vien stabilito da' padroni de' *Galli*. Per tal cosa ancora si alzano espressamente de' Teatri sopra de' quali si eseguiscono tali spettacoli, a osservare i quali concorre da ogni parte gente infinita, e vi succedono ancora grandi scommesse.

I *Galli*, che più degli altri sono animosi non cedono mai, ma vogliono piuttosto restar morti, che darsi per vinti.

enim Gallorum species, five varietates sunt, rotidem etiam Caponum esse possunt; etenim omnes castrari queunt, & sola ferme castratione a Gallis differunt. Caponibus ramen iuba est maior, quam Gallis, & caudae pennae longiores, calcaria quoque interdum longiora, vox demissior & rauca. Contrarium vero in boninibus castratis accidit, cum iis barba non amplius exurgat, voxque acutior fiat.

Galli castrantur unice ad Mensae usum propter carnis præstantiam, quam tali pasto adcommodati longius ultra primam aetatem servant, immo molli & sapida addita inde pinguedine adaugent. Apud antiquos Galli longe alio modo, quam nunc castrabantur, neinde candenti ferro, ut meminit Varro, Columella, & Plinius inrebantur; suspicari autem licet multos antiquitus ex insisto illo vulnere cum candente ferro interisse, ut quandoque aliqui ex nostris moriuntur, si erratum aliquod in castratione contingat. Hodierna castratio, ut nosissima, mulierculis etiam, relinquatur.

Gallina Frislandica Willughbeii ad varietatem banc reduci debet, diciturque Frislandica, non quia e Frislandia ad nos primum certe delata fuerit, sed quia nonnulli probabili arguento sibi persuaserunt Frislandicæ eam originis esse, quod scilicet plumæ frigoris vobemantia per torum corpus inborfescentes hoc modo crispatae videantur.

Gallorum pugnacitas nulli ignota est. Ab Anglis præcipue ad pugnam diligenter cura & exercita viutis ratione ali & præparari solent. Sunt autem frequentia per Oppida maiora, non statutis diebus, sed pro re nata indicta Gallorum certamina, quandocunque scilicet voluerint, vel inter se consenserint, qui Gallos alant. Quin etiam Theatra passim extructa sunt, in quibus exhibeantur buiūmodi spectacula, ad quae magno numero undique concurritur. Sporsiones deinde utrinque fiunt gentis non raro pretiis.

Galli generostores cedere nesciunt, & mori quam vincit, aut ignominiosa fuga sibi consulere malunt.

GALLO scherzoſo. — Gallus naturae lufus.

Sopra ogni altro genere d' Uccelli scherza, e varia in moſtruofita il Gallo. Voglio tacere la Gallina petrificata, e con le penne forti come l'Iſtrice, ſtata trovata fra due muraglie, e dall'Aldrovando deſcritta, ſiccome quel Gallo ſtato oſervato dal medefimo Autore in Tofcana alla Corte del Granduca Francesco de' Medici, nel quale, oltre una particolar diſpoſizione, e conforimatione, tanto di penne, che di parti, era oſervabile una lunga coda a forma appunto d' quadrupedi. Voglio parimente tacere tutte quelle moſtruofità d' individui, che ſono corredati di tre, o cinque piedi, o di due corpi, o più teste, come accade alcuna volta ne' feti umani. Coſe tali ſuccedendo affai di rado, e da molti non eſendo anco credute, perciò non appartengono a questa Iſtoria voluta breve, e ve-ritiera.

Per questa medefima ragione ſi tralafciano più altre coſe attenenti all' indole de' Galli, ed agli uſi, e facoltà, ſpecialmente mediche, delle Galline, e delle uova, ſiccome nulla abbiamo creduto dover toccare dell' uſo loro re-lativamente alla religione, ai preſagi, ai prodigi, ai ſimboli, o mifteri, alle favole, e più al-tre ſimili coſe, delle quali a ſufficienza ne parlano altri.

Supra reliquias certe Aves monſtrificus appellandus eſt Gallus. Tacebo Gallinam in lapideam ſubſtantiam inter parietes converſam peninis Hiftoricas inſtar horridam, & ab Aldrovando deſcriptam, pariterque Gallum in Aula Se-reniſſimi Magni Ducis Etruriae Franciſci Me-dicet ab ipſo Aldrovando oſervatum, cui praeter inſolitas partium & pennarum plures confor-mationes longa inſtar quadrupedum erat cauda; tacebo pariter monſtruosos illos tribus, & quinque pedibus inſtructos, ſive bicorporeos, vel capi-bus pluribus a nativitate, ut in foetibus bu-manis aliquando oſervatur, donatos. Haec ad Hiftoriam nostram concinnum, miſisque probatam, cum minime faciant, ut inſoliti, vel quia a pluribus ut fibulosa recipi facile poſſunt, liben-ter omittimus.

Eademque de cauſa plurimi alia reticemus, que ad Gallorum mores, Gallinarum & ovo-rum uſus ac facultates, praecipue medicas per-tinent, pariterque earundem Avium uſus in ſacris, praefagia, prodigia, myſtica, fabulosa, & alia multa, quae de bis dici poſſent, & apud Auctores abunde occurunt, tacemus.

11. **GALLO e GALLINA** bianca con gran ciuffo di penne in testa. = *Gallus & Gallina alba crista in vertice plu-mosa.* = *Gallus Gallinaceus crista in vertice plumosa densissima, & undequaque diffusa Rai.* = *Gallina alba crista Aldrov.* = *Gallina villoſa alba crista Willugh.* = *Gallus cristaſtus, & Gallina cristaſta Briff.* = *Phasianus Gallus cristaſtus Linn. Syst. Nat.* = *In omnibus cum aliis conueniunt, praeterquam quod habeant in vertice penas longiores, quae cristaſtam plumosam efformant, nec a Gallo nostro Patavino ſub Tab. CCIX. relatum longe diſferunt.*
12. **GALLO e GALLINA** con i piedi di cinque dita. = *Gallus & Gallina pentadactylus Brifs.* = *Gallus & Gallina domeſtīca Frisch.* cum accuratis iconibus. = *Pullicenus quinque digitis in utroque pede Aldrov.* pariter cum iconē, ſed minus accurata. = *Ab aliis tantum diſſerunt digitorum numero, que varietas monſtroſa eſt.*
13. **GALLO e GALLINA** di Turchia = *Gallus Turcicus & Gallina Turcica Aldrov.* Brifs. & Willugh. = *Colorum varietate & pulchritudine a noſtris abſcīde praecepiſe diſſerunt.*
14. **GALLO e GALLINA** d' Inghilterra. = *Gallus & Gallina Angliae.* = *Gallus Anglicanus & Gallina Anglicana Frisch.* cum accuratis iconibus. = *Gallus Anglicanus, & Gallina Anglicana Brifs.* . = *Craffitie noſtris non antecellunt, verum altitudine ſuperant; cruribus enim & pedibus donantur, quam in aliis multo longioribus.* In ceteris cum noſtris conueniunt.
15. **GALLO e GALLINA** di Bantam. = *Gallus Bantanicus, & Gallina Banticana Brifs.* = *Phasianus Gallus & Gallina Bentamensis Alb.* cum depicitis maris & ſoeminae iconibus, ſed minus accuratis. = *Gallus minor Bantanicus Brown.* = *Gallus parvulus Bont.* = *Phasianus Gallus Pusillus Linn. Syst. Nat.* = *Varietas hæc Gallo Tab. CCXII. ſimilis eſt, habetque ut illi pedes ad digitos uſque plu-moſos, ſed in latere exteriore tantum.* Ab eo etiam diſſerunt penas crurum longiſſimis, & ultra ealcaneos multum extenſiſt. Mas audaciſſimus eſt, & liben-ter praelium committit contra Gallos etiamſi ſe ipſo duplo maiores.
16. **GALLO, e GALLINA** di Mozambico. = *Gallus Mozambicanus, & Gallina Mozambicana Brifs.* = *Mozambi-cana Gallina Nieremb.* = *Gallus & Gallina carne nigra Bont.* = *Genuina ac diuersa videtur species, que ab aliis diſſerunt non ſolum colore pennarum, que feri in omnibus nigrae ſunt, ſed quia in hac crifa, palea, epidermis & periſtoſon nigro colore imbuuntur, ita ut cocta, in atramento elixa pueretur,*
17. **GALLO e GALLINA** di Persia. = *Gallus & Gallina ex Persia Aldrov.* = *Gallus Persicus & Gallina Per-sicus, ſive Gallus uropygio carens Brifs.* = *Gallus Gallinaceus, cauda ſeu uropygio carens Rai.* = *Gallus Per-sicus & Gallina Persica Ionſt.* = *Gallus non caudatus & Gallina non caudata Frisch.* cum accuratis iconi-reſtrictibus proſuſi carent, = *Phasianus Gallus ecaudatus Linn. Syl. Nat.* = *In omnibus cum noſtris abſcīde conueniunt; ſed uropygio &*

18. **GALLO e GALLINA del Giappone** : = *Gallus Iaponicus*, & *Gallina Iaponica*; sive *Gallus pennis pilorum ac mulis Bris.* cum optima iconē foeminae = *Gallina lanigera forte* Aldr. cuius iconem quoque affert, licet parum accuratam. = *Huiusmodi Gallinae*, inquit Aldrovandus, albae sunt instar nivis, & non pennis, sed lana ut pecus rectae sunt. Paulus Venetus scribit in Civitate Quelinqia in Regno Mangi *Gallinas* inventas, quae loco pennarum pilos habent, ut *Cati*, nigri coloris, & ova prima portant. Hanc *Gallinas* speciem fabulosam existimat Willughbeiu, sed minus recte, illamque, quam pro *Gallina pilosa* describit Paulus Venetus. Emeu Aeneus fuisse suscipitur. Reversa si varietas rosa alba datur, nigram quoque dari nil repugnat. Species autem alba huiusmodi pennis singularibus distinguitur, & pilorum acmulis, in Museo Realmuriano Parisiis assertior, & digitus trium antecorium extimus ad ungues usque pariter plomosus.

Galli vel Gallinae alias species, ab Aldrovando Indiae dictae, alijs descriptas a nobis sunt, praeципue sub Tab. CCXXXVIII. & CCXXXIX. Excellensissimus, atque inclitus *Eques* Daniel Farsetti Patrius Venetus *Gallivorus*, quas describere difficile propemodum esset. Veneta autem Regio domesticis Avibus propriis est, sylvestribus vero, us *Pheasantis* & *Perdicibus* non ita, quae accilia & Jessoia praecipue amant loca. Maxime summam pro *Viridariis*, *Ornitborophiis*, & *Museis* impedit expensas, & in scientiis hinc peritos omnes magnificissime diligit, argu protegit.

19. **GALLINA Padovana** col becco conico diritto, lungo, & acuto, forse scherzo della natura Ger. = *Gallina monstruosa*. In Germania autographa Ornithologia obseruatorum bac *Gallinae* varietas, quae Florentiae olim videbatur, in toto corpore nigra, caruncularum rudimentis duabus coccineis in fronte, & trifta magna pennacea alba in vertice. Ob rostrum supra indicatae stridulorum capite lateraliter declinato, sive inflexo, alituentum legere cogebatur. *Crax nigrae Linnæi*, si species constans & sylvestris esset, videtur affinis.

T CCXVII. B. 2. 15. -

PAVONE maschio, detto anco Paone. — *Pavo*, vel *Pavus* mas. — *Pavo longicaudus* Barr. Ornithol. — *Pavo* Gefn. Aldr. Ion. Rai. Willugh. & aliorum: — *Pavo*, seu *Pavus*; *Avis medica* Varroni; *Iunonia Avis* Ovidio, Rzac. — *Pavo cauda longa*, *plumis uropygi pulcherrimis* Brown. — A Kleinio *Avis Persica* etiam dicitur. — *Phasianus cristatus* Bris. sp. 7. — *Pavo cristatus* Linn. Synt. Nat. sp. 1. — Gall. *Le Paon*, — Angl. *Peacock*.

La femmina ha le penne assai meno varie, ed è tutta di un colore scuro, che volta al cenerino, fuorchè nel collo, e nel petto dove le penne sono verdi, ma quelle del petto terminano in bianco. L'iride dell'occhio nel maschio è giallognola, nella femmina piombina, e il mento di questa è bianco.

I *Pavoni* si cibano di quell'istesse cose, delle quali cibansi le *Galline*; ma infra le altre piace loro l'Orzo. Alberto disse, che mangiano i Serpi, onde non è maraviglia se dalla voce del *Pavone* restino questi spaventati. Quest'Uccello, a noi foresterò un tempo, trovavasi solo alla corte de' Regi, oggigiorno dovunque, e appresso i contadini ancora. Linneo assegna ad esso per patria l'Indie Orientali, e particolarmente l'Isola di Ceilan. Viene detto, che i *Pavoni* campino fino a cent'anni, e il Willughby si foscrive a quest'opinione.

Il maschio, dice Columella, nella salacità s'affomiglia molto al *Gallo*, e perciò gli si debbono dare cinque femmine; dimodochè se non ne ha alcun'altra nel tempo, che una trovasi in cova, affalta quella, e rompe le uova. Di questo costume essendo dalla natura ammaestrata la femmina, pone il nido per quanto ella può in luogo nascondito. Apportano i *Pavoni* sterminio agli orti, e guastano tutti i tetti. Quantunque il *Pavone* sia bellissimo al-

* **IN** foemina paucā admodum colorum conspicitur varietas. Tota fusca est ad cinereum vergens, collo & pectore viridibus, apicibus pennarum in pectore albī. Oculorum iris in mare lutescit, in foemina plane plumbea; mentum in bac totum candidum est.

Pavones iisdem, quibus *Gallinae* vescuntur, Hordeo autem imprimit, delectantur. Albertus Serpentes a Pavonibus edi dixit, unde non mirum Serpentes eorum voce terri. Peregrina origine Avis est: olim non nisi Regibus, nunc ubique genitum, & rusticis etiam familiaris. Linnæus Indian Orientalem, Zeylonam praecepit, pro natali solo iisdem tribuit. Pavones vitam ad centum usque annos (cuius sententiae pariter est Willughbeius) protrahere affirmant plures.

Masculus, inquit Columella, Gallinaceam salacitatem habet, atque ideo quinque foeminas desiderat; imo, ni adsit alia, cum qua coeat, incubante foemina invadit, & ova frangit, cuius rei conscientia foemina nidum quantum potest occultat. Maximam horis pestem inferunt, & regulas teatorumque culnos evertunt. Pavo, esti Avis visu pulcherrima sit, oculorum tamen vo-

lu-
ma
la

la vista, egli è altrettanto disgustevole e in-
comodo per la voce, onde di esso si può dire: luptas plurimo aurum tædio compensatur, unde
dictum fuit:
*Angelo appar per le dipinte penne,
Ma ladro il pè lo scuopre,
E per l'iniqua voce
Dall'Erebo venuto alcuno il tenne.*

*Angelus est pennis, pede latro, voce
Gehennus.*

Klein. pag. 112.

T. CCXVIII. B. 2. 13. 1.

PAVONE, o Paone bianco. — *Pavo albus* Gesn. Aldr. Ionft. Brifs. & aliorum. — *Pavo colore albo* Rai. — *Pavone candidus* Schwenck. — Gall. *Le Paon blanc*. — Angl. *White Peacock*.

QUegli occhi, o macchie, che si vedono in punta delle penne copritrici il di sopra della coda, quantunque sieno anch' esse tutte bianche, si distinguono però bene a motivo de' diversi gradi di bianco, da' quali son esse formate.

I *Pavoni* bianchi sono stati supposti da alcuni esser naturali de' paesi Settentrionali, ma ciò è contro le osservazioni. Questo genere d' Uccello è realmente Orientale, come lo devono essere anco le sue specie, e varietà. Luigi Cadamosto ci assicura aver trovati de' *Pavoni* bianchi, e in quantità nell'Isole Madere.

I *Pavoni* partoriscono fra noi cinque, o sei uova, e di rado otto, avanti il tempo di covare; e siccome covano due volte l' anno, sedici al più sono le uova che depongono in un anno. Quel' uova sono di guscio assai duro, di color bigio, che piuttosto inclina ad un color terroso chiaro, e gentilmente traforate nella superficie.

Pietro Martire racconta, che nell' Indie partoriscono venti, e anco trenta uova, ma non si sa se dentro l' anno, o in ciascuna covatura. Se le uova di *Pavone* ti porranno a covare sotto la *Gallina*, insegnano gli Autori, che chi n' avrà la cura si porti spesso al covo, e le rivolti, perchè difficilmente le rivolta la *Chioccia*, essendo esse più grandi e gravi delle proprie, e perchè sia ciò fatto anco meglio, vogliono, che da una delle parti si leggino con dell' inchiostro; in questa maniera si potrà certamente sapere se saranno, o non saranno dalla *Gallina* state rivoltate.

MAculae, quibus tectrices candaes superiores in apice praeditae sunt, quamquam ipsae sint in toto albæ, attamen paullulum apparent, quia verius efformantur albedinis gradibus.

Pavones colore albo Septemtrionalibus regionibus peculiares fuisse nonnulli crediderunt, quod observationibus opponitur. Orientalis revera est *Avis*, ut reliqua onnes sunt huius generis species & varietates. In Insulis, quas Maderas appellant, plurimos albos Pavones nasci, Aloysius Cadamustus testatur.

Pavones apud nos ova quinque aut sex, perraro octo ante incubationem edunt; cum vero intra annum bis incubent, sexdecim ad summum sunt ova ab iisdem quotannis exclusa. Haec autem cortice sumo solido, cinereo colore imbuta, diluto admodum, sed ad fuscum inclinante, & punctulis in superficie leviter perforata.

Petrus Martyr in India Pavones aliquando ova viginti, immo triginta parere refert; an vero infra annum, vel in singulis incubationibus accidere id soleat nescimus. Si *Pavonna* ova Gallinae forvenda supponantur, præcipiunt Autores, ut saepe ad cubile incubantis accedat custos, illaque, cum propter magnitudinem difficilis, quam sua a Gallina moveantur, manu veriset, atque ut diligentius id fiat, unam partem ororum atramento notari volunt, quiam eo signo, an a Gallina conversa fuerint, nec ne manifeste diuidicari poterit.

Si leggino con dell' inchiostro; in questa maniera si leggono con dell' inchiostro; in questa maniera

T. CCXIX. B. 1. 11. 1.

PAVONE della China maschio. — *Pavo Sinensis* mas. — *Phasianus Pavoneus* Klein. — *Phasianus Pavonicus* Chinensis Edw. — *Phasianus Pavo Sinensis* Brifs. sp. g. — *Pavo [bicalcaratus] capite laevi, calcaribus dusibus* Linn. Syst. Nat. sp. 3. — Gall. *Le Paon de la Chine*. — Angl. *The Peacock Pheasant from China*.

Quantunque il *Pavone* sia un Uccello bellissimo, la sua carne però è dura, asciutta, e di difficult concezione, e per questa ragione cotta che sia si conserva lungamente, e difficilmente si putrefa. Guardini, dice l' Aldro-

Licit *Pavo pulcherrima* sit *Avis*, eius tamen caro durior, siccior, & difficulteris concoctionis censetur. Hac de caussa cotta longius assertatur, difficultimeque putreficit. Caveant, inquit Aldrovandus, a *Pavoninarum* carnium esu qui

vando, dal mangiar carni di Pavone chi fa vita riposata, imperocchè convengono, o almeno nuccono meno alle persone esercitate, e soltanto anco per questi conviene quella dei Pavonini più teneri. I Romani essendo meno delicati, e dediti alle fatiche della Ginnastica, e della campagna, e più ancora per ragione di grandezza stimavano molto la carne di quest'animale. La carne poi de' piccoli, e più giovani Pavoni si stima assai sottile, e più giovani Pavoni si stima assai sottile, e saporitissima, né generalmente si fa posporre a quella delle Pernici.

qui quiete fruuntur; siquidem convenient, aut saltem minus nacent, hominibus multum se exercentibus, iisque tantummodo juniorum Pavorum, utpote teneriorum. Romani minus delicari, ac gymnasticis, & agroris laboribus affueti, maximeque luxus ratione, plurimi huius volucris carnem fecerunt. Juniorum vero Pavonum carnem teneram, delicatam & sapidissimam bis etiam diebus dicunt omnes, nec Perdicinam ei praeferre sciunt.

T. CCXX. B. 1. 2.

PAVONE della China femmina. — *Pavo Sinensis foemina* Bris. sp. 9. — *Phasianus fuscus* Klein.

SI dice la femmina della specie antecedente, ma per aver la coda larga e lunga, e le penne molto belle a' occhi celesti, e di turchino contornati, tanto nelle ale, che nella coda, i quali caratteri foglion mancare nelle femmine, vi è da sospettare, che non altrimenti sia una femmina, ma bensi una distinta varietà, e maschio anch'esso,

Habetur pro foemina superioris speciei, sed ob caudam amplam & oblongam, pariterque ob pennas admodum pulchras, oculatas, cyaneo & obscure caeruleo colore pictas in aliis, caudaque, qui characteres in buius generis avibus desiderari in foeminis solent, suspicari recte possumus, non foeminam supradicatae speciei banc esse, sed distinctam Pavonis Sinensis varietatem, maremque potius esse.

+ T. CCXXI. B. 1. 2. --

PAVONE del Regno di Tibet. — *Pavo Tibetanus* Bris. sp. 10. — Gall. *Le Pav. du Tibet.*

6. PAVONE della specie comune vario. = *Pavo varius* Bris. sp. 7. variet. A. = *Pavo varius* Frisch. cum accusata icon. = *Nostr. Tab. COXVII. similis; differt tamen genis, gastero supremo ventris parte, alarumque testicribus albis.*

7. PAVONE del Giappone. = *Pavo Iaponensis* Aldrov. & Ionst. cum iconibus maris & foeminae, licet non satia accuratis. = *Pavo Iaponicus* Charlet. & Bris. sp. 8. = *Mas superne caeruleo & viridi varius est, inferne leucophaeus nigris maculis insignitus, testicribus, sive caudae pennis, quam in nostrate, multo longioribus colore fusco ad castaneum vergentibus, capo candidissimo, & maculis versus apicem testicribum, quam in nostro maioribus, in medio aureis, dein caeruleis, marginibus viridiibus. Oculorum ambris in hoc est ruber, pupilla nigra, corumque irides luteae; rostrum cinereum, sed quam in nostro longius & tenuius; Pedes leucophaei. Foemina vero mare minor est, ventre profus nigro; testicribus caudae multo brevioribus, & testicribus viridiibus.*

T. CCXXII. B. 1. 8. --

GALLO PAVONE, altrimenti anco detto Pollo d'India, e Gallo d'India, col ciuffo; in Toscana volgarmente chiamato Tacchino, e Tacchina, e Pollo Dindo. — *Gallo-Pavo cristatus* Bris. sp. 1. variet. A. — *Meleagris Gallo-Pavo cristatus* Klein. — *Meleagris [Gallo-Pavo] capite cornucula frontali, cristaque gulari, maris pectore barbata* Linn. Syst. Nat. sp. 1. — Gall. *Le Dindou hapt.* — Angl. *Crested Turkey.*

GLi Uccelli di questo genere furono portati per la prima volta dalla Turchia, per quanto almeno si crede, e perciò furono detti Turcheschi. Ora però sono frequentissimi in Europa, e conosciuti da tutti. Avendo poi quest'Uccello gran somiglianza a prima vista, e per l'indole ancora, con il genere Gallinaceo, e non poca convenienza ancora con il Pavone

Huius generis Aves primum e Turcia delatae creduntur, ideoque ab Anglis Turkeis appellatae sunt. Nunc vero in Europa passim notae, & ubique fore obviae factae sunt. Existimur hunc alitem quam primo inveniu, & moribus & figura corporis, ad Gallinaceum genus pertinere videatur, communem vero cum Pavonibus pro-

Per

per la grandezza del corpo ; e per l'abilità, che ha di alzare, e aprire in ventaglio la coda, e come esso di godere nel guardarsela, lo hanno addimandato *Gallo-Pavone*, con vocabolo vale a dire, che ritiene e somministra l'idea dell' uno, e dell' altro genere, e che significa partecipare della natura, o delle qualità tanto del *Gallo*, che del *Pavone*.

Il *Gallo-Pavone* salvatico della nuova Inghilterra citato dal Raio, è molto più nero di colore del volgare, e molto più grosso ancora, trovandosene ivi qualcuno, che arriva a pefare 40. e 60. libbre, secondo Ioselino, che ha descritte le rarità di tal paese. Può ridursi a variare, e a divenir si grosso per il favorevol clima di tal luogo, e per l'alimento, che vi trova; essendo certo, che anco là è stato portato d' altronde, cioè dall' Oriente, e dall' Africa.

T. CCXXIII. B. 1. 6. 2.

GALLO PAVONE, o Pollo d' India bianco con macchie nere, o sia Pollo d' India comune. — *Gallo-Pavo albus*, matulis nigris confusis, sive *Gallo-Pavo vulgaris*. — *Gallo-Parus* Gesn. & Schwen. — *Gallo-Pavus*, sive *Gallus Indicus* Frisch. — *Gallo-Pavo Aldrov.* & Ionst. — *Gallo-Pavo*, sive *Meleagris*, ♂ *Numidicus*, ♀ *Avis Willugh.* — *Gallo-Pavo*: *Gallus Indicus*: *Meleagris Charlet*. — *Meleagris vulgaris Klein*. — *Meleagris versicolor vulgaris* Barr. Ornith. — *Meleagris caudam erigens* Brown. — *Gallus Indicus vulgo*: *Meleagris Gracis*: *Gallo-Parus* Gesnero : *Pavo-Gallus Aldrovando*: aliis *Avis Lybica*, ♂ *Avis Numidica* Rzac. — *Gallo-Pavo* Linn. Syst. Nat. sp. 1. — *Meleagris*

I Polli d' India amano i luoghi caldi: tuttavia allorchè sieno fatti grandi, e si sieno affuefatti sieno tollerantissimi anco del freddo. I nati di corto sono però tanto delicati, e soggetti a restar danneggiati dall' ingiurie dei tempi, e de' luoghi, che non si posson rilevare e tenere senza impiegarvi molta attenzione,

Gallo-Pavones loca calidiora amant; frigidiora tamen postquam adoleverint, iisque assuerint baud difficulter tolerant. Pulli autem admodum sunt delicati, & tenelli, atque iniurias tempestatum obnoxii, ut non sine diligentia cura educari possint.

T. CCXXIV. B. 1. 6. 2.

GALLO PAVONE, o Gallo d' India bianco con macchie bionde. — *Gallo-Pavo albus*, fulvo maculatus.

LE uova di quest' Uccello sono di guscio afsai sodo, alcune volte del tutto bianche, ma in alcune specie, o varietà, esse sono di un colore di acquerello di terra d' ombra con macchie alquanto più scure. Ne genera al più quindici, cominciando a partorire nel mese di Marzo; e dopo di aver allevato i figli, torna a generarne altrettante, e così fa per la terza volta, e la cova di esse non dura meno di 30. giorni, almeno la naturale, e ordinaria,

OVa buius cortice sunt admodum duro, interdum omnino alba, interdum calore terreo diluto, obscurioribus maculis adspersa, quod in quibusdam buius speciei varietatibus accidere solet. Ova autem ad summum num. 15. edere solet, Martio mense illa deponere incipiendo, & pullis ab bisce exclusis, atque pennis integre obtectis, iterum ova totidem parit, totidemque bisce enatis, per textiam vicem excludere solet. Unaqueque vero incubatio, non artificiosa saltet sed naturalis, diebus tricenis perdurat.

T. CCXXV.

T. CCXXV. B. I. 5.

GALLO PAVONE, o Pollo d' India nero. — *Gallo-Pavo niger, vel nigricans.* — *Gallo-Pavonis sylvestris species, vel forte varietas?*

POSSIAMO dire con l'Aldrovando, che la carne di questi Uccelli è squisissima, e non indegna delle tavole de' gran Signori. I *Pollis d' India* molto giovani sono assai teneri, e di carne facilissima a digerirsi. A noi son portati in gran quantità dalla Romagna, e quallora son grassi, e cotti arrosto gli troviamo un saporitissimo, e delicatissime cibo; i grossi poi, o più duri di rado si vedono sulle nostre mense, almeno nelle case de' più facoltosi, sebbene molti de' nostri confinanti, e diversi de' nostri ancora, assuefatti a più ordinarie vivande, sieno soliti di mangiare giornalmente quest' animale lesso. Mangiadolo in quest' ultima maniera resta al gusto troppo dolce, meno facile a digerirsi, e capace a produrre de' flati, de' dolori intestinali, e la diarrea.

Acciocchè questa carne riesca più fana, vuole l'Aldrovando, che non s'indugi troppo ad ammazzarlo, e che gli si leghino fortemente i piedi, o se gli attacchi un peso, e si stropicci gagliardamente, e anco si batta, e questo intendasi egualmente buono, e utile per la carne di *Pavone*, e di altri; poichè mediante questa faccenda si diminuisce non poco la durezza della carne, e la tenacità delle sue fibre. Celio Apicio poi vuole, che questo Pollame si addobi con molto Pepe, e altre Droghe.

T. CCXXVI. B. I. 6. 2.

GALLO-PAVONE, o Pollo d'India nero con macchie bianche. — *Gallo-Pavo niger maculis albis conspersus.*

I *Pollis d' India*, o *Taccibini*, come da noi si chiamano volgarmente, si rilevano appunto come i *Pavoni*. Dicono alcuni, che facilmente i *Taccibini* si uniscono con i *Pavoni*, e ne nascono bellissime varietà, la qual cosa però se sia vera non sappiamo accertarla. Il Porta nella sua Magia naturale, fra gli altri, promette per immancabile, che dal *Pavone* maschio, e dal *Pollo d' India* femmina ne nasca una varietà molto bella.

T. CCXXVII. B. I. 7. 1.

GALLO PAVONE del Brasile. — *Gallo-Pavo Brasilensis Brifs. sp. 2.* — *Alector Brasilianus Klein. av. 8.*
4. — *Phasianus fuscus Brasilensis Klein. av. n. 2.* — *Phasianus Brasilensis Iacu-pena dictus Margravii Rai.*
— Iacu-pena Pif. — *Iacu-pena Brasilium Willughb.* — *Quan, fave Guan Americanis Edw. av. 13.* — *Me-*
leagris [cristata] capite pennis cretis cristato, temporibus violaceis Linn. Syst. Nat. sp. 2. — *Gall. Le Dim-*
don du Bréfil. — *Angl. The Brasilian Iacu-pema.*

QUESTO trovasi specialmente 'al Brasile. Le penne, che gli si vedono in fronte, le suol tenere abbassate, ma le alza per altro spesse vol-

Avis haec in Brasilia praecipue habitat. Penas, quas in vertice gerit, depresso ut plurimum tenet, illasque tamen in cristam saepe V fae-

Gallo-Pavonum caro in cibis laudatissima est, & Principum epulis digna. Autore Aldrovando; iuniores enim, & pulli satis teneri sunt, & coeli faciles. Ad nos e Romandiolae terris magna copia afferuntur, & affatos, cum pingues sint, in delicis, ut sapidissimos & delicatos habemus: adultores vero & seniores raro in cibis ditiores nostri admittunt, licet plurimi ex nostris finitimus, aliquique etiam apud nos vulgaribus cibis assuei; ipsos quotidie elixos in mensis expetans. Forum caro hoc pasto parata dulcior palato videtur, bona coctioni in ventriculo minus apta, & ad excitandos flatus, ventris tortina, atque diarrheas obnoxia.

Ut vero eius caro salubrior reddatur, praecepit Aldrovandus, ut tempestivius Avis inguletur, & ad pedes, quod de Pavonibus, aliisque plurimis dici aequae potest, pondera adiutiantur, vel perstringantur diutius, fricenturve, & vapulent: hoc nempe ad discutiendam earnis duritatem, & frangendam fibrarum tenacitatem plurimum facit. Apicus inde multo Pipere aliquaque aromaticis condimentis Pullos bosce præparari iubet.

volte allorchè vuole. Alcuni individui però mancano di queste lunghe penne sul vertice, o sia di questa cresta; e questi probabilmente sono femmine. Il Klein riporta un *Fagiano* scuro del Brasile, dove è chiamato *Iacu-pema*, lo dice variegato di bianco e scuro, e lo fa diverso dal *Gallo-Pavone*, o sia dal suo *A-*lettore; ma questa varietà non credo possa nascere, che dal sesso, tantopiu' che yedendosi senza la cresta ne risulta a chi l'osserva una sensibil diversità. Edward vuole, che quest' Uccello si trovi anco nell'Isole Antille.

saepius erigit. Quaedam tamen bisce longioribus in vertice pennis, sive crista omnino destituantur: fortasse foeminae bac sunt. Kleinius Phasianum suum fuscum Brasiliensem, sive lacupemam Brasiliensem, quem colore tantum fuscum & albo tintum dicit, diversum a Gallo-Pavone, sive suo Alestore facit; sed ex simplici seorsu varietatem banc ortam credo, praecipue cum crista deficiens maximam intuentibus differentiam reprobent.

In Antillis etiam Insulis obviam esse banc Avem suspicatur Edwardus.

6. **GALLO-PAVONE**, o Pollo d'India tutto bianco Ger. Ornith. = *Gallo-Pavo omnino albus*. = *Hunc cum nisi coloris differentia a vulgari Gallo-Pavone differet supprimere cum insequenti, ac ipsa de causa, non dubitavimus.*
 7. **GALLO-PAVONE** tutto biondo, o rossigno, e macchiato di bianco. Ger. Ornith. = *Gallo-Pavo roro corpore flavicans, vel rufescens, ex albo maculatus*. = *E Romandiolae Terris, in quibus huius generis Aves abunde, Caturmam aluntur, indicatas ferme omnes varietates adiectae fuere.*

+ T. CCXXVIII. B. I. 7. 2.

MITUPORANGA del Brasile. — *Mituporanga Brasiliensis* Marcgr. & Ionst. — *Mitu*, vel *Metu* alias *Species*, *Mituporanga Brasiliensis* Marcgr. Rai. & Willugh. — *Mutuporanga Pis.* — *Gallus Indicus* Sloan. *Phasianus niger atra crista eleganter complicata* Barr. Hist. — *Crax niger iride subfuscata*, croceo ventre albido Brown. — *Phasianus Crax Guianensis* Brifs. sp. 12. — *In Mexico appellatur Tepetotoli, in Jamaica Quitzao, in Africa Ano. — Crax nigra Linn. Syst. Nat. sp. 1. — Gall. Hocco de la Guiane, & de Cayenne. — Angl. Curacao-Bird.*

Il nome di *Mituporanga*, che è Brasiliano, lo abbiamo adattato a più specie di questo genere di Uccello, o per meglio dire a più varietà di questa specie, acciocchè la differenza de' nomi non facesse credere alcuni di questi Uccelli, che per poco diversificano, come diversissimi di specie e di genere. I due inoltre che si dimostrano in queste Tavole, non furono giustamente in principio denominati, e perciò non si troveranno corrispondere a nomi, che si sono qui ora dati loro. La correzione di questi nomi è stata trovata tanto più necessaria dopo avere esaminate le specie riferite dal Brisson, che qui sotto secondo il solito faranno da noi registrate. Si deve per altro confessare, che tutte queste, fuorchè la festa denominata del Perù, sono mere varietà, e che tutte convengono fra loro, poco più, o poco meno, ne' costumi, e nelle qualità della carne.

Gli Spagnuoli prendono quest' Uccello per un *Fagiano*. E' più grosso d'un *Gallo*, ed ha le penne della testa, che formano una mitra, ma tenendole egli per il solito basse non gli si vedono; irritato per altro che egli sia le solleva, siccome a suo piacimento le alza in qualche altra occasione a foglia di cresta. Se ne trova qualcuno, che ha il becco di un color rosso sbiadito, o carnicio, o anche giallo, e bianco in punta. Volentieri stà sopra qualche cosa di alto, come il *Pavone*: è Uccello poi agevole, o molto facile almeno a farsi mansuetto; e la sua carne è molto saporita.

Mituporangae nomen, quod Brasilianum est ad plures eiusdem generis Aves, sive potius eiusdem speciei varietates accommodavimus, ne nominis differentia, Aves aliquas, quae revera vix specie differunt, ut genere diversas suaderet. Duæ insuper quæ a nobis figuris traduntur perperam denominatae initio in Tabulis fuerunt, ideoque denominationibus in Historia minime respondere videbuntur. Necessaria autem nominis correctio fuit, aliis observatis speciebus a Brissonio relatis, bieque infra descriptis. Fatendum revera est omnes eiusdem species, praeter sextam Peruvianam dilatam, esse varietates, omnesque moribus iisdem plus minus, & carnis bonitate convenire.

Hanc pro Phasiano habent Hispani. Maior est Gallinaceo, & pennis quibus in capite vestitur complicatas in planissimam quasi mitellam gerit, ut nesciens vix eam possit agnoscere, quas irascens, aut alia etiam de causa pro lubitu in cristam erigere potest. Interdum rotundum habet colore rubro magis dilutum, sive incarnato, vel croceo, atque in apice albicans. Libenter in alto sedet, ut Pavo: est autem mite animal, vel saltum facile mansuetus, carnem denique admodum sapidam habet.

T. CCXXIX. B. 1. 3. 1.

MITUPORANGA Curassavica. — *Mituporanga Curassavice nobis.* — *Gallus Indicus alter Ionst.* — *Gallina Indica Aldrov. & Willugh.* — *Gallina Indica prima Ionst.* — *Alector Curassavicus Klein.* — *Phasianus Crax Curassavicus Brifs. sp. 1. 3.* — *Angl. Corazzow-Cock.* — *Gall. Phasianus le Hocco de Curassow.*

E' Naturale della Guiana, e particolarmente dell' Isola di Curaçao. E' un animale docile, e amico dell'uomo. Tirando i servitori per il ferraiuolo chiede da mangiare: trovando la porta serrata di quella stanza, nella quale pensa di entrare, picchia col becco. Trovandosi sciolto va dietro dietro al Padrone, e tornando esso di fuori lo riceve tutto allegro, e facendogli festa; si nutrisce di biade, e d'ogni specie di frumento tanto cotto in forma di pane, che altrimenti impastato, e di simili cibi. La sua carne è buona a mangiarsi, ed è grassa. Il maschio è nero di colore col basso ventre bianco, la femmina poi è bruna, colla sola prima metà del basso ventre sotto il petto bianca.

Habitat in Guiana, & praesertim in Curaçao Insula. Mite animal est, & amicum homini; cibum apprebenso domesticorum pallio exigit; pulsatque rostro clausam ianuam, ubi aliquo intrare ei opus sit. Herum autem sequitur si liberum sit, venienteque alacriter applaudensque excipit. Aliut frumentaceis frugibus, seu in massam, seu in panem coctis, aliisque similibus esculentis. Edule est, ac pingui carne praeditum. Mas corpore est nigro, imo ventre albo, Foenina vero corpore fuscō, supra ventris medietate alba.

3. **MITUPORANGA** Mitu, ovvero *Muru de' Brasiliani.* = *Mituporanga Mitu*, vel *Mutu Brasiliensis*. = *Phasianus niger rostro cinnabarinus* Barr. Hist. = *Crax niger*, crista tota atro rostro cinnabarinus Barr. Ornith. = *Crax niger corolla arra*, rostro rubro Linn. Syst. Nat. edit. 6. = *Alector Mitu*, vel *Mutu Klein.* = *Mutu Pilon. Mitu*, vel *Mutu Brasiliensis* dicta Marogr. Ionst. Willughb. & Rai. = *Phasianus Crax Brasiliensis* Brifs. sp. 11. = *Corpore est nigro, ventre fuscō, pennis versicis apice rufis reflexis & crispis.* Candam semper in latum moveat, tamque Pavonum more explicat. Oculos habet magnos nigros, & pone aures maculam curvaceam albescensem ut Gallinæ. Rostrum buinis coloris est egregie incarnati, versus apicem tamen albcat. Corporis crassitie Gallum domesticum antecellit; mansuetus facile, habitatque in Brasilie & Guiana.
4. **MITUPORANGA** del Messico, detta ivi *Pauxi.* = *Mituporanga Mexicana Pauxi dicta.* = *Pauxi vocata Avis Fernand.* = *Pauxi Nieremb.* Ionst. Willughb. Rai. & Klein. = *Gallina alia Indica Aldrov.* & Willughb. = *Gallina Indica terria Numidica dicta* Ionst. = *Phasianus Crax Mexicanus* Brifs. sp. 14. = *Gallum Gallinaceum magnitudine paullulum antecellit.* Per universum corpus pennis vestitus nigris splendentibus & ad subcaeruleum vergentibus. Tuberculum, non secus ac species a Tab. CCXXIX ostensa, ad basim rostri in fronte gerit magnum, durum, pyriforme, coloris caerulei; rostrum vero rubicundum habet. Foemina a mare aliquantulum discrepat colore. Ubi enim mas niger, ibi foemina fuscā; in ceteris mari similis.
5. **MITUPORANGA** del Messico, ivi detta *Hoactzin.* = *Mituporanga Mexicana Hoactzin vocata.* = *Hoactzin Fernand.* Nieremb. Ionst. Willughb. Rai. & Charlet. = *Phasianus Crax fuscus Mexicanus* Brifs. sp. 15. = *Magnitudine Gallo-Pavonem foemina fere adaequat.* Cristam in capite gestat concinnatam & pennis ex candido in pallidum colorem vergentibus, subitis vero nigris. In reliquo corpore colore est fulvo ad fuscum inclinante, pectore candido-luteo, aliis & cauda candido & pallenti maculatis. Pedes in bac Ave fuscī sunt, unguis nigrī, Sylvestris est, Vescitur anguibus. Vox ei est magna, & ululatum quandam reprobatur. Apparet Autumno, & inaspicata habetur ab intolis, Vivit in calidioribus regionibus, magna parte arboribus iuxta flumina confusa infide.
6. **MITUPORANGA** del Perù. = *Mituporanga Peruviana.* = *Gallina Peruviana rubra Alb.* = *An Coxoliti Fernand.* Hernand. & Rai. = *Phasianus Crax Peruvianus* Brifs. sp. 16. = *Crax [rubra] capite caerulecente* Linn. Syst. Nat. sp. 2. = *Species a Tab. CCXXIX. demonstratae meram suspicuntur varietatem Kleinius,* atque Linnacus. *Magnitudine Gallo-pavonem fere adaequat, colore est fulvo, collo supremo & capite saturate cinereis; crista vero in capite donata pennis albis, apice nigris constata.* Oculis nigris, rictibus rubis, rostro saturate cinereo, pedibus nigris. In Peruvio praesertim habitat.

T. CCXXX. B. -- 18. 1.

MELEAGRIDE, o Gallina di Guinea, detta anco *Numidica*, o *Africana*, e volgarmente Gallina di Faraone, e Gallo moro. — *Meleagris*, sive *Gallina Guinea*, & *Numidica*, sive *Africana*, vulgo *Gallina Faraonica*. — *Meleagris* Gefn. Moehr. Brifs. sp. 1. — *Meleagris vel Gallus Numidicus*, sive *Mauritanus sylvestris* Gefn. — *Gallus niger maculis ovalibus & orbicularibus* Barr. Ornith. — *Gallus clamofus maculis minoribus orbicularibus variis, crista cornea, cauda horizontali* Brown. — *Gallus, & Gallina Guineensis* Sloan. — *Gallina Guineensis* Aldrov. Ionst. Willughb. — *Gallina Guinea veterum*, *Meleagris Rai.* — *Perdix Terra novae* Mus. Worm. — *Gallina Africana*, sive *Numidica* Gefn. — *Gallina Peregrina* Alp. — *Alector Guineensis* Klein. — *Phasianus*

fauus [Meleagris] vertice calloso , temporibus caruncularis Linn. Syst. Nat. sp. 2. — Gall. La Pintade ; Poule Pintade ; Poule de la Guinee ; ♂ Perdrix des Terres Neufes. — Angl. Pintado ; Guiny-Hen ; Guinea-Hen.

E' Grande quanto una *Gallina domestica*, ma di collo più lungo, e più sottile, e per la forma del corpo simile ad una *Sterna*. La sommità del suo capo è corredata di un corpo elevato, e duro come corno, e rosseggiante di colore. Si dice, che le *Meleagridi* vivono molte insieme, che sono assai feconde, e che rilevano anco i Pulcini non propri. La femmina si distingue dal maschio per il colore delle guance, che nelle femmine è rosso, né mascalce celesticcio.

Che quest' Uccello sia veramente la *Meleagridi* degli antichi, assai convincentemente lo prova il Bellonio; Columella, e Plinio lo dissero *Uccello di Numidia*.

+ T. CCXXXI. B. -- 16. 2.

MELEAGRIDE, o *Gallina* di *Guinea*, o di *Faraone bianca*. — *Meleagris*, sive *Gallina Guinea*, vel *Numidica alba*.

LE *Meleagridi* riconoscono l'Africa per Patria, d'onde sono state trasportate. Quella di color bianco stata qui rappresentata non è che una mera varietà dell'antecedente. Questa specie d'Uccello suol partorire le uova dal mese di Maggio al Settembre, senza adoprar artifizio alcuno in formar per esse espresso nido; ma le depone per il solito in qualche massa di letame cavallino, o nella paglia, nel fieno, o sopra simili materie, e qualche volta ancora le lascia sulla nuda terra, per i campi, e lungo le pubbliche strade. Sono poi queste uova di guscio molto duro, a segno che mescolate, e battute con quelle di *Gallina*, e d'*Oca*, sempre queste ultime restan rotte da esse. Sono di color d'ombra chiaro con macchie più cupe, e uniformemente distribuite. Per il solito i nostri ne mettono insieme 30. ovvero 40. e le fanno covare da una *Gallina*, e nati che fieno i Pulcini miche.

M Eleagrides Africam ut natale solum agnoscunt, ex Africa vero in variis regiones educatae fuerunt. Candida quae hic depicta observatur mera est superioris varietas. Huius speciei Aves a mense Maii ad Septembrem, usque sua ova, absque ulla tutelae cura, atque nidi artificio deponere solent: illa enim facilius in fimi equini, vel palearum, & stipularum acervis locant, aliquando etiam supra aridam agrorum terram, secusque publicas vias relinquit. Ova autem earum cortice sunt solidissimo, ita ut cum ovis Gallinarum & Anserum intermixta, & collisa, baet facillime frangant. Colore sunt castaneo diluto obscurioribus maculis undique, atque uniformiter adspersa. Triginta & quadraginta etiam borum colligunt ex nostris nonnulli, & Gallinae forvanda submissunt, e quibus cum pulli orti fuerint, Formicarum ovis principio eos nutryunt. gli tirano avanti cibandogli con uova di Formiche.

+ T. CCXXXII. B. 1. 6. 2.

MELEAGRIDE diversa, detta *Gallina d'Egitto*. — *Meleagris altera Gallina Aegyptiaca dicta Gerin.*

Questa specie di *Meleagridi* stata detta *Gallina d'Egitto* viveva a Versaglië il 1728. nell'Uccelliera del Re. Le *Meleagridi* devonsi allevare egualmente, che le *Galline* domestiche, e lo stesso trattamento richiedono anco le loro uova, e i loro pulcini. Anzi quel metodo, che nell'Egitto si adopra per far nascente i pulcini dalle uova di *Gallina*, si può dire egualmente buono, e da mettersi in pratica per far nascente anco questi.

M Eleagris haec, Gallina Aegyptiaca dicta, in Aviaro Regio anno 1728. Versalis vivebat. Meleagrides aequae ac Gallinae domesticae educari debent, earumque ova & pulli custodiendi sunt; immo methodus, quae in Aegypto pro excludendis ex vulgarium Gallinarum ovo pullis addibetur, bisco quoque extendi potest, Te-

De-

Democrito vuole, che posto in un guscio d'uovo alquanto sterco di *Gallina* polverizzato, e attorno attorno delle piume del medesimo animale, e collocato sopra quello e queste un uovo diritto, ed in forma, che la parte acuta sia voltata in alto, e coperto indi con altro sterco, e mosso, e rivoltato ogni due o tre giorni, perchè abbia un equal calore, in capo a ventun giorno nasca l'animaletto. Dice pure, che mettendo ne' gusci d'uova dell'escremento cavallino, e asinino insieme mescolato, in capo a tre giorni vi nascono de' vermi adattatissimo cibo per i nati pulcini.

Si legge, che in alcuni paesi ponendo le uova al Sole, avendole prima coperte di sottilissima piuma, nascano pure da esse dopo il determinato solito tempo i pulcini. Noi frattanto, mediante l'esperienze fatte, siamo certi, che nascono mettendo le uova nel letame di cavallo, che sia in fermentazione. Plinio ci aveva assicurati, che le uova situate nella paglia, ed esposte all'azione di un fuoco continuato, e debitamente rivoltate, felicemente nascevano. Una maniera tuttavolta più sicura, ad esempio degli Egiziani, molti anni sono fu sperimentata qui in Firenze alla Corte de' nostri Granduchi, e dipoi fu ripetuta a Livorno con ottimo successo dal Governatore allora di quel Porto il Marchese Carlo Ginori, la quale consisteva nel tener calde le uova in un Forno ordinario da Pane. La notizia di questo metodo venne a noi certamente dall'Egitto, o dalla Barberia, ne' quali luoghi una tal arte si praticava, e dove per l'esclusione de' pulcini dalle uova si risparmiavano le *Galline*. Modernamente poi il Sig. De Reaumur ha composto un trattato tutto su questo proposito, stampato a Parigi, al quale si rimettono tutti quelli, che intorno a questa cosa desiderano più circostanziate notizie.

Se mai a norma degli Egiziani volessimo far covare, e far nascere le uova, bisogna prendere una gran quantità di esse, accomodarle in alcune paniere, tramezzarle con finissime piume, in maniera che non si tocchino, e ricuoprile ancora, se così piace, con della pollina, acciò il calore sia più facilmente ad esse tramandato, e conservato, e così aggiustate metterle in un Forno d'ordinaria struttura, essendo però necessario fino al ventesimo primo giorno, nel qual tempo fogliono, con rompere il guscio, nascere i pulcini, riscaldar di bel nuovo ogni giorno il Forno. Per quel tempo che si spende a riscaldare in tutte queste volte il Forno, le uova devono serbarsi in un qualche vicino stanzino ben custodite, e coperte

Testatur Democritus, quod si Gallinacei excrementi portio in pulverem redacta in ovi medio cortice, ante infra tenuissimas plumas locato reponatur, indeque supra ipsum Gallinacei ovum erectum ita apretur, ut angustior eius pars in altum respiciat, ac novo undequaque superaddito fino Gallinaceo, ut aequaliter vivificandum ovum foveatur, eademque bac de causa si secundo vel tertio quoque die manibus removetur, intra vigesimam primam diem animal sive pullus orietur. Afferit insuper quod si in coriis ovorum Equi vel Asini finis bene mixtus reponatur, trium dierum spatio vermiculos enasci, qui pullis inde exortis apertissimum praebent alimentum.

Diversis ex Auctorum colligimus libris Gallinarum ova in nonnullis regionibus, scilicet valde Orientalibus vel Meridionalibus, exiliissima tantum involuca pluma, & Solaribus radiis exposita intra supra indicatum dierum spatium felicissime excludi. Nos autem experientia duce ceris sumus ab ovis in fumum equinum effervescentiam concipientem immisso pullos oriri posse. Affirmat verum Plinius ova pariter supra paleas deposita, atque ignis perenni actioni dia exposita, & revoluta feliciter germinare. Modum tamen facilorem, tutoremque, Aegyptiorum exemplo, multis ab bīc annis bī Florentiae in Aula Magni Duci expertus est aliquis, indeque Liburni experientiam ipsam optimo cum successu illius Portus quondam Gubernator Marcellio Carolus Ginori egressus est, iteravitque: qui modus in calefaciēndis ovis pistorii furni ope consistit, atque ex voto succedit.

Mos bic ab Aegypto, & Mauritania, aliisque Meridionalibus plagiis, in quibus incolae ea uruntur methodo, & Gallinarum auxilio pro exclusione pullis parcere solent, ad nos certo certius pervenit. Celeberrimus inde Dom. De Reaumur librum integrum circa hanc methodum Parisis edidit, quem curiosis, ac plura de bac rescri cupientibus consulendum relinquimus. Si Aegyptiaca norma ova calefacere & fovere voluerimus, illa oportet magno numero, vimineis in cistis prius accommodata, & tenuissima pluma circumdata, ne invicem se tangant, atque si placet Gallinacei steroris pulvere conspersa ad calorem melius conciliandum ac retinendum, in vulgaris structuræ Furnum immittere, singulique diebus Furnum de novo calefacere, donec vigesima prima dies pervenerit, in qua ex fraga ovorum crusta pulli omnes emergere solent. Tempore autem quo Furnus novo igne fovetur, in tepido repositorio vel cubiculo ovorum cistæ, cu-

te con de' panni. A motivo di un minor incomodo, e di un utile anco maggiore si può costruire per tal faccenda un Fornello di lastra di ferro, o di rame, nel quale accorciate egualmente, che negli altri le uova si potrà produrre il necessario grado di calore a forza di lampadi accese.

In hoc etiam Meleagridis genere varietates aliquas dari, nemo inficias ibit. Ab Albino T. II. pag. 24. depingitur Meleagridis species sub nomine Gallinae Guineensis, quae pectora est candida, in reliquis vero ut nostra Tabulae. CCXXX. Hanc ipsam describit Briffoni T. I. pag. 180. appellatque Meleagridem pectora albo, quam ex Iamaica accepisse dicit. Maregravius alias vidis e Sierra Lyona aduenitus, quarum collum circumligatum, seu circumvolutum erat linctamine quasi membranaceo coloris cinerei caerulecentis. Caput regebatur crista obrotundata multiplici, pennis eleganter nigris constante. Punctula albicantha, quae per solum corporis ambitum distributa observabantur, quasi umbra subalba variegabantur.

T. CCXXXIII. B. - 18. -

GALLO di Monte minore, e volgarmente detto Gallo alpestre; Fagiano alpestre, e Fagiano nero. — *Lagopus; Urogallus minor Klein. — Tetra, seu Urogallus minor Rai. — Urogallus minor Aldrov. lonst. Charleth. — Tetra minor Frisch. — Tetras minor, seu Urogallus minor Aldrovandi; Grygallus minor; Tetras; Phasianus montanus; Gallus Betularum Rzac. Aut. Hist. — Tetras Nemestano; Erythroraon Plinio; Grygallus Aldrovandi & Gesnero: aliis Urogallus minor, Tetra minor Rzac. Hist. — Urogallus minor Brifs. sp. 2. — Tetra [Tetris] pedibus hirsutis, crux bifurcata remigibus secundariis basim versus albus Linn. Syst. Nat. sp. 2. — Gall. Le Coq de Bruyeres a queue fourchue. — Angl. The Black game, or Grouse, called by Turner the more-Hen,*

E Senza dubbio della famiglia Gallinacea, sebbene sia silvestre, e conviene in molte cose con il Gallo alpestre maggiore, descritto e rappresentato alla Tav. CCXXXVI. e dopo di esso tra le specie salvatiche è il più grosso. Il rappresentato in questa Tavola fu portato d'Inghilterra, e trovasi tra le rupi de' più alti monti delle parti Settentrionali dell'Inghilterra, della Scozia, e ne' monti anco degli Svizzeri. Assai di rado si prende vivo, ma si piglia con il laccio, o coll' archibugio. Quando sia preso con il laccio, tosto si dibatte, e si stringe tanto la legatura di esso addosso, che presto muore, e si trova pendente e strangolato, come un malfattore alla forca.

Si trovano de' Cani così addestrati a questa specie di caccia, che perseguitano quest'Uccello fin tanto che non lo abbiano stracciato, e ridotto sopra di un albero, dove lo puntano, e lo tengon fermo, e intimorito, fin tanto che sopraggiunto il Cacciatore ivi chiamato dall' abbaiare che fanno, non sia restato uc-

Ex Gallinaceo genere est sine dubio, licet sylvestris sit, multaque cum Urogallo maiore infra descripto, & sub Tab. CCXXXVI. depicto communia habet, atque post ipsum inter sylvestres Gallinas maximus est. Hic noster ex Anglia delatus fuit, habitatque in montium altiorum latebris Regionum Angliae & Scotiae Septentrionalium, & in Alpibus etiam Helvetiis. Raro vivus capit, sed laqueo, vel scolopari ita interficitur. Laqueo, collo ita exagitate & adstricto, semper suffocatur, & infaratur dependet.

Canes nonnulli ita ad venationem hanc ita instituti inveniantur, qui eundem insequuntur usque ad arborem, supra quam se Avis reduxit; ibidem autem Canis firmiter stat, Avem observando, illamque timore deprimendo, atque simul Herum latratu commonefaciendo, donec Aucupe illuc adducto Avis interempta fuerit.

T. CCXXXIV. B. - 17. -

GALLO di monte minore, femmina. — *Tetra sive Urogallus minor, foemina, — Tetra minor foemina, seu Bruyeres femelle, — Angl. Great-Hen.*

IL Celebre Conrado Gesnero, seguitato poi dall' Aldrovando, essendo stato d' opinione, che in veruno animale la semmina potesse aver

Cum clarissimus vir Conradus Gesnerus, quem Aldrovandus etiam sequitur, in nullo animalium genere foeminam mari colorum varietate, la

la preferenza sul maschio nella varietà e bellezza de' colori, restò ingannato ne due Galli di monte, cioè a dire nel maggiore, e nel minore, avendo stimato specie diverse quelle che non erano altro che sole diversità di sesso; dimodochè di sole due specie egli ne fece quattro. Gallo di monte maggiore maschio lo disse *Urogallo maggiore*; la femmina *Grigallo maggiore*. L' Urogallo minore maschio *Urogallo minore*; e la femmina *Grigallo minore*.

*& pulchritudine anteire crediderit, praesumpta
bac opinione deceptus in utroque Urogallo, seu
Tetraone, maiore scilicet & minore diversum
sexum pro diversa specie habuit, adeoque ex
duabus speciebus quatuor fecit: nimurum ex
Urogallo maiore mare Urogallum maiorem
fecit, ex foemina Grygallum maiorem; ex U-
rogallo vero minore mare Urogallum minorem,
ex foemina Grygallum minorem.*

T. CCXXXV. B. - 18. I. 1.

GALLO di monte della specie minore diverso; Ger. Ornith. — *Tetrao, sive Urogallus minor alter.* Ger. Ornith.

FU questo mandato al nostro Sig. Marchese Gerini dalle Montagne del Veronese. Queste specie d' Uccelli amano i boschi ombrosi e nascondigli, perciò stanno nelle grotte, e nascondigli più alpestri, o nelle più montuose e dense selve, e soltanto escono, e volano a prati, e ne' seminati, per ragione di procacciarsi il vitto, ma da questi ultimi luoghi tosto, e con grandissima velocità trapassano.

*Hic ex montibus Veronensis ad Marchionem
Gerini missus fuit. Huius generis Aves
densa & opaca loca petunt, ideo saepe in late-
bris montium, & cuniculis, vel densissimis syl-
vis degunt, e quibus cibum captandi causa in-
sata, & foenilia tantum exent, callidissime-
que postrema bac loca excurrunt.*

T. CCXXXVI. B. I. 10. —

GALLO di monte, o alpestre, o di montagna, maggiore detto anco Fagiano nero, e Fagiano alpestre; propriamente Urogallo; e volgarmente Cedrone maschio, o Gallo cedrone. — *Urogallus, sive Tetrao maior;* mas Gesn. Aldrov. & Willugh. — *Urogallus maior* Ionft. & Schwenck. — *Urogallus maior;* *Tetraon* Plinii, *Gallus Alpinus* O' *Uragen dictus* Charlet. — *Tetrix Aristorensis* Ionft. & Charlet. — *Perdix longicauda;* *Lagopus nigricans, maculis cinereis* Barr. Ornith. — *Lagopus maximus* Klein. — *Urogallus maior* Brüs. sp. 1. — *Tetrao (Urogallus) pedibus hirsutis, rectricibus exterioribus subtraversoribus, axillis albis* Linn. Syst. Nat. sp. 1. — Gall. *Le Cog de Bruyeres, ou Cog de Limage*, O' *Faisan bruyant*. — Angl. *Cock of the Wood; or of the Mountain; Mountain-Cock*.

COME le altre specie di questo genere abita nelle altissime rupi, o piuttosto nelle selve più alpestri, e trovasi nella Germania, e in altri Paesi del Nort. Di questa specie se ne trova in qualche abbondanza nella boschia di Tangermunda, nell' alto Brandenburghe, e ne' boschi della Westfalia. Per testimonianza di Linneo se ne trova pure in Svezia, e per lo più nelle folte macchie de' luoghi paludosif tra i Pini, e gli Abeti. Per asserzione dell' Ionfton se ne trova di quelli, che pesano 23. libbre Italiane. Vogliono, che la carne di questo volatile sia d' un sapore sì buono, che niente ceda al Fagiano, e che sembri unicamente prodotta per le mense de' Sovrani.

L' intemperantissimo Calligola al riserir di Svetonio, comandò che nel Tempio, e avanti il suo simulacro, fossero sacrificati di questi Uccelli.

T. CCXXXVII. B. I. 3. —

GALLO di monte maggiore, o Urogallo, femmina. — *Urogallus, sive Tetrao maior, foemina.* — *Grygallus maior*

*UT reliquae buius generis varietates versatur
bic in altissimis montium ipsis, aut altissi-
mis potius sylvis, & Germaniam, aliaque fri-
gidissima & Septentrionalia loca amat. Horum
principice copia est in sylva, quae a Tanger-
a fluvio nomen habet in veteri Marchia, & in
Westphaliae sylvis. In Svecia etiam teste Lin-
naeo reperitur, habitatque in sylvis caespitosis
paludum inter Pinos & Abies. Teste Ionfto-
no reperiuntur buius species nonnulli, qui li-
bras viginti tres Italicas pendunt. Carnem bu-
ius tam grati saporis esse dicunt, ut ne Pba-
siano quidem cedat, & Principum mensis tan-
tummodo nata videatur,*

*Avem hanc voluptuosissimus Caligula sibi
in Templo immolari voluit numini proprio, ut
Svetonius tradit.*

major Gefn. & Ionst. — *Urogallina major* Schwenck. — *Teras Nemeianus Poene*, seu *Grygallus major* Aldrov. — Gall. *Poule de Limoges*, ou de Bruyeres; *Faisan Bruyans femelle*. — Angl. *Mountain-Hen*.

6. **GALLO** di monte della specie minore inferiormente punteggiato di bianco, detto di Scozia. = *Aliud Galli sylvestris* genus Gefn. = *Gallus Scoticus sylvestris* Aldrov. = *Urogallus minor punctatus* Bris. sp. 2. variet. A. = *Tetrao [hybridus]* cauda bifurca subraro albo punctata Linn. F. Svec. edit. alt. 1761. = *Mas* ♂ foemina *bis* species marem Tab. CCXXXIII. ♂ foeminae Tab. CCXXXIV. assimilantur: in eo tantum ab iis differt, quod mas, collo, pectore, aliis, erubescere punctis rubicundis aspersus sit, ♂ foemina leucophaea maculis nigrit varia. *Mas* ♂ foemina subtus maculis quibusdam albi variegantur. Habitans in *sylvis* *Sveciae* & *Scotiae*. Linnaeus speciem hanc hybridam dicit, scilicet ex *Tetrao* *Urogallo*, Tab. CCXXVI. ♂ *Tetrao*-*ne* *Tetrico* Tab. CCXXXIII. natam. Cauda infrastruitur bifurca.
7. **GALLO** di monte della specie minore, di coda lunga, del Canada. = *Tetrao*, sive *Urogallus minor*, cauda longior, *Canadensis*. = *Urogallus minor* cauda longior *Canadensis* Edw. cum optima icone foeminae Tom. III. Tab. 117. = *Tetrao [Phasianellus]* pedibus bisutis, cauda cuneiformi, restricibus tribus lateribus albis Linn. Syst. Nat. sp. 5.
8. **GALLO** di monte nereggiante con macchie bianche specialmente dall' una e l'altra parte dell' occhio. = *Lagopus* & *fusco* ♂ albo in inferiore corporis parte, & *fusco* ♂ nigro in superiori, ad oculos duabus lineis albis variis Klein. = *Tetrao [Canadensis]* pedibus bisutis, restricibus nigrit apice fulvis, lituris duabus albis ad oculos Linn. Syst. Nat. sp. 3. = *Urogallus maculatus* *Canadensis* Edw. Tom. III. Tab. 118. cum optima icone maris; Tom. vero II. Tab. 71. foeminae. = Foemina dicitur a Brissonio Bonasa Freti Hudsonis sp. 6. = *Mas* vero crassissime hanc paullulum superat, ac coloribus nonnihil discrepat; colore enim magis diluto, vel castaneo superne distinguuntur, atque gula lutescens donatur, quae partes in mare nigricantes sunt. Alise autem nonnullae species ad *Lagopum* referuntur.

T. CCXXXVIII. B. — 12. 1.

RONCASO, altrimenti Lagopo, detto volgarmente Francolino di monte. — *Lagopus*; *alii Attagen*, vel *Francolinus montanus*. — *Lagopus altera* Plini, Willugh. Rai. Sibbald. Klein. — *Attagen* Gefn. Aldrov. Bell. Frisch. — *Attagen*; *Perdix Asclepica* quibusdam Ionst. — *Attagen minor*; *Perdix Asclepica minor* Charl. — *Attagen* Bris. sp. 9. — Gall. *Cog de mairis*; *Francolin*; *La Gelinote hupé*. — Angl. *Red Game*; *Grey Game*; *Gor-Cock*; *Moar-Cock*.

Tanto questa specie, che l'altra della Tav. CCXLI. o sia la prima del T. III. si dicono volgarmente *Francolini*, quasi *Franci*, o vogliamo dire liberi, e immuni; poichè da' Principi è stato vietato al comune degli uomini il potergli ammazzare.

La femmina differisce dal maschio per esser d'un color rosiccio più sfondo, e in tutto il corpo spruzzata di macchie bianche. Questa specie appunto non so che trovai appresso di noi, essendo piuttosto particolare delle Regioni più fredde. Trovati in più parti della Germania, nella Francia, particolarmente nell' Overna, su i Pirenei, e in Inghilterra, particolarmente negli altissimi monti della Provincia di Yorek, e del Principato di Galles:

La carne di quest' Uccello è oltremodo stimata, facile a digerirsi, molto nutritiva, e sana, onde tanto dagli antichi, che da' moderni è stata considerata tra i cibi di maggior pregio. Tutto quel di più, che si potrebbe aggiungere di questo volatile, si vedrà riportato sotto la citata Tav. CCXLI. dove si troverà una specie d' Uccello, che assai poco differisce da questo, e che per le nostre notizie varietà pure si troverà più sotto al num. 4.

Species haec, nec non alia sub Tab. CCXLI. sive prima Tomi III. Francolini a nostris distent sunt, quasi Franci, idest liberi, seu immunes, quod nempe vulgaribus eas venari interdictum, & libertas vivendi a Principibus concessa sis sit.

*Foemina a mare discrepat in eo, quod rufo dilutiore tingatur, & maculis albis in universo corpore si variegata. Hac peculiariter specie Etruriam carere credo, cum revera Francolinus bic *Lagopus* dicitur, *Septentrionalis*, ac frigidissima incolat loca. Reperitur certe in Gallia, praesertim in *Arvernensisibus montibus*, & *Pyraeneis*, nec non in *Angliae altissimis montibus Eboracensis*, & *Cambro Britanicis*.*

Caro huius Avis laudatissima est, facilis concoctionis, nutrimenti multis, & opimi, unde primum dignitatis gradum, tum apud veteres, tum apud recentiores obtinuit. Reliqua, quae de bac Ave dici possunt, sub indicata Tab. CCXLI. relata sunt, ibidemque videantur, cum minimum inter se differentia haec Aves, ipsaque ferme, quo ad nostram norisitiam, obtineant qualitates. Varietas etiam alia videbitur infra sub num 4.

affai nelle qualità conviene con questo. Altra

T. CCXXXIX. B. - 12. -

RONCASO, o **LAGOPO**, detto altrimenti Pernice alpestris, e volgarmente Otorno, — *Lagopus vulgaris*, sive *Lagopus varia*. — *Lagopus varia* Gfn. — *Lagopus simpliciter* Klein. — *Lagopus Avis* Aldrov. Willugh. Rai. & Sibbald. — Terra [*Lagopus*] pedibus latis, remigibus albis, remicibus nigris apice albis, intermedii toris abis Linn. Syst. Nat. sp. 4. — Gal. *La Gelinote*.

Varia quest' Uccello nella grandezza, e nel colore, come più distintamente s'intenderà da quanto vien riportato sotto la Tavola susseguente. Sempre più piccolo trovasi nelle Alpi più fredde, e settentrionali, come infra le altre sono quelle della Lapponia, dove si ciba particolarmente di foglie e cime della Betula nana. Il Klein riporta l'anatomia di quest' Uccello stata data dal Robergo. Nel ventricolo di esso furono anco trovati non pochi sassuoli. Il maschio si distingue in Estate per esser più rossiccio di colore, e dall'alzare, secondo il Klein, le penne posteriori del capo in forma di ciuffo, o di cresta. Per questa ragione adunque il presente potrebbe essere Tavola antecedente il maschio,

Variat magnitudine, & colore, ut ab insquenis Tabulae illustratione uberior intelligenus. In frigidioribus & ad Septentrionem positis Alpibus, ut Lapponiae inter alias sunt, longe minor observatur, ibidemque vicitat praeferit foliis, atque summitatibus Betulae nanae. Kleinius anatomen babet buius Avis a Robergo relatam. In buius ventriculo plurimi lapilli reperti fuerunt. Mas in Aestate distinguitur colore magis rufescente, atque capitis pennis posterioribus, quas in crista formam referente Kleinio erigere solet. Haec de cassa Lagopus, qui bic conspicitur, foemina forte est aestivalis & pennis vestita, Tabulae vero superioris mas.

la femmina veduta di Estate, e quello della

T. CCXL. B. - 12. -

RONCASO, o **LAGOPO** bianco; altrimenti Pernice bianca di montagna. — *Lagopus alba*, sive *Perdix alba*, sive *Lagopus Charlet*. — *Perdix alba*, seu *Perdix petrofa*, *Lagopus dicta* Rzac. — *Artago candida* Bell. — *Lagopus Brifs.* sp. 12. — Gall. *La Gelinote blanche*; *Perdris*, ou *Perdris blanche*. Angl. *The white, and rough-footed Partridge*.

Lagopo fu chiamato quest' Uccello dalla parola Greca, che significa piede di Lepre, per avere i piedi simili ad essa, o come essa pelosi; e Pernice di montagna, dal ritrovarsi ne' luoghi alpestri. In Inverno è il Roncaso tanto bianco, che da' Cacciatori non si distingue sulla neve per altro, che dalla prominenza del suo corpo. Ama tanto il freddo, la neve, e il ghiaccio, che abbandona quei luoghi de' monti, dove le nevi si fogliono squagliare più presto, e si ritira in quelli, che sono a tramontana, e dove la neve, e il ghiaccio vi suole star tutto l'anno. Nell'Estate diventa di color bianco variato di scuro, o gialliccio, come si vede nella specie o varietà riportata dall' Edward, o si vede variegato di color castagno cupo, e di nero, come sono i da noi antecedentemente dimostrati. Quello dell' Edward differisce da tutti gli altri per avere i sopraccigli carnosì, rossi, e assai più rilevati e larghi, ed è probabilmente femmina. Trovasi questo genere di volatile nelle Regioni più fredde, come nella Lapponia, in Germania, negli Svizzeri, nella Savoia, e in alcuni quelli del Veronese. I maschi distinguonsi dalle femmine per una striscia nera, che dalla base della parte superiore del becco si stende sopra gli occhi verso le orecchie, la quale striscia ne' manca totalmente nelle femmine.

Lagopus a pedibus Leporinis, sive villosis, dictus fuit; Perdix vero petrosa, quia in rupibus nidulatur. Tanti est candoris tempestate bynnali, ut a venatoribus hoc solo, quod nives superet, visu deprebendatur. Frigore, nive, & glacie ita delectatur, ut loca montium inferiora ubi liquantur nives facile relinquit, & soli aversa, niveque magis obducta loca prosequatur, in quibus nix, glaciesque perennant. Aestate ex albo & fusco, vel flavicante variegata coloribus, ut ab Edwardo in sua Fretri Hudsonis specie, vel potius varietate, videtur est; vel castaneo saturo & nigro, ut in antecedentibus nostris observatur. Qui ab Edwardo pingitur membrana carne rubra supra oculis altiore, ac latiore, praे reliquis bumin generis donatur, & foemina creditur. Habitat Lagopus in Septentrionalibus præcipue regionibus, ut in Lapponia, Germania, Rhaetia, Sabaudia, & aliquibus Italiae altissimis montibus, ut Vorenenses sunt. In mariibus a superiori rostri mandibula ductus niger ultra oculos versus aures extenditur, qui in foeminis deest.

Questi Uccelli per la squisitezza della loro carne si voglion dire quasi universalmente Pernisi bianche; siccome poi vivono nelle Alpi quasi tutto l'anno coperte di neve, perciò la provida natura, in difesa di tanta asprezza di freddo, ha loro concesso i piedi rivestiti di lanugine, e di piuma.

Aves hac propter carnis praestantiam Perdices albae communiter appellantur. Cum autem in Alpibus maximam anni partem nivibus obstructis degant, provida ideo natura adversus frigoris asperitatem denso lanuginis & plumarum tegmine earum pedes munivit.

4. RONCASO, o LAGOPO della specie più comuni, detto anco Bonasa, e volgarmente Fagianella, Francolino, o Pernice alpestre. = *Lagopus Corylorum* Klein. = *Bonasa* Linn. Syst. Nat. edit. 6. = *Gallina Corylorum*, seu *Bonasa* Alberto dicta Geln. = *Gallina Corylorum* Aldrovand. Willugh. = *Attragen*; *Gallina rustica*; *Gallina Corylorum*; *Perdix montana*; *Perdix sylvestris* Rz. *Bonasa* Brifs. sp. 3. = *Tetrao* [*Bonasa*] pedibus bistris, rectricibus cinereis pennis nigris, fascia nigra, exceptis intermediis duabus Linn. Syst. Nat. sp. 7. = In Germania & circa Alpes inventus, atque crassissime Perdicem graciam circiter adaequat. Haec propria species dicenda videtur, quae vero sub Tab. CCXXXVIII. & cristata observatur, varietas huius.
5. RONCASO, o LAGOPO, detto de' Pirinci, e Pernice Damascena. = *Lagopus Pyrenaeicus*, sive *Perdix Damascena* quorundam. = *Lagopus altera* Ionst. = *Lagopus altera*; *Perdix Damascena* Bellon. Aldrov. = *Perdix Damascena* Bellonii, quam Aldrovandus *Lagopodem alteram* Plini exsistat Willugh. & Raii. = *Perdix lutea*, maculis castaneis, cauda dusibus pennis nigris longissimis terminata Barr. Ornith. = *Perdix Alcata*, seu *Filacotona* Aldrov. Klein. n. 5. = *Alchata* Geln. = *Alchata*, sive *Filacotona Arabum* Aldrov. & Ionst. = *Alchata*, sive *Filacotona* Aldrov. Charl. = *Oenas Aristoteli*; *Lagopus Bonasa Pyrenaea* Brifs. sp. 4. cum optima icon. = *Gazæ Vinago* Geln. = Perdicem cinereum crassissime circiter aquat, olivaceo, flavicante, nigro, & rufo varia; ventre albo, torque duplice nigro; rectricibus duabus intermediis longissimis, apice striatioribus; rostro ac pedibus cinereis, unguibus nigris. Digihi in hac Avis appendices squamoas brevissimas obinent, & pedes in parte anteriore tantum brevissimis pennis albis vestiuntur. Varietates dantur plus minus coloribus variegatae, nigro, & saturate cinereo transversim striatae, atque triplici torque nigro praeditae. Habitat bac Avis species in Syria, Arabia, atque Pyreneis montibus. *Alchata* nomen est Arabicum, ubi bac Avis frequens est tellus Kleinio; *Montpessulanus* Angeli nomine venit a plumarum pulchritudine.
6. RONCASO, o LAGOPO di Scozia. *Lagopus Scoticus*. = *Gallus palustris* Gesln. Aldrov. & Ionst. = *Bonasa Scotica*, sive *Lagopus Bonasa Scotica* Brifs. sp. 5. apud quem optima extat figura. = Perdicem Graciam crassissime superatas, rufo & nigricante transversim striata; remigibus maioribus fuscis, rectricibus quatuor utrinque extimus nigricantibus; rostro nigricante; pedibus griseis ad exortum usque digitorum pennis vestitis cinereo-fuscis, digitis, atque unguibus griseis, rostro nigro. Foemina mari magnitudine & crassitate cedit, atque superne rufo admixta, & rostro fuso distinguitur.
7. RONCASO, o LAGOPO del Canada. = *Lagopus Canadensis*. = *Lagopus Bonasa Canadensis* Brifs. sp. 7. cum optimis maris, at foeminae figuris. = Perditis Graecae paullulum crassissime cedit, superne ex nigricante & cinereo fuso transversim striata, remigibus maioribus fuscis, exterior cinerascente variis; pedibus ad exortum usque digitorum pennis vestitis cinereo-fuscis, digitis, atque unguibus griseis, rostro nigro. Foemina mari magnitudine & crassitate cedit, atque superne rufo admixta, & rostro fuso distinguitur.
8. RONCASO, o LAGOPO maggiore del Canada. *Lagopus Canadensis major*. = *Lagopus Bonasa major Canadensis* Brifs. sp. 8. cum accurata icon. = Perdicem Graciam crassissime paullulum antecellit, superne ex fuso, rufo, nigro, & cinereo, fordo albo admixta varia; fasciculis pennarum nigrarum longiorum summis aliis incumbentibus; remigibus maioribus fuscis, exterior fordo albo variis; pedibus pennis griseo-fuscis vestitis; rostro, digitis, atque unguibus fuscis.
9. RONCASO, o LAGOPO d' America con doppio ciuffo dietro il capo. = *Lagopus Americanus* a tergo collis duplister crassatus. *Lagopus*, sive *Urogallus minor Americanus*, fuscus, in cervice plumis alas imitantibus Klein. n. 7. & Catesb. cum accurata icon. *Lagopus Attragen Americanus* Brifs. sp. 10. = *Terrao* (*Cupido*) pedibus bistris, aliis succenturiatis cervicalibus Linn. Syst. Nat. sp. 6. = Crassissime circiter pars Perdicem superata; fuso rufescens, lineis nigris & albicantibus transversim striatis; remigibus maioribus nigricantibus, exterior rufescente maculatis; rectricibus subratis nigris; rostro fuso, digitis flavis; pedes aurei ad exortum usque digitorum pennis pariter flavis vestiuntur. Quod autem in hac Avis maxime singulariter est, quodque ab aliis omnibus non eam praecepit distinguit, sunt duo pennarum fasciculi tres pollices longi parvulas alas satis bene imitantes in parte collis superiori, prope caput, utrinque strii, & ad libitum Avis mobiles; Hos ferre semper secundum collis longitudinem extensos gerit, illosque non erigit, nisi dum perturbatur. Uniusquisque fasciculis quinque constat pennis, aliae aliis incumbentes ad instar remigum, quaque gradatim longitudo minuitur, longiore penna introrsum sita. Habitat in America. Foemina istis carens pennarum fasciculis; in aliis omnibus mari similis.
10. RONCASO, o LAGOPO col ciuffo di Pensilvania. = *Lagopus cristatus Pensylvanicus*. = *Lagopus Attragen Pensylvanicus* Brifs. sp. 11. = Crassissime Phasiano cedit, Perdicem antecellit, superne fuso & nigro variegatus, cinereis; rostro colore ex corneo fuso; pedibus plumeis albis pilorum aemulis vestitis ad digitos usque colore carneo similes. In summa capite pennis gerit ceteris longiores, quibus dum eas erigit Avis, crista efficitur; pars pariter collis superioris pennis tegitur longioribus, quas more Gallorum erigit quandoque, & tunc sor quem quadammodo efformant.

FINIS TOMI SECUNDI.

5174 19

Pappagallo col capo giallo e rosso — Pittacus luteo ac rubro capite.



A Sua Emin: il Sig: Card: Diacono di S: Chiesa, del Tit: di S: Ma: Martire, Principe Dom: Orsi
d'Aragona, Duca di Gravina, Sig: della Citt: di Muro, e delle Terre di Solofra, Pallata, Poggiosino, Foresta,
Roccanarga ec: Cav: del L'Ord: di S: Gennaro Gra: di Spagna di pr: Alba, Patri: Rom: Veneto, Napoli, Port: de:
dei Regni delle due Sicilie appo la S: Sede Ministro Genip: di Sua M: Sicil: alla Corte di Rom: ec.

Cmvt

Pappagallo giallo, nelle ale, e nella coda verdeggianti. — *Pittaui flavius alis et cauda viridis centibus.*

cxxxii.



All Ill: Sig: Abate Domenico Augusto Braxi Socio della Reale Società degli
Antiquarj di Londra, Accademico d'onore di Bologna &c.

cmr

Pappagallo minore, o Parruchetto verde, con il collare, o collana. — Pittau, *Pittaala viridis torquata dictus*.
CXXIII.



Al Bendmo P. Don Massimiliano Fresnel Dotti di S. Teologia, Exgenerale della Congregazione di Vallombrosa, e Abate nel Monastero della SS. Trinità in Firenze.

Cmr

Pappagallo d' Parruchetto, con collana, di capo, e petto vinato. cxxiv.
Pitta ualididus; torquatus;
capite, et pede vinaceo.



Al Molto Renido Sig^r Francesco Zopoli Cappellano delle LLAA. LL in Toscana.

Cmrs

91

Pappagallo, d' Parruccheto d' America, tutto verde, di coda lunga. l^o XXXV.

Pithecus *Pittaacula*
Americana dictus, totus viridis, macrourus.



Al Molto Eccell. Sig: Frano Rederini Maestro di Chirurgia nel Regio Spedale
di S. M. Nuova di Firenze.

Cmr

Pappagallo d' Parruchetto verde sauro, con la fronte rossiccia. — *Pittaev Pittaev ex fuso
viridi, fronte rubescente dictu.*

CXXVI



All'Eccell^{mo} Sig^r Dottore Sebastiano Pauli Medico Fisioco di Lucca

cmr

CXXVII

Pappagallo minore, o Parruchetto con la sommità del capo blù, e la fronte gialla. — *Pittacus*,
Pittaule dictus, vertice caeruleo, fronte lutea.



Al Mollo Pendò Don Gio. Batista Rota Patrizio Veneto, e Priore Capinense.

cmr

Pappagallo d' Parruchetto nero del Madagascar. — *Pittaau Pittauula nigra Madagascariensis* ^{CXXVIII.}



All'Ill. Sig^r Stefano de Lottinger Convigliere di S.M.I.e Regia. Apot. nel Consiglio Supremo di Milano.

Cmr

Pappagallo minore, o Parruchetto dell'Indie Orientali col capo turchino, *Pittaicus minor, sive Pittacula
Orientalis, capite ex caeruleo violaceo.*



All'Ecc^{mo} Sig^r Dott^r Ortenio Sutellari Accademio Fiorentino.

OSR

Pappagallo minore, o sia Parruccheto dell' Isola di Luiom.^{XXX.}, *Pittaui minor, sive Pittacula Luiomensis.*



All' Ill^{mo} Sig^r Francesco Bonviri Senatore, e Patrizio Lucchese

cmr

Pappagallo, d' Parruchetto, col ciaffo, del Messico. — Pittau, *Pittaau, Pittacula Mexicana cristata didus.*

c XXXI.



All' Ill. Sig: Giuseppe Antonio del Sacro Rom: Imp: Conte di Strasoldo
Graffenberg et Ciambraio delle LL: MM: II: QQ: Apost: cc.

cmv

Pappagallo minore, o sia Parruchetto col capo rosso del Regno di Gingi. — *Pittaui minor*
vel *Pittacula Gringiniana erythracephala*.

c XXXII



All Ill^{mo} Sig^o Filippo Grigno Segret^o Regio d' Ambasciata della Sua Religione Generolimut^o appo la S^a Citt.

cmr

Pappagallo piccolissimo con la fronte e gola rosa. — *Pittaetus minimus fronte et gula rubris.*

cxxxiii.



A Sua Eccell. il Sig:° Conte Filippo Guicciardi Ciamberlano attuale Tenente Marciallo e
Comandante di Cremona al Servizio di Sua M:° R:° Reale, e Apostolica cc.

cmw

Pappagallo piuolissimo con la fronte, e groppa rosa, — *Lataus minimus fronte ac dorso inferiore rubris.*



All'Eccell. Sig^{re} Bernardino Pipigliani Medio, e Accadem. Fiorense: e uno dei
Medici pratici ordinarij del Regio Spedale di S. Maria Nuova.

cmr

Pappagallo minore verde e cremisi d'America. — *Pithecus minor e vireo viridi Americanus.*

cxxxv.



All' Ill. Sig^o Conte Pietro Verri Patrizio Milanese e Camerlano delle P.M.M.G.e.Q.Q.a

cmw

Emeu, o Casuario, — Emu, sive Emu, Casuarus alij.

XXXVI.




All' Ill^{mo} Sig: Cav: Prior M^o Gino Clemente Capponi Nobil Patrizio Fiu: e Gran
Conte Stabile dell' Ord^o di S. Stefano ec.

cmw

Struzzo nero, o Struzzo della Libia, —, *Struthio niger*, *Struthio Camelus*, sive *Struthio Libicau*.
XXXVII.



All' Illmo Sig: Ignazio Gappagalli Patrizio Fior: e Pistoiese Dirett: per l'Appalto
Generale delle Finanze di S.A.R del Dipartimento di Pisa




Struzzo grigio, o cinerino. — Struthio Camelus griseus, vel cinereus.

cxxxviii



Al Molto Eccell^{to} Sig^r Francesco Pinⁱ Profess^r di Chirurgia Socio dell' Acad.
di Botanica di Cortona, Acad. Apulista, e P.A.



Struzzo bianco.




Struthio Camelus albus.

XXXIX.



All' Ed. Sig^o Dott^o Danieri L'Amberti Medico di Livorno.




Corvo, o Corvo maggiore. ← → Crow, or *Corvus major*.

cXL



Al Sig^r Pietro Chiesa Livornese Costruttore di Vasielli per servizio di S.A.R.




Corvo reale bianco.  Corvus albus.

CXLII.



All Ill. Sig: Gio Ludolfo di L'alletravera negli Sezzeri, Posseff. di un Copioso Museo
di rarità naturali e d'Arte, Acad. di Sontra, d'Uprada, e d'altre Acad. tanto degli Sezzeri, che forstiere.




Corvo d'Alemagna ivi detto Kri: — *Corvus Germanicus vulgo Kri.*

CXLII.



All' Ill^{mo} Sig^o Accorato Baldasseroni Cancelliere della Sanità e della Dogana di Livorno.




Corvo Imperiale. \longleftrightarrow Corvus Calvus, seu Corvus.

XLIII.



All' Ill^{mo} S^r Antonio Quarantotto Car^r d'aurato, e Operaio del Duomo di Pisa.




Cornacchia. \longleftrightarrow Corvus Ray.

XLIV.



All' Ill^{mo} Sig^{re} Car^o Bali Francesco Ronioni Patrizio Pisano.




Cornacchia frugilega, volgarn.^{mo} Mulachia. — *Cornix frugilega.*

cxlv



All'Eid. "Sig." Dott. Giuseppe M. Sgazzi Pisano.



Cornachia detta Mulachia nera, — Cornix nigra; Monedula; Lopus.

XLVI.



All' Ill^{mo} Sig^{re} Lazzero Damiani Nobile Livornese.


are available and expand.)

Cornacchia, o Mulachia Scherzosa. — Cornix altera, sive Monedula, Naturæ lufus.

CXLVII.



All' Ill.^{ma} Sig^{ro} Conte Gio. Nerucci Patrizio Senese.




Cornacchia, o Mulachia del capo di buona speranza. — *Cornix, sive Monedula capiti boni, jpsi*

XLVIII.



Al Ill^o Sig^r Francesco Mei Timotei di Sinigaglia.



Corazza, o Corvo Corallino.  Coracias Aldrov.

CXLIX.



All' Ill^{mo} Sig^r Conte Luca Gianini di Pergola.

VIA 22 MARZO N. 2401
VENEZIA
Restauri di gioielli e oggetti d'epoca
NEGOZIO OGGIETTI D'ARTE ANTICA

Coracia col becco, e gambe di color carnuzino. — Coracias nutro pedibusque carnei colore infuscatis.

CL.



All' Ill^{mo} Sig^{re} Car^o Giovanni Gabutini di Fano.




Coracia col becco, e gambe nere. — Coracias rostro pedibusque nigris.

CLL.



Al Revdiss^{mo} P. D. Antonio M^o de Lugo Somario Rettore del Collegio Clementino a Roma ex



Coracia di Montagna. \longleftarrow Coracias Montana.

CLII.




All'Ecell. Rendisi. di Monig. Mario Cornaro Patrizio Veneto, l'avoro di Sienza,
molto versato nell'Istoria Naturale, e gran Mezzante degli Studiori della medesima ec. ec.




Coracia cerulea.  *Coracias aerula.*

CLIII.



A Sua Eccell: il Sig: Ottone Thott Cav: dell' Ord: dell' Elefant, Consigliere
intimo di S: M: il Re di Danimarca, Gran Segretario della Cancelleria del Regno,
Presidente dell' Università e della Società Reale delle Scienze di Copenaghen &c &c




Coraxia dell' Isole Filippine. — Coraxia, sive Monedula Philippensis.

CLIV.




Al M.R.P. Clemente Lampredi Lettor Pubbilato in Sarra Teologia e
Provinciale de Minoris Operanti in Toscana.



Pazzera comune. — Pica varia caudata.



All' Ill. Sig: Bartho Sig: di Marmorier es, incaricato degli affari di S. M: Christianiss:
presso il L.C. Elezio, membro delle società economiche di Berna, Friburgo, Solothurn, e Bienna ecc.




Pazzera bianca  *Pia caudata alba.*

CLVI



*All' Ill^{mo} Sig^o Elia Bertrand Gentiluomo Svizzero d' Herdon Consigliere
intimo della Corte di Polonia, e Membro di più Accademie d' Europa.*



Pazzera Americana nera, e gialla. *Rica Americana luteo nigra varia.*

C L V I I I .



A Sua Eccell. il Sig: Don Federigo di Napoli, Barresi, Montaperto, Bellacera,
e Bonfiglio, Principe di Lenutano, di Contri e di Monteleone, Duca di Campobello, e di
Bassano, Sig: della Città di Alessandria et Grande di Spagna ex del Consiglio di S.M. Reale a




... a small dark bird with a long tail
... a small dark bird with a long tail

Parrulo di Boemia.  Garrulus Bohemius Lin. et Aldrov.

CLX.



All' Ill^{mo} Sig^r M^r Car^r Gino Capponi Ciamberlano delle LL.M.M.I.G.L.
Generale Maggiore al servizio di S.A.Q. del Serenissimo Arivdua Gran Duca
di Toscana, e Comandante del Corpo delle Guardie di Sanità et ec.



Phuandaia bianca. — *Pia glandaria alba.*

c LXII.



All' Illmo Sig: Cavaliere Nicolò Riaardi Serquidi Patrizio Fiorent:


CSU

Phandaia Nucifraga, volgarm. Nocciolaia, — Pua Nucifraga, Caryocatactes Willug.

C LXIII.



All' Ill^{mo} Sig^{re} Domenico Moritti Custode dell' Argenteria di S.A.R.
il Serenissimo Gran Duca di Toscana.



88
88
Picchio verde. — Picus virido Gess.

CLXV.



174
All' Ill^{mo} e Clar^{mo} Sig^{re} Senator Balsi Francesco Maria Buondelmonti
Nobil Patrizio Fiorentino.

CSV

Picchio vario maggiore con le penne del petto mutate. — *Picus varius major, pennis in pectore mutatis.*



All' Ill^{mo} Sig^r M^o Niccolò Guadagni Patrizio Fior M^o di S. Locino,
e Signore di Montepescali.

esr

1. *Picchio vario, o Sarto minore.* *Picus varius minor.*
 2. *Picchio vario, o Sarto minore bianco.* *Picus varius minor albus.*



A Sua Eccell. il Sig^r Luigi Zenobio Conte del Sac^o Romⁱmpⁱ Sig^r e Possessor^e
 delle Giurisdizⁿ d'Egna, Caldif, Salorno, Farognia, e Konikobergo ecc. Patrizio Vⁱneto.

esv

Picchio vario Indiano. *Picus varius Indianus.*

c LXXI.



A Sua Eccell.^{za} il Sig^r. Francesco D'Jacinto di Conti De La Tour En l'ovre Cap^r
dell'Ord^{re} di S. Stef. Chamberl delle LL.M.M.II.e delle LL.A.A.R.R Generale e Capit^r In.
della Guardia Nobile di S.A.Q.L Arciduca Gran Duca di Toscana.

CSU

Picchio Corvo. *Picus niger maximus.* Raj.

CLXXII.



All' Ill^{mo} S^r Cav^r Priore M^o Ferdinando Ximenes d' Aragona Patrizio
Fiorentino.

CSO

Picchio d'alto volo di Guinea, — *Picus altirostris ex Guinea.*

LXXIII.



A Sua Excell: il Sig: D. Giandomenico Maria Berio Patrizio Genovese
Marchese di Salza Sig: della Città di Montmarone, e delle Isole di S'Urturara, e di Parolisi ec.

CSV

Picchio verde col capo grigio di Norvegia, — *Picus viridis capite cinereo Norvegicus.*

CLXXVII.



All' Ill:^{mo} Sig^{re} Assessore Raffaello Marzini.

CSO

Picchio maggiore variegato del Messico. CLXXVIII.
Picus varius Mexicanus maior.



A^o Sua Excelenza il Sig^r Jacopo Morosini Patrizio Veneto.

CSV

Picchio brizzolato di Bengala. *Picus Bengalensis maculatus.*

CLXXIX.



Al Sig: Abate Giuseppe Domenico Filippo Ferretti.

esr

CLXXX.

Siechio con i piedi a tre dita. — *Picus tridactylus albo nigroque varius*. Linn.



Allo Ill^{mo} Sig^o Conte Abate Rinaldo da Rio Nobile Padovano.

esv

Picchio Indiano in gran parte celeste.  Piar Indicus magna ex parte caeruleus.

CL XXXI.



All' Ill^{mo} Sig: M^o Don Gio. Belisomi Camberl. delle SS. M. M. R. G. Reati

CSV

Barbuto.  Bucco. Bris.

C L X X X I I .



All' Ill^{mo} Sig: " Abate Giuseppe Granucci Patrizio Fiorentino



~~24~~

~~and~~



~~and~~

CLXXXIII.

1. Barbuto di Caïenna.  Bucco Cayanensis. Bris.
 2. Barbuto di Caïenna brizzolato.  Bucco Cayanensis nævius. Bris.



A S. A. Q. il Sereniss^{mo} Infante di Spagna Don Gabbiello Antonio
 Gran Priore di Castiglia &c. &c. &c.


ALR

Torcicollo altrove Collotorto, e Verticella. — Torquilla. Gesù = Ixax Torquilla. Aldr.

CL XXXVI.



All'Ill^e e Qm^o Sig^r Can^r Lodrigo Zanchini da Castiglione Patriz^r Fior
e Bolognese, Can della Metropol^e di Bologna, Dott^r Collegiato di Sacra Teologia,
Consultore di S. Uffizio, e Commis^r Gentile per la Santa Cava di Loreto in Bologna.



Curucu del Brasile. \longleftrightarrow Trogan Brasiliensis viridis Briss.

CL XXXVII.



Alla Sig: Arangiola Sengher Manetti

CSR

Curucù cenerino di Caienna. \longleftarrow Trogan Cayanensis anereus. Briss.

C LXXXVIII.



All' Ill: e Rm: Sig: Ruberto Antinori Can: della Metrop: e Patriz: Fiorent:

CSV

Curucù verde di Caienna — *Trogon Cayanensis viridis.* Briss. CLXXXIX.



All' Ill^{mo} Sig^r Marchese Luigi Capponi Patrizio Fiorentino

CSR

Cortofago. \longleftrightarrow *Cortophagus.* Briss.

CLXXXV.




All' Ill^{mo} Sig^r Conte Egidio Negri Nobile Vicentino.

CSO

Crotofago maggiore. \longleftarrow *Crotophaeus major.* Briss. CL XXXXI.



Al Reverendissimo Don Roderindo Cateni Abate del
Monastero degl' Angeli di Firenze, e Vicario in Toscana.




CL XXXII.

Crotofago vario Indiano. \longleftarrow *Crotophagus varius Indicus.*



Al Sig:° Francesco Bartolozzi Fiorentino Celebre Disegnatore,
e Incisore in Rame.




CLXXXIII.

1. *Pecotto, altrimenti Pachio piccolo grigio.* *Sitta, seu Picus minor cinereus.*
 2. *Pecotto del Canada.* *Sitta Canadensis.*



Alla Regia e Celeberrima Accademia Istorica di Madrid.




CL XXXV.

1. *Cerria cenerina* altrimenti *Picchio Paserino*. — *Certhia grisea*, seu *Picus cinereus minimus*.
2. *Cerria sura* minore *Indiana*. — *Certhia sura minor India*.



Collezione
All'Ill.^{mo} Sig^{ra} Marchese Carlo Gerini Patrizio Fiorentino
Camberlano delle LL. AA. QQ.




Cerzia muraiola, o Pechio muraiolo.  Certhia muralis.

CLXXXVII.




Ill^o Ill^{mo} Dño Sig: ^{no} Don Garzia Samaniega Cav: di S. Giacomo,
Arcidiacon della Metropoli di Pamplona, Censore dell' Acad: degli Arredi,
e nominato fra gli Celestano Megalopolitense.



- CLXXXIX.
1. Cerria minore dell' Isole Filippine. ————— Cerrha Philippensis minor.
 2. Cerria di color violetto del Senegal. ————— Cerrha Senagalenſis violacea.



All'Ill: Sig: Conte e Cav: Orlando del Benino Malavolti Ciamb: delle
A.A.P.P.Q: e attualm: Presidente della R. Societ: Fisico Botanica Fiorent:




Tucano mangiapippe. \longleftrightarrow Tucana piperivora.

CCIII.



All' Ill.^{mo} Sig^r. Roberto Lampaj, Svizzese, Membro del Collegio di
Medicina d' Edinburgo, e Acad.^o Onorario della Società Lirico-Botanica Fior.



Gallo nano. $\xrightarrow{\quad}$ Gallus pumilio.

ccxlv.




Al Molto Digno Sig^o Giuseppe Lissi Cappellano Fiorentino

Gallo scherzoso. \longleftrightarrow Gallus naturæ lufus.

ccxvi.




Al Sig: Domenico Bartolini.



Pavone maschio. — *Pavo cauda longa plumis uropygis pulcherrimis.* Brw. ^{ccxvii.}



Sua Ec^{za} il Sig^o M^o Giovanni Corsi Cav^r del S. Milit^r Ordⁿ
di S. Stefano Ciambel, e Consigliere Intimo Attuale di Stato delle LL.
M. M. G. P. D. Apostolica, e Cacciatore Maggiore di S. A. R.




Pavone bianco. \longleftrightarrow Pavo albus. Gmel. et Aldrov.

CCXVIII.




Alt' Ill^{ma} Sig: ^{re} Niccolò Richard de Lesse Provered^{re} dell' Ufficio del
Sale della Città di Firenze.



Pavo della China femmina. ————— Pavo Sinensis femina. ccxx.




All' Ill^{mo} Sig^r Dottor Girolamo Fedele Bonini Medico a Cesena



Gallo Pavone volgarm. Pollo d'India col cuffo. c cxxii.
Gallo - Pavo cristatus.




All'Ill^{me} Sig: Cav: Vincenzo S'vtori Patrizio Fioren: Commendatore
dell'Ordine Gerolimitano, e Capitano nel Reggimento Real Toscano.



Gallo Pavone, o Pollo d'India bianco con macchie nere. —
ccxxiii.
Pollo Paro albus maculae nigri con-
sparsas.



All'Ill^{mo} Sig: Dott: Gio: Batista Borsieri Medico primario della Città
di Faenza, e Socio Onorario dell'Accademia Fisico-Botanica Fiorentina




Gallo Pavone, o Pollo d'India bianco con macchie bionde. — Gallo Pavone albus fulvo maculatus.

CCXXIV.



All' Ill^{mo} Sig^{re} Carlo Fazzuoli Provved^r dell' Ufficio dei Fosse della Città di Pisa




Gallo Pavone, o Pollo d'India nero. — Gallo Pavo niger.

ccxxv



III^{mo}: Sig: ^o Avv: ^o Cosimo Pucini Lettore delle Istruzioni del Gius
Civile, e Canonico, e degli Elementi della Geometria nella Real Paggeria, e Avv:
dei Rei del S. Uffizio di Toscana.




Pollo Pavone, o Pollo d'India nero con macchie bianche, — Gallus Pavoninus.

CCXXVI



All' Ill^{mo} Sig^{ne} Conte Orlando Malarotti del Benino Patriz^e Fior^e Cav^o dell'Ord.
di S. Stefano, Ciamb^{ro} delle LL. MM. SS. e Q. Apostolica, e delle LL. AA. QQ.




Gallo Pavone del Brasile. — Gallo - Pavo Brasilianus.

CCXXVII.



All'Ill^{mo} Sig^{re} Dott^{re} Carlo Allione Profess^{re} di Botanica nella Regia Università
di Turino Accademico della Società Fisico-Botanica Fiorentina e di altre di Europa




Mitu, ovvero Mutu del Brasile. Mitu, vel Mutu Brasiliensem. Willig.

CCXXVIII.



Sua Eccell^a Donna Felice di Napoli e Bonfiglio, Principessa di Rositano, Contro; e Montelone.




Mituporanga. — Mituporanga Marag. et Raj.

CCXXIX



All' Ill^{mo} Sig: ^{re} Barone de Laye Signore di Breukelerwaert Cav^r Olandese ex




Meleagridide, o Gallina di Guinea. — Meleagris, sive Gallina Guinea, vel Numidica.

cc xxx




Cir' Ill^{mo} Rev^{mo} Sig^r Car^r Giachino Giachini de Conti Sandonini Pubblico Profess^r
di Sacri Canoni nell' Universit^à di Pisa, e Canonico Penitenziere di quella Chiesa Primaziale.



Meleagrido, o Gallina di Guinea bimac. ^{ce XXXI.}
Meleagris, sive Gallina Guinea, et Numidi-
ca alba.



All' Ill.^{mo} Sig:^{ra} Andrea Bologhini Nobile di Cesena



Meleagridide diversa d' Gallina d'Egitto, — Meleagris altera Gallina Egyptiaca dita.

ccXXXII.




All' Ill^{mo} Sig:° Barone Francesco Ancaiani Nobile di Spoleto.



Dallo di Monte minore. *Tetrao, seu Urogallus minor, mas.* *Pyg.* *Tetrao*
Tetrao. Linn. ccxxxiii.



Al Sig:° Giuseppe Bracci Giojelliere Fiorentino.




Gallo di Monte della specie minore, diverso — Tetrao, sive *Tetragallus minor alter.* Ger. Ornith.

CCXXXV.



Sua Eccell. il Sig: Cav: de Breteuil Balli, Commend: e gran Croce dell' Ordine di Malta, Priore Commend: del Regio Priorato d'Aumont, Ambasciat: Ord: della Relig: di Malta appo Sua Sant: Sante delle Guardie del Corpo di S. M. Cristian: Mistr: di Campo di Cavalli: cc.




C CXXXVIII.

Roncaso, detto comunemente Franelino di Monte \leftarrow *Lagopus alpinus Altigenus*, et *Franelinus Montanus*.



All' Ill^{mo} S^r Carlo Rosi Segretario del Consolato di Mare



cc xxxix.
C Poncaso, o Lagopo d'anco altrimenti Pernizz alpestre, = *Lagopus vulgaris*, sive *Lago.*
puy varia.



All'Ecell^{mo} Sig^r Dott^r Fran^co Pagnini Socio dell' Accad. Bot-
ca Fioren^{na}, e Medico della Comunit^a, e Paese di Bientina.

VIA 22 MARZO N. 2401


— VENEZIA —

Restauri di qualsiasi tipo e d'ogni epoca
NEGOCIO OGGETTI D'ARTE ANTICA

Zoncaso, o Lagopo bianco. ccxxxx



To the Ill^{mo} Sig^r M^o Giuseppe Bonifacio Locatelli Orsini Nobile di Genna, Spo-
leti, e Ancona, Camb^o delle L. M. M. D. Apost^o Teoriere dell'Umbria et.



三

