

Schede per il materiale della Biblioteca Test

Scheda a cura di  
(Supervisione: prof.Ezio Sanavio)

Titolo del test: MCMI-II: Millon Clinical Multiaxial Inventory-II

Autori del test: Theodore Millon

Edizione: National Computer Systems,1987

- Ambito di utilizzo
  - Assessment clinico
- Modello teorico di riferimento

Il modello teorico di Millon relativo ai disturbi di personalità: egli individua quattordici pattern di personalità patologica. La tassonomia di Millon è stata assorbita dal Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV (DSM-IV).

- Costrutto misurato

Vengono esaminate le quattordici configurazioni di personalità indicate da Millon: Schizoide, Evitante , Depressivo, Dipendente, Istrionico, Narcisista, Antisociale, Sadico, Compulsivo, Passivo-Aggressivo, Masochista, Schizotipico, Borderline, Paranoide. Dalla somministrazione del test si ottengono anche delle misure relative a dieci sindromi cliniche: Ansia, Disturbi somatoformi, Mania, Distimia, Dipendenza da alcool, Dipendenza da droghe, Disturbo da stress post-traumatico, Disturbi del pensiero, Depressione Maggiore, Deliri. Millon ha incluso nell'inventario quattro scale di controllo: Validità, Autoapertura, Desiderabilità sociale e Drammatizzazione; esse servono sia per stimare la validità del protocollo compilato, sia per correggere i punteggi del soggetto alle altre scale.

- Kit del test
  - Fascicolo (comprendente spazio per le risposte)
  - Manuale
- Somministrazione
  - Qualifica del somministratore del test
    - Psicologo iscritto all'albo
  - Qualifica del valutatore del test
    - Psicologo iscritto all'albo
  - Destinatari - Fasce d'età:
    - Adulti
  - Livello culturale:
    - cultura inferiore

- cultura media
- cultura superiore
- Tempi di somministrazione:
  - 30 minuti-un'ora.
- Tempi di correzione:
  - è sconsigliata la correzione a mano da parte dell'esaminatore; le risposte possono essere conteggiate tramite lettura ottica ed è previsto uno scoring computerizzato che richiede pochi minuti. Si può richiedere inoltre lo scoring tramite servizio di posta elettronica: il referto viene inviato al richiedente nel giro di ventiquattr'ore.
- Modalità di somministrazione:
  - individuale
  - con programma di scoring automatizzato
- Modalità di presentazione degli stimoli:
  - carta-matita
- Materiale di stimolo e risposta:
  - Fascicolo con spazio per le risposte
- Modalità di correzione:
  - con griglia manuale
  - con programma di scoring automatizzato
- Modalità di risposta:
  - L'esaminato deve leggere attentamente ciascuna affermazione e scegliere tra due alternative :Vero oppure Falso.
- Forme:
  - Unica

- Eventuali connessioni

Millon ha anche sviluppato un inventario per la misurazione delle caratteristiche di personalità patologiche nell'adolescente (Millon Adolescent Clinical Inventory-MACI) e uno per i pazienti con patologia medica (Millon Behavioral Health Inventory-MBHI). Il questionario MCMI-II non è più in uso , poichè è stato sostituito dal MCMI-III.

- Caratteristiche psicometriche

- Attendibilità:

I valori di test-retest, calcolati in un intervallo di tempo di quattro settimane, variano da 0,51 a 0,85 per le scale dei disturbi di personalità e da 0,47 a 0,83 per le dieci scale cliniche. Il valore di consistenza interna (alpha di Cronbach) è compreso nella gamma da 0,81 a 0,95.

- Validità di costrutto:

L'inventario è stato costruito sulla base di un approccio teorico estremamente importante e ben definito. La validità del test è stata analizzata in diverse popolazioni cliniche americane: depressi, tossicodipendenti, disturbi alimentari e disturbi da stress post-traumatico. Nel Manuale vengono fornite le correlazioni item-totale.

- Validità concorrente:

Nel Manuale vengono fornite le correlazioni con l'MMPI su un campione di 3000 pazienti. Infine sono stati confrontati i risultati al test di 770 pazienti con le rispettive diagnosi formulate da parte di un clinico esperto.

- Campioni normativi:

Si fa riferimento a 643 pazienti americani di sesso maschile e a 649 di sesso femminile.

- Dati normativi:

Nella tabella 2-25 del Manuale vengono riportate le medie e i cut-off della popolazione normativa americana di confronto. Nella tabella 2-26 si evidenziano invece le seguenti caratteristiche del gruppo normativo: sesso, età, stato civile, religione, etnia, status, disturbo lamentato e durata dell'episodio più recente.

- Bibliografia

- American Psychiatric Association (1995). "Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV)". Washington D.C. , American Psychiatric Association.
- Choca J.E. e Van Denburg E. (1997). "Interpretative guide to the Millon Clinical Multiaxial Inventory". Washington D.C. American Psychological Association.
- Craig R.J. (1997). "A selected review of the MCMI-II empirical literature" in Millon (1997),Craig R.J. e Olson R.E.
- Millon T. (1969) "Modern psychopathology: A biosocial approach to maladaptive learning e functioning". Philadelphia, Pa. Saunders.
- Millon Theodore (1987) "Manual for the MCMI-II. Second edition"
- Millon T. (1990). "Toward a new personology: An evolutionary model", New York, Wiley.
- Millon T. (1993)."Millon Adolescent Clinical Inventory Manual", Minneapolis, Minn., National Computer Systems.
- Millon T. (1997) "The Millon inventories: Clinical and personality assesment". New York, Guilford Press.
- Millon T. e Diesenhaus H. (1972). "Research methods in psychopathology", New York, Wiley.
- Millon T., Green C. e Meagher R. (1982). "Millon Behavioral health Inventory manual", Minneapolis, Minn., National Computer Systems.
- Millon T., Millon C. e Davis R. (1994). " Millon Clinical Multiaxial Inevtory-III manual", Minneapolis, Minn., National Computer Systems.
- Sanavio E., Sica C. (1999) "I test di personalità". Ed. Il Mulino.

- Commenti

Il questionario è in lingua inglese in quanto non è ancora stato tradotto in italiano. L'inventario MCMI-II è stato sostituito dalla terza versione del test (MCMI-III) (Millon, Millon e Davis 1994).