

Annulationes

in plantas serbicas Anni 1863.

Streisacium

spec. nova? Sect. Anretho

fici Strig. glauci fr. Omnib. magis foliorum. Matura rosato rad. arserentia Sect. Accipitronisum mentem, ac inter glauca St rigidum habitu. repetens; hinc characte. rib, nec sensu, ab omnibus diversum. Squamulis antherodiales, atrovirides dorso stelligato ac pilis glandular cerinis, germen. libus sparsim obdito, margine paludiori glabro, apice obtu. sinuato barbellato; styli fusco-virides, flores late flavi. Caulis, ascendens aut strichus basi pilis eque diametro sublon. gioribus obditus, a medio glabrescitur; folia continua sen. sui decrescentia acuminata; rami ac pedunculi stelligati ac glandipili.

Confes H. Kotschyannum Henff Walper Rept V pag 332 quod tamen Accipitronis, adnunciatum. nec glaucum, nec stelligate, nec glandipile dicitur.

Dixeram acuminatum; donec evocetur non fuerim Jordanum hoc nomen alteri plantae primum ascripisse.

Habitat in partibus alpestribus M. Rosovati tamen ac Ivanova livada 2000-3000' alt subst. gnesticis ac mico. sibirico. Flor. ~~sub~~ Aug.

x C. FinjaKevacens. x

Centauraea salontina Vis. Mihi videtur quidquam diversa
a planta quam primum e glaucis arenaceis ad Fornasa Sest
merid. lecti communicati. Acheniorum marginalium qui in mea
planta aequae ac in tua salontina lineari cylindrica sunt
ae loco pappi mollem conam gerunt nullibi mentionem
reperi.

Centauraea collina Panz. Innum viz L. Cum genuinam C.
collinam a botanicis gallicis nec C. orientalem a soppis
impetrare potissem species has cognatas intelligere non valeo.
Hae mea collina est fors genuina orientalis, altera vero
orientalis Panz. ex arenis ad Thlasova et vicinis ad e regio
tin species est facile nova cui nomen specificum a spiculis
anthodii peculiaribus bullatis proponendum fo. et. C. nume.
lica pro qua brevi tempore meam orientalem credebam est
jam dissectione praesenti diversa. Vid. Scopii pl. Os. II. t. 78.

Centauraea desertana nov. spec? Sect. Psephellus. C. ly.
sophylos qui C. Marchaliana sp. ac C. integrifolia C. A. Mey.
proxima a primis differt: foliis rad. non divisis et capitulis in
ter folia bracteiformia sessilibus ac squamulis omnibus, fimbriatis
nec exterioribus, ut in C. Marchaliana, lanceolatis integerrimis
patentibus; ab integrifolia foliis majoribus, caulis, plejo.
cephalis ac indumento.

Radix multiceps, caules in orbem diffusi a medio ad
scandentes ~~a medio~~ in ramos monocephalos (cultura plejo.
cephalos) divisi.

Habitat in superstitib. calcareis praesumpti passus Derwen.
Sa^x (Serb. occid.) flor. Ann

Si nomen speciei geographicum non placet dices plantam,
si ut novam recognoveris, C. barbacoefoliae aut cum reversa folie
barbarae vulgari vegetat.

Centauraea nova spec? Valde quidem congruit
cum descriptione C. corymbosa Pons. in spec et gustu florae
France II pag 250 sed est diversa habitu, gracilior, capitulis mi-
noribus, involvis non radiantibus, pili filamentorum longioribus ab anthe-
ris spatio conspicuo remota, antheris minoribus, hylo acheniosum ^{merocci} rhon-
beo nec parvo orbiculato. De copioso samento araneoso in corolla
praesertim radicali nullibi mentio fit.

Stetusa, capitulorum ac acheniosum magnitudine, filamentis den-
se ac longiusculo pilonibus, ac albis hyalinis ad basin genitum, pro-
funde accedit ad C. dissectam Ten. Sed differt (comparata cum exem-
plaribus gramin e manu A. de Heldreich): foliis multo tenuis sectis
pappi achenios longiore

Serbico achenium $3\frac{1}{2}$ m. l. pappus $3\frac{1}{3}$ m. l.
Dissecto — $3\frac{1}{3}$ — — $1\frac{1}{2}$ —

umbilico achenii rhombeo, caisura videlicet ad basin profunda an-
gusta ad latere vero simbo rotunditatis instructo

A maculosa et tenuisecta differt propter pappum longiorum
antheris basi truncatis nec sagittatis.

Habitat in praesumptis calcareis etc. Vahar^{xx} (S. centi).
Florat. Julio.

Achillea macrophyllodes nov. spec? Proxima A. ma-
crophylla, sed ob antheria oblonga ac ligulari sarti anther.

dis breviores ad Sect. *Multifolii* amandanda. Matura est
planta morsa depressiva ac omnes ejus partes nonnihil reductae,
achemia 1,5 mm l (A. macrophylla L ad exempla tabunda
2,5 mm l) apice longiore alula provisa.

Pone caules flores ac fructus proferentes adsumt in morsa
planta sope caules hynercenter magis minusve elongati
apice somula foliorum terminati (eminus vis fructuum
soti mentantur) e quibus probititer emergent anno proximo
caules florentes.

Habitat in ^{Serb. austr.} (Sylvestrib. Sarosin ill. Vrška Cuta^v et Jon
lema glama circa 2000' alti subto. Calcat. et in consimilibus
locis ill. Krovati kamen, Vektien, Ivanova livada^{xx} circa 2500-

Floret in demissioribus hinc in elevioribus Julio ad me.
diu Aug.

Occidentali A. macrophylla L erit morsa forma in orienti-
salibus Europae plagi species vicaria!

Phytolacca vulgaris Jacq. Proximam quidem hujus vase.
lati y) somulato Jacq. sed foliis copiosioribus, majoribus ac floribus
intensius flavis quidquam discernim.

Carex brevicollis DC. Conferat cum exemplaribus gallicis
si possunt. Planta mihi quidem nonnihil dubia ob achemia
ovata trigona basi apiceque aequaliter contracta ac totum so-
sum herba visorem quem Jacq. ex Gott flore de France III
pag 417 peltentem dicit. Crescit ingenti copia inter virgultu
x C. Conarckens. x) xx C. Kinja Devacens. xx

Syringis vulgaris ac Capivi orientalis, passim montes integros
(calcarios) maximis suis cespitibus obducens. Montibus no.
stis planta in via quodam copia, secunda parces respiciant
ac si ad id fame conpellantur, petuntur abortum aut sterile.
Sunt inde nomen vernaculum Talovek quod idem ac the.
siliticant. Soli culmi floridi ac fructiferi possunt ab ipse no.
ra absumi.

Ranunculus bulbosus, L. Forma depessa in glaciis et
Vulgar 2000' alti cum Taxaco caucasicis crescit, mihi primo
obtusis diversa via via ob inveniuntur ac folia sed ob statum
parviter non facile iudicanda.

Senecio Gymnostenes Hoff & Helld. ^x Duratio viz non bi.
ennis, capitula sub antheri multaria, ligula lachrya capax 10. Cul.
Lusa docebit nam a specie Hoiffiana mea planta diversa.

Allium vaginatum spec. nova? Bulbi ovato conici tumi.
in furis reticulatis; scapo leschi ad duas lachrya non minus quam
ad umbellam usque vaginato; foliis ^{faceti} ^{Sen. cylin. v. v. v.} ^{angulatis} ^{fumosis punctis}
albida ^{aristis} ^{aspetis} ^{caulis} ^{reflexive} ad angulos cum vaginis, filis ^{caulis} ^{reflexive}
obtusis; spathe membranacea univalvata a basi lachrya vaginante
linearis acuminata umbellam ^{3-13 florum} sublonga; pedicelli inopulibus
sub antheri ascuto pendulis tandem strictis; perigonii ad lachrya
partem connati phyllis pallide lilacinis carnis fusco
viridibus, externis oblongis, internis linearis oblongis, parte longio.
ribus; staminibus ad lachrya partem perigonii adnatis ac in lachrya
se connatis; filamentis parte libera subulatis, albeis, basi le.
tionibus, perigonium sublongis; antheris flavis; stylo staminibus

haec periclyta
nec nisi
fuerit in

Subsequente, stigmale capitellato; capsula obovato trigona
brevis stipitata perigonio crasso latic parte brevior, stylo ca-
bi brevior coronata; carpellis ad costam ultra medium profundo
sulco crassis; seminibus in loculo binis oblongo trigonis, atris,
nitidis. — ^{folia ob pubem glauco-campensia supra canaliculata canaliculo glabrisque,}
^{subventis quibusdamque pilorum (longis et nudis) quibus inchoat utroque de angulo dense utriusq.}
^{caudice adpressi}

Junim

ca appropinquat formam *A. calliductyon* C. A. Mey. differt
scapo
caute inferne foliato, spatula bivalvi, phyllis perigonii exterioribus
oblongis obtusiusculis, interioribus latis subbrevioribus
(in nostra plane corticosum) et filamentis nites de liberis.

A. angustum Don (quantum ea nimis prope diagnosi colli-
gi potest) differt umbella globosa confesta.

A. lupani Desf = *A. peririca* Boiss differt floribus brevioribus 5, 5^{mm}
l. (nostri perigonia 8^{mm} l.) capsula rotundato trigona stylo brevior
sinu coronata, foliis glabris ^{penes bulbum stat conspicuiss.} ac statura gracilior

A. calimischen DC = *A. Doryano* Kunth floribus simile ob
lunicas bulbi nigras in fibras non solutas longius distat.

Habitat in declivitate orientali Mt. Leskottok C. A.
Lektinacend. ad 1500' alt substr. calcareo, copiosissimum!
Floret Augusto.

Dryas *virgetum* W. Recentiores relegant speciem *W. l.*
novianam ut synonymon ad *Ph. limnifolium* cui mea planta
jam ob stolonem (super adne accessibiles) repugnet cum *Ph. limnifolium*
saxa prodiligit quidem sed nites ea etiam in terra
humida occurrat ac possimum sit tuncque aut adlocuto ramo
stipitatum nec copiosis gracilibus virgibus, ut nostrorum, gaudeat. Ob
stetum tamen plantae deflorescentia auctum plantae dicitur

non potest, poterit spero in futurum si mihi cultura contigerit.

Gypsophila compressa Desf. Est minima g. illyricæ, quam ex Sviranička banja S. r. vid. par. A 1856 communicatam haberi affinis, caeter, sunt tamen a medio compressi, quæles, adjudicantur speciei Desfontainiand.

Senecio vivum Steffeli Schott. Statura quidem huic speciei proxima, sed ob substratum, ubi reperit, mihi dubia — S. Steffeli constantior crescit in ympib. calcareis An. nov. potius idem cum planta Koyonikensi?

Senecio vivum blandum Schott. Proximior videtur S. Lectosum. Rariter, habet virides, maximam cultura in diametrum ultra sexipedalem excrecentes.

Senecio vivum Telebori Schott. Est planta, crassa, genuina, in Serbia ab itineratore Bot. Telebori, nunc adjuncta in musco botanico, A 1856 reperta ac a Schott in Ostes. bot. Wochenblatt 180 31 A. 1857 descripta. S. Stellifloris affinis, ob petala difflora flavo; hoc videtur differre secundum exemplare culta e mem. Cl. S. Hampe petalis ac foliis longioribus angustioribusque, primam statura multa prolixiore nec albes. Crescit copiose in superbitibus calcareis (C. Požarevacens. Flor. Anl.)

Unde Schott habuerit exactius non notat.

Poffet ut planta eacturive Sebice in nostris Decadibus illustrari, sit, ut superius indigitabam, a ruthenico ac gran. diffloro reverse riverrum!

De aliis Sempervivis a meridⁱⁿ in ere pearduo, minichidis obles,
vationibus moran non concedenti, collectis, quidam pro futuro re.
sero ubi ei in hortum transplantati ac egregie jam rigentibus
stardinecim. Wipson valet de aliis quibusdam rubis speciebus
quorum sentunt viginta exemplaria aut semine colligere fas erat
ubi: Salvia argentea h., Allium prob. celticorum. A. prob. scabille
Renuncula prob. ptilostachys gr., Onosma rigidum Led. Cerasium com.
penn. latum. Larenta spec. Cyrtus ponticus. C. microphyllum Hoff. Scer.
li spec. Dianthus prob. pumfotus Tragopogon spec. etc. quae colere ac
abundant obrescere in anno est.

4 Octobris 1860
Belgrad

John. Raney