

[illegible]

[illegible]

Metricaria L. Less. St. exaltij specib.
Capitula radiata aut discoida, involucrum ~~breviflorum~~, florum radii ^{ovis coccineis} Cylindrici perianthii ^{tubuli calicem} ~~nervi~~.
Nec tubulosi corollae. Pappus ~~complanatus~~ ^{nervosus} ~~laevissimus~~.
Achena conformia oblongo-turcica apice ^{obtusiuscula} tenuissime s. costata, glande,
Vitis nuda aut hirsuta.

[illegible][illegible]

[illegible]

Matricaria Chamomilla L. fl. suec. ed. II p. 296, sp. pl. ed. II p. 1256 *St. herb!*
non Prodr.
M. gleba caule ramoso diffusa, foliis bitripinnatis-pinnatis, lobis angustis linearibus, involu-
cris squamis oblongis marginibus serratis, receptaculo ovato aut conico, acheniis quinquecostatis
natis vel siccis - poppulis.

* forma acheniis omnibus nudis

Matricaria N. 701 L. fl. suec. ed. I ~~p. 296~~, mat. med. n. 401 quoad diagn. et ex herb. *syno-*
nymis ad Anthemidum nobilem pertinens

Matricaria recutita L. sp. pl. ed. I p. 891.

Matricaria fraxodensis L. fl. suec. ed. II p. 297, sp. pl. ed. II p. 1256 *facta. r. p. ed. sen. p.*
tab. St. prodr. syst. nat. VI. p. 51 n. 8

Chamomilla officinalis C. Koch in *Linnaea* vol. XVII p. 45

** forma acheniis omnibus aut quibusdam poppulis

Matricaria pumila W. en. pl. h. bot. p. 907

Matricaria Courmontiana St. prodr. VI. p. 52 n. 10 ex herb!

Matricaria pyrethroides St. prodr. VI. p. 52 n. 13 ex herb!

Matricaria fraxodensis L. K. in *Buch. pl. cancr.* p. 150

Matricaria Chamomilla p. poppulis Reut. et May. fl. rant. p. 96 ex herb. St.!

Matricaria coronata Jacq. herb.

Chamomilla occidentalis C. Koch in *Linnaea* vol. XVII p. 45

Il secondo genere accennato più sopra ed in cui notevolmente s'accolgono la *Matricaria*
indica e la *M. graeca* non può confondersi col precedente né coi Crisantemi
pei caratteri di' suoi achenii che sono tripartiti nel lato interno, granulati & glia-
scolati per tutto il dorso e verso l'apice di questa fornito di una o due ghiandole nere.
I Botanici, avendo sentite in ogni tempo la difficoltà d'allocar degnamente la
M. indica né genui esistenti. Pensò il Linneo che nella flora svecica l'avesse
collocata fra le *Matricariae*, nella seconda edizione delle *Species plantarum* tra-
solla fra i Crisantemi: lo Smith la pose fra i *Protri*; il DeCandolle vider
nella alla *Matricaria*: il prof. Koch & Engelm. ai Crisantemi, il dott. Koch
& Seno alla *Chamomilla*. La discordanza de' Botanici nell'assegnar il genere
d'una pianta fu quasi senza per noi un buon criterio per rispettarli inas-
il tipo d'un nuovo genere, pericula appena questa discordia d'opinioni
in argomento si possiede non può procedere se non per s' del mancare alla distin-
piante alcune d'pei caratteri, che sono proprii dei vari generi cui si riferisce.

Gruppi tra specie nelle riviere per di loro più caratteri degli ~~altali~~ ^{oggetti alle riviere} ~~altali~~ ^{oggetti alle riviere} ~~altali~~ ^{oggetti alle riviere}
 diffusi e sparsi e nelle zone per loro per la qualità degli abitanti, che sono spesso
 a forti portanti d'istigazione. Il carattere inoltre ed il prezzo hanno in comune
 il carattere di aver due ghiande buone ^{profonde e per loro di un'istigazione} ~~profonde e per loro di un'istigazione~~ ^{profonde e per loro di un'istigazione} ~~profonde e per loro di un'istigazione~~
 ed è gruppo due ghiande corrispondono nelle avole tenute da di benedici due pezzi
 buoni. Il carattere spesso invece ha una sola ghianda buona e da una
 più grossa dell'altra, questa non ista ai due vengano del dopo e grossa all'origine del vengano
 in tempi invece sull'origine stessa.

On mesurait en pouces de 11 à 12 pour 21/2 pouces de longueur

- 1.°: esamin il nuovo gran Charonilla proprio del 1.° Reich di Vienna vi si trova per lo più
 la grande specie di vario gran vi venivano per lo più la Charonilla vulgaris che
 si trova il nome noto per un altro nome di Charonilla
 2.°: la Charonilla vulgaris che si trova il nome noto per un altro nome di Charonilla
 3.°: la Charonilla vulgaris che si trova il nome noto per un altro nome di Charonilla
 4.°: la Charonilla vulgaris che si trova il nome noto per un altro nome di Charonilla

3. Della *Mathenia* in due - Mr. Moore dirigenne forma un gran pece cui
proprio si ravvicina l'altro con il. *Chazotte*, con cui fu da *Barbier*
unita la prima specie, quindi d'ordine della *Mathenia* non più della
forma
della del *grosso* un par di *strutture* *bigliam* dell'altro: al più gran altro
che d'altro.

[illegible][illegible]

- [illegible]

