

8. *F. indicum* Roxb. l. c. p. 536. Per. ovum saltem, signentis unifornibus
mafe. in ore recept.

9. *F. standif* id. ib. Per. 3-5 folia

10. *F. hederaea* H. p. 538 Fl. mafe. rursus fem. mixti, per. 3-stylis. Pauc.
pedicellati, per. 3-stylis, stylis lobis.

11. *F. compta* W. Roxb. fl. compta. II. n. 125. Fl. mafe. et fem. mixti, hi
stylis, mafe. anther lobis. Fem. stylis longis gracilibus, stylis filiformibus
bipartitis.

12. *F. longifolia* Roxb. fl. ed. III p. 559 Fl. mixti. mafe. pauci tristylis,
fem. per. 5-stylis.

Seet. II. *Lycocarpus* - Fl. Neri vel monandri, rursus mafe. inf.
fem. vel mixti, stylis glomeratis monandris. Perianth. ut in seet. I
Cassia. Styl. lobulatis, rursus vix. Styl. simplex unicus
puberulus, gl. lobulatus. M. perianthi coriacea integre inte
gera vel lobulata.

S. 1. Stylis diffinis

1. *F. humilis* Roxb. l. c. p. 535. Fl. omnes fem., per. 5-partiti, rursus
hi unifornibus

2. *F. elaphia* Roxb. l. c. p. 541. Fl. mixti, mafe. per. 3-partiti, rursus
hi unifornibus, planis ^{p. 24} (singulis) brevibus, anther. erectis cla
vatis oblongis. Fem. per. ut in var., styl. later. curvis, stylis
ample filis.

3. *F. laetifera* Roxb. l. c. p. 545. Fl. saltem feminini. Per. 4-stylis. Stylis
subulatis stylis acutis.

4. *F. oblongifolia* Roxb. l. c. p. 546. Fl. mixti, monandri, utriusque per. 3-stylis
stylis elongatis, stylis acutis.

5. *F. laevifolia* id. ib. p. 557. Fl. feminini.

6. *F. Pauciflora* Koenig. Roxb. p. 557. Fl. mafe. monandri.

7. *F. virginica* Roxb. p. 556. Fl. trinum feminini longe pedicellati filis
incurvis - Per. 3-stylis, stylis filiformibus laevibus acuminatis. Stylis
clavatis, stylis perforatis.

8. *F. virginica* Roxb. l. c. p. 530. Fl. mafe. rursus longe pedicellati per. 3-5 lobis, stem 3
fem. subulatis per. 3-stylis, stylis filis, stylis tenuibus clavatis filiformibus.

9. *F. gogonensis* Desv. in Nov. ann. hij 10. vol. XVIII p. 311. Fl. rursus
mafe, rursus fem. per. 5-partiti.

p. 350 - *Z. cerasiformis* n. sp? Cl. sub hsc nom. in H. *Polystichum*.
 p. 35 *Recept. axill. solitaria subglabra pedunculo brev. hirs. vixit ducuntur into*
pinnatifid; carae immo suberectae, exhy pils glandulif. punctata. Foramen
vixit largiusculum pilosum. Flony ovary pinnatifid, ~~superi~~ rugosa 19 ang
vixit (pentathic vixit?). Pinnatifid band conformis h. pils, rugosa
laxi cellulis vixit hirs. lacini, lanceolatis, irregularibus, immo majore
concavo-crispatis, alba breviss. Ovum cum stylo involucrum compositum
numerulatum, basi in squamam contractum; stylo lateraliter jagugeth
conformis, tunc ovulum apertum, stigmati subcapillato muciculis gland
*Dist. Int. irregulariter grande hys species 19 hinc a *Z. cerasiformi**
*Dist. col. h. pils. que *Z. amentum* Hamilt. Walling.*

S. Thyma acule.

p. 35 II. *Recept. longif. Foxb. l. c. 557. Stam. solitaria, stigma notis rubicundum*
*adu. Nomen generis typis vixit vixit *Z. macrophylla* Foxb.*
*et *Z. oppositifolia* W.*

Sycomorpha - *Recept. peduncul. axill. vel nuncius confert androgyn*
basi brachia. H. nup. in ore recept., per. 3. gartito, flam. soli
tatis. Pinnatifid nuncius large pedicellatis vixit. Stylus later
alis, stigmati infundibuliformi. - Arb. Caecyng, vixit pils, in
vixit oppositifolia - India orientalis.

1. *Sycomorpha Foxburyi* - *Z. oppositifolia* W. Foxb. fl. covm II n.
 126. Fl. id. III p. 561.

In *Z. macrophylla* Foxb. fl. id. III p. 556. Flony adia, pinnatifid
 vixit, stigma simplex pilosum, pulchre vixit. p. 35