

8. Anchusa micralis nika.

A. hispidis, caulibus debilibus ascendentibus subsimplicibus; foliis planis, radicalibus
obovato lanceolatis basi attenuatis obtusis repandis, caulibus lanceolatis sessilibus au-
tibus integris; racemis pedunculatis conjugatis alternis basi foliolatis laxis; calycibus
bifidis dimidiis. 5-fidis corollae tubo recto brevioribus, bracteolis duplo longioribus, in fructu
rectis; formibus apice incurvatis truncatis glabriscaulis; mucibus vaginis apice acute tri-
lobatis, basi umbilicatis. 24

Hab. circa pagum Verlika ad marginem agrorum. Julio.

Obs. Calyces parvi, minores etiam quam in Anchusa temperivente.

9. Cerintho purpurea nika.

C. caule erecto superne ramofo, foliis amplexicaulibus obtusis glaucis lobis integris albo macu-
latis, inferioribus spatulatis basi attenuatis, superioribus cordatis; corollis conico-clavatis pau-
cam versus subius ventricosis, limbo constricto, dentibus obtusis triangularibus reflexis bre-
vissimis. 24

In sylvarum Boraja inter Vibenicum et Dragurium. Majo.

Obs. Nimum affinis, si non eadem, C. retorta Sm. H. Graec. 2. 171 p. 60-61. Attamen in nostra
corolla non tubo duplici curvis, ac prope medium sigmoides, et in illa, et dente non acuti-
plente sed reflexi obtusiusculi. In descriptione insuper spelletur tum in flora graec loc. cit.
tum in Rem. et Sch. Syst. veg. vol. 10 p. 711-12 nullus fit sermo de mentis foliorum.
Haec in videri, terra confuscula, in vicis autem, verruculis albidis prius in terra foliorum im-
mersis extrorsum eminent, ac ideo folij asperitatem quandam imperiunt. Pars plantae floralis
ex violaceo purpuris, exsiccatione vero magis ad colorem vergit atropurpureum, aut carcum.

10. Herniaria rotundifolia nika.

H. radice perenni, caulibus prostratis herbaceis ramosis puberulis, foliis elliptico-subrotundis obtu-
sij crassis glabris subulicis petiolatis, floribus axillaribus glomeratis glabris sessilibus 24.

In maritimis graminis insula Apythidi prope Lassin picolo in parte Cigale. Aprili.

Obs. Dorsan affinis H. permixta San Blanch. pl. exsic. 229, 8, sed foliorum forma certe distincta.

11. Anthusay Calafolium nika.

A. glabro, caulibus striatis dichotomis geniculis tenuibus; foliis ternatis petiolatis, foliolis late ovatis
basi obliquis inciso-pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis, vaginis floccosis ciliatis
marginibus membranaceis, umbellis axillaribus terminalibusque, involucri monophyllo lanceo-
late, involucrique phyllis ovato-lanceolatis, reflexis acuminatis margine membranaceis; p-

etibus fissiformibus mucato-tuberculosis, stylis divergentibus. ♂?

Hab. in monte Sella supra Afrivium. Florat Junio.

Obs. Ex Anthosiferi speciebus a cl. Sprengelio enumeratis in Syst. veg. 1. p. 984 uni A. pamerisoidi mihi ignotis videtur affinis, a qua tamen, ex diagnosi, differt caulij forma, folijs minus compressis, lacinijs glabris lobisq; majoribus, calycis florisq; margine tantum serratis, umbellis quaeque axillaribus.

12. Athamantha flavescens mihi

A. diffusa, caule sulcato cano-scabro verticillatim ramosissimo; folijs ternatis-septatis compressis glabris, foliolis linearibus-subulatis mucronatis, umbellis multiradiatis axillaribus terminalibusq; involucri omnibus polyphyllis lanceolato-linearibus; seminibus peltatis canescentibus substellatis. ♂.

Hab. in rupibus Mandrici, Orzi, mont. Diakovo, Aguz, Afrivii. M. Julii.

Syn. Athamantha verticillata Portenschl. et Trattinn. En. pl. daln. p. 14. t. 4 non Smith.
— ramosissima Port. et Schult. Syst. veg. 6. p. 496 n. 14 non Link.

Obs. Florae et viridis flavescens, foetida. A. verticillata Sm. longicalis species inno diversis generis. A. ramosissima Link. ex cl. Steudeli Nomencl. bot. p. 90 synonymum est A. tuberosa Prot. quae a cl. Sprengelio refertur ad A. Matthioli. Hinc ad compressionem extendendam triviale nomen mutari. Non citata vivis manca.

13. Pastinaca selinoides mihi.

P. glabra, caule erecto striato ramoso; folijs petiolatis pinnatis, inferiorum foliolis ovato-acutis incisive-pinnatifidis, lacinijs ovatis lanceolatisq; integris marginibus scabris subtus venosis, superiorum foliolis lanceolatis subintegris; involucri subnullo. ♂

Hab. circa pagum Verlika in herbis, prope. Autumnus.

Obs. Genere ambigit inter Selina et Pastinaca. Fructus tamen et affinitas cum P. pimpinellifolia M. B., a qua differt characteribus a cl. Sprengelio datus (Syst. 1. p. 913) stirpem nostram Pastinacis adnumerant. Florae albi, subtus fructusque rubri.

14. Ornithogalum saxatile mihi.

O. saepe recto, folijs glaucis unicoloribus canaliculatis late linearibus ciliatis, mucronatis obtusis, bracteis lanceolato-linearibus longe acuminatis floraequeantibus; pedunculis fructiferis erectis; petalis oblongis, alteris obtusis; filamentis subulatis basi lacinijsq; sp.