[Az. B. 24/m. 22]

Enumeratio
Stirpium Dalmatiarum
Quas hactenus sibi observatas
Descripsit, Digessit,
Rariorumque iconibus illustravit

Robertus de Visiani

Medicinæ Doctor, olim in Patavina Universitate Scholæ Botanicæ Hortoque publico Professor Adsistens, Imp. ac. Reg. Athenaei Veneti, I. ac R. Academiæ Scientiarum, Litterarum Artiumque Patavinæ, I. ac R. Academiæ Georgophilorum Florentinæ, R. Academiæ Scientiarum Taurinensis, R. Societatis botanicæ Ratisbonensis, R. Societatis Medicoæ Botanicæ Londinensis Sodali

Vol. I

Nyhæa oblig. Lit.
fol. reg. 1842 n. 5.

~~Jadera~~

~~Petri et Francisci Battara~~

Typis ac Sumptibus

~~1832~~.

Resto del Karst

Del N°. 1 al 111 piante di Sign. Bottè Bright, Kadino Beker, Protoph

Del 112 al 148 Bicker

Del 149 al 230 Kimenigg, piante più alte della giogaja del Protoph.

NB. Plantæ in herbario deficientes signo + notantur.

Zwölf tage auf Montenegro und ein Blick auf Dalmatien von Doct. Wilhelm Ebel
Zweites Heft: Botanische Bemerkungen nebst vier Tafel abbildungen und einem Elenchus plantarum dalmaticarum
Koenigsberg 1844 8vo

Lilium gracile Ebel l. c. p. 8 t. 1. f. 1. est [illegible] montanum
[illegible] flore

Plantæ Dalmaticæ

Nomen.	Icon.	Observationes
+ Centranthus ruber Dl. gen.	Lam. Enc. Pl. 24. f. 2. Moris. hist. 3. s. 7. t. 14 f. 15	bene bene — Engl. bot. 153.
Salicornia herbacea Lin. [illegible]	Lam. Enc. Pl. 4. f. 1. Fl. Dan. t. 303	bene bene
" fruticosa	vide Kali Cam. Epit. 246 Zannich. 32. mala	bene
anceps? an macrostachya [illegible]	~~vide Cali Cam. Ep. 247~~	
Hippuris vulgaris β. Roth Engl. bot. t. 763 bene	vide Act. Paris. Vaill. 1719 tab. 1. f. 3. Bull. t. 365 Fl. Dan. t. 87 bene	bene — Folium emersis longioribus erectis, immersis [illegible] reflexa in nostra.
Callitriche verna Engl. bot. t. 722.	Lam. Enc. Pl. 5. f. 1 Fl. Dan. t. 129	Bene est [illegible] Mejo ad [illegible]
autumnalis? ~~an verna var.?~~	vid. Loes. pruss. t. 38. bene ~~[illegible] 3. t. 1. f. 2~~	Folia [illegible] truncato-emarginata, fructus sessilis majore [illegible] ut in icone Lam. 5. f. 3. f.
Zostera marina est [illegible]	Lam. Enc. Pl. 737 Engl. bot. t. 467	bene bene
Psilurus nardoides	vid. Cav. ic. t. 39. f. 1. Bocc. mus. 2. tab. 57. Host. gram. 4. t. 29 Vill. delph. 1. t. 2	bene bene Gram. [illegible] arundinacea. minimus [illegible] Aspalla [illegible]
Ligustrum vulgare Engl. bot. t. 764 bene	Lam. Enc. Illustr. 7. vide Bull. t. 295 Matth. 1. 188. ic. Fl. Dan. 1141	bene, ~~[illegible]~~ bene Vergoraz, Salona Apr. Maj. bene ~~[illegible] Lam.~~ bene
Phillyrea latifolia	Lam. Enc. Pl. 8. f. 2. Plukn. alm. t. 310 f. 4 v. Clus. hist. 1. p. 51 P. prima.	bene sed folia non subcordata [illegible] vide [illegible] folia subcordata [illegible]
Clus. β. media	Matth. 1. 189. v. P. tertia Clusii hist. p. 52	bene folia integra [illegible]
γ. laevis	v. P. arbor Lob. ic. 2. p. 132.	folia esse debent elliptica, subintegra, venosa. bene
+ Olea europæa	Lam. Enc. t. 8. f. 1. Matth. Comm. 1. p. 219. Matt. ib. 1. p. 218	bene bene male ob spinas axillares
+ — sylvestris	v. Sibth. Fl. gr. tab. 3. Dal. 2. t. 14	bene [illegible]

Syringa vulgaris — Matth. Comm. 2. 1293 — bene. Virgines Apr.
v. Cluf. hift. 1. p. 56.
v. Bull. herb. t. 265
Gratiola officinalis — Matth. Comm. 2. 734. — bene
Lobelius rubra — v. Bull. herb. t. 130. — medicus. pl. bonis. Lotio in pectoris Dan.
Lam. Pl. 16. f. 1.
Lycopus europæus — Lam. Enc. Pl. 18 — bene
H. Dan. t. 1081.
Eyl. bot. 1005 — Matth. Comm. 2. 1056. — bene — [illegible] pl. nimis inula
+Salvia glutinosa — v. Sabbat. hort. 3. t. 21. — nimis magna
Moriſ. Hiſt. Sect. II. t. 13. f. 18 — Rubia. iis. Horum flos latus opt.
Scleb.
Sp. Pf officinalis — Matth. Comm. 1. p. 747 — bene. S. Spir. Alm. Marinæ Apr. May.
Lam. Enc. Pl. 20. f. 1.
v. Blacku. tab. 60 — nebulos
+ β. acuta — Matth. Comm. 1. p. 748 — bene
Schkuhr nitida. Willd. — nimis — bene
v. Blacku. t. 67. 71 — nullius — quod speciem. Alia non aucta in iconibus
pratensis — v. Bull. herb. tab. 557. — opt. — Hormino. pratensis Riv. iis. opt.
v. Knaut. 2. 938 — ad Eng. it. pro S. sylvestri
Pf. Wallachia — v. Hormin. Tylo. III. Cluf. hiſt. p. 29 — Hormino. Riv. Apr. Jul.
v. Riviu. mant. tab. 60. — Hormino. spicatum bene
Pf. Marina — Horminum — v. Sibth. fl. gr. t. 20 — Mar. Apr. Horminum corona rubra Riv. iis. opt.
Matth. Lon. 2. 327 — medium an Sinuata
Hort. Upſ. 4. 1. 2. — Hormin. Apr. ic. bene
v. Hormin. ſubtot. Flor. Dan. ic. 200
virens — Reichb. Bent. 6. f. 227 — opt.
patulum
Pyr. Sclarea — Matth. 2. 939. — marium, Lactuca, Calth. May. Jul.
v. Blacku. hort. 1. 122 — Horminum Riviri ic. bene
206. ic. 856. f. 2. — bene
Pf Verbenaca — Reichb. Ic. VI. 17. f. 718 — bene — Sect. Horminum fl. Lactucis Riv. ordinis. iis.
Engelbr. t. 174 — Jacq. obſ. 1. 64. — bene
Pr. Marina — β. multifida — id. t. 6. f. 1. 320 — bene — Horminum et pro in Hungaria Cyp.
Cavanilles — in pratis Hiſp.
Rosmarinus officinalis — Matth. Comm. 2. 837 — bene — ſp. Apr. in inſ. Hiſp.
Lam. Enc. Pl. 19. — nullus
Pavia Rosmarinus — Jacq. bene
Veronica longifolia — v. Schmid. Comp. Ust. pl. 2. f. 1. — opt. — Nomen ſibi apposita non bene
subſpicata — Willd. Hort. Berol. 1. p. 11. — opt. — id. Nomen ſpecifica.
Kit. Pannon. 1. p. 44. — Fl. opportune vel Apr. ſtirpe. Nomen
spicata — v. Fl. Dan. tab. 52 — bene — glabrum
Reichb. Paris. t. 93. f. 1. — bene — Cilicia
M.N. Sonis ſeptyllifolia — v. Fl. Dan. tab. 492 — medicus. vulnus adjuvat nimis
v. Jacq. pyrgt. 41. — bene — V. minimum vagum Riv. opt.
β. pubescens — Hortorum varietas ſpicata (var. major) bene
Beccabunga — v. Fl. Dan. 811. Becc. — Riviu bene
v. Jacq. pyrgt. 593. — bene — Eyl. bot. t. 658.
v. Blacku. t. 45. f. 1 — bene

Veronica Anagallis — v. Fl. Dan. 903. — bene — Nomen ſibi Alia Anagallis in variis
Eyl. bot. t. 781 — v. Anag. aquat. Reich. hiſp. 2. f. 791
Mediterr. bene — officinalis — v. Lam. Enc. tab. 13. f. 2.
Salzſt. Beth. — v. Bull. herb. t. 293 — opt. — Eyl. bot. t. 765.
Veronica mystica Matt. 2. 930 — medicus.
Buxbaumii Chamædrys — v. Fl. Dan. t. 448 — bene — V. pratens. Lonicer. Nomen bene
Apr. — Auct. hiſt. 1. 552. Cham. pars. Lyſim. — bene
Eyl. bot. t. 623.
β. incisa
Sp. Bergſtraßiana — austriaca — v. Jacq. austr. t. 329. f. 2. — empiria f. 4. V. Pariſ. p. 388.
Mar. Mgn. bene — β. maritima
arvensis — v. Curt. Lond. fasc. 2. t. 2. — V. latifolia minus Nomen bene
Coleum. Phytolog. p. 21. tab. 3. — Fl. Dan. t. 515 nullus.
Eyl. bot. t. 734.
agrestis — Add. auct. tab. 1. f. 1.
Apr. Pf — agrestis — v. Curt. Lond. fasc. 1. t. 1.
Reichb. Ic. III. f. 45 f. 404-5. — optime. Ver. folio Chamædrys Riv. bene
Apr. Pf — hederifolia — v. Fl. Dan. t. 425. — bene — Riv. fl. 1. f. 76. f. 2
Eyl. bot. t. 784 — Buxbaumii — Venet. fl. nov. tab. 1. Riv. iis. bene
Pol. May. Pf — Venon fl. nov. tab. 1. — optime
Sibth. Fl. gr. 1. tab. 8.
Reichb. Ic. III. f. 430
Pf Pf — Cymbalaria — v. Riv. Fl. it. fragm. pent. t. 16. f. 1. — bene
Sibth. Fl. gr. tab. 9. — bene
Circæa lutetiana — Lam. Enc. Pl. 16. f. 1 — bene
Eyl. bot. 1056 bene — v. Fl. Dan. tab. 210 — bene
Add. ic. 206 ic. — bene
Alsinen germanicum — Vaill. Par. 1202 — bene — bene
v. Bulard. Pl. germ. tab. 5. f. 1. — bene — inſignis. Nomen
v. Host. Gram. 1. tab. 5. — bene
Anthoxanthum odoratum — v. Host. Gram. 1. tab. 5. — bene — Selinum Marinum. Cyp.
Leeſk. Prodrom. tab. 2. f. 1 — Eyl. bot. t. 642.
Lam. Enc. Pl. 23.

30

Valeriana montana — C. Bauh. Prodr. 87. f. inferus. — bene
Sibth. Brit. — v. Clus. hiſt. 1. p. 55 V. ſyl. alpin. — bene — Pan. auct. t. 269 bene
tuberosa — Matth. Comm. 1. p. 29 — bene — Verg. Sept. Apr.
Dalech. hiſt. 926 ic.
+ tripteris — C. B. Prodr. 86 ic. — bene
v. Jacq. austr. t. 268. — bene
officinalis — Lam. Enc. Pl. 24. f. 1. — bene — Corymbi. Nomen bene
Matth. Comm. 1. p. 44 — bene
Eyl. bot. t. 644.

Phleum pratense Leers. Fl. t. 3. f. 1. hum
Cyst. bot. 1876 hum v. Host. 3. t. 9. hum
C. B. Prodr. p. 10 f. exc. hum
Bohemia v. Gen. H. icc. t. 25. f. 2
Polypogon monspeliensis v. Host. 3. t. 46 hum Zwei Berg. Dam.
v. Schreb. gram. 1. t. 20.
Agrostis alba v. Host 3. t. 24 hum Sudeten mejs Dam. Tatragebirg
Milium effusum v. Host 3. t. 22 hum
Cyst. bot. 1906 hum Leers. Fl. t. 8. f. 2. hum
v. Fl. Dan. 1143. hum
Sesleria coerulea v. Sibth. fl. gr. t. 66 Agrostis Cyst. bot. t. 1904 hum
v. Host. gram. 3 t. 45 hum
v. Bertol. ic. 754 hum Sp. M.V. Mayr Dam.
Stipa pennata v. Host. 4. t. 33 hum
v. Barr. ic. t. 46 spadicea hum schon flavescens
v. Moretti spicil. f. 64 hum
Lam. Encycl. Pl. 41. f. 1. hum
Aristella v. All. auct. t. 2. f. 4.
v. Host gram. 4. t. 54 hum
Calamagrostis v. Host gram. 4. t. 43 hum
v. Schreb. gram. t. 1. f. 8. hum flavesc.
Agrostis vulgaris Sm. v. Host. 4. t. 59 hum Cyst. bot. t. 1671 hum cum sequentibus varians.
Leers t. 4. f. 3.
Agrostis Den
Cyst. bot. 1906 hum stolonifera v. Host. 4. t. 56 ? hum Formula continua corpora, namely subspecifically
stolonifera v. Host. 4. t. 57 C.
Cynosurus echinatus v. Host. 4. t. 93 hum
v. Barr. ic. 54. Gr. g. typologie a. media wij
Lagurus ovatus + v. Host. 1. t. 56 hum Dans, Baden Suc. Alp.
C. B. Prodr. p. 2. f. bot. hum
Hordeum murinum v. Host. 1. t. 32 hum S. Ser. Myr.
Fl. Dan. t. 678 hum
v. Jacq. ic. 30 hum
Cyst. bot. t. 1931 C
v. C. B. Prodr. 124.
pratense v. H. pratense Host. 1. t. 33 hum Salzburg
Reichenb. t. 760 Cyst. bot. t. 1899 hum
maritimum v. Host gram. 1. t. 34 hum Salzburg gratis Myr.
v. Fl. Dan. f. 1632. subinermis
All. Ped. t. 91 f. 3. hum

Hordeum bulbosum v. Desf. Atl. 1. t. 31
v. Host 4. t. 13 hum
Hyp. v. Barr. ic. 112. f. 2 hum Syr.
+ Digitaria sanguinalis v. Host. Gram. 2. t. 17. hum Cyst. bot. t. 849
Mutt. Comm. 2. 1068
Leers t. 2. f. 5 hum
+ sthenoides v. Host. 2. t. 18 hum
v. Clus hist. pl. 217 Gr. byst. hum Cyst. bot. t. 850 hum
v. Schr. gram. t. 2. f. 9. hum flavesc.
ciliaris v. Host. IV. t. 15 hum
v. Schreb gram. 1. t. 3. f. 7. hum flavesc.
Phalaris canariensis Bellardi Fl. nov. Acc. Berl. Dill. Elth. t. 354 f. 455 Pl. Hyp. 3. f. 4.
Ingrassia Observ. 1. t. 1. f. 1. Brera Dan. Cyst. bot. t. 1899 hum
Lagurus ovatus Lam. Encycl. Pl. 41. hum
Cyst. bot. 1899 hum v. Host. 2. t. 46 hum
Aira caryophyllea v. Host. 2. t. 85 hum
Flora Lapp. t. 5. f. 6. p. 26. hum
a. vulgaris
caryophyllea Lam. Encycl. Pl. 144 hum Host. Fl. Hung.
β. capillaris v. Host. 4. t. 35. hum Cyst. bot. t. 812 hum incipiens t. 22. hum
media Sonn.
Cyst. Fl. S. gen. 330 y. 2.
Hyp. Fl. t. 3. f. 3. hum Avena Cadium Host. Hyp. 2. t. 42
Melica ciliata v. Host. 2. t. 11 hum cum sequ. 4. t. 35 pilosa
Imperata cylindrica Willd. Cyst. bot. t. 1058 hum H. Dan. t. 1144 hum Gramineae Suc.
ciliata v. Host. 2. t. 12 hum
Schreb. Agr. t. 3. f. 16 Fl. K. hum
v. Clus hist. 2. p. 199
Saccharum Ravennae v. Jacq. hist. 1. t. 24
v. Host. 3. t. 1. hum
strictum Host gram. 2. t. 3. hum in pratis sylvaticis Slavoniae Hung. Alsat. sub Phal. arundinacea
Andropogon Allionii All. Ped. t. 91 f. 4 hum
virens v. Host. 4. t. 1. hum Diese als spielarten folgt Lagurus ovatus
v. Decand. gr. 315. t. 8. f. 1
paleaceus Jc. nostra
Psilurus v. Jacq. ic. rar. t. 630 aegypt.
v. Host. 3. t. 2. hum
Broccia t. 11 f. 1. hum
Ischaemum v. Host. gram. 2. t. 3. hum
Jacq. aegypt. t. 384 hum
Pollinia Griffithiana v. Host. gr. 2. t. 1. hum
Bauh. hist. 2. p. 436
Lam. t. 840 f. 1 hum

Sorghum halepense — v. Host. gr. 1. t. 1 — hm — Zapp. Lapeirn. Rr.
Schreb. agr. t. 11. f. 12 — hm

saccharatum — v. Host. gr. IV. t. 4. — hm (cultum)
vulgare — Add. Schrad. t. 4. f. 2.
v. Host. gr. IV. t. 3 — hm
f. Halepense — v. Host. gr. 2. t. 29 — hm
Cenchrus — v. Host. gr. 1. t. 2. — Zapp. M.W. Rm.
Cyst. bor. 1129 hm. — Pl. hm — 1181 — hm — in dry Norg
Chrysurus echinatus — v. Host. gr. 2. t. 95 — an hm
v. Barr. ic. t. 123. f. 2 — Cyst. bot. 1333
Pl. gr. t. 78
Rottboellia incurvata — v. Host. 1. t. 29 — hm — Zapp.
v. Cav. ic. 3. t. 213 — cpt.
Schreb. tab 2. f. 1. hb.
Pl. gr. t. 91.
Setaria verticillata — v. Host. 2. t. 13 — hm
Cyst. bot. 474 rare. — v. Mey. hist. 3. S. 8. t. 4. f. 11. — hm
Lam. Enc. Pl. 43. f. 1.
id. 875 hm widely — v. Host. 2. t. 14. — hm
v. Jacq. ic. 1. t. 22
Schreb. t. 2. f. 2.
+ indica — v. Host. 4. t. 11. — hm — hm
Mey. hist. 3. S. 3. f. 2. — rare
f. glauca — v. Host. 2. t. 15 — hm
v. Schreb. gram. t. 25
Leers t. 20. f. 2.
Orthopogon hm gallo id. 876 hm — v. Host. 2. t. 19 — hm — Dolich. Cyst.
Mnch. 1. 431 — hm
Panicum crus galli — v. Fl. gr. t. 59.
miliaceum — v. Host. gr. 2. t. 20 — hm
Mnch. 1. 429 — indica.
Beckmannia cruciformis — v. Host. gr. 3. t. 6 — hm
v. Denn. neog. t. 5. — often spindly hybrids
+ Secale cereale — v. Host. 2. t. 48 — hm — Mey.
v. Bloch. w. t. 424 — wild.
monstrosum — Cyst. Nadel. Flor. t. 45
+ Triticum — Spelta — v. Host 3. t. 32 — Zapp. hm
monococcum — v. id. 3. t. 26 — hm
vulgare — v. Host 2. t. 46 47 — hm — Spinat Mey.
villosum — v. Host 1. t. 28 — hm — Brenn. Dunn.

Cyst. bot. t. 221 hm
Triticum loliaceum — v. Host gr. 2. t. 27 — hm — Zapp.
v. Vis. Fl. it. fragm. 1. t. 23. f. 1. — hm — Journ. fl. cur. f. XVI. 6. hm
Cyst. bot. t. 221
repens — v. Host. 2. t. 21 — hm — Pabst Mey.
Cyst. bot. 929 hm — v. Fl. Dan. t. 748
glaucum — v. Host gr. 2. t. 26. f. 1 — Bern vaginehaut a. Leers. t. XII. f. 2 (? repens)
v. Host. 3. t. 33.
caninum — v. Host. 2. t. 25 — hm — Cyst. bot. 1382 ausse. hm.
v. Smd. 116. 1. t. 27 — Cyst. bot. 1382 ausse. hm.
Leers. tab XII f. 4 — spinke in meiner hm ausgesetzt
Phalaris — caerulescens — v. Host. 4. t. 29 — Pf. Dest. fl. atl. t. 24 non jacquin
paradoxa — Schk. H. Atl. t. 24 — hm
panicea — Host. 1. t. 22 — hm — Cyst. bot. t. 729 non rotboll.
sylvatica — v. Host 1. t. 21 — hm
v. Fl. Dan. t. 64
Cyst. bot. t. 729
Lolium perenne — v. Host. gr. 1. t. 25 — hm — Sp. Dolich. Major hm
Lolium. Lge. Pl. 484 f. 1 — hm — Cyst. bot. t. 315
Fenica Matt. 1973. — hm
Leers. t. 12. f. 1 — hm
p. vivipar — 6. Leers. ibid. — hm
arvense — Host 3. t. 25 — hm
Linn.?
temulentum — v. Host. 1. t. 26 — hm
Cyst. bot 1124 hm — Lam. 48. f. 2 — hm
Leers. t. XIV f. 2 — hm
+ speciosum — Dolich. hofp. 1. p. 411
Aegilops ovata — v. Host. gram. 2. t. 8. — hm — Marian. frag. in Sicily gen. mischsp. Major
Lam. Enc. Pl. 839. f. 1. — hm
Mnt. Prod. p. 81. f. 89 — M. gr. 93
triuncialis — v. Host. 2. t. 6 — hm — Salonn. Dunn. Major hm
v. Schreb. gram. t. 10. f. 1.
Lam. Enc. Pl. 839. f. 3. — hm — Aegilops hybrid
Hybrid
Asplenium nitidum? — v. Den. fl. neog. t. 103.
trinchinense — v. Schreb. gram. t. 6. f. 4. — hm — good flowg — Dioscor. Mart.
an Host 4. t. 22? — richtiger sein
Ischnatherum strictum — v. Host gr. 2. t. 97 — hm — ? Pilo Apr.

Bromus madritensis v. Host. 1. t. 17 bene . ad vias Clissa Majo
Engl. bot. 1006 bene
Barr. ic. t. 76 f. 1.
β. spiculis 12-floris Host. t. 18 B. rubens bene
+ mollis Leers herb. t. XI f. 1 bene
Engl. bot. 1078 bene Scheuchz. t. 5. f. 12 bene
v. Host. 1. t. 19. bene
Lam. Enc. Pl. 46. f. 1.
+ β. nanus
elatior Sch. Agr. t. 5. f. 18 bene Engl. bot. vid. not. in tab. 1592-3.
v. Host. 1. gr. t. 8.
erectus Sch. Agr. t. 5. f. 13 bene Spec fl. [illegible] f. 6 ic bene glaber
α glaber v. Host. 1. t. 10 bene Engl. bot. t. 471 opt.
β. villosus v. Vall. pari. t. 18. f. 2
Calamagrostis Epigejos Schrad. Prodr. t. 5 opt. In Valles Aug.
v. Host gr. 4. t. 42 bene Ph. arundinaceum [illegible]
v. Schr. germ. t. 4. f. 3 bene floris Engl. bot. t. 403 bene
+ Arundo ~~Phragmites~~ Donax v. Scheuchz. Agr. t. 3. f. 14 A. bene
v. Host. gr. 4. t. 38 bene
Matth. Comm.
+ Phragmites Leers t. 7. f. 1 mediocr. Engl. bot. t. 401 b.
v. Host. 4. t. 39 bene
v. Schr. germ. 1. t. 5. f. 4 bene floris
+ Psamma ~~arenaria~~ v. Host. 4. t. 41 bene ~~Engl. bot. t. 222 sub Phalar.~~ Engl. bot. t. 520 sub arund. bene
Nov. [illegible] Schrad. t. 5. f. 2. bene floris
Holcus umbellatus Fl. dan. t. 917. Lam. Enc. Pl. 51. f. 1. bene Engl. bot. 27 bene 10 fl. [illegible]
Brock. [illegible] t. 21. bene
Fl. Dan. t. 1204 bene
Roem. fl. [illegible] fasc. 2 ic bona
Polycarpon tetraphyllum Lam. Enc. Pl. 51. bene
v. Barr. ic. 534 bene
Matth. Com. 1096 bene

168

Globularia vulgaris v. Lob. ic. 478 f. 2 mediocr.
v. Moris hist. 3. f. 6. tab. 15 f. 26 mediocr.
cordifolia [illegible] v. Jacq. austr. 2. t. 245 bene Vergli Agr. MN. Ten.
Lam. Enc. t. 56 f. 2.
Moris hist. 3. f. 6 t. 15 f. [illegible] bene fol. integris [illegible]
β. nana v. Del. [illegible] Pl. [illegible] 2. t. 3
γ. bellidifolia v. ~~[illegible]~~

+ Dipsacus sylvestris Matth. Comm. 2. 699 bene
v. Blackw. t. 50 bene
v. Jacq. austr. t. 402 bene
+ laciniatus v. Jacq. austr. t. 403 (non 405) bene
v. Moris hist. 3. 1. 7 t. 36 f. 4 bene
Lam. Enc. Pl. 56 f. 2.
Scabiosa arvensis Lam. Enc. Pl. 57. f. 1. bene grand. floris Cult. MN. [illegible]
v. Fl. dan. t. 447 bene [illegible] Ten. [illegible]
Bauh. hist. 3. f. 2. Engl. bot. t. 659 bene
β. integrifolia v. ~~Roth fl. germ.~~ [illegible] Ten.
[illegible] integrifolia Savi [illegible] 1. t. 2. f. 1 bene
β. lyrata id. 1. t. 2. f. 6. 1. bene
collina [illegible] arvensis var.
Succisa transylvanica v. Jacq. hort. vind. t. 3. tab. 111 bene
Reichb. Cent. II f 234 opt.
leucantha α. Reich. Cent. IV f 537 opt. Scopoli [illegible]
Vir. fl. [illegible] 1. t. 18 opt.
β. integrifolia
γ. [illegible]
δ. Scopolii
ε. bipinnatifida
repens [illegible] v. Fl. [illegible] 1. t. 2. bene
v. [illegible] p. 76. bene fol. [illegible]
v. Reichb. Cent. IV. f. 585 bene
Asterocephalus holosericeus [illegible] Gerard Herball, p. 719 f. 2. bene
[illegible] Reichb. IV. f. 535. [illegible]
grandiflorus [illegible] Sieg. del. fl. ins. t. 14 bene
[illegible] Reich. Ic. Cent. 4. f 506 [illegible]
Pterocephalus multisetus Ic. nova
β. integrifolius
γ. triphyllus
Galium cruciatum Engl. bot. t. 143 bene [illegible]
pedemontanum All. auct. t. 5
Waldst. Kit. 1. t. 33 fol. oblonga
Bauhini v. W. Kit. t. 32 bene [illegible]
[illegible] divaricatum [illegible] Del. ic. [illegible] t. 24 bene

Symphytum officinale v. Fl. Dan. t. 664 offic.
v. Blackw. t. 252 bon
v. Matth. Comm. Disp. regim 1012 – offic.
Engl. bot. t. 817 bon
tuberosum Jacq. Obs. 3. t. 63 off. fruticosum Kniphof. Lapp. Bot.
Engl. bot. t. 225 bon
Pollich. Pl. Lemb. 3. f. 35. bon
Asperugo procumbens Lam. Enc. Pl. 92 bon
v. H. Dan. t. 552. bon Engl. bot. t. 661 bon
Cynoglossum pictum v. Clus. hist. 2. p. 162 f. 2 bon
v. Cam. Col. Epit. 1. t. 171 pess. C. chinense Lapp. non
Lobel. Icon. 1. t. 175 bon
Echinospermum Lappula Lam. Enc. Pl. 91 bon Engl. bot. t. 842 bon
v. H. Dan. 692. bon
Anchusa officinalis Lam. Enc. Pl. 101 bon Lapp. Bonn
v. Storck fl. germ. 1. f. 1. t. 2 Matth. hist. p. 18 offic.
Ang. inspic. Matth. Engl. bot. t. 529 bon
+ coerulea v. H. Dan. 1570 bon Spenn. Lapp.
Blackw. Engl. bot. t. 1823 bon
a. femina Matth. Matth. hist. p. 19 f. pr.
β. viridi-albida Matth. β. Spenn. Lapp. Bonn
Lycopsis Nemausensis v. H. Dan. t. 493 bon
Nemaus. Matth. Jacq.
Engl. bot. t. 528 bon
vesicaria Lam. Enc. Pl. 101 f. 1. bon Mor. Kniphof. Lapp. Bot.
Dalt. hist. t. 347 bon
H. Dan. t. 689 bon Engl. bot. t. 841 bon
pumila v. Clus. hist. p. 181. Lill. f. 2 bon
v. Jacq. Austr. 1. t. 366 bon
Cerinthe Scabra Magn. monsp. t. 162
v. Sibth. Fl. gr. t. 189
Cynoglossum amplissimum Jacq. Fl. austr. 3. t. 218 Almissa Mayo
Clus. hist. 1. p. 265 f. 2 similius. Sed radix perennis
repandum Sibth. Fl. gr. 2. t. 186. Spalato minium glabr.
Primula veris Cal. Sepher. 1. p. 235 bon Stagno Lapp. Bonn. Mor. Mor.
v. Jacq. Fl. austr. 1. t. 19 bon
officinalis v. Cal. Phyt. 6. f. 1 Lapp.
v. Clus. hist. 1. p. 302 medium. Engl. bot. t. 4 bon

Androsace villosa v. Jacq. Collect. 1. t. 12. f. 3. bon
Pallas It. Taur. 1. p. 188 bon
Erythraea Centaurium Centaurium Matth. 692 bon Engl. bot. t. 417 bon
Cerinthe Kitaibelii v. H. Dan. t. 617 glabra grandiflora Lapp.
Kitaibeli major & glabra v. Reneal. Spicil. t. 76.
β. albiflora
grandiflora H. Sic. t. 103
Menyanthes trifoliata Cap. Pamphl. 1. t. 199
latifolia Col. Ecphr. 2. t. 77 bon Bergonii Lemon. Nat. Groning. et in
Barr. Ic. 466 med. Lugd. Batav. Mill. Dal. Pedem. et Pany. Osnab.
spicata C. B. Prod. p. 130 Hedera bon
Zannich. Hist. p. 56. f. 3 fl. alba
Convolvulus tricolor Sibth. Fl. gr. 2. t. 195 offic. S. Jacob. Clusii Jacq. Lapp. Mayo
Cap. pamphl. 1. t. 57
arvensis H. Dan. 459 bon
Dalt. hist. t. 269 bon Engl. bot. t. 312 bon
Bod. pempt. 393
Clus. hist. medium.
sepium Lam. Enc. Pl. 104 f. 1. Jacq. Catt. Junio Alm. Mon.
Smith. Brit. Matth. 1272 med. Engl. bot. t. 313 bon
H. Dan. t. 458. bon
Cuscuta Sibth. Fl. gr. t. 200 S. Nicolai di Lesina ad radices
Tabern. Icon. 2. p. 6. t. 18 Cupressi
Cantabrica Jacq. Austr. t. 296 bon Pomaria di Spalato Mayo
v. Clus. hist. 2. p. 49 bon
Hyoscyamus niger Dalt. hist. t. 93 bon Verona Mt. Apollon.
Bod. pempt. 450 med.
Historia Matth. med.
Hyoscyamus albus Lam. Enc. Pl. 117 f. 2 Mayo
Matth.
Blackw. t. 111 bon
viscosus Dalt. hist. t. 99 non bon Apoll.
Hoffm. Fl. Mosq.
+ Nicotiana rustica Dalt. hist. t. 249 bon Bonelli Lapsch. Lapp. Bonn.
Matth. Comm. 1121 bon
Verbascum Thapsus H. Dan. t. 631; fol. Spenn. bon Alm. Catt. Apr. Jun.
Lam. Enc. Pl. III.
β. thapsoides Matth. Matth. hist. p. 1207 Illyrica fol. sepius ang. inferius
Nicotiana Matth. Alm. Hist. p. 1207 Dan.
Olivieri Comm. Epist. p. 882 bon
Schrank. hist. p. 1302
v. Sibth. Fl. Gr. 6. t. 522

Campanula lingulata — W. Kit. hung. 1. t. 64 — Reichb. N. Cent. VI. f. 380-81

grominifolia — W. Kit. t. 154

Col. Phyt. t. 25

Bon. fic.

p. fl. lepidoto — an tenuifol. W. Kit. t. 155. cfr.

Erinus — Col. Phyt. t. 28

Barrelieri — Jacquin ic. rar. t. 2.

Specularia — Lob. ic. 448 — Dod. pempt. 102 — p. Barrelieri — p. fl. lepidoto

falcata — Jacq. fl. austr. 1. t. 20

Biscut. Cent. 4. t. 38

familia — Prot. Eu. Pl. Ind.

Lonicera etrusca Santi — Jacq. austr. t. 274

balearica

algira — Jacq. austr. t. 274

Chaixiana — Jacq. hist. p. 59

Phyteuma integrifolium — Jacq. austr.

Chaixii — Chaix. hist. p. 111.

Jacquini — Hall. 43

Scheuchzeri — Jacq. Coll. 1. t. 5

Haenkeana — Jacq. Fl. carn. t. 2. f. 2

Absinthium — Chaix. hist. 1. p. 50

Balbisianum — Jacq. ic. rar. t. 50

Blackw. t. 134

Lam. Enc. Pl. 145 f. 1.

Campanula cenisia — Fl. dan. 1089

Haenkeana — Lam. Ekl. Pl. 131

Chaix. hist. p. 37 Tw. I

Chaix. hist. ib. Tw. II

Jacq. austr. t. 49

Viola odorata — Fl. Dan. 309 — Ball. 169 — Engl. Bot. t. 619

p. albiflora

hirta — Fl. Dan. 623 — Cam. Epit. 912

p. arvensis — Cam. Ic. 913 — Sol. Biscay. Mant. Appx.

p. patavina

canina — Reichb. N. Cent. I f. 75.

Riviniana — Mutth. Comm. 185 — Blackw. tab. 285 — Lob. ic. 2. p. 202. f. 1

Engl. Bot. 1289

Sowerbiana

subflexuosa W. Kit

Grimmeiana — Blackw. t. 271 — Engl. Bot. 1292

Zimmermanniana

Hedera Helix — Lam. Enc. Pl. 145 — Ball. tab. t. 133 — Blackw. t. 188

Engl. Bot. 1287

Pennsylvanica — Reichb. N. Cent. V f. 645

Thesium Linophyllon — Reichb. N. Cent. VIII f. 947

Pyrenaicum — Lam. Enc. Pl. 177

Cynanchum acutum — Lam. Enc. Pl. 177 f. 2

monspeliacum — Jacq. Coll. 1. t. 1. f. 2

Fl. gr. t. 251

Vincetoxicum — Fl. Dan. t. 849

Jacq. Coll. 1. t. 1. f. 5

Ball. tab. t. 31.

Lam. Enc. Pl. 175.

Gentiana acaulis — Jacq. austr. t. 195 — Bauh. ic. 43 — Engl. Bot. t. 1594

Sargentii hort. — Lob. ic. 308. f. 2

Chaix. hist. p. 141

Jacq. ic. t. 139. f. 2

Linum radiflorum — Moris hist. 2 s. 5. t. 6 f. 11 — 2 pl. Jun.
Col. Ecphr. 2. t. 80

strictum — Sibth. fl. gr. t. 304 — Pag. Steigerwald (Kropf) Aug.

Hieracium p. campanulifl. — Lob. ic. 414 — Mr. in agr. Apollonii ad Myc. planum
Bauh. pin. 120 — bona ad nicaeam, varietas, flore intus luteo
P. Boccone p. 2. p. 812. — nimis vulgare, ad aquas.

— Clusii hist. p. 347 f. ext.
Tragi. augusti. t. 214.

279

Ornithogalum luteum — Pona in Istria Aun. 11. t. 1. f. 1 — bona Engl. bot. t. 21 bona
Thom. Johnst. fl. 12.

— arvense — Pona ib. t. 1. f. 2. — bona
Fl. gr. t. 332

Fritillaria in agris prope Mar. — H. Ran. t. 66
Lipsi. pro Dorycnio habitus — H. Aur. 1206 — opt.
Lugd. auctar. t. 130
Pona hist. auctar. f. 343 — bona — Sp. Aqu.
Bon. 2. Math. Cama.

pyrenaicum p. alt. syn. Barrel. — exaratum Den. fl. neap. 1. t. 34 — bona Pag. Mentzel.
Reichb. Ic. Cent. II p. 269 — bona

— comosum p. Barrelii — Ic. ruspae — Cluna Maj.

— divaricatum — Trag. ic. rar. t. 426 — bona
Clus. hist. 187 — vidi in Pourgal. bona in Clus. in pal. Clus.
Barrel. Icon. t. 1142 — bonum Flora Gyrani in Ic. Tragi. Gyrani
Tragi. auctar. t. 103 — vidi ipse. — tuberum amarum.
Tragi. Hist. 222 — Gyrani. — brevis.
Clus. hist. 1. p. 186 — bona — 87 cubitos pyram. ac dud.
Pona ib. t. 1. f. 221 — vidi ipse Clusii
Col. ecphr. 1. t. 83. — Hercules. Spec. hispan. p. 92 bona
Boccone rar. t. 728

Allium fistulosum Lob. — Lob. ic. t. 138 f. 1. — bona

— vineale — Dod. Pempt. 176 — bona
Lob. ic. t. 138 f. 2. — bona — Brock. Ic. t. 1. t. 44 bona

— pyrenaicum — Lob. ic. 135 f. 2. bona

Aconitum lycoctonum — Matth. ger. t. 24 f. 5
Sibth. Flor. t. 312 — Engl. bot. t. 637 bona
Lob. ic. t. 385
Clus. hist. p. 190 — vidi.
Kapella Lichtenstein p. Cepa — Lob. ic. 150 f. 1. 2 — bona
Dodon. pempt. 684 — bona

Allium ascalonicum Lob. — Matth. ger. t. 4. t. 14 f. 3 — bona ad pinos Florentiae
Cupani Sicul. Matth.

— sphaerocephalon — Clus. hist. 1. p. 195 f. sup. — bona
Matth. ger. t. 24 f. 2
— d. pilosum — Bocc. t. 39
Bot. mag. t. 1764

— descendens — Cast. magy. 251 — opt.
Hall. 2. All. t. 2. f. 1
Sibth. fl. gr. t. 316. — non bona reginensis planta nostra

— rotundum — W. Kit. t. 62 — bona
Clus. hist. 1. p. 195
Gerard hist. p. 86. f. 2 — bona ad Monte Pisano
— carinatum — Reichb. N. V. f. 602 — opt.
Hall. t. 2. f. 2 — Engl. bot. t. 1638 bona

— magicum — Sibth. fl. gr. t. 323 — bona ad b. montalbanum.
Lucy. auctar. t. 10
? Waldst. Kit. t. 17 — quod adnexum bona
Cyr. fl. nap. spec. 2. t. 5. — bona
Dod. pempt. 665.

— asphodelum — Cyr. fl. nap. spec. 1. t. 4 — bona — Agr. Spol. in bosco
Sibth. fl. gr. 1. t. 325
Pod. tab. t. 100

— sativum — Pod. tab. t. 108. — Lug. Alm. macaron Agr. Magio
an — bona in iconibus ad locum citatum
b. opt. Mihi nimis d. sign. a. sativum — Cyr. phyt. f. 2. t. 6 — bona ad vulgare
Ung. probably the same — Barrel. 1274 — in agris ad Magio abundans, Nobis Magio thomasii. Dupl. bona gigantea, 1876 bona, copiosum Maj.
— Dod. Pempt. t. 943
— serotinum — Ch. hist. p. 196 Alb. II. — bona
Cruda. Sib. t. 11. f. 2.

— roseum — Sibth. gr. t. 314 — Pag. Ignem. Mazzoni Salone Agr. Magio
Tragi. ic. rar. t. 360 — vidi b. Aloysius opt.

— p. bulbiferum — Sibth. fl. gr. t. 327
Den. fl. neap. 1. t. 28 — bona
Lob. ic. t. 160 f. inf. — bona

— paniculatum — Reichb. Ic. Cent. V. f. 604 — opt.
Hall. t. 1. f. 1. d. alb.
Bot. mag. t. 1432. — Nullo. Nisano. Jun. Julio
Sibth. fl. gr. t. 317
Pod. tab. t. 272 — fl. semitans. subdiaphana
Col. Ecphr. 2. t. 7 f. 2 — in Pallene et Pag. medio. Vulg. — inventa Nepae semulcum hodie, pube obtusa, ovis elongatis subtilissimis
— Kit. ic. t. 246
Clusii. t. 316

Allium flavum — Jacq. austr. t. 141 — bina
Pod. lil. t. 119
Amoen. I. 39. Clus. hist. I. p. 194 bina

Chamaeroby — Cl. Segu. I. t. 326 bina
Lilium pyrenaicum
Pon. lil. t. 325

moschatum — Reichb. Ic. V. f. 615 — D — In nepos gehört ohne Zweifel hieher!
W. Kit. ic. t. 68 bina 1 pet. anth.
Cav. ic. 3 t. 206 f. 1. id
Bauh. pin. 28 — pet. anth.
Eyg. bot. t. 322 bina
Narcissus Dapsitta — Sibth. fl. gr. t. 306
Bot. mag. 224
Lam. Enc. Pl. 229. f. 1 — varietas ob petala exacte unguiculata
Cant. bot. mag. 915 — bina — 10 bina alba
Cant. bot. mag. t. 940 — varietas — 1 pet. t. 8. f. 2 — 10 ad supra
Hyz. t. 368 — — — bina varietas
p. plenus — Lob. hist. t. 153 f. ext. bina
poeticus — Dalib. herb. t. 306 — opt. — Discolor Maj.
Pod. lil. t. 160 — Eyg. bot. t. 278 opt.
Dur. ic. 927 — 30 — Dalib. herb. 389 bina
Pseudo-Narcissus — Eyg. bot. t. 17 bina
Ferraria illyrica — Schlosser in Cat. Sag. in Lond. 2. t. 14 — Ft. bracteis binatis
Clus. hist. t. 185
en meist. tr. Ic. rar. 309 — Sibth. Oxon. t. 8. f. 1 — simplex — Wiesbur — Eyg. bot.
Cl. Hist. 1. 167 bina — Travers Herbarium t. 27
Galanthus nivalis — Lam. Enc. Pl. 230 — bina
Pona fl. cur. fasc. 5. ic. — bina — Engl. bot. t. 89 bina
Jacq. austr. t. 330 — 313 bina — Ft. bina — 1265 opt.
Leucojum aestivum — Lam. Enc. Pl. 230 f. 2 — bina — Sal. Alm. Aqu. Maj.
Jacq. austr. t. 203 — bina — Engl. bot. t. 621 bina.
Narc. VII. Matth.
Strobilanthes callicistus — W. Kit. t. 159 — bina — In gelbl. traves Cleve
Cl. hist. Narc. aut. min. p. 164 bina
luteus — Sibth. fl. gr. t. 310 — Spalax S. Spirlan
Barbat. t. 48. Cant. mag. 290 opt.
Lilium candidum — Sibth. Moth. Cow.
Blackw. t. 11 bina
Pod. lil. t. 199 — Cant. mag. 278 bina

Lilium chalcedonicum — Jacq. austr. app. t. 20 — bina
Cant. mag. 30 — Cl. hist. Lil. 2. p. 191 bina
Cant. mag. 961.
Martagon — Jacq. austr. t. 351 bina — Stapp, Pillich MN. Ban. Pal.
Cant. mag. 893
Lam. Enc. Pl. 246 f. 3 — bina
Duliqua sylvestris — Poem. fl. cur. f. 7 — bina — Vergara Aqu.
Pl. Dan. t. 375 — bina
Engl. bot. t. 243 — bina
Lam. Enc. Pl. 245 f. 1. pet. anth. — Pistille in nepos antheris oblongis
Fritillaria Meleagris — Cavill. Md. — Jacq. austr. app. t. 32 — v. Bot. mag. 664
an pyrenaica — Cant. mag. 932 et 946
var. bifora ex Jacq. — Sims fl. gr. t. 328 — 10 unifloris
Erythronium dens canis — Clus. hist. p. 266 — bina — Pillich Aqu. Dioscur. Maj.
Jacq. austr. app. t. 9 — bina — 10 flos. unicis bina
Lam. Enc. Pl. 244 f. 1
Pod. lil. t. 191.
Hyacinthus orientalis — Matth. Comm. — Bot. mag. 933 — 993
romanus — Sibth. Flor. t. 340 — Aqu. Israelis
Seb. et Maur. rom. fasc. 2. t. 52
Pod. lil. t. 334
Muscari moschatum — Lob. ic. t. 109 f. 2 — bina
Pod. lil. t. 132
Galanthus nivalis — Jacq. austr. 2. t. 126 — bina — Aqu. Sal. et Alb.
Pod. lil. t. 231
H. com. III Bod. pengt. 218
Lob. ic. 106 f. 2 — bina
racemosus — Lob. ic. 107 f. 2 — bina — Sp. Stapp Aqu.
Jacq. austr. t. 147 — bina
Pod. lil. t. 232 — Bot. mag. 122 bina
botryoides — Lob. ic. 108 f. 1 — bina
Fuchs — H. III — Cl. hist. II. p. 181 f. ext. — bina
Bot. mag. t. 1371 — bina
Scilla bifolia — Pl. Dan. t. 158 — Jacq. austr. t. 117 bina
Poem. fl. cur. app. f. 5. 2 bina — Engl. bot. t. 241 bina
Ic. exsicc. 238 f. 1
H. Bud. Bod. pengt. 219
autumnalis — Cant. bot. fasc. 6 t. 29 — Ins. Sille Pestrovidi Pannie
Cav. ic. III t. 274 f. 2 — opt.
Engl. bot. 28 in gem. pl. — Lat. binatus bract. ovato-lanceolatis

Scilla maritima — S. hisp. Clus. hist. p. 171. — Byn. Squilla Lusit. myag. 918 Blackw. t. 591.

· hyacinthoides — Lusit. myag. 1140 Clus. hisp. 172.

amethystina — Wolfg. Kit. ic. t. 189

pratensis — Hyacinthella cinerea Clus. hist. p. 184

in prat. Mt. Selles — Lusit. myag. 663?

Agave americana — Lam. Enc. Pl. 235 f. 1.

Smaken glassie — Lob. ic. 37 Cam. Hort. t. 5

+ Asphodelus ramosus — Cav. ic. 3. t. 207. — Clus. hisp. 2. p. 197 A. minor — Sibth. fl. gr. t. 335

albus ? ramosus — A. 1. Clus. hisp. 1. p. 196 f. inf. — Jacq. austr. t. 161 — Sturm fl. germ. p. 1. f. 6. t. 6

erectus — Jacq. Eclog. 1. t. 77 — Bot. mag. t. 2626

luteus — Jacq. H. Vind. 1. t. 77 — Bot. mag. t. 733 — Blackw. t. 233

Anthericum Liliago — Jacq. H. Vind. 3. t. 83 — Fl. Dan. t. 616 — Icon. Enc. Pl. 240 f. 2 — Jacq. austr. t. 161 — Fl. Dan. 1137 — Lob. ic. t. 141 f. 2

ramosum — A. hisp. 2 p. 177 f. inf. — Sibth. Hort. v. t. 53 — Sibth. gr. t. 337.

Sylvaticum — Wolfg. Kit. ic. t. 201

amoenum — A. hisp. 2 p. 179 — Pers. Syn. 1. p. 446

Convallaria majalis — Fl. Dan. t. 854. — Lam. Enc. Pl. 248 — Sibth. Hort. 1. t. 5.

Polygonatum — Fl. Dan. t. 377 — Moth. Phytol. Pod. lil. t. 258

latifolia — Jacq. austr. t. 232 — Phyt. III. Clus. hist. p. 276 — Bull. herb. t. 304

Smilax aspera — Moth. A. hist. 1. p. 112 f. inf. — Sibth. Fl. oec. 2. nov. t. t. 53.

Tamus bluffbosy — Lees. herb. t. 13. f. 7 — Fl. Dan. t. 431 — Host. germ. 3. t. 89

+ officinalis — Host. fl. 3. t. 83 — Lees. t. 13. f. 2 — Fl. Dan. 1096

Lilium Martagon — Host. gr. 3. t. 81 — Fl. Dan. 1159

pyrenaicum — Moris hist. 3. s. 8. t. 9. f. 2 — Engl. bot. t. 2143 — D. C. Bot. p. 12 f. ext.

canadense — Host. gr. 4. t. 97 — Moris. hist. 3. s. 8 t. 10. f. 15

+ maritimum — Host. gr. 3. t. 80 — Fl. Dan. 689 — Moris. ib. f. 14.

bulbiferum — Host. 3. t. 90 — Fl. Dan. 1098

Ornithogalum umbellatum — Lees. t. 13. f. 8

Lonicera caprifolium — Fl. Dan. 1933 — Host. 3. t. 97 — Lees. t. 13. f. 5

alpigena — Lees. t. 13. f. 9 — Host. 3. t. 95 — Hoffm. germ. 1. t. 6

Betonica officinalis — Lam. Enc. Pl. 253 f. 1 — Fl. Dan. 904 — Blackw. t. 163

Cichorium autumnale — Act. Mosq. VII t. 15 — v. sanct. Engl. bot. t. 133.

β. minus — Sibth. fl. gr. t. 350 ! 6 pt. — Differt ab autumnali tantum petiolis brevibus

Prod. Lit. t. 238 — Cat. hist. 1. 199. 200 — minus bene

Cat. plantar. t. 4 n. 5.

montanum — Ic. rar. — Cretzschm., Sagorius, Brotero, Lagasc.

an Lobelii pro 200 — C. Bauhini Sdv. Act. Mosq. VII p. 72. — C. Cyprium Linn. Sp. pl. 1. 1. Cheiranthus Cheiri Linn. Sp. pl. 1. 1. Cheiranthus Cheiri Linn. Sp. pl. 1. 1.

Erysimum Barbarea — Barr. ic. t. 271. — bene — Cheiranthus Cheiri Linn. Sp. pl. Vol. 1. pag. III. p. 1319.

Cardamine maritima — Fl. Dan. t. 306 — bene — differt C. pratensis Thomasii foliis caulinis ad basin auriculatis

Cardamine pratensis — Fl. Dan. t. 306 — bene — Linnaei folia bulbo polyphyllo, pluries auriculata magnis crenis

Cardamine pratensis — Lam. Enc. Pl. 343

Veronicum album — Bay. angl. 4. t. 338 — bene — Lob. ic. 1. 167 bene — an Lobelianum ? Lobelii obs. pag. 165 Schkuhr t. 241.

Pillitz, Jacquin Austr. — Fl. Dan. 1120

Ranunculus thyrsiflorus — Sabaud. ic. 437

angl. bot. 2014

Nemolapsa — Cant. Lond. fasc. 3. t. 21

crispus — Lam. Enc. Pl. 271 f. h. — bene — Reichl. N. VI. f. 283 — bene — Cant. Lond. fasc. 2. t. 20 — Engl. bot. t. 1998

Munt. bibl. t. 190

acutus — Munt. ib. t. 189 — Engl. bot. t. 324 — Blackw. t. 491 — bene

palustris — Moris. hist. 2. s. 5. t. 27. f. 13 — Engl. bot. t. 1576 — Dill. h. giss. t. 37 f. 2 — Reichl. N. V. f. 679 — bene

Sturbridgensis β. glaucus — Jacq. ic. rar. 1. t. 67 — medius. — Sod. pumpt. 649 — f. ext. bene

Ranunculus — Blackw. t. 230 — bene — Engl. bot. t. 127 — Mutil. v. auctor. Moth. Moris. hist. 2. s. 5. t. 26. f. 11

tuberosus — Lam. hist. t. 84. — bene — Sibth. fl. gr. t. 348

Ranunculus Aethiopicus — Fl. Dan. 1171 — bene — M. N. Lasbra Pers. — Act. nov. Moth. — Blackw. t. 309 — bene — Engl. bot. 1674 — Cant. Lond.

β. multifidus — Bocc. mus. t. 126 — Aethiopicus minor Chrysanthemi folio — bene

γ. angustifolius

Alisma Plantago — Lam. Enc. Pl. 272 — Bauhini Cathol. Lugd. Agr. Lam. — Fl. Dan. 561 — Engl. bot. 837 — bene

β. angustifol. — Sibth. agr. Moth. — Bauh. ic. 1. 857. — bene

ranunculoides — Fl. Dan. 122

Sibth. — Reichl. N. Cant. 1. f. 79 — bene — Engl. bot. t. 926 — bene

Lob. ic. 1. t. 300 f. 2. — bene

95

Cant. Lond. 2. t. 25

Cucubalus Behen — Clus. hist. 1. p. 41 Cl. supplem. 1. — mediterr. in Hisp. — Cl. in ed. 214 f. 1 — Pluk. t. 251 f. 1

Silene — Cl. hist. 1. p. 42 f. inf. — mediterr. — Cl. in ed. 215 f. 1 — Cl. in Hisp.

Viscaria vulgaris — bene — Dill. Elth. — Cl. cor. fol. II — Cluj. hist. 1. p. 42 f. ext. sp. nativ. Pannon. — Dod. pempt. 271. — Lobel Icon. — vagans f. Clusii Lobel Nov. Obs. Addit. — glabra Clusii — Schkuhr t. 241.

Viscaria vulgaris — bene — Lam. enc. 1. t. 32 — bene — Cl. hist. 1. p. 44 f. ext. et int. — mediterr.

Viscaria Dioscoridis — vulgaris — Cant. Lond. — Fl. Dan. t. 877 — bene — Schkuhr t. 241 — Dill. Elth. 341 — bene

Cucubalus acaulis — Reichl. N. III. f. 351 — bene — Cattier Lugd. Bat. — Brotero Lusit. — Sering

Cucubalus Otites — Cucubalus Hyoscyamifolius — Matth. Comm. — Lam. Enc. Pl. 737 — Cap. ic. 2. f. 191 — opt. — Otites vulgaris Cast. Zwickauer Nat. — Pluk. Alm. t. 251 f. 3 — Bocc. rar. t. 18 f. 3. — bene — Bocc. Pisan.

Cucubalus otites — Jacq. fl. austr. 1. t. 100 — bene

Cucubalus acaulis — Pl. B. hist. 1. p. 2. pag. 166 — Engl. bot. t. 1. 82 — bene — Del. natur. 1. t. 10 f. 2. — Pisan. bene

Cucubalus Pseudo-platanus — Cap. hort. Cl. hist. 1. p. 10 — Bocc. rar. 1. t. 90 f. 1. — bene — Pisan. — Engl. bot. t. 303 — bene

Cucubalus Behen — Epilobium angustifolium — Fl. Dan. 289 — bene — Pl. B. hist. 2. p. 907 f. 1. — Engl. bot. t. 1917 — bene

Rosa alpina var. pyrenaica Soc. Ill. t. 19 bene
" alpina Mey. auct. t. 279 bene
spinosissima Dec. prodr. 2. t. 124 opt. M. N. Pauis
Engl. bot. t. 187 ? Vallis. Pennis. Aug
glutinosa Mutth.
Dech. arb. 2. t. 53

β. pumila Dec. auctor. 2. t. 198 bene 2 opt. Kuriosa Ins. Aboy
γ. Sabinica Pall. fl. ross. 2. t. 1 f. 3. bene descripta pet. exemplar.

rubiginosa Dec. auctor. t. 50 bene Bellegra
Sturm. pflanzen p. 1. f. 18 B. 10
agrestis Pall. fl. ross. 2. t. 6. 2. bene

+ canina Blackw. t. 8 Sp. Agr. Maj
Fl. Dan. 555 opt.
Sm. Engl. bot. 992

Sicyonia
hemetorum Sm. Engl. bot. t. 2579 opt.

+ arvensis Sm. Engl. bot. t. 188 bene
Fl. Dan. t. 298
Bauh. hist. 2. p. 44 f. 1.

sempervirens Bulliard. herb. n. 7. t. 13 f. 1 Sp. Catt. Legnan Lastra Majella
Trio. prodr. 1. p. 4. t. 6 bene
Pall. alth. t. 246 f. 318 bene

31

Engl. bot. t. 643 ?
Cupanea Arzenone Fl. Dan. 461 bene Chiese. M. N. Majo bene
Lob. ic. 276 f. 2 media
Pauis hist. S. 3. t. 14 f. 10
+ Ulmifolia Mutth. Engl. bot. t. 645 ? Cagr. Maj. Spol.
Kadurck Mutkely Blackw. t. 2 bene
Xdurisky
Salb. H. ross. 4. t. 62.
Chalidonia Lam. Enc. N. 451 Engl. bot. t. 2145 ?
cornuta
magna Bull. herb. t. 57 bene
Blackw. t. 482 bene
hybridum engl. bot. t. 43 bene
vela coffinigia prop. alt.

Chelidonium majus Fuchs. hist. 865 Engl. bot. t. 1581 ?
Lam. Enc. N. 450 f. 1 bene
Fl. Dan. t. 542 bene
Glaucium luteum Cam. Epit. 805 Sp. Dobrik Majo bene
Engl. bot. t. 8 bene
Fl. Dan. t. 585

Argemone spicata Lam. Enc. N. 446 f. 1 bene
Fl. Dan. 589
Blackw. 565.

Papaver spinosum β. Fl. gr. t. 487 ex gr.
v. Sm. ic. pict. fl. ross. t. 20 Ossus Sirkane Sulis
Blackw. t. 117

Delia grandiflora Vent. monogr. p. 6. t. 1. f. 2 Engl. bot. t. 610 ?
Lappacea
Blackw. t. 469 bene
Lam. Enc. N. 467
Bok. austr. 1. t. 64 bene 10 fl. pulch. Sed omnia pulchra elegans
in Lappacea nitescit.
Cissus nitida
Vitalba Mariana Scala Sirkin
Legitana [sub C. corniculata Nob.] Aqua Mariana
an cordata? Lag. ic. nov. 1. t. 95. Affinis a nostra fl. vali. Lanuvina augustana?

Bassia muricata Salsoflora C. pumila Cl. hist. 1. p. 70. ?
hirsuta Lam. ic. 2. t. 137 salsoflora bene mera mera pl. ad yeras citata a Pauli.
Lam. Coll. 2. n. 8 salsoflora bene
muricata? Zelan V. Clus. 1. p. 19 f. 1 vera bene Cav. ic. 135 alt. Valen. altissima
Hedianthum galloprovinciale Col. Ecphr. 2. t. 20 f. 1 bene Ins. Tarent. majo inv. Sulis
Cheiranthus Cheiri Fl. Dan. t. 844 bene M. Vesuvio Sulis
Lam. Enc. 2. t. 83
Engl. bot. t. 844 bene
salicifolium Lag. nov. 3. t. 6 f. 3 Bok. alt. Sicilia Agr.
Cav. ic. 2. t. 144 bene

Turnera Lamarck. ill. t. 116 Salona Agr.
Poem. fl. eur. fasc. 2 Lag. augt. t. 252 bene
Berg. ic. 286 ? bene
prostrata Barr. ic. t. 495 bene
alpestris Reichb. Icones I. t. 2 bene
Crantz austr. t. 6 f. 1 bene
Lag. nova t. 399
Lagu. nov. 2. t. 6 f. 2
Stop. carn. t. 23. bene

Melampyrum nemorosum — N. Den. t. 305 — bractey hei[ght] pann. subsp.
Dauc. ic. 269 f. 1 — hue
2 botanisten — W. Kit. pl. hung. t. 36 — hue
Scrophularia aquatica — Cam. hist. t. 43 — hue — Italia
aquatica — Blackw. t. 86 — hue — Lal. Sp. Mon. Ap.
N. Den. t. 507
Sabb. hort. 2. t. 89
laciniata — Walp. Kit. hung. 170 — hue
canina — Sabb. hort. 2. t. 90 — Catt. 106. a. ow
Cluf. hist. 2. p. 209 f. 1
id. cryptantha — W. K. hort. t. 59
Pers. VIII. t. 971 — hue
Digitalis grandiflora — Reichb. Ic. hb. Cent. 2. f. 289 — hue
Jacq. H. Vind. t. 57 — Reichb.
hirsuta — W. Kit. pl. hung. 2. t. 158 — hue — tota planta in autumno cinnamomea nitore pilorum stellatorum, non flavi nitoris
ferruginea — Reichb. Ic. hb. II. f. 286 — hue
Sibth. hort. 2. t. 86 — med.
Linaria dalmatica — Reichb. Ic. Cent. V. f. 629 — hue — Brem Cattaro Livno Cuccha Lastva Smilic Podic
Durb. Cent. I. p. 95. t. 22 — hue — Lastvilla
Moris. hist. 2. s. 3. t. 12. f. 1.
p. corymbosa
Cymbalaria — N. Den. t. 86 f. 2
Bull. herb. t. 395
Mutel.
pubescens — Jacq. A. pal. 3. Fl. neerl.
pilosa — Jacq. obs. 2. t. 48
elatine — Wulf. Reich. 2. t. 25 — hue
Blackw. t. 170
N. Den. t. 426 — opt.
Bull. herb. t. 245 — med.
Lexicon Desf. — Mr. Verl. neerl. — part.

Linaria Jacquiniana — Vernier fran. Mutel.
Jacq. hist. 167 — hue
N. Den. 913 — hue
minor — Anthr. 3. Mutel.
Lob. ic. t. 490 f. 1 — Jacq. hort. t. 204 — hue
Vaill. monsp. t. 85 f. 2 — Lin. cymbalaria Pers. opt.
Flodm. t. 502
L. Pseudo-Cymbalaria — Vaill. monsp. t. 80 f. 2 — Lin. dissecta alii Pers. hue
Hungarica Sp. Mayo — Cyp. veneg. fasc. 2 t. 9 — hue sed alia fl. quoad pilosa
Pelisseriana — Barr. ic. 1162 — hue in ic. Barrel. fl. capitis, (Cluf. iadvis.) fauces tubi minores (f. ext. in ed. Belon.)
magnol. hort. monsp. p. 158 med.
striata — Fl. alb. 197 (non 199) — hue
Jacq. hort. t. 183 (non 184) — hue
simplex — Lacq. ic. rar. 3 t. 499 — hue
Villosa fol. lanceol. obt. in Pers. Hungarica. Sp. Mayo
averrhoi? — ast — Jacq. Bern. — Jacq. herb. crit. 1. p. 18
Linaria — Cistula — Mutel.
Jacq. hort. t. 658 — hue
Blackw. t. 113
N. Den. t. 982 — Linaria flo. - lut.
Bull. herb. t. 261
alsinoides Sp. Mayo
Antirrhinum majus — Bocc. mus. t. 41 f. inf. — Antirrhinum flo. - lut. opt.
flavum — Barrel. ic. 655 — hue — med.
Jacq. hort. t. 129 — hue
p. corymbosa
Orontium — Cam. Epit. 923 — hue — Pisum A. annuum hue
Anthr. 4. Mutel. — hue
Bull. herb.
Calla aethiopica — Lam. Ellis. Pl. 532 — Durand Cat. t. 20 — hue — Lusitania Mayo Alm. Sp. nec Linnaei
Orobanche caryophyllacea — Reichb. Ic. Cent. VII. f. 890. 1 — hue
Mutel. Anthr. Fasc. 1. t. 46
Peloponnesia — mentha id. ib. f. 896 — hue
hirsuta id. ib. f. 935 — hue
major id. ib. f. 933–934 — hue
Lam. Enc. M. 551 f. 2 — hue
Jacq. hort. Vind. II. t. 184 — IX ic. opt.

Alyssum campestre — Reich. VIII 980 hm Agr. Dan.
Chenopodium
Chenopodium — Clus. hist. 2. p. 133 — fug. in Kirsch et Agr. v. Semina
Cam. Epit. 558 f. 1. — Krocker III. 2. t. 32 hm
Leg. auct. t. 338 hm
— t. VIII. 114.
Hutchinsia petraea — Dalech. auct. t. 131 hm Stroya, Pillich, Agrost. Agr.
Col. Ecphr. t. 273 opt.
Moris. hist. 3. t. 19 f. 6 Lugd. 62. t. 111 hm
Thlaspi arvense — Lob. ic. 216 f. 1 Schmidt. Blatt. Kirschsp. Dan. Bot.
Cam. Epit. 339 hm
Dan. ic. 893 f. 1 hm
Biscutella laevigata — Matth. Com. Thlaspi IV. hm Agr.
Lepidium Draba — Matth. Com. 395 f.
Cochlearia
Cam. Epit. 341
Clus. hist. 2. p. 124 f. icon. hm
Dalech. auct. t. 315 hm
Thlaspi — Dod. pempt. 714
Matth. t. 312 Lob. ic. 223 f. ext hm
Dalech. ic. 438
Fabb. H. rom. 4. t. 14
campestre — Dalech. hist. 306 hm
Cam. Epit. 336 Lugd. 62. 1355 hm
Fl. Dan. 1221 hm
Thlaspi — Matth. Com. Fabb. III. 2. t. 29–30 hm Lugd. 62. t. 1575 hm
Draba dubia — Pankratz. Ein. alm. rom. Agr. Clus. copies. Mag.
Ic. supra
montanum — Venten. H. Cels. t. 85 Cattus Finger
Pocock. Ic. Cels. III. f. 983 hm in Flug alti.
Viscaria viscosa — Dan. Enc. Pl. 559 f. 1. hm in Gärten
Lag. Mem. Madrid.
Bocc. mus. t. 68 rund
Kit. t. 146 hm in Gärten Fl. Schlesien = europaea
Silene nutans — Lob. ic. 180 f. 1
— ic. 373 f. 1. Rosenthal. Gaur. Fl. 3. ic. hm
Clus. hist. 2. p. 131 f. 1. hm

Viscaria viscosa — Ic. supra
Lychnis Coronaria — Ic. supra
sylvestris — Fl. Dan. t. 983 hm Lugd. Bat. t. 586 hm
Lam. Enc. Pl. 556 f. 1. hm
ciliata — Syn. comm. t. 4. f. 3.
Lob. ic. t. 469 f. 1.
viscosa — Lam. Enc. Pl. 556 f. 2 hm in Wiesen massiv.
C. B. Prodr. 50 hm
Cochlearia Draba — Col. Ecphr. 1. t. 272 hm
C. B. Prodr. p. 4 f. 2.
in 49 f. 1
Dalech. hist. 1028 hm
Thlaspi montanum — Col. Ecphr. 1. t. 276 f. 1. ext. hm Stroya, Pillich, Dan. Bot.
europaeum Lugd. 62. t. 81 hm Cl. hist. 2. p. 131 f. 1. Agr. Mag.
Dalech. auct. t. 232 hm
p. prox. fl. indiv. dent. Dalech. Hist. 2. t. 276
perfoliatum — Col. Ecphr. 2. t. 276 f. 2. hm Agr. Dan.
Moris. ox. Sect. 3. t. 17 f. 15, 16 Lugd. 62. 2354 hm
Bauh. ic. 815
Dalech. auct. t. 307 hm
Bursa — Fl. Dan. t. 729 Lugd. 62. t. 1485 hm
Lam. Enc. Pl. 557 f. 2 hm Agr.
p. minor Dalech. ic. 199
γ. integrifolia Moris. ox. 2. f. 3. t. 20 f. 1.
arvense — Fl. II. Matth.
Dalech. Lugd. 562 f. 2 Lugd. 62. t. 1059 hm
Matth. t. 68
Lam. Enc. Pl. 557 f. 1 hm
saxatile — Col. Ecphr. 1. p. 277 f. icon. hm Sal. Prices Dan. Bot.
Cesalp. p. 1. Cauvon. t. 16a
Bauh. ic. 895 rund Dalech. auct. t. 236 hm
p. angustifolium
Nasturtium sylvestre — Fl. Dan. 931 rund Fuchs. hist. t. 263 hm Sal. Mag. Agr.
Dalech. Hist. 2. 866 Lugd. 62. t. 2324 hm
Moris. ox. 3. t. 6. f. 17
hispidum — Dalech. ic. rom. 3. t. 505 hm Oppido, Pergens, Segment
v. pyrenaicum Dalech. Lugd. Agr. Mag.

Chrysanthem. segetum — Fl. Dan. t. 995 — Engl. bot. t. 540 — Willd. in Mem. de l'Acad. inf. ic. 1824 — pl. 2. f. 3. 4

montanum — Lap. Sp. 4. t. 91 — fl. ungar. augustalia

All. t. 37. f. 2

Leucanthem. — Bellis magn. Matth. 96a ic. 1866 — Engl. bot. t. 601 hort. fl. carl. hei

Blacku. t. 42 — opt. — Schk. fl. mon. bl. 194

Fl. Dan. t. 994

graminifol. — Lam. Enc. Pl. 678. f. 5

rudbeckiae folio — Regn. Mejo

cordatum — Matth.

Cl. hisp. 1. p. 335. f. sup.

Matricaria Chamomilla — Matth. — Lap. Scheele Sum.

Parthen. pirum — Lob. ic. 770. f. 1. — Engl. bot. t. 1232 med.

Blacku. t. 298

Bellis perennis — Lam. Enc. Pl. 667

Fl. Dan. t. 503 — Engl. bot. t. 424

Blacku. t. 200 — Bod. pent. 265 f. ext. opt.

Matth. 1065. f. 960

Chrys. sylvaticus — Cyr. plant. fasc. 2. t. 4 — Bergia Skiernyka

Bod. pent. 265 f. 1. a. — opt.

Bell. perenn. 2811

Bell. maj. t. 35

Doronicum — Clusius — Ger. Cat. Lepor. 2. t. 30 — opt. — Carl. omiss.

Ger. rem. t. 79 — opt.

Bellidiastrum — Matth. — Cam. Epit. 658

Lap. augur. t. 480

Bellis media Matth.

? montan. — Cl. hisp. 2. p. 15. f. ext. — Blacku. t. 295

Fl. Dan. t. 63

Alpinum Matth.

Senecio vulg. W.

Lap. augur. t. 464

vulgaris — W. Kit. hung. t. 143

Doronicum — Cl. hisp. 2. p. 17. f. int. sup.

Lap. augur. V. app. t. 45

? aquaticus — Engl. bot. t. 1131

Fl. Dan. t. 782

erucifolius? — Bauh. Pinax. ic. Cent. IV. f. 538 — non

sylvaticus — Scop. fl. Carn. Cent. IV. f. 511 — Matth. Cl. hisp. 2. p. 17. f. int. inf.

W. Kit. pl. hung. 2. t. 128

Dill. pl. t. 29. f. 2 — Fl. Carn. 2. t. XIII

Jacobaea — Segu. ver. Matth.

Fl. Dan. t. 944 — Bauh. Cath. Gun.

Pinax. hist. 132

tenuifolius — Lap. glaucus t. 228

? Jacobaea — Bauh. ic. 153

Jacobaea angustifolius — Matth. Cl. hisp. 2. p. 17. f. int. inf.

Bod. pent. 265 f. 1. a.

abrotanifolius — Lap. augur. t. 79

Cl. hisp. 1. p. 334. f. 1.

vulgaris — Matth.

Blacku. t. 172

Fl. Dan. t. 513

Bull. herb. t. 192

Lap. augur. t. 147

Cineraria maritima — Lob. ic. 227. f. 2.

Solidago Virgaurea — Matth.

Fl. Dan. 683

minuta — ? Jacobaea ? W. Kit. hung. t. 208

Aster Amellus — Cyrill. fl. Neap. fasc. V. ic.

Aster Lap.

Cyrill. ic. 2. t. 86. f. 2

Fl. Dan. t. 615

pyrenaeus — W. Kit. hung. 2. t. 109

Cav. ic. 3. t. 232

Amellus — Matth.

Cl. hisp. 2. p. 26. t. sup.

Bod. pent. 268 f. 1.

Lap. augur. t. 425

Insulae orientales — Boec. mus. f. 18
Jacq. auctor f. 162 bene

Villosa — Zannich. ist. f. 103 Vid.
Jacq. stirp. f. 165 bene
Bocc. fic. p. 18. t. 7.

Asparagus — Pluckn. alm. f. 16 f. 1 bene — Dortsch. Nicotiana Pal.

Asparagi? — Tribu radic. virg. lanceol. ovatae caul. strigo angles. integr. flexo. caul. strigo angles. integr. flexo.

Dion. Zuppa Lepsina Servia vitis glauca — bene Rhamn. in Cl. Eyeb. f. 253 — Asbury affinis aquif. — ex Pl. Rav. ex Pisid. Asparag. calyc. angusti lanceolati

Hedericum — Matth.

Oman, Veliko selje Turki Kovez ovnak — Blacku. t. 473 — Fl. Dan. t. 528 — Eyl. bot. 1546 bene

Hyacinthus — Caiga medic. Matth.
Dalech. hist. 436 bene
var. canus — Oeder. 410 bene
Dill. hort. t. 297 bene

Britannicus — Dalech. hist. 1082
Fl. Dan. 413 bene
Moris hist. s. 2. t. 19 f. 8 mai.

+ Pulicaria — Conizoides Matth. — (?) mpt. Cat. Bauh. Pin.
Jacq. hist. 166 ic.
Blacku. t. 103
Fl. Dan. t. 613 bene

Dubium — Jacq. austr. fasc. app. t. 19 bene (non)
Scop. carn. t. 58 f. 2 bene — Eyl. hist. ubi Pollin. Pl. omn. lanceol. anglos.

solidum — Cl. hist. 2. p. 15 f. 1 bene — Orientale Gunno, Peponibus Pin.
Fl. Dan. t. 786 bene

hirtum — Cl. hist. 2. p. 14 f. 2 pl. magnifica bene
Scop. carn. t. 98 V. 2 excellens bene — Lucaszi, Baden Stagnis rich. Aug. Vaga.
Zannich. ist. t. 82 f. 1
Jacq. austr. t. 354 bene sed pl. pl. magnifica

withmirsky — Cornus 3. Matth.
Zannich. ist. t. 23 bene
Donat. templ. p. 52

Erigeron graveolens — Lob. ic. 746 f. inf. bene
Barr. ic. 334 bene

Bravo — amoenum — Moris hist. s. 7. t. 20 f. 29 bene
Jacq. hist. t. 28 — Eyl. bot. t. 2019 medio
Fl. Dan. t. 292

acre — Cast. bonon. ic.
Lob. Icon. 2. p. 26 f. inf. bene
Fl. Dan. t. 622 — optime

Conyza — squarrosa — Fl. Dan. t. 622 — Baden Pal.
Lam. Enc. Pl. 697 f. 1.
Blacku. t. 102 bene
Matth.

geminiflora — Zan. misc. t. 77 bene
v. scopolety Flora. supp. t. 746 (male ex Pers.) — Pl. quadrat. undulatis integris, pedunculis long.

C. D. Prodr. f. 123 Hyat fil. acuty subtriacty?
v. saxatily Bocc. mus. t. 102 bene

candida — Zann. fl. rar. t. 76 bene — pedunculi nimis crassi et flores
Zannich. hist. bot. f. 72 bene — subspicatim
asperata — Zann. in pl. Italiae inedit.
Bocc. fic. p. 60 t. 31 f. 2

Microgyne creatica — Barr. ic. 296 bene ad capitulo nimis crassis.

Vespia hyb. — pygmaea — Lam. Enc. Pl. 692 bene — Insula Dalmatiae
Gouan. fl. p. 2. t. 168 f. 5 — Lam. ic. t. 36 optime

Artemisia — Abrotanum — Cam. Epit. 452 — Eyl. bot. t. 1230 bene
Blacku. t. 17
Matth.
Lam. Enc. Pl. 695 f. 1
arborescens — Lob. ic. 753 — Dod. pempt. 21 f. bene ad.
narbonensis — N. wirtz.

campestris — abrotanum — Dod. hist. 21 — med ad. — Lobel folia nimis tripinnata, caulem potentem calycesque laxiores, pro 3 non — supra. Eyl. bot.
Matth. 1. 2. f. 2 mala
Blacku. t. 555

campestris — Cam. mat. med. rep. t. 38
Lob. ic. 769 f. 1. bene
var. a. pubescens — N. Kit. Hung. 3. t. 214 bene
scoparia — W. Kit. Hung. 1. t. 65 bene

Pulicaria hyb. bifida — vulgaris — Lam. Enc. Pl. 695
Lob. ic. 762 f. 2.
Blacku. t. 431
Matth. — Fl. Dan. 1176 bene

Artemisia cyrulescens — Col. Eyst. 2. t. 26 — Cam.
Absynthium — Absynthium marinum Matth.
Lob. ic. 766 f. 1 — rud.
Moris. hist. 3. 6. t. 1. f. 5.

Tanacetum vulgare — Lam. Enc. Pl. 696 f. 1.
Bratsch — Zeitsch. hist. 96 — Eyst. bot. t. 1229 —
Blackw. t. 456 — bon
Matth.

Hermodactylus tuberosus — Reichl. Cent. VII f. 863 — bon — 10 à 12 mille pl. bonn
Soy. monogr. p. 36 f. 2.
Moris. sect. 6. t. 12 f. 1.

Gnaphalium germanicum — Lob. ic. 488 f. 2 — bon — Reg. Bonn, Coll. Cam.
Matth. pl. — H. Dan. t. 997 — bona
Gallium — Kvitk. Wk. Matth. Reg. t. 117. 2369 f. bon — Moris 1. 7. t. 11 f. 14 — rud.
Lingua Avis — Bern. ic. 1125 — bona — Inter Bicas et Reg. Cam.

Dianthus Petraeus — Blackw. t. 222 — bon
Bull. Herb. t. 391 — opt — Eyst. bot. t. 431. —
H. Dan. t. 842
Matth. Icon. rud.

Passerina — Cam. Epit. 590-91 — Dens Leg. Pollam, Bonn Cyr.
Capitinjak — Blackw. t. 202 — bon
H. Dan. t. 595 — Eyst. bot. t. 429
Matth.

Balsamita vulgaris — Blackw. t. 98 — bona
Baleta hist. 678

Ptarmica matthioli — Mill. ic. t. 135 — bon — Baden Sept.
Eyst. bot. t. 191 — bon
Lobel. Adv. p. 2. t. 685

Bidens bipinnata — Blackw. t. 519 — Bonn Dean Coll. aus Sept.
Lam. Enc. Pl.
Cavan. Cond. ic.

Chrysocoma Linosyris — Lob. ic. 409 f. 1. — bon — S. Gir. Valenç. Majo
All. ped. t. 11. f. 2
Lam. Enc. Pl. 698 f. 1.
Eyst. bot. 230 — bon

Eupatorium cannabinum — Matth. — Eyst. bot. t. 428 —
Lob. ic. 528 f. 2. — rud. — Reg. Gothia Pol. Slay
Blackw. t. 110 — bon — Vallée
H. Dan. t. 745

+ Centaurea Cyanus — altera Matth.
Col. Eyst. 1. p. 19. t. 23 — bona
Blackw. t. 458 — bon
Lobel. Adv. p. 2. t. 181 f. 2

+ Calcitrapa — Cl. hist. 2. p. 7 f. 3. — bon — Perpignan Junio
Cl. phytob. p. 85 t. 24 — Eyst. bot. t. 125 bon
Lobel. Adv. p. 2. t. 163 f. 2

bracteata — Matth. — Pyg. Junio
Cam. Epit. 586
Blackw. t. 476 — bona
Lobel. Adv. p. 2. t. 162 f. 3.

solstitialis — Moris. hist. 7. t. 34 f. 29 — Coll. Bocking C. Cantab.
Eyst. bot. t. 243 — bon

rupestris — Col. Eyst. 1. p. 36 t. 35 f. 2 — bon — pl. Lejun. Lanuginos.

+ Salmantica — Pay. Hort. t. 62 — bona valde
Moris. 1. 7. t. 26 f. 12 — rud.

ragusina — Mill. Dict. t. 152 f. 1. — bona — S. Gir. Marso. Lesina in collibus
Moris. 1. 7. t. 27 f. 22
Bauh. ic. 309 — bona — Zaum. hist. bot. t. 43 bon

Cyanus — varietas — Matth. Icon. rud. — Cam. Epit. 589 — bona — Ped. caul. unifl.
pro varietate — Bauh. ic. 369 — bona
Jo. Bauhini — Dalechamp. t. 26 bona

Jacea nemorosa — Dalechamp. — stricta W. Hist. hung. 231 multiflora pl. Lanuvii, Junio
montana — Cam. monogr. Matth. — Kit. t. 219 — bona — in M. Junio
Blackw. t. 68 — bona — unifloram hospit.
Pay. Hort. t. 371 — bona — Dean
Lob. ic. 548 f. 1. — bona — variegata pl. in agro

p. pumpta — Dr. 61. p. 26 — bona — cum rosea a Wirt. Carinth. transmissa pl. Lanuvii Junio
v. etiam — Zaum. hist. p. 60 — 61
Bocc. mus. p. 20 t. 2

Carlina acaulis + Cl. hisp. 2. f. 135 fig. exact. hm
Skuhra Matthe. t. 632.
Camelina lenea Mönch.
+ β. caulescens W. Kit. Pl. hung. 2. t. 152 hm
+ acanthifolia All. ped. t. 51
Haenke. fl. carn. f. 7. t. 1 hm
Cnicus ? Sauid. aix. p. 86 t. 21 hm
Cl. hisp. 2. f. 129 & ext. opt.
Cnicus palustris Moris. hist. s. 7. t. 32 f. 13 hm
Gmel. Ib. 2. t. 23. f. 2 opt.
Cast. lond. fasc. 6. t. 56 Br.-Br. 1341 VII.
+ acaulis Gl. hm. 1114 hm opt.
Jacq. ic. 3. t. 579
Lob. ic. t. 15. f. 1. sygl. bot. t. 161 opt.
Cl. hisp. 2. f. 156 fl. sup. hm
+ arvensis Fl. dn. 644 hm
Moris. hist. s. 7. t. 32 f. 14
+ Cesarea Cav. ic. 1. t. 53 hm
+ lanceolatum Fl. dan. t. 1153 hm
Engl. bot. t. 107 hm
209 stellatus Pollich t. 98 hm fol. rami dichotomi - spinis inaequ.

Orchis papilionacea Duxb. lent. 3. t. 3 hm
Jacq. hort. vind. 1. t. 283 hm Bourgeau
Pollini Veron. fasc. 8.
laxiflora Vaill. paris. t. 31 f. 33. 34 hm flowers Alon. Navarra
Taberna. ic. 667 f. inf. hm Bourgeau Salon. Mey.
J. B. hist. 2. f. 765. ic.
Moris Hall. helv. t. 33 hm
Prospik supra Laaskoj Cpr. 2. fol. bis. 209 hm
Vaill. paris. t. 31. f. 13. 14 Kunth. Enum. 3. t. 1. hm
Jacq. hort. Vindob. Jacq. ic. rar. 2. t. 15 f. 7.
minor Globulifloram variety Balb. miscell. obs. t. 2 Gay in pasquis Bourgeau
marsh. Lepine
+ virescens Jacq. ic. rar. 3. t. 599 hm
Hall. helv. t. 34. hm Bourgeau Lepine

Orchis fusca Hall. helv. t. 30 hm Pad. Deser. Sib.
Jacq. anstr. 2. t. 15 f. 2
maculata Linnaei spec. Vaill. paris. t. 31 f. 21, 27, 28
Moris. inter Leptos in hort. Taurin. Jacq. austr. t. 307 hm
Linnaei Col. Ergbr. t. 320 f. int. opt. Lam.
2 var. Vaill. paris. t. 31 f. 25. 26
pyramidalis Hall. helv. t. 27 hm inter Salmet et Lesnaure
Sygl. bot. t. 110 hm Jacq. austr. t. 266 hm Bologna, Cuneo, Cuneo
Haenke Bohemia t. 66 f. 266 hm
coriophora Jacq. austr. t. 122 hm M. Bieb. Cod. med. Odess. Obs.
Hall. helv. N. 1284 Pol. Ind.
Vaill. paris. t. 31 f. 30-31-32 male exhibit regula, nivis hiem.
Reichb. Fl. Germ. Exc. t. 773
virescens fl. strigosum - Cesati
Cnicus palustris Presl Bohemicus O. Hostii Bohemicum Moris. fl. sard. 2. t. 84 hm Cnicus palustris
Kalmeriana Allion. O. Hostii Austriacum archiv. t. 122 hm Vergara Cpr.
Dodonaei caespitosa Hall. helv. t. 29
Vaill. bot. paris. t. 30 f. 8 Sygl. bot. t. 10 hm
Fl. dn. t. 224 hm
Reichb. Fl. Germ. Exc. VI. f. 815 hm
Lobelius Icones Sembuccus Jacq. anstr. t. 8 f. 5 Vergara Cpr.
Jacq. austr. t. 108 hm
Fl. dn. t. 1232 hm
maculata Haenkeana Icones fl. carn. t. ic hm
Reichb. f. 823. incarnata
Hieracioglossum Hall. helv. t. 35 hm
Vaill. bot. paris. t. 30 f. 6 Sygl. bot. t. 34. hm
Lam. Enc. Pl. 326 f. 1 hm
Jacq. austr. 4 t. 367 hm
anthropophora Hall. helv. f. 23. hm
Col. Ergbr. t. 320 f. 2 hm
Fl. dn. t. 103 hm
sygl. bot. t. 29
Ophrys aranifera Vaill. bot. paris. t. 21 f. 15. 16 hm Cobell. Ic. Dodart. Lobel.
Gouanianus sygl. bot. t. 8. hm ex Vaill.
Seguier. Veron. 2. fol. 15. f. 13 opt. Bourgeau Dod.
Hall. ic. XXIV t. 5 hm
Ophrys fuciflora C. passiflora Cat. lond. 67 t. 988
Sygl. bot. t. 22 hm Bivona d. Knowles Pol.
Stalitz

Crataegus tinctoria — Lam. Enc. Pl. 790 — Roy. Bard. Sept.
A. hisp. 2 f. XLVII
Ambrosia maritima — Lam. Enc. Pl. — Brenc ad mare
Dod. pempt. 35 f. 1?
Xanthium strumarium — Lam. Enc. Pl. 765 f. 1. — Catt. Pen.
H. Rav. t. 930 — bene
Blackw. t. 444 — bene
Matth. Lugd. bat. 2. 144 bene
spinosum — Magnol hort. t. 208 — bene — Catt. Pen.
Lam. Enc. Pl. 765 f. 2 — Mang. 3. f. 15. t. 2 f. 2 bene
Plenck. icon. t. 239 f. 1.
Myagrum hyemale — Lam. Enc. Pl. 375 — Jour. fl. cam. fasc. XII. 11 opt.
Enc. bot. t. 83 bene
H. Rav. 681 bene
C. B. Prod. p. 93 f. int. bene — Lyc. d. Bourgogne augm.
antiscorbut.
Coryl. Avellana — Matth. Engl. bot. t. 723 bene
Gaertn. fr. 2. t. 89 f. 3 bene
Lam. Enc. Pl. 780
Ostrya vulgaris Gubernum — Michx. gen. t. 104 f. 1. 2 — Virgin. Agr.
Carpinus Betulus Bielgrab — Matth. f. 1445 Carpin — Vaux Leipsick Journ. Pillits Agr.
Germ. orientalis — Duham. arbr. 1. t. 49 bene
Gaertn. fr. 2. t. 89 f. 2 bene
Lam. Enc. Pl. 780
Fagus sylvatica — Matth. Engl. bot. t. 1846 bene
Duh. arbr. 1. t. 98 bene
Gaertn. fr. 1. t. 37 f. 2 bene
Lam. Enc. Pl. 782 f. 2
Castanea vesca — Matth.
Gaertn. fr. 1. t. 37 f. 1. bene
Duh. arbr. 1. t. 58 bene
Lam. Enc. Pl. 782 f. 1.
Quercus Ilex — Matth.
Lecsmika Carnika Sveda — Blackw. t. 466 — Duh. arbr. 1. t. 127 fol. asperis simus 124 fl. subtus subglaucis
Duh. arbr. t. t. 128
β. integrifolia — Bauh. hist. 2. p. 101.
Suber (obtusifolium) — Duh. arbr. 2. t. 80 bene
Blackw. t. 192 mas.

Quercus coccifera — Magnolia. t. 188 bene
Duham. arbr. 1. t. 125 bene — Ch. hisp. 1. p. 26 bene
Cerris — Cerris mas — Duh. arbr. 1. t. 53 bene
Lob. ic. 2. 158 fol. 1 bene — Chi. descript. anat. integ.
austriaca — Ch. hisp. 1. p. 20 (bene) obs.
pars Suber — Robur — Dod. arbr. 2. t. 46 bene
pedunculata — Duh. arbr. 2. t. 47 bene
Plenck. t. 1150 bene — Lyc. bot. 1942 bene
Matth.
Dulcamara — Matth.
Blackw. t. 247 bene
Lam. Enc. Pl. 781
Thelygonum Cynanchum — Lam. Enc. Pl. 227 — Sp. Veg. Catt. Agr. in vulg. Lattis picris
Dave. ic. 335 bene
N. Prod. p. 59.
Andromeda telephiifolia — Lam. Enc. Pl. 791
Pinus picea — Abies Matth. — Mem. sur les Pins t. 16 f. 2. opt.
Picea — Lemb. pin. t. 30
Com. Egit. t. 48 a 49
H. Rav. t. 193 bene ind. fol. cum
Pinaster — Lemb. pin. t. 1.
Duh. arbr. 2. t. 29 2. 11. bene — P. mariti. altera Matth.
Cembra — Sauv. ving. 2. t. 1 bene — minus fol. nigr.
Matth. Comm. p. 112 bene
Fischer pl. Granat. p. 36 bene
Halepensis — Lamb. Monogr. of pin. t. 10 — Jour. Cuisin. Botany
Pini maritimae Matth. p. 111 bene
Duh. arbr. 2. t. v. tab. 70. bene
Duh. t. t. 28 bene mas
Gerard. opt. fig. p. 1449 bene ad f. 2 Duh. P. maritim. 2. Matth.
Salisb. hisp. hisp. 1. p. 44
Picea — Matth. p. 108
Blackw. t. 189 bene
Pitonii bot — Duh. arbr. 2. t. 22 n. 1. bene

Asplen. lanceol. Mett.
Blechn. t. 99 bon
transv

petrolicum Mor. hisp. 3. f. 3. t. 32 f. 11 pl. triangulari A
Sag. Delic. inf. part. 2. p. 14. t. 7 bon, fl. infer. tribl.
Fl. Dan. 1285 bon mutica

argutifolia Ait. hort. 1. Mett.
Z. B. hisp. 2. p. 373 f. ext.
Schkuhr Handb. 3. t. 343

triangulare W. Fl. Dan. 1280 fol. inf. subtriloba ut in loc.

laciniata Mor. 3. 5. t. 32 f. 17 bona sad.
A. marina Mett. Syst. Veg. t. 165 bon

Diffusa Desv. Fl. Dan. 1284 ic. minus bona ac laciniata

Trichomanes Crantz Mich. gen. t. 107 fol. ut fr. bon
Dub. elect. t. 101 major.
Mill. ill. ic.

exaltior Mett. Mac. Hopp, Veg. Aper.
Mich. gen. t. 103 med.
Blechn. t. 328 bon Syst. Veg. t. 1892 bon
Fl. Dan. t. 969 opt.
Dub. elect. t. 101 bon

119

Cystopteris palustris Fl. Dan. 1183 bon
Bolt. fil. ic. t. 35

hyemalis E. 3. Mett. med
Bolt. fil. ic. t. 39 Conv. Syst. 770 f. A. bon

Asplenium Ruta muraria Mett. Blechn. t. 219 bon
Fl. Dan. t. 190
Bull. herb. t. 195 bon

Adiantum nigrum Mett. Syst. Veg. t. 1950 bon
Blechn. t. 220 bon Flor. Dan.

+ anceps Pollich. ver. 3. t. 2. f. 2 bon

Cystopteris Lonchitis Mett. Plukn. t. 180 f. 3 bon
Fl. Dan. t. 493 bon
Bolt. fil. ic. t. 19 Syst. Veg. t. 792 bon

auriculata Plukn. alm. t. 180 f. 1. bon
Mor. hisp. s. 14 t. 3 f. 15 med
Bolt. fil. ic. t. 28

. . . p. bulbosa Plukn. phyt. t. 180 f. 3 bona Syst. Veg. t. 1553 bon

fragilis Fl. Dan. t. 401. bon Syst. Veg. t. 1587 bon
Bolt. fil. ic. t. 27. 46 Plukn. alm. t. 180 f. 2 mediocris

p. bracteata Sey. ven. 3. t. 1. f. 2. Mill. hisp. 3. t. 55 subspecies

Miss. Botan. Blechn. t. 420 bon Fl. Dan. 18 f. 1 mediocris Fl. Brit. Engl.
Gymnogramma Ceterach Mett. Syst. Veg. t. 1878 bon
Ruta muraria Bauh. ic. 1043, 1044 bon
Blechn. t. 216 bon Syst. Veg. t. 2446 bon

Polypodium vulgare Mett.
Rutifolium Fl. Dan. 1080 bon
Blechn. t. 215 opt.
Bull. herb. t. 191 opt.

Phegopteris polypodioides Mett. Blechn. t. 225 Syst. Veg. t. 1879 bon
Bull. herb. t. 207 opt.

Asplenium Trichomanes Mett. Syst. Veg. t. 570 bon
Blechn. t. 220
Fl. Dan. t. 119 bon
Bull. herb. t. 185 bon

Filix foemina Blechn. t. 226 bona Syst. Veg. t. 1457 bon
Plukn. phyt. t. 180 f. 4 bona
Hedw. theor. t. 7. f. 2. 3

Ruta muraria Mett.
Blechn. t. 219 bon
Fl. Dan. t. 190
Bull. herb. t. 195 bon

Aspidium aliquem Jacq. ic. var. 3. t. 642 opt. In fissuris [illegible]
Seg. verm. 3. t. 1. f. 3

Adianthum Capillus Bull. herb. t. 247 Cyl. bot. 1564 [illegible]
Pago an item Jacq. miscell. 2. t. 76 [illegible] Epit. 1924 [illegible]
Ad° Matth.
Oglinstoff Blackw. t. 416 [illegible] Fl. dan. 147 [illegible] Mr. d'Ostern Mayo
Cheilanthes odora Viv. fl. it. fragm. t. 11. f. 2. 3. 4 [illegible] Cyl. bot. t. 198 [illegible]
Schkuhr filic. t. 123

Scolopendrium officinum Tillitis Matth.
Trace Elegans Blackw. t. 138 [illegible]
Bull. herb. t. 167 [illegible]
Serapias longa Col. Ecphr. 1. t. 321 [illegible]
24 — cordigera Morris. s. 12. t. 14. f. 21 [illegible]
Sebast. fl. rom. t. X.
+ Fl. graeca. Sibth.
+ Fl. lusitanica. Vifinens. et Link.
+ Fl. atlantica Desf.
~~Fl. [illegible]~~
Botanical Magazine Curtis etc.
+ English botany —
+ Deland. icon. var. fl. gall.
/ Goldbach dis. de Crucis
/ Gochnat dis. de Hieracio
Redoute Les Liliacées
+ Marsh. Bieb. Cent. var. fl. r
Andrew Repository t. 376
Sturm. fl. germ. 1. t. 6-7
/ Bivona Bernardi fl. Sicula

Erythraea lutea? Alsch. In pratis Xerae dit. Enone, et in vernon
Bolesnik dit. Jadesky
Scorzonera id. Ad mare prope Nova in arenosis
Leontodon bulbosus id. ib.
Genista germanica id. In prato Xerae
Crinodon sativum Ragusa Rubizius
Sium? In sylva Xerae
— latifolium Ad vicum prope sylv. Xerae

1-2-3 —	201
4-5	337
6 — 11	222
12-13	120
14-16	252
17-18	188
19	205
20-24	190
	1715

Saxifraga H. asper. VII. 1.

Saxifraga petraea t. 1. bona
granulata t. 2. b.
Alsine segetalis t. 10 b.
(sub multis habitus)
Arenaria serpens t. 11 bona
Lithospermum officinale t. 14
b.
Lycopsis arvensis
a pl. hyem. t. 17 b.
Cerastium viscosum t. 18 bona ad ripam turfosam non alsinen
Cynoglossum officinale t. 20 b.
Anchusa officinalis t. 25 pl. rarius
Myosotis palustris t. 28 bona in aquosis
Myosotis sylvatica t. 29 cum planis aliquo minus
Echium vulgare t. 31 b.
Echium arenarium t. 32 b.
Cynoglossum officinale t. 33 b.
Verbascum phoeniceum t. 34 non pl. alborum
Scrophularia nodosa t. 36 pl. varietates numerosas et diversas
Antirrhinum Orontium t. 38 rarissime elongatos subpedunculos
Digitalis ochroleuca t. 40 bona
Veronica officinalis t. 46 bona cum foliis Cerastii ad hyem
Veronica arvensis t. 49 bona
Veronica agrestis t. 50 bona
Veronica praecox t. 54 bona
Digitalis purpurea t. 57 b.
Chenopodium album t. 61 ad hyem rubescens rubiginosum maculatum
— hybridum t. 62 bonum
Rumex acetosella t. 67 b.
Rumex crispus t. 68 bonus

Atriplex patula bona t. 69 b.
Polygonum Convolvulus t. 71 minutissima forma glandulosa v. brevis spec. t. 4. f. 2.
pro varietate pl. mihi vel. multa augmenta
Polygonum aviculare t. 74 bonum ad cloacas
Euphorbia Cyparissias t. 75 bona. Planta ab aquosa pl. arenaria insigne diversa bona
Salsola Kali t. 78 b.
Lemna minor t. 79 bona pl. lecta
Typha angustifolia t. 97 autem plantae in aquis nostris elongatae varietas diversa
Alisma Plantago t. 101 bona
Butomus umbellatus t. 103 bonus
Orchis latifolia t. 108 b.
Salix triandra t. 117 b.
Salix Caprea t. 120 b. folia subtus tomentosa. pulchra varietas cum foliis 4-duris.
Duriora e aquosis. pl. ex Salice aurita
Euphorbia palustris t. 124 b.
Orchis conopsea t. 122 b.
Potamogeton oblongus t. 123 b.
Carex stricta t. 124 b. pl. glauca. Haud alia cum ea diversa.
Carex gracilis t. 125 b.
Myosotis cespitosa t. 126 b.
Myosotis sparsiflora t. 128 b.
Myosotis palustris t. 129 b. cum aquosis unde
Lycopus europaeus t. 131 b.
Mentha aquatica t. 132 b.
Mentha sylvestris t. 133 b.
Juncus acutiflorus t. 135 b.
Alisma plantago t. 141 bona
Typha latifolia maxima t. 142 b.
Typha glauca t. 144 b.
Salix Caprea t. 154 bona pal. obscura magis diu pruinosa minusque tomentosa

Cyprian Carpzov t. 155 bm
Cornelius Nepos t. 156 bm
Cornely Rimsky t. 157 bm
Marcus Porcius t. 160 bm cum illo in tribu generali 100 milium cum Romano
pl. exemplarium cum, i exp. cond.
Anthimus Nicolaus t. 161 bm
Ovidius Naso t. 162 bm
Leonardus Aretinus t. 162 bm cum ital.
Olbrycht Radziwiłł t. 170 bm
Cornelius Tacitus t. 182 bm
Seneca Lucius Annaeus t. 184 bm
Cornelius Nepos t. 185 bm
Bycina Nicolaus t. 187 bm
Ovidius Naso t. 198 bm cum varia
Bryson Nicolaus t. 199 bm pars vol. 3.
Hilleby Hieronim t. 202 bm
Leander Albertus t. 203 bm
Hieronymus Cardanus t. 207 bm
Gregorius Magnus t. 209 bm
Ostroróg Stanisław t. 210 bm
Salustius Crispus Caius t. 211 pl. dyplomatum
Livius Titus t. 215 bm
Hieronymus Cardanus t. 222 bm pleniores omnino integre
Paulus Orosius Christianus t. 223 pulcher quod habet. Index longissimus
Hieronymus Cardanus t. 226 bm
Krupa Michael t. 227 bm
Cornelius Tacitus t. 232 bm
Valerius Maximus t. 236 bm
Ovidius Naso t. 237 bm
Ovidius Naso Publius Nasonius t. 240 bm cum punctis

Plutarchus Chaeronensis t. 245 bm Hieronymus Cardanus pl. exemplarium Andreae Dudithii
ad Hieronymum Radziwiłł e Lacy vol. 3 p. 26.
Lactantius Firmianus t. 250 bm cum illo pl. ndr. augustissimi
Cassius Dio Roman t. 252 bm
Silius Italicus t. 253 bm
Hieronymus Cardanus t. 258 multa omnino parva omissa et grandiora addita, quia
aliter multitudo librorum grandem in modum.
Livius Titus t. 259 bm
Dionysius Halicarnassensis bm cum magna pleniore commentario et exegesi
Scandinavia Jacobus t. 263 bm
Ostroróg Jan Stanisław t. 266 bm
Valerius Maximus t. 268 bm
Cornelius Tacitus t. 269 bm
Livius Titus t. 274 bm cum 10 decadibus additis
Cassius Dio Cocceianus t. 278 bm cum Xiphilino
Seneca Lucius Annaeus t. 278 bm
f. 92. Corpus librorum multum pl. exemplarium pl. adnotationum
Justinus Marcianus t. 279 bm
Hieronymus Cardanus t. 282 bm
Curtius Rufus Quintus t. 292 f. 1 bm
Dionysius Halicarnassensis t. 295 bm
Cornelius Tacitus t. 296 bm
Leander Albertus t. 298 bm
Hieronymus Cardanus t. 300 bm
vol. IV.
Ostroróg Jan Stanisław t. 302 bm
Alexander Gallus t. 308 bm
Hieronymus Cardanus t. 309 bm
Galenus Claudius t. 313 bm

Cochlearia Draba t. 315 hmr
Primula grypsana t. 317 hmr
Thlaspi agrifolium t. 318 hr
Centaurea paniculata t. 320 caulis rigidi corymbus fol. lobata ac in genuina et caucasica.
Scopolia Carniolica t. 323 hmr
Bromus asperus t. 329 syn. Bromus erectus. Huds. Nostrum vix reperiemus a fj. 3-4-5 yam a fj. 1-2. Tres primas species exhibet glandes carnibus Europae a nostris Hybridis, 5ta glaucescens a Pisa genuina Bromus.
Anthyllis montana t. 334 hr
Viola alba t. 335 hr
Thlaspi perfoliatum t. 337 hr
Alyssum saxatile t. 338 hr
Dianthus Seguieri t. 339 hmr fol. latis lineis nervosis
Bromus Gussonei t. 340 } hmr
Vicia Cassubica t. 341 }
Hyoseris radiata t. 342 hr
Orobanche minor t. 343 hr
Euphorbia carniolica t. 345 hmr
~~Bromus Scoticus t. 349~~
Lilium Martagon t. 351 hmr
Hedysarum Onobrychis t. 352 hr
Rosa lutea t. 353 hmrs
Adonis vernalis et flammea t. 354-355 hmrs cum gradibus
Sempervivum Carniolicum t. 356 hmr cum crebris
Cardui hirsuti t. 358 ad fol. in rosam basilarem
Stachys recta t. 359. fol. caulina ad caulem sessilia (ex descriptis speciebus Stachyos quales sunt) inferiora obtuse et brevius petiolata, reliqua sessilia et caulem Cel. Scopoli haud secundi, numerosi subrigui et pilosi, folia vero Linnaei Stachydis Willdenowii petiolatiori, basi glabra plerumque obliqua et obtusiori crenatura.

Stachys arvensis t. 360 hmr
Lotus Alpinus t. 361 hr
Thymus Serpyllum t. 365 hr
Hypericum perforatum t. 366 hr
Satyrium hircinum t. 367 hr
Dorycnium pentaphyllum t. 370 hmr
Centaurea nervosa t. 371. hmr. caul. cum fol. rigid. fol. lata lanceolata dentibus numerosis caulis hispidi corymbus nudus crassiusculus.
Gentiana Cruciata t. 372 hr
Euphorbia cyparissias t. 375 hmr
— platyphylla t. 376 hr
Brunella laciniata t. 378 hr
Chrysanthemum corymbosum t. 379 hr
Potentilla recta t. 383 hmr
Andryala Pinnatifida t. 384 hr
Trifolium rubens t. 385 hr
Cytisus virgatus t. 387 hr
Scandix Cerefolium t. 390 hmr
Anthericum Liliastrum t. 392 hmrs fol. rostris.
Brunella grandiflora t. 394 hmr
Pimpinella Saxifraga t. 395 hr
Euphorbia Gerardiana t. 398 hr
Bromus Gussonei t. 400 hr
Vol. 5
Cytisus virgatus t. 401 fol. caulina dentibus vix ciliatis, tubo parum
Dipsacus sylvestris t. 402 hr
— laciniatus t. 403 hr
Bromus arvensis t. 404 hr

Leonurus Marrubiastrum t. 405 bene

Phyteuma orbiculare t. 412 bene

Myosotis palustris t. 414.

Lycopsis arvensis t. 417

Anchusa officinalis t. 419 bene

Asperugo procumbens t. 425 bene

Echium vulgare t. 427 bene

Lithospermum officinale t. 428 bene

Myosotis arvensis t. 431. bene

Pulmonaria officinalis t. 433 bene

Symphytum officinale t. 434 bene

Echium italicum t. 435 bene

Physalis Alkekengi t. 437 bene in agris

Solanum nigrum t. 438 bene in agris ruderatis

Datura Stramonium t. 443 bene

Verbascum thapsiforme t. 444. Pl. ad Lentum altius adscendit. Planta tota lanuginosa albicans

Verbascum nigrum t. 446. bene

Verbascum phoeniceum t. 447 bene

Verbascum Lychnitis t. 448 bene

Antirrhinum majus t. 449. bene

Appendix.

Linaria vulgaris t. 5 bene in agris Oppidi

Erythraea Centaurium t. 5. bene in pratis humidis rudera

Convolvulus arvensis t. 15 bene in agris

Echium vulgare t. 16 bene in italico

Orobanche Rubens t. 19 bene in agris in pratis Phleo altissimo locisque

Lithospermum officinale t. 20 bene

Pedicularis sylvatica t. 24 bene

Gentiana Pneumonanthe t. 32 Caules steriles, ad hyemem rubescentes, lanceolata

Gentiana cruciata t. 36 bene

Asperugo procumbens t. 41 in agris. Cymae apicis. Flos albus.

Convolvulus Soldanella t. 45 Ad glareas Oppidi. bene

Cynoglossum officinale t. 48 bene

Veronica Chamaedrys gall. var. caule t. p. pil.

pag. 1.

Gentiana ciliata t. 3. pl. caule quadrifariam villosiusculo, foliis ovato-lanceolatis. Dentes calycis subulati integerrimi. Pl. caule angulato pilosiusculo

Polygala monspeliaca t. 9. caulis rami ad apicem adscendentes

Dianthus Seguieri t. 19 bene in Ins. Wight.

Silene gallica t. 20 Vix bene in agris, plerumque nana, pedunculis calycibus longioribus et pilosis pl. caulis hispidi, rami adscendentes. Petala integerrima. Calyx in apice pedunculi hispidi calyce carentes.

Galium divaricatum t. 24 bene

Gentiana Pneumonanthe t. 32 bene Cor. calyce duplo longior, circa ungues calycem

Hypericum quadrangulum t. 34 bene

Hypericum perforatum t. 35 bene

Dianthus Seguieri t. 38 bene adscendit

Veronica officinalis t. 40 omnibus partibus minor et rarior pilosa rarius ut var. β. pl. caule adscendente, foliis ovatis ut ovatis, ovatis ut ovatis, ovatis ut ovatis

Carpini brachypoda t. 44 bona

Listy pamětní, p. carduj prosinj t. 30. Ar spuj ernest ope nosse a list- a hvězdič.

Monographie des Campanulées par Alphonse Delandolle
Paris. 1830 4° 1 vol.

Wahlenbergia Schrad. Cobl. hort. gotting. 1814. Codonia Spr. Syst. 1. p. 735
Schultzia Roth enum. pl. phanerog. germ. pars I. 1827. (non alior.)
Cal. 3-5fidy. Cor. apice vel raro supra medium partem 3-5fida. Stamina 3-5 libera, plerumque basi parum expansa. Styli inclusi glabri, apice versus sensim parum crassiores. Stigmata 2-3. Ovarium calycis tubo connatum. Caps. 2-5locularis, valvis totidem medio septiferis apice dehiscens. Semina numerosissima. A. Dc. p. 429. W. grossipila
W. caulibus et foliis nullibi pubescentibus, foliis integris, radicali linearis vel linearis spathulatis, caulinis linearis subsagittatisve, brachiis arcte accumbentibus integris subpatentissimis, calycis tubo glabrescente, laciniis patentibus, sinubus edentulis
Wahlenbergia integrifolia Alphonse Delandolle Mem. phys. p. 33. t. 26. N. Bull. Soc. 2. p. 802. ic. Wahlenbergia cyanea hirsuta foliis grossiorum Dec. Fl. p. 78 f. 2. — Dann. ic. 332 opt. C. grossipila Link Handb. 1. p. 234 Hayne fl. germ. t. 206 Reichenb. Germ. Excurs. p. 130.
W. hirtibilis. W. caulibus nullibi pubescentibus foliis subtilissime, radicalibus linearibus subtus dense hirtis, brachiis arcte accumbentibus integris subpatentissimis villosissimis, calycis tubo villoso, laciniis subpatentissimis ubique pubescentibus, sinubus dentatis. C. grossipila W. Kit. Hung. 1. 154 excl. syn. Baumg. Transs. 1. p. 155. (post fl. exsicc. excl. Casp. Bauhini) Fl. exsicc. p. 131
Differt a comm. C. grossipila foliis et caule fl. subtilissime strictis linearibus et minime falcatis, pilis (quod extrema) marginum foliis, brachiis pauciis magnis adultis, stylum glabrum, calycis tubo villoso, et praesertim sinubus dentatis non

vs integris. Hos ultimos characteres ad omnia specimina Hungarica ... Petri Hayne a C. grossipila quae vendens ulterius 42 pro. tab. (prop. Germaniae) reperta fuit. Ipsa quoque species in aliquibus Carniae et Croatiae locis ... Basilius Kit in sua Synopsi Fl. Hung. speciem suam C. grossipila vocat (Vid. Shuy. Fl. Pan. p. XXXIII.) Nomen tandem hoc ei an ad praecedentem spectans? p. 132.
W. [illegible]. W. caulibus foliisque fl. linearibus integris margine subtus pilosis, brachiis arcte accumbentibus subpatentissimis, calycis tubo pilosissimo, laciniis subsetaceis, sinubus edentulis. C. grossipila W. Kit. 2. t. 155. Fl. S. ex. C. grossipila Hayne fl. exsicc. excl. syn. Cl. et W. Kit. t. 154. C. grossipila β. Schrad. plant. sin. pilos. gaeg. Mey. 11. Hab. in Carnia et praesertim Croatia. (Specimina non inspexi nisi e W. Kit. l. c.) p. 103.
Calycem autem hanc speciei (C. affinibilis) a C. grossipila differentem, et semina ab ea differt: pilis patentissimis calycis, stylum glabrum (ut in tribus) et margines foliis grossipilis subtilissime; brachiis plerisque brevissimis pilis duris calycis; calycis tubo superne calvo; laciniis ubique pubescentibus non asperis, sed longe molli apice pilosis acutis, sinubus dentatis semper integerrimis; corolla majori, limbi apertis extrorsum glabris, intus pubescentibus non dilute. Ovarium et stylus glabra, hic illic pilosa. Cl. Host ex Wahlenbergia grossipila
W. dalmatica caulibus glabris, fl. linearibus lanceolatisve integris brachiis arcte accumbentibus integris ciliatis, calycis tubo pilosissimo, laciniis integris ciliatis dense pilosissimis, sinubus edentulis. Hab. in Dalmatia Visiani. Bivoltata in Hort. Bodl. affinis grossipilae, Kit. et hungaricae. Ab omnibus hucusque differt caulibus glabris, brachiis longioribus, calycis calycini multibus brevissimis adpressis tubo calycino triangulari. Differt a var. W. grossipilae Kitaibeli quoque differt fl. integerrimis pauci longioribus et calycis tubo ciliato, nec villoso pilosis.

brachij hirto-ciliatij nec utrinque glabrati; a W. Kitaibeliana foliis valde ciliatis integris, bracteis integris, calycis subglobosi interne glabri, staminibus declinatis; a W. stenophylla longius petiolata ad basin attenuata, calycis nervis ad orificium abeuntibus differt. DC. monogr. p. 134.

W. parviflora. W. glabra, caulibus brevissime velutino-scabris, ad lineam unam inferne glabris, superne magis molliter puberulis; foliis radicalibus petiolatis, superioribus basi latissima sessilibus, omnibus obovato-oblongis, subtus calycibus dense glandulosis; calycis subglobosi glabri, lobis integris foliis subduplo brevioribus. C. parvula Ry. in Linnaea 5. p. 136 (W. spec. ab. C. Kitaibeliana Host (non Pichler) Icon. rar. t. 320 (non bene) Sturm. exsicc. Bromnen und einige andere schlagen nec vitida. A. DC. monogr. p. 134-5.

Physoma. Calyx 5-fidus, tubo 5-gono, basi in pedicellum brevem sensim attenuato. Corolla 5-fida, tubo basi ventricoso-gibbo, faucem versus subito ampliato, limbo patente, subaequali. Stamina 5, basi corollae inserta, inclusa vel subexserta. Stylus filiformis, stigmate capitato. Ovarium imperfecte 4-loculare. Capsula loculicida, basi vel ad medium usque 4-valvis. Semina ovoidea, interdum subangulata, tuberculata. Presl. p. 180

P. villosum. P. caule fruticoso, foliis radicalibus lanceolatis, utrinque attenuatis, subtus pubescentibus, nervo dorsali, ramis subtus tomentosis, capitulis terminalibus (ex Presl. descript.) C. virgata Ten. fl. neap. 1. p. 66 (exclud. syn. Lobell. P. villosum Host. gr. austr. p. 93 t. 19. Hab. in Illyrico, Istria.

Caulis erectus, vix ultra pedalis, subangulatus, parcissime pubescens, scaber, simplex vel ramis alternis erectis instructus. Folia radicalia lanceolata, utrinque attenuata, apice acuta, ad non exactum semipollicem usque petiolata, margine subtiliter serrata, scabra, subtus pubescentia, nervo dorsali subtus et interdum etiam marginibus villosis, supra scabra, 2-3 pollices longa, 2-3 lineas lata, caulina lineari-lanceolata, adpressa. Flores 1-5 capitulis terminalibus. Calyx pubescens, 5-partitus, laciniis profunde carinatis, acutis, 3-4 lineas longis. Stamina

long. Corolla coerulea brevior. Capsula corollam superans, ovoidea, basi villosa, pilosissima, post anthesin elongata, stipitata, pedicello duplo fere longiore apice vix 2-3 fido. Semina inaequalia, non tuberculata, ut in cit. icon. Lobel. Caps. angulata, sectura tuberculata 3-loculari, pauci 3-tuberculata (vulgo apicem et viridem a tubulo) Schreber in Gmel. l. c.

Affinis P. lanuginosae Lobel. et C. virgatae Lobel. a priore differt foliis radicalibus tuberculato-scabris et ramis dorsalibus (nec supra inaequi) pubescentibus, capitulis terminalibus (nec axillaribus) scabris. A posteriore (quem ipse confert) minus differt habitu et foliis quam caulibus profunde 5-partitis (nec apicem 5-dentatis) superne confertim et brevissime. DC. monogr. p. 203

Campanula. Cal. 5-fidus, tubo ovato, apice appendiculis obtecto. Cor. apice 5-dentata vel 5-fida, apice campanulata. Stamina 5, tubum florale basi, calycis et membranaceis. Stylus basi 5-gonus, pilis collectivis (exceptis imo basi) tectus. Stigmata 3-5 filiformia. Ovarium omnino inferum 3-5 loculare. Capsula calycis 3-5 loculicida dehiscens. Semina apice ovata, angulata, interdum ovoidea et laeve minima. DC. mon. p. 213

Sect. 1. Medium. Ramus calycis appendiculis obtecti. Caps. 3-5 loculosa, valvis ad basin fissis dehiscens. C. Rotundifolia, Bellidifolia, Rapunculus, Linnaea, Lobelia, Trachelium. p. 214

Sect. 2. Eucodon. Ramus calycis appendiculis non obtecti. Caps. tricocca, valvis ad basin usque apice liberis fissis dehiscens. C. glomerata. Medium. Raponticula, (quae ex DC. adest in C. Rhodensi) et non pl. pedicellis longissimis p. 270-1 est C. Rhizopetala Ten. fl. neap. 1. p. 69 t. 17.) Cirsiifolia, Hypopitys, Waldsteiniana, Trivia, patula (de qua DC. dubitat num sit C. Erinus) Erinus, Portenschlagiana, isophylla, pyramidalis, persicifolia, rapunculoides, Loeflingii,

C. Verbenus pubes pliq reprehendi caule erecto, ramis divaricatis, pliq caulinis ovato-ensiformibus floribus axillis ramorum fasciculatis, labio calycino longe subulato caulem dimidio brevioribus, staminum appendiculis subulatis labio dimidio brevioribus. Boec. pl. rar. t. 45 f. 2. opt. Jacq. coll. 3. t. 12 opt. H. gr. t. 211. Reichb. ic. H. nov. p. 236. f. appendiculis staminum calycis obtusis. C. bracteis Salzm. ined. 2. p. 237.

Differt C. villi et hac caulibus hisp. pramboeis pilisque caulis nullis pube inconspicua vel obsoletissima reprehendi p. 238.

C. hirsutus pilis caule paniculae pl. ramulisq. subspathulisq. commixtis hisp. asperatis, caulinis repetitis lanceolato-acuminatis, pedunculis multiplo divaricatis, labio calycis tubuloso-pilis longe acuminato corollam 4-plo brevioribus, staminum appendiculis ovatis obtusis labio dimidio brevioribus. H. p. 243

C. pubescens W. Kit. hung. 3. t. 258. (non Sibth.) Species vix a priori distincta H. l. c.

C. hispidus caule pilis reflexis asperato, pilis reflexis undulato-crassiusculis, foliis inferioribus lanceolato-spathulatis, superioribus linearibus acutis, labio calycis oblongo obtuso, staminum appendiculis labio similibus, corollae labio calycem duplo longiore. C. hispidus W. Kit. l. t. 64. sp. 1. excl. syn. C. echinus H. nov. p. 258

v. C. echinus p. 258 ann. H. nov. Vix tabulae tantum pl. gr. differt C. hispidus a quo differt pilis reflexis asperitate brevioribus, patentibus appendiculis staminum (ut in C. hirsuto) floris majoris pro ratione quoad et calycis pilosis. Obs. Smith. in Rees C. capitatus Sieber herb. rom. ad hanc speciem refert floribus et pl. reprehendi quae differt videtur, ad pl. radicales descripta a cl. Sieberi. H. l. c.

C. hispidus C. caule erecto pl. ramosis pilosis, pilis reflexis patentibus, foliis linearibus integris, basi ciliis elongatis longis crectis ex carunculis angulo dispositis ad basin ramorum. H. nov. p. 239

C. rotundifolius C. pl. radicalibus petiolatis ovatis rotundatis crenato-dentatis, caulinis linearibus vel lanceolatis, glabrisque crectis, calycis laciniis subulatis brevibus crectis ex carunculis longis hirsutis. H. l. c. p. 251

C. minus rotundifolius Lob. ic. 328 opt. Bauh. hist. 2. p. 796 bon.

C. hyssopifolius herniariifolius pl. radicalibus confertis hirsutissimis ovatis glabrisque dentatis nitidis, glabrisque floribus et capsulis nitidis, calycis laciniis brevissimis crectis ex carunculis longis hirsutis, pilisque reflexis. C. Bauh. prod. p. 34 t. 34. opt. hyssopifolius Sieber pl. exs. H. nov. p. 283.

C. Wulfenianus glaber caule erecto-flexuoso nitido ramosissimo, pl. rigidis glaucis, inferioribus obtusis, superioribus longe acuminatis, ala hyssopi crassis, labio calycino subulato pubescente corollam aequante 4-plo brevioribus C. flexuosus W. Kit. 2. t. 136 C. Wulfenianus Jacq. fragm. 5. p. 99. Reichb. ic. bot. cent. 1. t. 88.

C. crinitus H. p. 295

C. glutinosus caule effuso pl. caulibusq. gracilibus ovato-lanceolatis inferioribus obtusiusculis, floribus longe racemosis, calycis tubo hispido-glanduloso corollae dimidio brevioribus C. glut. Lois. fl. gall. ed. 2. t. 1. p. 240. All. ped. t. 7. f. 2 mala. Species ab omnibus affinibus distincta floribus racemosis, pilis omnibus intus in fauce speciosis et praecipue calycis tubo ovato-lanceolato inaequaliter, stylo exserto. Nomina caulis pilis reflexis nunc pramboeis nunc erectis. Calycis calycini nunc ovato-lanceolati, nunc linearis-lanceolati. Pl. tota pubescens et inconspicue glandulosa vel glabrescens. Vidit Sauvages 1753 in C. fragili reperiendum. Alterius varietatis origo et patria quod sciam calycis H. nov. p. 301

C. Portenschlagiana t. XIII f. A.

C. caule subnudo, foliis interne sparsis petiolatis ovatis obtusis acutis argutis-dentatis, floribus racemosis, laciniis calycinis obtusis ovatis inferne subtriplicatim trifidis brevioribus. v.v. α. glabrum β. villosum

Species hic figurata dedit Portenschlag. Poetae magis diffusa delineata est in sp. Obs. at a regnis fl. Germanicis. Inter ultimas affines fragaria C. Ehrharti. Hl. rar. p. 303

Non exhibet plantas exotico-affines, flore exacte ante dentes, sed corolla infundibuliformi, segmenta tubum parum superante, obtusa. (nos)

Planta media inter C. Ehrharti et glandulosum. Differt a priori foliis longe ovatis, dentibus minus acutis, calycinis inter se sparsis basi non angustatis et erectis, et praesertim corollis multo majoribus fauce vulgari — Caryophyllea (nec perfecte S-fida et quasi obtusa) stylo duriusculo non exserto. A C. glandulosum Viv. (isophyllum Mert.) magis acutis: differt tamen dentibus foliisque magis acutis et praesertim corolla infundibuliformi, semi S-fida (nec patentissima S-fida) stylo clavato inclusa. Hl. l. c.

C. isophyllum caulibus subnudis fauce pil. minutis inter se sparsis petiolatis ovatis obtusis crenato-dentatis, floribus corymbosis, laciniis calycinis acuminatis ciliatis cor. duplo brevioribus, stylo exserto, capsula ovata. C. Mertensii giorn. d'Ital. I. Anno 1824 Novembre 1. fascic. C. glandulosum Viv. fl. Lyb. app. 2 fl. 17. p. 67. Differt a C. Portenschlagiana corolla infundibuliformi, a C. Ehrharti flores. multo majoribus et aliis characteribus. Hl. l. c. p. 306

C. Lerchii caule ramoso pauciflore, pil. glabris subtilibus, inferioribus remotis obtusis, ramis acto-brevibus, superioribus brevissimis indigis, calycis tubo hispido, laciniis longe acuminatis glabris, basi dentiformibus, petalis longissime unguiculatis obtusis, capsula globosa, pedicellum aequante et stipitem pilis. C. Lerchii Pollich. exsicc. sup. C. saxatilis. Hl. rar. p. 333

et C. saxatilis vix Pl. p. 339 speciei valde affini C. Lerchii a qua capsula globosa stipitem aequante corollisque minoribus imprimis differt. Ab illa C. Lerchii semper glabrescente, caule ramoso pauciflore, floribus minoribus, laciniis calycinis longioribus, petalis longissime unguiculatis, et praesertim stipite capsulae duplo longiore valde distincta. Differt porro caule magis ramoso, floribus minoribus, laciniis calycinis longioribus, petalis longissime unguiculatis. Ab utraque differt habitu elegantiori. —

Specularia Speculum fl. Germ. ex Fund. etc. p. 8. anno 1748
Legouzia Durand fl. Bourg. 2. p. 26 anno 1782
Cyanea Neck. Elem. bot. 1. p. 224
Prismatocarpus (sp. non congruus) L'Herit. stirp. nov. p. 2.

Calycis 5-fidi tubo clavato prismatico vel longe obconico. Cor. rotata 5-fida. Stamina 5. inter se libera, cor. duplo breviora. Glandula brevis membranacea pilosa. Antherae planiusculae longiores. Stylus inclusus pilosus pilis recurvis. Stigma 3-lobum, lobis linearibus papillosis. Capsula longe prismatica 3-locularis, loculis poro ovato vel fissula supra medium patente pilis deciduis. Semina ovata vel subcylindracea, subangulosa, subtilissime Hl. l. p. 344.

Specularia falcata p. 345
— Speculum p. 346
caule ramoso ramis 3-floris, calycum glabris vel pubescentibus, tubo prismatico apice angustato, laciniis lanceolatis patulis demum reflexis, cor. longitudine tubum calycis, basi gerens pilum C. Cordatum.
cor. 5-partita pilis 2 longis caule erecto est P. hirsutum Ten. prod. et fl. neap. t. 19. Differt ex descript. speciei Pollichianae caule 1-pollicari subnudo, radice ovato-conica repetita, segmentis lanceolatis obtusis. Hl. rar. p. 347.

Centuria Plant. rar. Rossiae meridionalis [illegible] Taurici et Caucasi.

L. B. Frider. Marschall a Bieberstein. Pars I. Charkoviae. 18.0.

Crocus reticulatus t. 1. f. dextra. bene Marsch. fl. taur. cauc. 1. p. 28

[illegible] Lepidium [illegible] Bieb. p. 30 tab. 30 [illegible] [illegible] Wille-

[illegible] [illegible] [illegible] capillaris [illegible] [illegible] [illegible] longiores.

Gen. Lepidii [illegible] definitio eod. loco. Recept. paleaceum : paleis capillari-

bus. Calyx calyculatus. Pappus [illegible] [illegible]. p. 30

Semina [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] tab. et pag. 38. Marsch. fl. taur. cauc. 2. p. 60. [illegible]

. Stev. apud [illegible] in Comment. Societ. phys. med. Mosq. Vol. 1. P. 1. p. 46

similis nostro [illegible] [illegible] ex [illegible]. [illegible] fl. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], caule ramoso [illegible], fl. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Marsch. fl. taur. l. c. [illegible] [illegible] [illegible] et habitu [illegible]

10 [illegible] ramoso, [illegible], et [illegible]. Marsch. ib.

English botany. by James Sowerby London. 1790

Primula vulgaris t. 4. bene [illegible] P. acaulis

Paris quadrifolia t. 7 bene

Chelidonium Glaucium t. 8 bene

Orchis conopsea t. 10 bene

[illegible] [illegible] t. 11 bene

Campanula Trachelium t. 12 bene

Narcissus pseudonarcissus t. 17 bene ex [illegible].

Galanthus nivalis t. 19 bene

Ornithog. luteum t. 21 bene

Orchis bifolia t. 22 bene

Scilla bifolia t. 24 bene

Holosteum umbellatum t. 27 bene [illegible] fl. [illegible]

Ophrys anthropophora t. 29 bene

Vicia lathyroides t. 30 bene

Hippocrepis comosa 31 bene

[illegible] [illegible] t. 34 [illegible]

Borago officinalis t. 36 bene

Potentilla verna t. 37 bene

Serratula tinctoria t. 38 bene sed fl. omni[illegible] [illegible] [illegible]

Melampyrum cristatum t. 41 bene

Papaver hybridum t. 43 bene

Genista tinctoria t. 44 bene

Ophrys nidus avis t. 48 bene

Berberis vulgaris t. 49 bene

Melamp. arvense t. 53 bene [illegible]

Cuscuta europaea t. 55 bene

Centaurea solstitialis t. 56 bene

Eryngium campestre t. 57 bene

Verbascum Lychnitis t. 58 bene

Tulipa sylvestris t. 63 bene

Ophrys myodes t. 64 bene

— aranifera t. 65 bene

[illegible] [illegible] [illegible]

Coriandrum sativum t. 67 bene

[illegible] [illegible] t. 74 bene

Geranium lucidum t. 75

fl. [illegible] [illegible] et acute incisa

Polygala vulgaris t. 76 bene fl. [illegible]

Ajuga Chamaepitys t. 77 bene

Scilla autumnalis t. 78

fol. [illegible] linearia brevia, [illegible] [illegible]

Cardamine impatiens t. 80 bene

Thlaspi alpestre t. 81 bene [illegible]

Myriophyll. spicatum t. 83 bene

[illegible] [illegible] t. 85 bene

Aster Tripolium t. 87 fl. [illegible] [illegible]

Potentilla argentea t. 89 opt.

Campan. glomerata t. 90 bene

petala calycis [illegible]

Tamus communis t. 91 bene

Hedys. Onobrychis t. 96 luxurians

Isatis tinctoria t. 97 bene

Sanicula europaea 98 bene

[illegible] [illegible] 99 bene

Ranunculus Lingua 100 bene

— aquatilis 101 bene (heterophyllus)

Statice Limonium t. 102 bene

Anthyllis Vulneraria t. 104 bene fl. [illegible]

Geum rivale t. 106

Carduus lanceolatus t. 107 bene

Ophioglossum vulgatum t. 108 bene

Orchis pyramidalis t. 110 bene

Lepidium petraeum t. 111 bene

Lathyrus Nissolia t. 112 bene fol. [illegible]

Lithosperm. purpurocaeruleum t. 117 bene

Ranunculus parviflorus t. 120 bene

Allium ursinum t. 122 bene

Lithosperm. arvense 123 bene

Cent. Calcitrapa 125 bene

Rumex Acetosa 127 bene

[illegible] [illegible] 129 bene

Ornith. umbellatum 130 bene

[illegible] [illegible] 131 bene

Abelow authentic f. 133
Abrahamowicz Alexander von Radziwiłł Lehnsmann
Abrahamowicz Stefan
Abrahamowicz Officialist 134 f. Radziwiłł
Abramowicz Andrzej 135
Abramowicz Antoni 137
Abramowicz Litauischer 138
Adelheid Konrad Schreiber, adlig.
Adelige Hofe Ausgang zu Pferde
Adelige Ordnung Ausrüstung, Pferde und Pferde
Adelige Angelegenheiten f. 139
Adelige Familien f. 141
Adelige Artikel f. 142
Adelige Polnische Comitive f. 143
Adelige Offiz. f. 142
Adelige Pflichten f. 148
Adelige Krieg f. 149
Adelige Recht Gericht
Adelige Gesetze f. 153
Adelige Verbrechen f. 154
Adelige Leute f. 159
Adelige Adel f. 160
Adelige Landtag f. 161
Adelige Versammlung f. 164
Adelige Adel Schreiber
Adelige Leute f. 165
Adelige Ordnung f. 169
Adelige Pflicht Adel
Adelige Versammlung f. 170
Adelige Ausgang f. 173
Adelige Gesetze f. 175
Adelige Gericht f. 178
Adelige Recht f. 179
Adelige Schreiber f. 184
Adelige Gesetze f. 187
Adelige Adel f. 188
Adelige Pflicht f. 195
Adelige Gericht f. 190
Adelige Recht Gericht
Adelige Gesetze f. 198
Adelige Adel f. 199
Adelige Gericht f. 203
Adelige Gesetze f. 204
Adelige Recht
Adelige Gericht f. 206
Adelige Gesetze f. 207
Adelige Gericht f. 219
Adelige Gesetze f. 220
Adelige Gericht f. 221
Adelige Gericht f. 222
Adelige Gericht f. 225
Adelige Gericht f. 230
Adelige Gericht f. 231
Adelige Gericht f. 238
Adelige Gericht f. 241
Adelige Gericht f. 243
Adelige Gericht f. 247
Adelige Gericht f. 249
Adelige Gericht f. 255
Adelige Gericht f. 256
Adelige Gericht f. 259
Adelige Gericht f. 261
Adelige Gericht f. 264
Adelige Gericht f. 268
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 272
Adelige Gericht f. 275
Adelige Gericht f. 277
Adelige Gericht f. 279
Adelige Gericht f. 280
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 283
Adelige Gericht f. 284
Adelige Gericht f. 285
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 286
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 292
Adelige Gericht f. 298
Adelige Gericht f. 301
Adelige Gericht f. 303
Adelige Gericht f. 304
Adelige Gericht f. 307
Adelige Gericht f. 308
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 309
Adelige Gericht f. 312
Adelige Gericht f. 313
Adelige Gericht f. 315
Adelige Gericht f. 316
Adelige Gericht f. 318
Adelige Gericht f. 320
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 325
Adelige Gericht f. 326
Adelige Gericht f. 334
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 336
Adelige Gericht f. 340
Adelige Gericht f. 344
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 347
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 348
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 350
Adelige Gericht f. 351
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 355
Adelige Gericht f. 359
Adelige Gericht f. 334
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 362
Adelige Gericht f. 365
Adelige Gericht f. 375
Adelige Gericht f. 376
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 378
Adelige Gericht f. 381
Adelige Gericht
Adelige Gericht f. 382
Adelige Gericht f. 383

Felix agilis t. 384
[illegible]
Verbosus Blakeni t. 393 h
Aristobulus Clarensis 398 h
Aurelius Thorgunius t. 401. [illegible]
— Episcopus t. 402
Calenogastis t. 403
h. m. n. [illegible]
Granius pyrrhicus t. 405 h
m. n. [illegible]
Gregis fabius t. 406 h
Pisgardus Saxifragus t. 407 h
Hordeum portensis t. 409 h
Mercurius vulgaris t. 410 h
Thyas acuminatus t. 411 medium.
[illegible]
Stellaria aurea Sm. t. 415 h
m. n. [illegible]
Stirpis hybridus t. 416 h
Chiron Centaurii t. 417 h
Bellis perennis t. 424 h
Hamulus dryadis t. 427 h
Euphrasia comitalis t. 428 h
Dianthus Jovianus t. 429 h
— Pistoiensis t. 431 h
Thymus citrius t. 439 h. p. n.
Euphrasia Portlandica t. 441 diuscul. s.
pinn. et cap. pl.
— Chamaedrys foliis adpressis t. 442
h.

Gryphus Barbatus t. 443
Ulysses minimalis ovalis, villosus ex
ala rubi.
Mentha hirsuta t. 447 m. agrestis vapa
Thymus adoptivus t. 451 h.
Primula mensis t. 457 h. m.
(praecox. 257)
Chiron publicus t. 458 h. m. n. [illegible]
Chimera t. 462 h. [illegible]
Lotus maximus t. 467 h.
Bromus ensis t. 471 opt.
Senebus Stirpis t. 475 10 fl. purpureus.
— virgo t. 476 h.
Phyllum hirsutum t. 478
Vicia Cretae t. 481 h.
— hybrida t. 482 h.
Verbena pulmonalis t. 487
similis vestae flavae
Ajugo reptans t. 489 h.
Cardamine hirsuta t. 492 h.
— amethystina flore.
Scrophis erectus t. 494 h.
Orchidis pyramidalis t. 499 h.
Saxifr. hirsuta flore t. 501 h.
Calthae palustris t. 506 h.
Plantago lanceolata t. 507 h.
Leontodon taraxacum t. 510
fl. pyramidalis.
Stellaria Holostea t. 511 h.
Ranunculus arvensis t. 512 h.

Ranunculus bulbosus t. 515 h.
— repens t. 516 h.
Acanthus mollis t. 520 h.
Viscaria hirsuta flore t. 525 h.
Lysimachia Nummularia t. 528 h.
Lamium album t. 529 flore purpureo h.
Stellaria media t. 537 opt.
Crepis agrestis t. 538 opt.
Victoria Britannica t. 539
in aqua Kew 1873
Chrysanth. segetum t. 540 h.
Orchis pyramidalis t. 541 h.
Scirpus maritimus t. 542 h.
Cistus guttatus t. 544 h.
Cyclamen europaeum t. 548
flore cyclamen cum
basi nivis rosa picta
Verbena Thyas t. 549 medium.
cum flam. basi
Leontodon palustris t. 553 h.
Pastinaca sativa t. 556 h. m.
Bryum extinctum t. 558 h.
Ranunculus aureus t. 559 h.
Rosa rubiginosa t. 560 h.
Potentilla aurea t. 561 h.
Salix Babylonica t. 565 h.
— viridis t. 566 h.
Lychnis flos cuculi t. 573 h.
Senecio tenuifolius t. 574 h.
flore fere ut in Ilice ex Darwin non ex Verbena

Anglicus Trifolium t. 576 h.
Dubium umbellatum t. 651 h.
Ranunculus acris t. 652 h.
Viscum Boreale t. 655 h.
Ophrys Conopsea t. 657 h.
Antirrhinum Linaria t. 658 h.
Scabiosa arvensis t. 659 h.
Galium verum t. 660 h. m.
Asperugo procumbens t. 661 h.
Taraxacum officinale t. 665
pericarpia bicornia rostrata
rami dichotomi.
Scirpus lacustris t. 666 h.
— virgatus Litwinsky t. 666 h.
Lathyrus pratensis t. 670 h. m.
Malva sylvestris t. 671 h.
Rosa canophylla t. 672 h.
Senebus arvensis sat bene a vestro
ad elongatum glabrum
Teucrium Chamaedrys 680 h.
Orchis mascula spicata t. 682 h.
Phellandrium aquat. 684 h.
Mentha sylvestris 686 h.
Antirrh. spurium t. 691 male picta
— Elatine t. 692 medium.
Valeriana off. 695 h.
Senebus Stellaria 703 h.
Rosa canina 706
fr. atro violaceis!

Joseph Wyszy 1412 ł
Wyszy Niepo 1418 K. woj.
Eufrozyna ożeny 1416 ł
Zofia Leszki 1455 ł
ożeństwi 1456 ł
Chrzestni płeszcz 1460 ł
pł. Stefan wdzięczny
antyfiku 1481 ł
pł. zamiast
Expedit. Ruski Semion 1459 ł
Wiesz alber 1470 ł
Stolnic Kuchy pogrzeb 1485 ł
Semion Pstrowa 1486 ł
Szymek ł Stanisław 1802 ł
10 Stycznia 1800
Bekot Alexy 1508 ł
Agnies wielkie 1513
Wiesz w wszyst pisany
ostrzy wł wielky pomoc
Pan Pluskiny 1520 ożł.
Chrzest. Tomasz 1521 ożł.
Zofia wszyst 1524 ł
Valerian wtór 1531 ł
ożeństwi Stefana - 1522 brat
we wszyst dzieci
Scrophul. wielki 1544 ł
Pstrok. Stefan 1545 ł
Jadwiga Helena 1546 ł
Ostrogi wielkiego 1547 ł
Stanisz wojew 1548 ł
wielki 1559 ł

Expedit. Stefan 1563 ł
Andrzej Leszk. Star. 1564 ł
Semion pułkow 1576 ł
Stefan alber 1578 ł
Lyskiny Dzieci 1580 ł
Chrzestni wojsk 1581 ł
Gryzbor wojsk 1587 ł
Joseph pułkowy 1592 brat we wszyst
et Zofii
— dzieci 1593
widzi we brat we wszyst - Vellel.
Gracian wielki 1594 ł
Leszki wielkie 1595 ł
Stanisz Wasilego 1612 brat we wszyst
Pstrok. Stefan 1614 ł
Pstrok. wielkie 1616 ł
Pstrok. alber 1618
pł. Stefan Stefan
Caroline 1619 pł. wielki Stefan
Fulvian ożeństwi 1628
widzi brat we wszyst. pisarz pisz
Stefan pułkowy wielkie wyszła.
Leszki wielkie 1630
Stefan wielki wszyst
Galian Tricorn 1641 ł
Gryzbor rybołow 1642
widzi brat we wszyst a Leszek.
Rozkazany wielkiego 1643 pł. wielki
Alber ożeństwi 1657 ł
— wielki 1658 ł
Stefan wielki 1659 ł
Leszki Pstrok 1660 ł
ożeństwi Stefana 1671 brat we wszyst wielki

Stefan Wasilego 1673 ł
Semion Leszki 1674 ł
Stanisz Pstrok 1675 ł
Wyszy Stefan 1676 ł
Leszek Pstrok 1678 ł
10 Stycznia Stanisław wielki
Wiesz Stefan 1679 ł
Stefan wielki 1691
est we Stefana Stefan wojew.
et wielki
Wiesz Stefan 1692 ł
Gryzbor Stefan 1704 ł
Chrzestni wielki 1721
widzi ożeństwi
— wielki 1722
Stanisz
— alber 1723 ł
Wiesz wielki 1725 ł
Stefan wielki 1726 ł
Stanisz wielki 1748 ł
Wielki Stefan 1749 ł
Stefan Stefan 1750 ł
Pstrok Stefan 1767
widzi brat we wszyst
Gryzbor Stefan 1768 ł
Stefan Stefan 1769 ożł.
— Stefan 1770 ł
Anthony Stefan 1772 ł
Stefan ożeństwi 1774
pł. Stefan Stefan wielki
umiłuje
Wiesz Stefan 1780 ł

Wyszy Stefan 1784 ł
Stefan Stefan 1785 ł
Stefan wielki 1804 ł
Felix Stefan 1807 brat widzi we wszyst
Stefan Stefan 1822 ł
Stefan Stefan 1823 ł
Delphina Stefan 1839 ł
Leszek Stefan 1841 ł 10 Stycznia
w wielki
Chrzestni Stefan 1934
widzi brat we ills Stefan Stefan.
— wielki 1935 ł
Stefan Stefan 1946 ł
Epikt ożeństwi 1942 ł
— Stefan 1948 ł
Ożeństwi Stefan wielki 1950 ł
Leszek Stefan 1953 brat we wszyst
Stefan Stefan 1843 wielki.
Stefan Stefan 1844 ł
Stefan Stefan 1846 ł
Stefan wielki 1856
Stefan Stefan 1857 ł
Stefan Stefan 1858 Stefan pł. wielki Stefan
Stefan wielki 1872 ł
Stefan Stefan 1885 ł
Stefan Stefan 1888 ł
Stefan wielki 1898 ł
Stefan Stefan 1909 ł
wielki 1910 ł
Chrzestni Stefan 1919 ł
Stefan wielki 1921 ł
Stefan Stefan 1923 ł

Allia vinacea 1974 h
Bromus arvensis 1984 h
Panicum crus 1998 h
— rhipsilis 1999 h
Euphorbia Peplis 2002 h
Antirrhinum minus 2014 h
Erigeron canadensis 2019 medium
Equisetum arvense 2021 hem
Stachys sylvatica 2031 hem
an nostra nunc. c Rich.
all. pp. t. 28 t. 1.
Orchis mascula t. 2059 h
Echium italicum t. 2081 h
Hieracium murorum 2082
h — ill. fl. nitidiusculus
et valde insolitus videndus
Solanum tuberosum 2090 h
— major 2091 cum maj. multiflo.
Rumex longifolius 2143 h
Papaver somniferum 2145 h
Brassica Napus 2148 h
Ulmus suberosa 2161 h
Bromus Rigae 2176 h
Amaranthus Blitum 2212 h
Avena fatua 2221 hem
spicula 3-flora
Brassica campestris 2234 vitt.
hem. an nostra. Fl. Carniol
inf. hoc pronuncia.

Lepidium draba 2258
cfr. an nostra nunc.
Stachys glutinosa 2321 vitt. nostr.
vix aliqui pedunculi elongati
Silene inflata 2324 h
Hieracium Schmidtii L. t. 2332
vitt. nostr. a cunctis Phrygiis
vix unus unicus hoc videtur
Thlaspi perfoliatum t. 2354 h
Hieracium Auricula t. 2368 h
Gentiana pilosa t. 2369 h
Orobus luteus t. 2372 h
Selinum pimpinellifolium t. 2413 h
Salix alba 2430 h
Pinus sylvestris 2460
an nostra Pinaster
Festuca ovina 2462 h
Salix glauca 2467
an nostra reflexa
Salicornia fruticosa 2467 hem
an illa ramosissima
Mespilus oxyacantha 2504 h
vel Crataegus
Chrysanthemum Leucanthemum 2505 h
Senecio viscosus 2515
vix unicus nostra vix flosculis elongatis
Xanthium strumarium 2544 h
Iris Pallasii 2549
Flores tres, pauci
Lonicera nigra 2550 h
vix flosculi immaculati

Myosotis arvensis 2558 h
rarissime 2559
an nostra
Viola hirta 2579 opt.
Geum urbanum 1400 h
Salix viminalis 1389 h
Scandix Pecten 1397 h
Hieracium bifidum 1379 h
Dryopteris Oreopteris 1381 h
Phegopteris Dryopteris 1382
raccemi viridiflori pedi
inaequales, ovatae latae truncatae
Valeriana officinalis 1385 h
Valerian dentata 1370
vix hucusque
Convolvulus arvensis 1371 h
Vicia cassubica 1372 h
an nostra
Linum austriacum 1357 h
Melittis Melissophyllum fl. albus 1340
Daucus carota 1341 h
Geum rivale L. pedunculi
vix. 1342
h
Cynoglossum officinale 1338 h
Lysimachia nummularia 1334 h
Agrimonia Eupatoria 1335 h
Trifolium minus 1316 h
Veronica officinalis 1318 h
pumila
Hypericum tetrapterum 1320 h
Lysimachia Nummularia 1321 h

Lamium purpureum 1314 h fl. extr. elongat.
Festuca pratensis 1392 h
Carex flacca 1394 h
Avena pratensis 1396 hem an Hack. Fg.
Plantago lanceolata 1286
fl. inferi. saepissime sepe. abort.
Vicia villosa 1287 h
Dianthus Armeria 1285 h
Festuca rubra 1289 h
Galium Mollugo 1267 h
Scandix Cerefolium 1268 h
Lathyrus pratensis 1255 hem
Trifolium pratense Hayn. 1256 h
fl. inferiores pedicellati
— Lupinus 1257
fl. minimi, card. pronat. flist. 1211 2
Anemone pratensis 1266
cfr. an alba nostra
Achillea Ptarmica 1244 h
Polygonum aviculare 1252 h
Anthoxanthum odoratum 1253 hem
Alopecurus pratensis 1254 h
Matricaria Chamomilla 1232 vulgaris
Vicia cracca 1236 hem an
varietas fl. minimi
Erodium cicutarium 1223 h
similis hujus
Trifolium arvense 1224 hem
Anthriscus Cerefolium 1228 h
Ranunculus arvensis 1229 h
Achillea Millefolium 1230 vulgaris

Anselm Jarocin 1208 L
Agnes gnesen 1240 L
Conrad Spandau 1195 L
Hartwig Merseb 1205 L
Ogrodzki alter 1189
Conrad Merseb 1191 L
Bronislaw Lesław 1171 L
Rudolf Minden 1173 L
Henry Curon 1174 L
Fidelis Merseb 1177 L
Ludwig Lyhnen 1167 L
Ulric Curon 1168
ex libris Wappen Fl. Wojew
Hilary Lemberg 1169 L
Pelagius Belgien 1149 L
Salvator Off. 1150 L
Berthold Lebus 1150
Stanislaus Cracau 1154 L
Casimir Cracau 1155 L
Krzysztof Curon 1158 L
Jan Cracau 1141 L
Brictius Belgien 1143 L
Lothar Merseb 1124 L
Severus Lebus 1130
Fl. Cracau Wappen Pilawczyk
— Cracau 1131
ex libris Wappen Graf Ludwig Henning
Fl. Cracau Wappen

Casimir Merseb 1112 L
Gregor Lebus 1111
Fl. Cracau
Bishop Signature 1115 L
Daniel Dyonisius 1115 L
Ludwig Wigand 1121 L
Conrad Speyer Sec. 1099 L
Ludwig Curon 1105 L
Fabian Ostrog 1106 L
— Lublin 1107 L
Ludwig Cracau 1108 L
Sigismund Curon Mainz 1090 L
Nikolaus Rudolph 1092
Gallus Wappen Ogdl Lyhnen et Lebus
Hermann Pizzeln 1093 L
Conrad Linz 1096
— Signatur 1098 aus Lübeck
Adam Curon 1083 L
Clemens Flensburg 1070
ex libris Wappen Herbe
Jan Bielitz 1071 L
— Litauen 1072 L
— Prussia 1073 L
Hermann Signatur Stempel 1075 Lübeck
und Fl. Signatur
Philipp Posen 1078 L
Bronislaw Rudolph 1078 L
Nikolaus Minden 1056 L
Sigismund Ostrog 1060 L

Ludwig Schlesien 1061 L
Conrad Danzig 1064 L
Friedrich Schlesien 1048 L
— Officium 1049 Lübeck
mit Wappen Fl. Cracau
— Signatur 1050 Minden
Liborius Lebus 1056 L
Theodorich Olden 1034 L
Conradus Magdeburg 1035 L
Pelagius Mainz 1043 L
— Signatur 1044
Mauritius Pelagius 1026 L
Bronislaw Stanislaus 1030 L
Pelagius Theophylact 1031 L
Sigismund Ogdl 1032 L
Alexander Ludwig 1011 L
Bernhard Crispinus 1012 Lübeck
Erich Ludwig 1013 L
Erich Severus 1015 L
Rudiger Posen 1016 L
Jan Ogdl 1003 L
Bronislaw Diedrich Lübeck 1006 L
Jan Ostrog 986 L
Casimir Anthonius 987 L
Burchard Flensburg 988
ex libris Wappen Kalkreuth
Pelagius Hydrographie 989 L
Posen Religion 991 L

Fabian Caracas 992 L
Ludwig Pelagius 994 Lübeck Signatur Lebus Ludwig Anthonius
— Augustus 995 L
— Marius 996 L
Gregor Caracas 992 L
Antonius Augustus 998 L
Cornelius Aug. 981 Lübeck
Theodorich Lebus 972 L
Rudiger Lyhnen 974 L
Severus Lissa 950 Lübeck Lissa
Ludwig Mainz 950 L
Adam Glogau 952 L
Diedrich Posen 956 L
Silvester Curon 957 L
Antonius Marius 958 L
Engelbert Pelagius 959 L
Lysander Augustus 938 L
Theodor Posen 939 L
Egydius Rudolph 940 L
Pelagius Cracau 941 L
Ernst Steinmetz 942 L
Antonius Caracas 943 Lübeck
Mathias Lebus 944 L
— Prussia L. Signatur Stempel 945 L
Engelbert Germania 946 L
Adalbert Posen 946
Fl. Wappen Dreieck Pfauenfeder
Wappen

Aalya giesta 918 L
Aarny annuj 920 L
Cynosp. off. 921
a illa e lanuj
Alsine conica 922 L
Arenaria segetalis 923 L
Arabis thaliana 901 L
Bupleur falcatum 903 bw
Datura stramonium 909 L
Draba muralis 912
+ luxurians
Sherardia arvensis 891 L
Plantago arvensis 892 L

Sedum reflexum 896 L
Bartsia viscosa 879 bw
Stipa ~~pennata 880 L~~ stipoides
agrostis 881 L sp.
Euphorbia helioscopia 883 L
Galeopsis Ladanum 884 L
Orobanche caryophyllacea 886 L
Papaver rhoeas 872 milium.
– virid. 875 L
– Cambricum 876 L

Flora Portugesa por la Comte de Hoffmansegg et H. Link.
Tom. I. Berlin 1809

Salvia glutinosa t. 19 est ne die inter Verbenaceas et nullo pacto huiusce loco illa mirum quam &c. Citatur a Fl. Lusit. p. 150 et Synonimum Barr. ic. 220. 66/24.

S. pratensis t. 20 est omnino nostra. Desf. atl. 1. p. 25 (Wahl. contra J. Lusitanicum Mill. Dict. N°3. Fl. Lusitanica p. 272 Brotero Phytogr. Lusitanica p. 179.

Cynoglossum pictum t. 24 optime cum nostro mirum tamen Desf. p. 179.

Linum corymbiferum Desf. 42 bene cum nostro Lusitanico
= Chrysolinum Rhyz.

Rhagadiolus stellatus t. 55. Fl. viridis ubi auctor Fl. cumuniensis

Erysimum pictum t. 68 bene cum nostro ? flores in nostro magis conferti cor. lutei, laciniae calycinae acuminatae.

Mercurialis tomentosa t. 8. Lac. Ed. 3. 719
Fl. cordubensis tabulis obscuris minuit hispida, tabulis candicantibus calycem hispidum, laciniis explanatis, dentibus obtusis majoribus mucronatis, laciniis foemineis Fl. Lusitan. p. 117
calycem dentibus 5 majoribus ovatis acutis, 5 minoribus, stigmata albida dentata Lobel Obs. p. 118. Folia villosa subtus, laciniis stigmatum dentatis non alienum.

Lithospermum fruticosum t. 21. differentia ab L. petraeo.

Caules pedales: habitus humilis plantae, folia flore tardiora, caules ? tabulae dilutiores, ovalis tubi limbo longiora, staminibus stigmata tamen subaequantibus. Mill. Dict. Lithosp. p. 3. Caules ovalis pauci villis elongatis, stylis longis ovalibus brevibus circiter, Lithosp. diffusum Lam. n. 13. Mill. et synonima C. Bauhini et Tournef. Syst. Vol. 1. Monspeliae p. 275.

Annali di Storia Naturale di Bologna 1829 fasc. 3°.

Osservazioni del Prof. A. Bertoloni sopra due piante dimostrate nella sua Flora Italica Tomo I. p. 406 – 409.

La pubescenza della Flora greca chiamata da Bertoloni pube cinerea mollissima intorno alle S. montana L. cinerea cinerea = Crispata Bertoloni; porta tinture della stessa L.

S. montana caulescens foliis obovato lanceolatis brevibus acutis mucronulatis punctatis, racemis confertis subsessilibus, laciniis calycinis tubo inferiori longioribus. S. montana Sp. pl. 294. Willd. et Sm. Fl. gr. 6 p. 55 tab. 543 Reg. Fl. cam. ter 130. S. cyanea Desf. Reg. Plante avie nella Grecia e nelle Isole greche poste al levante delle Italie, non trovate finora in alcuna altra parte del mondo, e nemmeno in Persia, Palestina e nemmeno in Egitto che L. dice le cresce nelle sue opere: cresce in Grecia Asia minore et Nubia Fl. Egypt. p. 308 n. 4. La pianta di Nubia è forse propria di una pianta affinis, e rappresenta le foglie troppo piu lunghe di una cosa nella stessa nudata.

10

S. hypnoides : ramosissima, foliis dorso convexis acuminatis margine subtus punctatis ; ramis laxis secundis, basi subsimplicibus ovatis subglobosis » S. montana Sois. Fl. Basil. Prod. S. pennata Spec. muscor. p. 96 S. dubia Lindb. Hist. p. 897. Comm. Epit. in oper. ad Sarcoscyp. secundam p. 713 cui ic. Bolt. non pergunt tam gallo Rhenano ad Sarcoscyphos ortum. Linnæo fere dubium manente hoc Muscum Sarcoscyphum montanum nec Viridi Clifford. p. 57. nec Hort. Cliff. p. 508 nec Hort. Upsal. p. 161 assignè ad marginem pro patria Helvetia et Austria : parvi dubia de ipsis Speciebus quæ pluribus nativis ad Rhenum, e quibus de certo nobis possidemus. Imprimis ipsi Linnæo in gallo opus quod pinxerat Bolton sua patria Halifax Crypt. Angl. p. 288 t. cui ipse Bolt. suas species nullas subnexuit, et quod Bolton non vidit nisi de pagina sui libri ad mare Rhenum. Ea pinxit Bolton ex Sarcoscypho montano Linn. et quod ad Sarcoscyphum Bolton a Linnæo adscriptum, ex Linnæo, explicat ipsi pinxisse ad Sarcoscyphum montanum Linnæi ex Linnæo ipsi ortum. Linnæus ipse ex Bolton ad Sarcoscyphum montanum L. cc. » p. 409.

Bolton delle semplici ispezioni delle piante delle Selvagge non tutte delle Montagne, che lui pare i Boschi delle S. subpinnata, ancor pennata de quelle Rupe essere la vera S. montana di Linneo per la sua regione, il suolo, che la Scheda autore della Flora nobile e peregrina del Museo Linneano è probabile che abbia stimato la pianta greca della stessa maniera, stabilì che la Selvaggia montana di tutte i Botanici posteriori a Linneo non poco gentile di Linneo, e che perciò dovesse con nuovo nome distinta, cioè la chiamò S. hypnoides Bolton. Ma pianta di tutte con esattezza esposta Una pianta greca nel è pianta nelle tavole 348 della Fl. greca Ne Scheda nulla lo accenna Illustrazione della Selvaggia montana di quella Specie non è i Boschi della S. subpinnata, come il colore rossiccio di fiori, la brevità di pedicelli, comune delle cime congenerici il vicino a piccole pianticelle per credere. I fiori della Selvaggia delle tavole non sono interamente noti come si spiegano assolutamente nelle subspecie, ma l'elemento maschile di esso specialmente nel lobo superiore non si spiega una media di forma bislunga che ha punta e nel lobo medio del lobo superiore non altrove altre maglie volta semi ovali e strettamente a tre punte.

Il punto più del colore generale della cuticola è bianco come nelle Selvagge montane di tutti i Botanici, nella pianta greca e specialmente nelle cuticole della stessa che il ch. D.r Hoppe distinse col nome di marginata Bot. Taschenb. 2. p. 134, osservazioni maglie volta di forma

Trib. II Alsineae Dl. fl. fr. 4. f. 166

Lagina
Moehringia
Holosteum
Stellaria
Arenaria
Cerastium

Ordo XV. Lineae
Capsula Linum
Diversitas XVI Malvaceae
Malva
Malva
Althaea
Lavatera
Hibiscus
Sida
XVII Tiliaceae
Carcerula Tilia
XVIII Aurantiaceae
Bacca Citrus
XIX. Hypericineae
? Hypericum
XX Aceraceae
Diversitas Acer
XXII Meliaceae
? Drupa Melia
XXIII Ampelidae
Bacca Vitis
XXIV Geraniaceae
Diversitas Geranium
Erodium
XXVII Oxalydae
Capsula Oxalis
XXVIII Zygophyllaceae
Diversitas Tribulus

XXIX Rutaceae
Capsula Ruta
Regma Dictamnus
Subclassis II. Calycifloreae
O. XXX Celastrineae
Trib. II. Evonymeae
Capsula Evonymus
O. XXXI Rhamneae
Drupa Zizyphus
Carcerula Paliurus
Bacca Rhamnus
O. XXXII Terebinthaceae
Trib. I. Anacardiae
? Drupa Pistacia
II. Sumachineae
? Rhus
XXXIII Leguminosae
Legumen Subordo I. Papilionaceae
Trib. I. Sophoreae Spr. Dl.
Anagyris
II. Loteae
Spartium junceum
Genista
Cytisus
Ononis
Anthyllis
Medicago
Trigonella
Melilotus
Trifolium
Dryonia

Lotus
Tetragonolobus
Psoralea
Glycyrrhiza
Galega
Colutea
Phaca
Astragalus
III. Hedysareae
Scorpiurus
Coronilla
Astrolobium
Ornithopus
Hippocrepis
Lecanigus
Hedysarum
Onobrychis
IV. Vicieae
Cicer
Faba
Vicia
Ervum
Pisum
Lathyrus
Orobus
V. Phaseoleae
Phaseolus
Lupinus
Subordo II. Caesalpineae
Trib. VI. Cassieae
Ceratonia

Ordo XXXIV Rosaceae
Tr. I. Amygdaleae
Drupa Amygdalus
Persica
Armeniaca
Prunus
Cerasus
II. Spiraceae
Etaerio Spiraea
III. Dryadeae
Dryas
Geum
Rubus
Brayanis
? Potentilla
? Tormentilla
IV. Sanguisorbeae
? Alchemilla
? Drupa Potentilla
V. Roseae
Etaerio Rosa
VI. Pomaceae
Pyridium Crataegus
Cotoneaster
Amelanchier
Pyrus
Cydonia
O. XXXV Granateae Don. Dl. Prodr. t. 3. inad.
Carcerula Punica
O. XXXVI Myrtaceae
? Bacca Myrtus
XXXVII Cucurbitaceae
Pepo Cucumis
Bryonia
Momordica
Cucurbita

O. XXXVIII Onagrariæ
Gr. I. Onagreæ
Capsula Epilobium
II. Jussieæ
Jussiæa
Corolla Circæa
III. Hydrocharideæ
Trapa

O. XXXIX Halorageæ
Gr. I. Ceratophyllinæ
Myriophyllum
II. Callitrichineæ
Callitriche
III. Hippuridineæ
Hippuris

O. XLI Lythrarieæ
Capsula Lythrum
Peplis
XLII Tamariscineæ
Capsula Tamarix
XLIII Portulaceæ
Pyxidium Portulaca
XLIV. Paronychieæ
Gr. I. Telephieæ
Corolla Corrigiola
II. Illecebreæ
Herniaria
Paronychia
III. Myrteæ
Myrtus
IV. Scleranthineæ
Scleranthus

O. XLV Cucurbitaceæ
Styrax Umbellifera
Lobelia
Campanula

O. XLVI Ficoideæ Cfr. Bot. Mag. vol. 35 p. 1411
Cactus

O. XLVIII Grossulariæ
Ribes Ribes
XLIX Saxifrageæ
Capsula Saxifraga

O. L. Umbelliferæ s. Coriariæ

O. LI. Caprifoliaceæ
Gr. I. Hedereæ
Hedera Hedera
Cornus Cornus
II. Sambucineæ
Sambucus Sambucus
Viburnum
III. Caprifolieæ
Lonicera Lonicera

O. LII. Loranthi
Viscum

LIII Rubiaceæ
Asperula Asperula
Galium
Rubia
Sherardia
Crucianella

LIX. Valerianeæ
Valeriana Centranthus
Centranthus
Valeriana

LX. Dipsaceæ
Scabiosa Scabiosa
Knautia
Cephalaria
Dipsacus

LXI Compositæ Vaillant 2. p. 103 Cfr. Pl. p. 4. p. 1.
Labiatæ I. Corymbiferæ Vaill.
Cynareæ
Eupatorium
Tussilago
Cineraria
Senecio
Doronicum
Arnica
Chrysocoma
Aster
Erigeron
Solidago graveolens
Bellidiastrum Cassini
Bellis
Conyza
Inula
Pulicaria
Elychrysum ang. mit Gl. Cl. Pl.
Filago
Micropus
Gnaphalium
Antennaria
Anaxeton
Artemisia
Santolina
Tanacetum
Balsamita

Anthemis
Achillea
Matricaria
Bidens
Calendula
III. Cynarocephalæ
Echinops
Carlina
Lappa
Onopordum
Silybum
Carduus
Serratula
Cirsium
Cynara
Centaurea
Kentrophyllum Carth. Lanata
Carlina
Atractylis
Crupina
III Cichoraceæ
Scolymus
Cichorium
Hyoseris
Arnoseris
Lactuca
Chondrilla
Prenanthes
Sonchus
Leontodon
Picris
Tragopogon
Podospermum
Scorzonera
Hypochæris
Thrincia
Phoebe Cassini Bull. nouveaux opuscules Tom. 1821 p. 125
Crepis
Hieracium

Helmintha
Pinq
Hirudines
Gorgon Lin. ill. t. 646
Hypodryas
Trygonus
Rhinia tubesp.
Lemoda
Podargus
Scyphius
Hyperia
Cetochilus

O. LXVIII Carpenteles Capsula
Phytoecha
Prosthesceros
Capsula

Ö LX. Cricetus
Subl. I. Cricetus St. Hof. 3. f. 674-5
Arctodus Bär
Hystrix ?
Cricetus Capsula ?
Callosus

Subclassis III. Cordilifera
O. LXII Ebenus
Fr. I. Dasypoda
Dasypoda
II. Stenurus
Stenus

O. LXIII Tesmines
Fr. I. Tesmines
Drupa Olea
Phillyrea
Ligustrum
Tesmine
II. Lilacea
Capsula Lilac
canina Fraxinus
LXIV Apocynea
Fr. I. Asclepiades
Folliculus Cynanch
II. Vincetoxicum
Nerium
LXV. Gentianea
Capsula Chlora
Gentiana
Chironia
LXVII Convolvulacea
Convolvulus Convolvulus
Cuscuta Cuscuta
LXVIII Borraginea
Capsula Cerinthe
Heliotropium
Echium
Lithospermum
N. Cuticula Nonea
Pulmonaria
Anchusa
Symphytum
Cynoglossum canina
Anchusa
Borrago
Asperugo

Capsula Myosotis
Dichotylis Cynoglossum
O. LXIX Solanea
Datura Lycium
Capsula Physalis
Atropa
Hyoscyamus
Capsula Datura
Nicotiana
Pyxidia Hyoscyamus
Capsula Verbascum
LXX Antirrhinea Syst. gr. 118
Capsula Scrophularia
Digitalis
Antirrhinum
a. rotunda Linaria
p. Capsula
Bursa pastoris Elatine Stroplularia
O. LXXI. Orobanche
Orobanche
O. LXXII Rhinanthacea
Fr. I. Pedicularea
Pedicularis
Rhinanthus
Bartsia
Euphrasia
II. Veronicea
Veronica
O. LXXIII Labiata
Capsula Lycopus
Mentha

Salvia
Ajuga
Teucrium
Physostegia
Phlomis
Galeobdolon
Leonurus
Marrubium
Ballota
Betonica
Stachys
Lamium
Glechoma
Prunella
Scutellaria
Nepeta
Lamium
Salvia Salbei
Melissa Rosmarinus officinalis
Melissa 368 S. gr. Apiastrum
Thymus
Melissa
Melissa
Origanum
Thymus
Clinopodium
Satureja
Basilicum
O. LXXIV. Verbenacea
Verbena
Capsula Vitex
O. LXXV. Acanthacea
Capsula Acanthus
mollis Lin. ill. 556 f. 2
Mollis ib. - XI.

O. LXXVII Primulaceæ
Cyclamen Cyclamen
Lk. Hft. ff. pl. 8. Asperifolien Heller
333. Anagallis
Corn
Androsace
Primula
Cyclamen
Soldanella
LXXVIII Apocineæ
Oleander
Sibelopsis IV. Monocotyledonen
Perisperm farblos, gelblich weiß oder
milchig weiß oder ölig weißlich
O. LXXIX Plantaginei
Cupressi Plantago
Statice
O. LXXX Plantaginei
Pyxidi Plantago
O. LXXXII Amarantaceæ
Celosia Amarantus
O. LXXXIII Chenopodeæ
Fr. 1. Atriplices
Obione
Atriplex
Spinacia
Beta
III. Polygoneæ
Polygonum
O. LXXXIV. Polygoneæ
Coccoloba Coccoloba
Polygonum
O. LXXXIV bis Polygoneæ
Fagopyrum Stellera
Daphne
Passerina
Thymelæa
O. LXXXV Laurineæ
Laurus
O. LXXXVI Santalaceæ
Thesium
Osyris
O. LXXXVIII. Cytineæ
Cytinus
O. LXXXIX Aristolochiæ
Aristolochia
Asarum
O XC. Euphorbiaceæ
Ricinus Croton
Buxus
Euphorbia
Mercurialis
O XCI. Urticeæ
Fr. 1. Urticeæ
Parietaria
Urtica
Humulus
Fr. II. Artocarpeæ
Morus
Ficus
O. XCII Cupuliferæ
Quercus
O. XCIII. Amentaceæ
Fr. 1. Celtideæ Linky Gd. 1421.
Celtis
II. Betulineæ
Alnus
Betula
III. Salicineæ
Salix
Populus
IV. Juglandeæ
Juglans
Carpinus
Ostrya
Corylus
Carpinus Linky
O. XCIV Coniferæ
Fr. 1. Taxineæ Fichtelg. 128
Taxus
II. Cupressineæ id. 137
Juniperus
Cupressus
III. Abietineæ id. 135
Pinus
Abies
Classis II. Monocotyledonen
mit Endosperm phanerogamen
Fr. organ. 1. f. 638
O. XCVI. Alismaceæ
Fr. 1. Butomeæ
Butomus
II. Alismeæ Linky 137
Alisma
III. Damasonieæ
Triglochin
O. XCVII. Potameæ Fragm. Disp. post
t. 42 & 93
Potamogeton
Zostera
Zannichellia
O. XCVIII Orchideæ
Orchis
Ophrys
Serapias
Nidus
Epipactis
Cephalanthera
O. XCIX Irideæ
Iris
Gladiolus
Crocus
Ixia
O. C. Amaryllideæ
Amaryllis
Pancratium
Narcissus
Leucojum
Galanthus

O. CI. Asparagae
Asparagus
Paris
Convallaria
Smilax
Ruscus
Tamus

O. CII. Liliaceae
Tr. I. Tulipaceae
Tulipa
Tritillaria
Lilium
II. Asphodeleae
Erythronium
Asphodelus
Phalangium
Scilla
Hyacinthus
Muscari
Selisb. in ann. of bot. 2. p. 555 Gagea lutea villosa
Ornithogalum
Allium
~~III. Hemerocallideae~~
~~Hemerocallis~~

O. CIII Bromeliaceae
Agave

O. CIV. Colchicaceae
Colchicum
Uvularia

O. CV. Juncaceae
Juncus
Luzula

O. CVI Palmae
Phoenix

O. CVII Aroideae
Arum

O. CVIII Typhaceae
Typha
Sparganium

O. CIX Cyperaceae
Cyperus
Schoenus
Scirpus
Carex

O. CX. Gramineae
Mays
Holcus Nelapraesis. Sagt
Andropogon
Saccharum
Lagurus
Cynodon
Digitaria
Tragus
Calamagrostis
Agrostis
Milium
Stipa
Panicum
Phalaris
Phleum
Polypogon

Alopecurus
Crypsis
Anthoxanthum
Melica
Aira
Avena
Bromus
Festuca
Arundo
Dactylis
Koeleria
Poa
Briza
Cynosurus
Festuca
Nardus arista
Rottbeck
Aegylops
Triticum
Secale
Lolium
Hordeum

O. CXI? Lemnaceae Dutz. p. 532.

Class. III. Monocot. sec. Endogenae Cryptogamae Dl. org. 1. p. 126

O. CXII? Characeae L. C. Fich.
Chara

O. CXIII. Equisetaceae
Equisetum

O. CXIV. Filices

Tr. I. Ophioglossaceae Hook. Nat. 2. p. 158
Ophioglossum
Botrychium
II. Osmundaceae l. c.
Osmunda
III. Polypodiaceae ib. p. 152.
Ceterach
Polypodium
Polystichum
Aspidium
Athyrium
Asplenium
Scolopendrium
Pteris.

O. CXVI. Lycopodiaceae
Lycopodium

Monandria
Diandria
Triandria
Tetrandria
Pentandria
Hexandria
Heptandria
Octandria
Enneandria
Decandria
Dodecandria
Polyandria
Monadelphia
Diadelphia
Polyadelphia
Syngenesia
Gynandria
Monoecia
Dioecia
Polygamia

Liquidi per lavamen (clister)
da somministr.

Sublimato corrosivo ℥ij
Canfora ℥ij
Spirito di vino ℥ij

s'infonde il tutto a freddo in caso bisogno per alcuni giorni si mescola sovente poi si passa per carta grigia, e si conserva.

Liquido per pediluvi

Acqua di Felice ℔j
Spirito di vino ℥ij
Allume
Nitro } ℥ij
Sal marino

Per vaccinare: estrarre dalle vesc. e pust. di Vaccaro

s'immerge la lima estremità nel seguente liquido, e così bagnata per due o tre giri, più si lascia asciugare

Acqua ℔ss
Allume ℥ij
Nitro ℥ij

Cotiledoni o Frutti secondo Michel.
1. frutti semplici indeiscenti
Cypsela - (Achenia Neck. D. Achenium Juss.) Synanthereae.
Cerio (Caryopsis Juss. Del.) Gramineae
Carcerula - Panicea - Lotica - Polygonum - Rheum - Daucus - Allium - Solanum - Rosa - Salsola - Bupleur. - Evonym. - Carex - Rumex - Asparag. - Hyssop, Scutell. - Salvia - Salix - Ulmaria - Tilia. Conifer. - Tilia.
2. frutti semplici siliquosi
Legumen - Leguminosae
Siliqua - Cruciferae
Pyxis (Pyxidium Schr. DC.) Anagallis - Hyoscyam. - Plantago - Portulaca. Anagallis
Capsula - Chelidonium - Corydalis - Ilex - Armeria - etc. - Jris - Tamarix - Antirrhin. et Linaria - Glaucium - Asphodelus - Anthericum - Antirrhinum - Aquileg. - Scrophularia et Hemiphr. et Verb. - Convolvulus - Verbascum - Ophrys - etc. - Lilium - Acanthus - Lythrum - Veronica - Evonymus - Caryophyll. - Nigella - Linum - Papaver - Viola - Syringa - Jasmin. - Campanula - Hellanthem. - Epilobium - Oxalis - Asarum - Plumbago - Samolus - Statice - Primula - Gentiana - Erythraea - Pinus - Pinus - Salix - Populus
3. frutti semplici deiscenti in più cocchi.
Cremocarpium (Polachenium Juss. DC.) Umbelliferae
Legumen (Chaetevium Juss.) Ranunculus - Cistus - Spiraea - Euphorbia - Dictamnus
Diversitas (Dicera Galium Sherardi Asperifol.) Aceri - Geranium - Pri. - Globularia - Alisma - Malvaceae - Tribulus - Cynoglossum
Bistellatus (Stellatus DC.) Asclepias, Lysimachia, Nerium.
Etaerio Geum - Ranunculus - Rubus - Fragaria - Rosa - Potentilla - Dalechampia - Helleborus - Potamogeton - Paeonia - Clematis - Sedum - Semperviv. - Drosera - Aconitum - Magnolia - Spiraea - Ranunculus (Ph. Bot. 6)
3. frutti semplici pomiformi di varii ovarii fusi.
Coenobium - Labiatae - Borragineae (excl. Lycopsis) (Heliotropium DC. Juss.)

6. Frutti semplici carnosi con nocciuolo

Drupa Prunus. Amygdalus. Juglans. Phœnix. Olea. Zizyphus. Daphne.
Pastinaca Chenopodium urticae (Utricula. Radicula Colocasiae Desv.) Potentium. Cornus. ~~Mespilus~~ Celtis.

7. Frutti semplici carnosi con molti semi separati

Pyridium. (Pomum L. DC.) Sorbus. Malus. Pyrus. Mespilus. Cratægus.

Pepo. (Peponida Rich. DC.) Cucurbitaceæ. Bryonia. Elaterium

Bacca Ruscus. Asparagus. Atropa. Verbutus. Vitis. Ribes. Citrus. Phytolacca. Phy-
salis. Nymphæa. Actea. Ligustrum. Andersonum. Paris. Sambucus.
Berberis. Solanum. Arum. Lonicera. Rhamnus.

Calybio. Frutti coperti. (Glans DC.) Quercus. (Nucula DC.) Corylus. Castanea. Fagus. Ephedra.

Strobilus. Cupressus. Juniperus. Pinus. Abies. Alnus. Thuja. Betula

Syconus (Ficus DC.) Ficus.

Sorosus (Syncarpa Rich.) Morus.

Sylloge plantarum novarum ... cognitarum
a professoribus botanices Universitatis et
Societatis regiae botanicae ratisbonensis edita. Tom. II
Ratisbonae 1828 ingressa ad calcem Flor. oder
botanische Zeitung anni 1827.

p. 240 Diagnoses plantarum novarum aut minus cognitarum
auctore Prof. Lausch

p. 243 N. 7. Dianthus nodosus: floribus solitariis pomiculatis, squamis
brevissimis obtusis imbricatis, petalis denticulatis imberbibus,
caule debili nodoso decumbente: foliis angustissimis, margine
calloso reflexis.
Hab. cum D. littorali Host in Dalmatia. 2.

D. sylvestrem proxime accedit, sed squamis calycinis 6–8 imbricatis,
caulis adnodum flexuosis nodosis decumbens.

ib. N. 8. Dianthus sylvestris β. macranthus: caule elatiore uni-
multifloro, calycibus plantae alpinae Dalmaticae longioribus, squamis
latissimis laxis.
Hab. in Dalmatia 2.

Eadem est planta, quae olim e horto Berolinensi pro D. virgineo
exivit. An huc D. Carthusianorum sup. pertinet.

p. 245 N. 14. Bupleurum virens: foliis ovato-lanceolatis subcoriaceis glaberrimis,
foliis obtusis integerrimis, petalis stellatis hirtis.
Hab. in Dalmatia 2.

Simillimum B. virenti, at foliis integerrimis, petalis longioribus minus
dense tectis, viridia, vix incana. Stirpes utrinque attenuatae.

ib. N. 15. Trifolium petiolare: caule erecto ramoso petiolis glabris
foliisque angustis lanceolatis mucronatis conspicuis pilosis, stipulis
brevibus subulatis; capitulis gemmis subsessilibus laxis demum
cylindraceis, dentibus calycinis setaceis subaequalibus tubo corollae
subaequantibus.
Hab. in Dalmatia 2.

Culmus spithamaeus major caule adnodum petiolis flexuosis et floribus
laxis Trifolii subterranei, sed caulis erectus glaber, folia angusta, et
spicae elongatae.

p. 246 N. 17. Brassica tenuifolium: calycibus fructus erecti caulique
simplici hispidis; foliis lineari-lanceolatis margine revoluto sparse pilis
stellatis strigosis (viridibus)
Hab. in montis Karsicis Carnioliae.

Proximum B. sinuato Sieb. (angustifolia Lehm.) quod etiam in Agro
nostro crescit, cujusque Diagnosis erit: B calycibus fructus erecti caulique
simplici appresse strigosis; foliis lineari-lanceolatis margine revoluto sparse
pilis stellatis strigosis inversis. Ab B. sinuato, quod ex Dalmatia
pomdere differt foliis angustis non conspicuis.

ib. N. 18. Carpesium Dalmaticum: herbaceum (capitulis glomeratis
bracteatis exappendiculatis); foliis obtusis subintegerrimis hirtis,
radicalibus ovato-cuneiformi-lanceolatis petiolatis subrepando-sinuatis
ciliatis; floribus terminalibus capitatis, involucris lanceolatis
squarrosis.
Hab. in Dalmatia cum C. cernuo W. K. cui simillimum, sed differt
indumento hirto nec hispido, foliis subintegerrimis, calycibus exappendiculatis.

p. 247 N. 20. Erysimum Cheiranthus β. capitatum: caule simplici obtuse
tetragono, floribus terminalibus capitatis bracteatis.
Hab. cum E. tenuifolio Lindl. in Dalmatia. ⊙

Zrbia et flores magnitudine C. centaurii, sed caules dyssitos, et flores in capitulum longius aut pedicellum congesti. Calyces longitudine tubi corollæ. Hæc species, an var. gemella centaurii e paucissimis individuis, quæ extant ex Dyssicandra.

p. 248 N. 24. Satureja fasciculata: caules axillares subsessiles, secundi; folia lineariby complicatis emarcidis fasciculatis hirsuta scabriuscula; caules fruticosi.

Hab. in Dalmatia ♄

Affinis S. thymbræ L. et Nepetæ Juncea Mill. pl. creta var. (Th. Nepetæ L.) sed flores non verticillati, capitati. Folia pro modo arctius aut pendulosius scabriuscula.

p. 249. N. 27. Mentha Dalmatica: floribus verticillatis villosis; folia oblonge-lanceolata obtusa serrata utrinque attenuata pilosa, subtus molliuscule villosa; caule erecto ramoso villoso (floriferis spicatis)

Hab. in Dalm. ubi et M. sylvestris singulari varietate lanata, caule nempe foliisque crassis subtus niveo-lanatis obtusis. ♃.

ib. N. 28. Origanum sylvestre β. lanuginosum: caule acutangulatissimo.

H. in Dalmatia. Licet intermedia O. fœmineæ Lois. sit spicatum tamen solum est var. O. sylvestris, capitulum enim est rotundum insidens elongato pedicello erecto, nec subglobosum sessile: cui pedicello petiolisque, terminalibus maximis spicatoramosis et in Echinopo spinoso, denique folia superiora sunt lanceolata integra basi connata nec cordata.

ib. N. 30. Centaurea globosissima: caule gracili erecto paniculato patulo; folia lanceolata, lacinia oppositis lineariby subulatis numerosis; p. 250 antheræ tentaculatæ hispidæ, stylus appressissime pennæ ciliatis.

Hab. in Italia. Affinis C. paniculatæ, sed antheræ longe fere minus tentaculatæ, stylus appressissime hispidus quoque flavo-pellucidus, flosculi elongati et tubo glabriusculo.

ib. Dyss. p. 250 N. 31. Centaurea Karelliana Sieg. cent. 2 p. 140 t. 55. caule humili paniculato pilisque pinnatisectis lineariby rigidis glabriusculis, summis indivisis; stylus antheris rigidis ciliatis multis numerosissimis.

β. spinosa ciliata: stylus antheris ciliatis numerosissimis rigidis. C. spinosa ciliata Bernh. in Sturm. 1901. 2 p. 403.

Hab. in monte Caraibi, inter Sicher ambos carentes provincia Albaniæ. Habitu omnino non dissimilis C. paniculatæ, flores vix, nisi quod in β. stylus terminantes ciliis nonnullis, ac in C. salicifolia Dyss. crassiores, stylus C. paniculatæ Cachet andr. Stylus ciliis nunc pilisve nunc simul nullis.

p. 253. N. 39. Senecio multangularis: corymbo composito calycibus intactis; folia auriculato-amplexicaulibus pinnatifidis, laciniis oblongis subdissis angulato-dentatis, caulique erecto demum remotiusculis.

Hab. in Dalmatia ☉. Viktor. cadem fere forma, quæ in horto vulgaris nomine S. montani W. exhibet, licet in vetta lacinia foliorum magis remota sint, quam vere dentata et latitudine lacinianum admodum variantes vid. Suentenius W. et Kit. grossi et hos notabi individua a S. vulgari W. K. non dissert.

p. 254 sub nom. Senecio sticta N. 40 ait. S. Bubonium, quem Dalmatia habet, repertum dixerunt: S. foliis conjuncto-oblongis subamplexicaulibus rigidis scabris glandulosis dentatis sublobatisque, corymbo depauperato multiflora, pedunculis subdissis, squamis ovatis squamosis.

ib. p. 243. Stoke Dissyphon: folia lanceolata spathulato retusa

punctato-scabris; scapo decumbente ramosissimo articulato glabro, articulis angulatis divaricatis, spicis elongatis erectiusculis terminalibus, squamis 2-floris.

Ht. in Dalmatia ♃. St. cordata proxima, sed differt magnitudine in omni majori, scapo decumbente, spicis erectiusculis, squamis bifloris.

p. 255 N° 49. Allium amethystinum: caule (planifolio) umbellifero, umbella globosa spatha subulata duplo (p. 256) breviore, pedunculis capillaribus coloratis; staminibus 3-cuspidatis petalis lanceolatis duplo longioribus.

Hb. in Dalmatia, unde Bertinus Stelzer summitates absque foliis attulit, sed ex summa affinitate cum A. Porro, et Ampeloprasso certe sunt plana. Umbella major, densa, pedunculis capillaribus amethystinis ½–⅔" longis. Flores oblongi minimi plus minusve purpurascentes.

ib. p. 256. N° 50. Gladiolus dalmaticus: floribus alternis subsecundis erectiusculis subimbricatibus; corollae laciniis oblongis obtusis: inferioribus 2 lateralibus supremo ⅓ brevioribus, antheris filamento sublongioribus, foliis ensatis

Hab. cum Gl. communi L. in Dalmatia. ♃.

Callitriche brutia Guss. Fl. neap. quam ipse Tenore per annos [Junii et] Augusti [illegible] [illegible] Sammit et Aprili collegit Joh. Gussone Neap. 1826 4to tab. 1. differt a nostra fol. lanceolato-cuspidatis.

Veronica angustifolia tab. III est varietas nostrae angustifoliae, pilosa

Polygonum [illegible] tab. V. f. 2. floribus ex foliorum axillis [illegible], [illegible] altera ex foliorum axillis [illegible], altera biloba [illegible]

Zerna fallax tab. IX.

Asperula nitida tab. XIII f. 2 [illegible] [illegible] punctis glabra [illegible].

fig. 3 Plantago montana fol. [illegible] [illegible] dentatis.

Stephanomeria [illegible] tab. XIX

~~Dianthus [illegible] tab. XX~~

[illegible] [illegible] tab. XXIII f. 1.

Dianthus ciliatus tab. XXXII petala angusta cuneata obtuse crenata; nota et in fig. 4 acute [illegible], [illegible] [illegible].

[illegible] ciliatus tab. XXXIII [illegible] nostri majoris, sed bracteis [illegible] ovato-cuspidatis margine ciliatis, calycis pubescentis, [illegible] [illegible] ciliati [illegible] p. 168–69, [illegible] margine membranacea, [illegible] [illegible] [illegible] reticulata.

Saponaria bellidifolia [illegible] p. 163 [illegible] fig. [illegible] [illegible] tab. 7. f. 2! et [illegible] t. 62 f. 1. Barrel. ic. 498

Silene [illegible] fig. 172 tab. 35 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et fig. 174 [illegible] [illegible]. S. [illegible] et [illegible]; et ab hac distinguitur [illegible] [illegible], floribus subpaniculatis, corollae laciniis bipartitis non bifidis, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ovato-oblongis non [illegible]

Pyrus [illegible] tab. XXXIX. bene

[illegible] [illegible] [Bertol.] t. XL Barrel. icon. 564 affinis [illegible] oblongifolia Kit. 10 differt foliis oblongis et [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] calyc. [illegible] [illegible]: — [illegible] [illegible] fol. [illegible].