

Piante fossili conservate nella capsetta
che si spedì al sig. Prof. R. D. Visiani

1. *Chondrites intricatus*, Sternb. nell'argilla stratif. sopra la lignite bituminosa coccinea (Braunkohle) di Stranitz nel Boemia.
2. *Diandra Brongniardi* nell'argilla sud.
3. *Taeniopteris marantacea*, Sternb. — id.
4. *Cassia hyperborea*? Ung. — id.
5. *Equisetites*? — id.
6. *Laurus Swoscowicziana*, Ung. nello schisto marnoso superiore all'argilla della lignite di Stranitz.
7. *Laurus lignum*, Ung. *Cassia hyperborea*, Ung. *Apocynophyllum Russeggeri*, Ettingh. nello schisto marnoso sud. con *Pistidium Schlehani*, Lanza (nov. sp.).
8. *Potamogeton coccinea* nello schisto marnoso sud.
9. *Sphenopteris Haudingera*, Ettingh. e *Aracanthites curvifolius*, Ettingh. nello schisto marnoso bituminoso di Varas presso Sernis (alle falde del Boemia).
10. *Aspidites*? con *Aracanthites curvifolius*, Ettingh. nello schisto sud.
- 11-12. *Aspidites*? e *Sphenopteris*? nello schisto sud.
13. *Caulinites Kadabajensis*, Ung. nello schisto marnoso bianco di Varas.
- 14-15. *Aracanthites curvifolius*, Ettingh. nello schisto marnoso bianco di Varas.
- 16-17. *Callitrites Brongniardi*, Endl. nell'arenaria marnosa con Melanite ed altre carb. di acqua dolce di Varas.
18. Arenaria marnosa fossilifera, con *Peltiti* della formazione coccinea di Dobruavitzka presso Scandona.
- 19-20. Schisto argilloso a *Fucidi* della formazione Priajzica (stratif. del Keuper) dei dintorni di Much.
- 21-22. *Aracanthites* sp.? (affatto nuova) nel calcare metastacco foraminifero dell'isola Lipra.