

Florae Dalmaticae  
Supplementum alterum

Characeae Agd.

Vis. fl. dalm. I. p. 33.

Characeae A. Br. in Vis. fl. dalm. III p. 323 additio synonymon

Chlorophytaceae A. Br. consp. 1958. Char. 1867 p. 5. quae jungunt pro  
cedenti specie formis intermediae teste ipso ex Characeae monographia.  
Add locum ad Genista aquatica L. subsp. halobia A. Nels. ut legit Sentius (Bosnia) &  
Equisetaceae D.C.

Vis. fl. dalm. I. p. 34.

Equisetum sylvaticum L. sp. pl. 1816. Hort. Koenig. 2 p. 624. Röbb. fl. exc.  
p. 156. Pautz. et al. pl. var. in Engor. p. 102.

E. varie fructifer. coactaneo, rami dense verticillatim armato - nutan-  
tibus tetragonis verticillatae ramosis, ramis tricuspidatis, vaginis conico - compa-  
nitatis sectionis finis, dentibus tubulatis.

Icon. Bod. fl. dalm. tab. 1812. In engl. bot. tab. 1814.

var. B. capillare Milde fl. aur. et atlant. p. 223: major, ramis recte potentibus. Pautz.  
ad. in flor. et faun. Hercegov. p. 10.

Syn. E. capillare Hoffm. fl. galat. evgpt. p. 3.

Hab. species in lacustribus sub monte Durmitor (Panicie), et var. in sylvestris circa  
pagum Lipovo (Panth.) in Montenegro. Ital. Perenne.

Ad Equisetum Dalmaticum Ehrh. var. breve Milde l.c. p. 219. Panth. l.c. p. 10:  
caule abbreviat. (1') angusti ramoso.

Hab. in sylvestris circa Vrsia in Bjelagora (Hercegovina), in irriguis sylvestribus Morenae  
sup. a Panicie (Montenegro) circa Dravnik et Srebrenik a Sentius (Bosnia)

B. var. comosum Milde l.c. Panth. l.c. p. 10.

caule elongato (2), inferne simplici modo, ramis superioribus recte potentibus.

Hab. in sylvestris vallis fluminis Tara infra montem Kom, circa Vraca Luk, et Slavnicki  
abi legit Panth (Montenegro).

Ad Equisetum arvense L. Vis. fl. dalm. I. p. 33. ad locum ~~ad~~ <sup>maglae ad</sup> Horvath ubi legit Sentius  
(Bosnia)

Ad Equisetum palustre L. Vis. fl. dalm. I. l.c. ad locum in palustribus Skopje (Montenegro)  
vagis in Bjelagora (Hercegovina) et in Vraca dol. infra montem Crna Planina Panth (Montenegro)  
Panth et ad Guzzinora Sentius (Bosnia).

Ad Equisetum elongatum W. in 183. fl. dalm. l.c. ad locum in humidijs (vira Cattaro) Dalmatia Panth.

6-1

*Equisetum hyemale* L. p. pl. p. 251. ~~Hast.~~ Pl. austri. 2 p. 885. Arch. Pl. ex. p. 158. Pan.  
et. pl. 60. p. 102.

*E. caudatus* paucinibus conformibus subimplicatis multicostatis, vaginis cylindricis  
adpresso, dentibus rotundatis obtusis, acuminis lanceolato-subulate membrana  
eo icto evanido terminatis, spica mucronata.

Strob. Son. engl. bot. Tab. 255. Ed. of 1619 in red ink written above  
Strob. in sylvestris prope Cervos Teylor sub monte Durnatoris in idem tempore prof. Panice  
(Monte Negro)

Lycopodiaceae DC.

Vis. & Latm. I p. 352

*Lycopodium selaginoides* L. pp. 1565. Horst K. aufr. 2. p. 681. Rehbe. II.  
186. p. 153.

*L. curvirostris*, varia pectoralis tibialis, foliis operarii lanceolatis spinis  
so dentata, spicis terminalibus 10-11 libris solitariae.

Syn. *Selaginella spinulosa* A. Braun ap. Dotterstein. f. p. 58. Pantl. I. c. p. 12  
Icon. Dillen. hist. mus. tab. 68. f. 1. Sturm figmata tab. 5. Hatt. Philos. t. 145. f. 1.

*Stab. in pratis circa Riffen, iuxta infra Mala Durmitor (Montenegro) Art. Perana.*

ad *Lycopodium denticulatum* L. *Vig. Dalm.* t. p. 35 adie *Syn. Selaginella helvetica*  
*Panzk.* l. c. p. 12 non *Spring.* Invenitum in rupestribus montis *Vernae* prope *Cattaro*  
*(Dalmatia)*. *Obs.* I. *helvetica* *Spring.* differt a *S. denticulata* (L.) *Pleure* laterali-  
*bis* carinatum obtusiusculis (nec longe acuminatis) intermediius duplo majoribus, et ramiis  
*apice* spiniferis rectis, insigne filidibus minutis laxo vestitus. — *Obs.* II. Ex hisce specie  
*bis* *Spring* condidit genus *Selaginella*, quod a *Lycopodiis* usq; dividit sporis &  
*formulis*, quarum aliae *porvae* (*Microporae*) in sporangia reniformia aut sphacelia  
*inclusae* (*Microsporangia*): aliae maiores (*Macroporae*) binatis tribus elevatis, in  
*vestitum* prominentem convergentibus, in sporangia 3-4ccm. *dehincusiles* (*Macrospor-  
*angia*) . In *Lycopodiis* usq; sporangia omnia sunt reniformia.*

Tiliaceae Sw.

Vis. fl. salm. - I p. 38

*Past Polypodia* Vis. 1. c. adde  
*Polypodium Phaeopteris* Lep. pl. p. 150. Hort. austriac. p. 173. Koch 1511 ff. germ. II p. 97 A  
*P. frontalis* evoluta Tonge a luminaria pubescensibus, pinus pilularis filii, infimis seclusis, pari usque pina  
nularum cum parte opposita in figuram quadrangularem conformatis.  
Den. Lovs fers br. a. exst. I. pl. XXI X. Monat. best. pl. 3. rect. XIV tab. 14. fig. 17.

Gen. Lovae feras brit. aucten. I pl. XXIX. Merit. hist. p. 3. sect. XIV tab. 3. fig. 17.  
Hab. a Tussintan super hiseljat ad Poeniga (Bosnia) sendtner. Ad P. iohannae  
Adicatus genus Notholæna R. Br. Im syn. P. Robertianum Hoffm. et var. m. Plas-  
 sich s. Satyrus (Bosnia) sendtner. foliolata

Prodr. fl. nov-hollandiae, p. 1.

*N. frondosus* bipinnatifid, pinnules linear-oblanceolate, subacute, petioles introrachis dense short, stipitate, <sup>hirsute.</sup> *palauensis*



var. *y. synaplochia*: clado, pinnulis oblongo-ovatis pinnatipedij aut pinnatis  
tatis, lobis ovatis dentatis.

Syn. *Polyodium cajupitolum* Hoffm. deutsch. fl. II. p. 9. *Cystopteris fragilis* Bernh.  
*B. pinnata-partita* 2. *cyanopolia* Koch t. c. *C. fragilis* var. *cyanopolia* Milde sp.  
ren. pf. p. 68. *Panth.* I. c. p. 12

Hab. in sylvestris montis Eliva prope Trebinje (Hercegov.) Jul. Perenn.

Ad *Asplenium Ruta muraria* L. Vis. fl. dum I. p. 40 adde

var. *B. Matthiolae*: *Heuffl.* Aspl. sp. eur. p. 325-36. *Panth.* I. c. p. 11: pinnulis breviter  
petiolatato-cuneatis, antice latevolundatis integerrimis venuleatis.

Syn. *B. Matthiolae* Gaspar. notiz. d. Lucan. p. 2.

Icon. Matth. diss. in Diosc. p. 105. Tabern. ic. pl. p. 296.

Hab. in rupestribus circa Biće (MN) Jul. Perenn.

var. *y. zolicense*: *Heuffl.* t. c. p. 335 et 338. *Panth.* t. c. p. 11: elatum, pinnulis basi  
in longum petiolatum cuneatis, antice truncatis.

Syn. *B. Zoliensis* Kit.

Hab. in rupestribus circa Trebinje (Hercegov.). Jul. Perenn.

Obs. Collatum cum specimine originali hitaietianae, nunc in Museo Pestinensi.

Ad *Asplenium Adiantum-nigrum* L. Vis. fl. dum I. p. 41. var. *B. acutum* substitue Syn. A.

*Onopteris* L. sp. fl. ed. I. p. 1081, et confer *Heuffl.* t. c. p. 300.

Adatur *Asplenium septentrionale* Sw. syn. fl. p. 25. Koch syn. fl. germ. II. p. 983.

Obs. frondibus longe stipitatis, foliis 2-4 petiolatatis linearibus basi integerrimis,  
marginae dentibus 1-2 linearibus, iugis inaequalibus inciso-tridentatis.

Syn. *Aerostichum septentrionale* L. sp. fl. p. 1524

Icon. Sm. engl. bot. 1017. Sturm. deutsch. fl. II. p. 2-4. Lowe fern. brit. a. exot. V. pl. III-A.

Hab. circa Ebendash et Varesch ubi locum a Sentmar (Bainia)

*Asplenium Filix-femina* Bernh. in Schrad. journ. V. p. 2. Koch syn. fl. germ. II. p. 982.

Obs. frondibus elliptico-oblongis, basi angustioribus, squamatis, pinnis angustis lanceolatis pinnae  
septentrionaliter fimbriato-lacivis.

Syn. *Alayrum filix-femina* Roth Panz. et al. p. 101. *Asplenium filix-femina* Sw. Best. fl. austriaca p. 615

Icon. Lowe fern. a. v. pl. XXIX. Phil. phys. tab. 180. p. 4. Alors. hist. ph. sect. XIV. tab. 3. fig. 8 -

Hab. in sylvestris montis Durmitor et Sutoroman, in dicatum a prof. *Panicic* (MN). Jul. Per.

Post *Asplenium officinale* Willd. fl. Ed. 1. p. 90. in raro genere

*Blachnium* L.

Gen. fl. II. p. 1115.

Char. Son. luceas rectilongis, costis pinnarum parallelo continuo. Indusium membranaceum  
et diplopteris exortum continuum, interius dehiscent. Cl. Cryptogamia. Ord. Pterid. Syst. Lycopodiaceae

Pl. spicant Roth tent. III. p. 14.

Bl. frondibus oblongo-lanceolatis pinnati-partitis, fructiferis subcylindricis longioribus,  
pinnae integerrimis, sternitum lanceolato-linearibus approximatis, peritiliis linearibus  
remotalemente, omnino inferius minimis -

ad 1.

- 2/ 7/ 1. *Ornithogalum umbellatum* L. sp. p. 1522. *Blechnum boreale* Host fl. austriac. p. 680 11-12  
Icon. Ver. fl. dan. t. 17 fig. 99. *Hedera helix* L. Clas. Hist. plant. cc. VIII.  
Hab. in sylvestris ad Tounigge, et *Traenik* locum ad *Sandtner* (Bosnia)  
Ad *Cheilanthes odorata* Sw. corrigi synonymos *Adeanthi fragrantissimae* in *Vivian* et ad.  
de syn. Ch. fragrans Hook. Panth. ad. p. 10 et habitationem circa Trattinge (Herzegow.)  
Ad *Cespedaria persica* Vip. ad locum in roquistibus circa Veljine et *Pridvorice* (Herzegow.)  
Panth. t. c. p. 11  
Ad *Botrychium lunaria* L. var. *Panth.* t. c. p. 12 ad locum in pratis montis Male Durmitor,  
*Hungarina Planina*, et *Kom.*, et teste *Panic* in summo pago montis Durmitor.  
Ad *Ophioglossum vulgatum* L. *Vis.* Herbar. t. p. 43 ad locum ex *Sandtner* ad *Borovica*  
prope *Satynska* (Bosnia)

### Graminae L.

- Ad *Holcus avenaceus* L. sp. p. 366. suppl. p. 13 *Sandtner*  
Ad *Holcus latifolius* L. *Vis.* fl. dalm. t. p. 48 ad locum in graminosis circa *Piper*  
*Burone* (MN) *Panth.* ad. p. 16. et *Thaus* *Tellach* prope *Traenik* (Bosnia) *Sandtner*  
Ad *Leontopodium lepidum* Pers. *Vis.* fl. dalm. t. p. 49 ad locum in graminosis montis  
• *Gliox* prope *Trebinje* et circa *Grancarevo* in *Bjelovara* (Herzegow.) et circa  
*Danilov Grad* et *Manastir Duga* (MN) *Panth.* t. c. p. 18. et in saxonis sub *Lugon* *Pant.*  
Ad *Andropogon Ischaemum* L. *Vis.* fl. dalm. t. p. 50 ad locum in apriis *Zajina*  
• *Dol* prope *Grajkovac* in *Bjelovara* (Herzegow.), et ad *Q. vulgaris* *Vis.* t. c. t. p. 51  
(non *Cit.*) in graminosis ad pedem montis *Vermic* prope *Lattaro* (Dalm.) *Panth.* ad. p. 18.  
Ad *Saccharum strictum* Spz. *Vis.* t. c. t. p. 52 ad locum in graminosis circa *Lagarac* et *Alastinovice* (MN). *E. strictus*  
Panth. t. c. p. 18. et locum in graminosis circa *Lagarac* et *Alastinovice* (MN). *E. strictus*  
Ad *Lagurus ovatus* L. *Vis.* fl. dalm. t. p. 53 ad locum *Gracova* (Dalm.) *Panth.* t. c. p. 18. et in  
asperis ad *Bojnice* dist. *Brnicicae* (MN) *Pani*. t. c. p. 96.  
Ad *Polypogon monspeliensis* Desf. *Vis.* t. c. suppl. p. 16 ad locum *Callan* (Dalm.) *Panth.* t. c. p. 17  
Ad *Ligularia Dactylon* Scop. *Vis.* t. c. t. p. 54. ad locum *Cynodon Dactylon* Pers. *Panth.* t. c. et locum  
circa *Trebinje* (Herzeg.) et *Pani* in campis ad *Cetinje* (MN) et pl. p. 96.  
Ad *Lappajinem racemosum* W. *Vis.* t. c. t. p. 55. ad locum in arvensis circa *Rieka* (MN)  
*Panth.* t. c. p. 18. et syn. *Pragia racemosa* Desf. *Pani*. t. c. p. 96. et locum in cultuis asperis ad *Callin*, *Svihava* (MN)  
Ad *Calamagrostis* <sup>not. Hert.</sup> *Vis.* fl. dalm. t. p. 55 ad locum *Suza* supra *Borovljaka* et prope *Livno* (Bosnia)  
*Sandtner*, et in *Bjela Gora* et sub *Cavena* *Stijena* montis Durmitor (MN) *Pani*. t. c. p. 97.  
Ad *Calamagrostis Epigejos* Roth. *Vis.* fl. dalm. t. p. 55 ad locum *Cetinje* et in vallis *Zetae* (MN) *Pani*. t. c.  
Post inventum *Calamagrostis* *sylvestris* L. *Vis.* fl. p. 253. *Panth.* t. c. p. 17. *Pani*. t. c.  
C. perenne foliis valvis acuminatis, pilis glandulis trichotrichis, aristulis spinulatis velutino vegetata.  
Syn. *Cyperus* Host p. 110. t. p. 228 sub t. p. 16. *Polygonum arundinaceum* L. sp. p. 9. *Arundo* *gigantea* Schreb.  
Gen. *Ribes* L. t. p. 146. *Host* p. 110. t. p. 228.  
Hab. in pratis sylvaticis non montis Durmitor. Sub. *Pecuna*.

18-18-14

Ad Agrostides vis. fl. dalm. t.p. 59 addatur

Agrostis vulgaris Willd. arrang. p. 62. Host fl. austri. t.p. 101. Rchb. ff. ex. p. 25. Pantk. adh. p. 16.

A. panicula oblongo-ovata, dein patentissima, ramis divaricatis scabriusculis, foliis annulis linearibus planis, ligula brevi truncata.

Ikon. Host icon. grm. austri. IV tab. 56. Rchb. ic. bot. XI tab. 34 f. 1127.

Hab. in pristivaria Danilev grad, in Vriva Det. infra Cina Planina, circa Kocice (M.N.)

Hab. P. Perenn. Pantk.

Var. a. stolonifera: Lam. ssp. stolonibus longis serpentibus. Syn. R. ciliata L. t. St. Tonifera L.

Ad. p. 93. Host fl. austri. t.p. 100. Rchb. ff. ex. p. 25. Ikon. Host grm. austri. V tab. 56. Rchb. ic. bot. XI tab. 34 f. 1128. Fig. 1128. Hab. in parvus sub monte Durmitor. Panč. et pl. vesc. p. 96.

Var. b. aristata: Fls. in Pantk. t.p. 17 glumella inferioris supra medianae aristata - Hab. circa Danilev grad.

Var. c. nemoralis: Le mont. pl. p. 31. Pantk. t.c. minor (ramulis) instigatae corrigidae, stylis persistentibus. - Ikon. Reichb. 16. bot. XI tab. XXXIV f. 1125. Hab. in pratis Vriva Det. supra monte Crna Planina, et in parvis monte Male Durmitor. (M.N.) Pantk. P. Perenn.

Var. d. coarctata Hofm. t.p. 37. panicula pallida coarctata, ramulis pubescensibus, glumellis subaristatis. Ikon. Rchb. ic. bot. XI tab. XXXV fig. 1131. - Hab. in campis ad Grohovo et supra Vriva dicta Crna Planina. Panč. t.c.

Var. E. marginata Lam. t.p. 38. panicula compita, foliis longitinctis, glumella superiori non aristata. - Ikon. Reichb. 16. bot. XI tab. XXXVI f. 1132. - Hab. in pratis Vriva Det. non aristata. - Ikon. Reichb. 16. bot. XI tab. XXXVII f. 1133. - Hab. in pratis Vriva Det. non aristata.

Ad Agrostis vis. alpinis Rchb. ic. bot. XI tab. 49. - Rchb. ff. ex. p. 25. Pantk. t.c. p. 17 Reichb. - ic. bot. XI tab. XXXIII f. 1123.

Agrostis rupestris All. fl. ped. 2. p. 237. Rchb. ff. ex. p. 25. Pantk. t.c. p. 17

A. panicula nonis laevius, glumis subaequalibus lanceolatis emarginatis, carina subapicalis, glumella unica apice dentatula, infra medium aristata, foliis radicalibus convexo-acute rotundis, ligula oblonga.

Ikon. Host grm. austri. III tab. 49 (per err. A. alpina Host non alior.) Rchb. ic. bot. XI. tab. XXXIII f. 1123.

Hab. in pratis alpinis Bjela Carine prope Korn et in hoc monte. (M.N.) Pantk.

Agrostis Spica venti L. t.p. 92. Host fl. austri. t.p. 92.

A. panicula effusa, gluma inferioris minore, aristis glumellam ter quaternam superante, anthers linearie oblongis.

Syn. Palea Beauvoisii agrostis p. 31. Rchb. ff. ex. p. 25. Pantk. adh. p. 17

Ikon. Host icon. grm. austri. III tab. 48. Rchb. ic. bot. XI tab. XXXII fig. 1121.

Hab. in gressinorum circa Piperi (M.N.) circa Trašnik (Bosnia) Sestrn. P. Perenn. Pantk.

Ad Milium lenticigeraum L. Vis. t.p. 57. ade loca haec species variet spiculis matutis in Dalmatia festu. Tunc non videtur. - Ad Milium effusum L. Vis. fl. dum. t.p. 58 Pantk. t.c. p. 17 addatur locis in tyrrhenicis montibus Crna Planina ad ocellia Favore dicta (M.N.) Pantk. H. P. Perenn.

Ad Milium paradoxum L. Vis. t.c. Pantk. t.c. ade locum in raxori circa Skodjezn in Bjela Gorra (Herzeg.)

Ad Stipa Aristellum L. Vis. t.c. p. 59 ade synonymum Aristella bromoides Bertol. Pantk. adh. p. 17 et locum in lapidarij circa Burone (M.N.), nec non Panč. et pl. p. 98.

Host addatur

Leersia Soland.

ap. Sw. fl. ind. occ. I. p. 132

Char. spiculae uniflorae. Glumellea bivalvis, valvis compresso-carinatis, nuncius, inferiore nudo latissime. Stigmata plenaria a spicula lateraliter egrediente. Laxyopsis inclusa. Cl. Triandria Ord. Lymnaeales

Leersia oryzoides Sw. t.c. in not. Host. fl. austri. t.p. 69. Rchb. ff. ex. p. 33. Panč. et pl. vesc. p. 96.

L. panicula patente, ramis flexuosis, spiculis triangularibus.

Syn. Phalaris oryzoides L. t.p. 81. Asperula oryzoides Lam. ill. p. 167.

Ikon. Nees ab Genua genit. fasc. 31. n. 2. Host. icon. grm. austri. I. tab. 35. Rchb. fl. grm. tab. 22. Rchb. ic. bot. XI tab. 18. f. 11495.

Hab. in solijs ad Vir (M.N.) Panč. P. Perenn. Non vidi.

Ad Setarium Ris. fl. dum. I. p. 61 addit. Setariae glauca Beauvois var. p. longicula major  
 spica spathacea, setis floribus ter quatuor superantibus - Hab. iuxta Lettinge (M.N.) ubi legit  
 prof. Ad. Stöppelk.

Ad Setarium viride Beauvois fl. dum. I. p. 61 addit. locum Lettinge (M.N.) Panth. I. c. p. 18, et iuxto in loco etiam vallis  
 Zetae vel Daniles f. sp. (M.N.) Panth. I. c. p. 95.

Ad Setarium verticillatum Beauvois fl. dum. I. p. 61, ade locum in cultu Lettinge, Rijeka, Grado. Panth. (M.N.)

Ad Phalarides Ris. fl. dum. I. p. 61 addit. III. p. 337 pro Ph. paradoxus L. subtotius var.  
Ph. Sibthorpii Ris. spicif. f. sum. p. 467-8, cult. econitibus, et exil. syn. Lin. et iconibus  
 Pluker. et Mots. et Leichtwag. non L. f. dec. II tab. 33 ad Setaria referuntur, p. 493 tab. 11.  
 que omnia Ph. paradoxum L. legitimam referuntur. Differt hanc a Ph. Sibthorpii Ris.  
 panicula ~~foliis~~ spathiformi ~~foliis~~ involucro multibasale exerta  
 perticulis ~~spiculis~~ ~~in~~ ~~latis~~ perticibus sterilibus mixtis, nec sole fastigiata  
 rictore panicula abortivis, glomeris valvis acutis ut baristatis, dentate urinatis ovato-obtusis, glu-  
 mella valvis binis acutioribus ovatis obtusiusculis - Ad diagnosis plantae Linaceae  
 pertinent icones Plukeretii almag. tab. 33 f. 5, et Morisoni hist. pl. III sect. 8 tab. 3 f. 6, nec  
 non L. f. dec. II tab. 18, et Schreb. beschr. d. grise. p. 93 tab. XII.

Ad Baldingeram arundinaceam Gaertn. Ris. fl. dum. III. p. 338 adde syn. Phalaris if  
arundinacea L. Panth. et cyl. var. p. 95 et locum in laurocibus ad Siriaci.  
 Post hanc inviro genus

### Hierochloa Gmel.

Char. Gluma bivalv. <sup>fl. subtr. t. 101</sup> 3-floris. Flores duo inferiores manulo triandri, glumella <sup>super-</sup>  
 viore bivaricata; superior 3-andri glumella superiora unicarinata. Glumella tr-  
 velis. Stigma plumbosa ex apice stylis exorientia - Class. Gramidia. Ord. Digrasse Ris.  
Hierochloa austriaca Poem. et Schult. II. p. 514. Rehbf. fl. exc. p. 53.  
 H. panicula bivaricata subsecunda, pedicellis <sup>2-3</sup> spiculatis spiculata non brim pelvis, flore  
 hemiphrodito nutrio, manulo inferiore infra apicem brevissime aristato, exstata recta,  
 manulo superiore e domi media aristata geniculata extenuata, radice repte.

Syn. Holcus odoratus Host. fl. austri. I. p. 122 non L.

Icon. Host. grm. austri. I. tab. 4. Rehbf. fl. bot. II. tab. VIII. p. 1627 (Hierochloa)

Hab. ad Planicu super Bakkaris (Herzeg.) Sebestner.

Ad Phleum L. Ris. fl. dum. I. p. 62. III. p. 338 Suppl. p. 16 adde sequentia

Ad Ph. portense Ris. fl. dum. I. p. 63 adde locum Ribje Jezero, ad pedem montis Durnitov  
 et var. B. nodosum ~~L.~~ ~~Spach~~ Saed. fl. helv. I. p. 164-5: humilis, culmo supra radem bulb.  
 se-inverso - Syn. Ph. nodosum L. p. 11. p. 88. Ph. buttonum Host fl. austri. I. p. 81. Ph. Bertol-  
ini Ris. fl. dum. I. p. 63. - Icon. Host. grm. austri. IV. tab. 21. Sm. engl. bot. (ed. nov) tab. 1702.

Leers fl. herbar. fig. 2. - Hab. in humido civia Skodrigon in Bjelago (Herzeg) et circa  
 Lettinge (M.N.) Panth. - Sel. Perenn.

Ad Phl. echinatum Host. Vis. l.c. adde locum circa Erzvora (Dalmat), Trebinje, in valle Zakhlae prope vicina in Bjelagora, et circa Bilekki (Herceg), in campis aveniorum ad Grahovo (MN) Paní.  
Ad Phl. alpinum L. Vis. l.c. adde locum in parvis alpiniis circa vicia Lavorje in monte Crna Planina et in monte Korn (MN) Paní, in parvis in Durmitor iuglo Sjeme (MN) Paní; et in Mali Lazdich (Bosnia) Sondner. Post adda

Phleum Micheli Allion. fl. p. 233. Host fl. austri. I. p. 83. Rehb. fl. exc. p. 32.

Phl. panicula speciforme cylindrica, glumis lanceolatis breviter in apicem acuminate, dorso hispido-ciliatis, radice culmis fertilibus fasciulisque sterorum & sterilibus caputatis. <sup>Phl. Hosti. Host. fl. austri. I. p. 83. Rehb. fl. exc. p. 32.</sup>  
Syn. Chilochloa Micheli Rehb. II. bot. XI. pag. 19. Phalaris alpina Host. II. gram. II. p. 26  
Icon. Rehb. l.c. XI. tab. 1. f. 1489. Host. II. gram. II. tab. 35. Vair nuovo giorno VI. tab. 1. f. 7  
var. p. subinervatum Gris. in Panth. adn. p. 17: panicula breviter ovato-acute cylindrica oblonga (1") longa.

Hab. in raro*sylvestribus* sub monte Durmitor vasis jugum Stalac. (MN) Paní et gl. p. 96: var. in parvis montis Mali Durmitor (MN) Panth. l.c.

Phleum Boissieri Wibel prim. fl. verth. p. 125. (1799)

Phl. panicula speciforme cylindrica, glumis linearis-oblongis oblique truncatis submucronatis compressis dorso hispido-ciliatis subrufae, radice culmis fertilibus fasciulisque foliis sternilibus caputatis.

Syn. Phl. phaloides Koch. gram. p. 52 (1802) Phalaris phleoides L. sp. pl. p. 80. Chilochloa Beauvois. <sup>Rehb. l.c. pag. 19.</sup>  
Icon. Im. engl. bot. tab. 659. Cled. fl. dan. tab. 531. Host. II. gram. II. tab. 34. Rehb. II. bot. XI. tab. 1. f. 1488.

Hab. in vineis ad Klapot dist. Bratnožice, ubi indicator a Paní. et pt. ver. p. 96. Lat. Perenn.

Ad Alopecurus L. Vis. l.c. addeatur

Alopecurus pratensis L. sp. pl. p. 88. Host fl. austri. I. p. 88. Rehb. fl. exc. p. 31. Panth. l.c. p. 96

et panicula speciforme cylindrica obtusa, glumae valvis infra medium conicatis acute villoso-ciliatis, culmo recto. <sup>recto.</sup>  
Icon. Host. gram. austri. II. tab. 31. Rehb. <sup>fl. austri. bot. XI. tab. XXIX. f. 1489. Im. engl. bot. tab. 759. Schreb. berch. d. gr. tab. 19. fe.</sup>  
Hab. in pratis circa Kovice ad pedem m. Mali Durmitor Panth. et in pratis ad lacum Sodraum (MN) et in monte Krasich sopra Bakar (Bosnia) Sondner.

Alopecurus pratulus Pers. Vis. l.c. p. 65. Adde locum ad littora maris circa Erzvora (Dalmat), ad rivulum Suica prope Danilov Grad (MN), in herbis circa Trebinje (Herceg) Panth. et in palustribus sub m. Durmitor (MN) Paní.

Alopecurus Gerardi Vill. hist. des. pt. de Dauph. II. p. 66. Panth. l.c. p. 97.

et panicula speciforme ovato-subtunda, glumis lateris aristatis villosis, vaginis foliorum superioribus ventricosis, culmo recto.

Syn. Phleum Gerardi Allion. <sup>Host. fl. austri. I. p. 65. Paní. et pt. p. 96.</sup> Coloboclema Gerardi L. host. herb. I. p. 74. Rehb. fl. exc. p. 31.

Icon. Targ. II. var. II. tab. 301. Rehb. II. bot. XI. tab. 6. fig. 1482.

Hab. in pratis alpiniis montis Korn et Mali Durmitor (MN) Panth. et in raxens Mričevac Do sub monte Korn Paní.

var. p. aristata Lis. in Pantk. l.c. p. 17: glumella inferiore infra medium aristata.  
var. p. pumila Pantk. ex Pantk. l.c.: minor, stylis persistentibus.

Hab. var. 3. in graminosij circa Danilev Građ., et var. 1. in pratis Vivisa Dol  
infra montem Crna Planina, et in pasuis montis Alati Furmilor. Jul. Perann.

Ad Agrostidem alpinam Lis. fl. dalm. suppl. p. 15 dect. cit. Host gram. austri. III tab. 49 (per  
err. C. rapensis) Reicht. ic. germ. XI f. 1423, et substituatur.

A. rupestris All. fl. ped. II p. 237. Rchb. fl. exc. p. 25. Pantk. l.c. p. 17.

A. paniculae rami laevibus, glumis non equalibus lanceolatis mucronatis carina  
stabis, glumello unica apice dentatula, infra medium aristata, foliis radiculis  
bus involuto-setaceis, ligula oblonga.

Icon. Host gram. austri. III tab. 49. (per err. A. alpina Host non alior.) Rchb. ic.  
germ. XI fig. 1423.

Hab. in paucis alpinijs Bjelo Garinji prope et in monte Kom. Jul. Perann.

Agrostis Spica venti L. sp. fl. I. p. 92. Host fl. austri. I. p. 96.

A. panicula effusa gluma inferiore minore, arista glumellam ter quatuor  
superante anterij linear - oblongis.

Syn. Apina Spica venti Rchb. fl. exc. p. 25. Palis-Beauv. agrost. p. 31. Pantk. l.c. p. 17.

Icon. Host ion. gram. austri. III tab. 48. Rchb. ic. germ. XI. tab. XXXII fig. 1421.

Hab. in graminosij circa Pijeri (Montenegro). Jul. Perann. (siciv. Pravnik Božija Savam)

Ad Milius e fusum L. Lis. fl. dalm. I p. 38 Pantk. l.c. p. 17. addatur locus in Tyberiticis  
montis Crna Planina ad oritur Savore dicta (Montenegro) Indicatur a Sentner

Ad Stipium paradoxum Nis. l.c. Pantk. l.c. adde locum circa Skodje in Blagojora  
(Ad M. Wojcikow Stipium paradoxum in Dalmatia ex Zizani p. 165, et Stipium paradoxum Stipium paradoxum (Ad Stipium urstellum L. Lis. l.c. p. 39. adde Syn. Uristella bromoides Bartol. Pantk. p. 17)

et locum in lapidosis circa Burone (Montenegro). Jul. Perann.

Ad Setariae viridem Beauv. adde locum Cettinje (Montenegro) et Kulinje (Hercegovina)  
Pantk. l.c. Jul. Annua. Ad Setariae glauca Beauv. adde var. 3. longistram:  
major, spica spathacea, setis florullos ter quatuor superantibus. Hab. circa  
Cettinje (Montenegro) ubi legit prof. Ad. Stojich.

Ad Phalaris Lis. fl. dalm. III. tab. 33. multa Ph. paradoxum in Ph. Lithophyli Lis. sp. fl.  
rum. p. 468 sed diagnosis nostram serva. ex. syn. Phalaris lithophylloides bus.  
cf. diagnosis Linnaei et icones Pluken. alm. tab. 33 fig. 5 et Moris. hist. pl. III  
sect. 8 tab. 3 fig. 6. a L. ciliata, et L. lit. dec. II. tab. 18. p. 35, et Schreber. beschr.  
d. græs. p. 93. tab. XII. Differt a Ph. paradoxum L. panicula oblonga, nec obvorta, seu basi at.  
tenuata, dum in illa basi levior dum cylindrica, floretis inferioribus ad callositates  
microscopicas, iuxta Lis. reductis, spiculis omnibus fertilibus sterilibusque  
mixtis

- Ad *Phleum pratense* L. Vis. fl. dalm. t. p. 63 adde locum *Ribje Jezero* ad pedem montis Durmitor, et adde var. *B. nodorum* Gaud. fl. helv. t. p. 164. *Panth.* *hirsutissimum* est. *var. supra radicem bulboso-incrassato* - syn. *Phl. nodosum* L. sp. pl. p. 88. *P. bulbosum* Host fl. austri. I. p. 81. *P. Bertolonii* DC. Vis. fl. dalm. t. p. 63. *Icon.* Host grana austri. IV. tab. 21. *Sm. engl. bot. ed. nov. tab. 1702.* Leers fl. herbarum f. 2. — Hab. in humido circa Skojevo in Bjelajica et circa Bileki (Hercegovina) et circa Cetinje (Montenegro).
- Ad *Phleum echinatum* Host. Vis. t. c. T. p. 64. adde locum circa Gravosa (Dalmatia), Trebinje, in valle Zaslop prope Vraca in Bjelajica et circa Bileki (Hercegovina).
- Ad *Phleum alpinum* L. Vis. fl. dalm. III. p. 338. adde locum in pasuis alpinis circa ovilia Savovice in monte Crna Planina et in monte Korn (Montenegro).
- Phleis* addatur *Phleum Michelii* All. fl. ped. II. p. 233. Host fl. austri. I. p. 83. Rchb. fl. ex. p. 32. *Phl. panicula* spiciformi cylindracea, glumis lanceolatis breviter in aristam attenuatis, dorso hispido-iliatis, culmis fertilibus fasciculisque foliorum cespitosis.
- Syn. *Chlorochloa Michelii* Rchb. ic. germ. XI. p. 19. *Phl. Michelii* Savii nov. giorn. di lett. ital. IV. p. 230. *Phalaris alpina* Host ic. gron. II. p. 26.
- Ikon. Rchb. t. c. XI. tab. 151. fig. 1489. Host t. c. tab. 35. Savii t. c. tab. I. f. 7. *var. B. incrassatum* Gris. in *Panth.* adm. p. 18: *panicula* breviter ovato-aut cylindrica-oblonga (longa)
- Hab. varietas in pasuis montis Mali Durmitor (Montenegro). Jul.-Pereun.
- Ad *Alopecurus utriculatus* Pers. Vis. fl. dalm. t. p. 65 adde locum ad litora maris circa Gravosa (Dalmatia), ad rivulum Suvica prope Danilov Grad (Montenegro), in herbido circa Trebinje (Hercegovina). *Panth.* t. c. p. 17. *Phl. Bohemicus* Web. in part. a Tzur. addit. pro *Vaginella* *varia* *gracilis* (Bohemia)
- Alopecurus pratensis* L. fl. p. 88. Host fl. austri. I. p. 78. Rchb. fl. ex. p. 31. *Panth.* t. c. p. 19. *A. panicula* spiciformi cylindrica obtusa, glumes velutis infra medium connatis acutis, villoso-iliatis, culmo recto.
- Ikon. Host gron. austri. II. tab. 35. Rchb. ic. germ. & tab. 49 fig. 1489. *Sm. engl. bot. I. 259* Schreb. descr. & grans. tab. 19. f. c.
- Hab. in pratis circa Kovice ad pedem montis Mali Durmitor (Montenegro). Jul.-Pereun.
- Alopecurus Sevardi* Willd. hist. des. pl. da Dauph. II. p. 66. *Panth.* t. c. p. 18.
- A. panicula* spiciformi ovato-subrotunda, glumis liberis aristatis villosis, vaginis foliorum superioribus ventricosis culmo recto.
- Syn. *Phleum Sevardi* All. fl. ped. 2. p. 66. *Colobachne Sevardi* LK. h. berol. 1. p. 76. Rchb. fl. ex. p. 31.
- Ikon. *Ag. sc. r. v. II. tab. 301.*
- Hab. in pratis alpinis montis Korn et Mali Durmitor (Montenegro). Jul.-Pereun.
- Addatur *A. fulvus* Sm. indicatus a Sandrevo circa Oussino nera Kicegak, Duria, monte Podolovo prope Parchin, Konak (Bosnia); *mont. Varisch*, et supra Bakari (600), et *A. geniculatus* Pers. in palustribus sub monte Durmitor juxta Panici (Bosnia).
- Indicus etiam Hierostolus austrius *poen* et Sch. p. 46. *Lepturus* in m. Vojnich supra Balkan indicatus (Bosnia).

13 Alopecurus geniculatus L. sppl. p. 89. Host fl. austri. I. p. 78. Rell. & ex. p. 81. Pani. cl. pl. var. p. 96.  
 A. culmo basi prostrato, dein adscendente, glabro panicula spiciformi cylindrica, spiculis ovoide-oblanceolatis, glumis obtusis villosatis, tan. 1/2 lata connatis, ~~litteris~~ <sup>anis</sup> tincta medium aristatae,  
~~spiculis~~ ~~litteris~~ ~~litteris~~  
 Leon. Leers fl. herbar. tab. 2. fig. 7) <sup>sec. 7)</sup> Forst. anglo-bot. tab. 1250. Rell. & ex. bot. XI tab. xix fig. 1421  
 Hab. in palustribus sub monte Turnator (MN) a Pani. indicatum  
 Alopecurus nigricans Horn. hort. hafn. I. p. 68. Rell. fl. ex. p. 31.  
~~strobilis~~ <sup>receptaculus</sup> ligulo nigra extensa,  
 L. culmo exserto panicula spiciformi cylindrica, ramis paniculae multifloris, glumis acutis infra medium  
 connatis villoso-villosatis

Syn. *A. nigrescens* Tay. fit ed. gram. II. p. 17. *C. pratensis* Schub. beschr. d. grases. p. 133.

Icon. laev. b.c. tab. 13. Schwab. 1.c. tab. 19.f.b (forma ventricosa)

Hab - in monte Vlachic ad Baklavie et in Mali Sandic (Barania) Sentner.

*Alopecurus falvus* Sm. engl. bot. p. 21 Rehbe fl. exs. p. 30.

*R. culmo adscendente, paniceo spiciforme cylindrica, spiculis ellipticis, glomeris <sup>34</sup> basi connatis, glomeris <sup>2</sup> que medio aristata apice ciliatis, anteroris aurantius.*

*Syn. A. geniculatus* Host. ic. gramm. austri. II. p. 24 ~~non~~ <sup>ne</sup> alior. ~~inf. bet. sub-1416~~

Icon. Host. 1. c tab. 32. Sm. engl. bot. tab. 1567. Rchb. Jc. bot. xi tab. XLIX f. 1426

441 (Gymnus major Kielick) m. Podlewo, (Bawin) Sandnes

Hab. ab Cunno supra Kielce Luria Konak (Bohemia) sent. nov.  
Trix Atopocinus criticus a Richb. istiusque Detinuntur inde dictis, quibus estidem adhuc invitas.

*Ed. Melicocca uniflora* (L.) Vis. f. *dalmatica* (L.) f. *lobata* Cocum montis *glauca* prope

valle Radius Bruto prope Vulca in Bjelagovo (Herzeg), et ad Pliek (M.N.) Panth. l.c. p. 15. in humectis volvi  
Turunae M.N. Pančić, et Travnik ad Bukoville, ad Baklan, ad Cecvija (Bosnia) Sentner.  
 Ad Melicam ciliatum L. Vis. fl. dalm. t.p. 67 addit in diagnos: inferioris vulva exteriore glumellae  
 versus marginem tota barbata, dorso scabra; et laevum in glumulis lateri inter Pocanjo et Stolac  
 prope Cattaro in Dalmatia. — var. B. Magnoliae Eris. in Panth. adn. p. 15: Vaginis scabris, glandulae  
laxa. Lyn. M. Magnoliae Gordet et Gren. fl. de France III. p. 350. — Hab. in savoir Brava skala dictis  
valley Perećica upre monten horn (M.N.) — var. v. nebrodensis Eris. l.c. p. 15: foliis convolutis —  
 — stictis virginisque striatis — Lyn. M. nebrodensis Parlat. fl. palerm. t.p. 20. Guzzon. Lyn. fl. iii. 2. p.  
 886. — Hab. in graminosis montis Glen prope Trebinijs (Herzeg) et circa jagum Kočevje (M.N.) — var. v. Bourgani: Eris. in Panth. adn. l.c. vaginis inferioribus dense villoro-pilosis — Hab. in graminosis montis  
Vernai prope Cattaro in Dalmatia — Obs. Hace recedit a M. Cupani Erys. K. II. p. 20. propt. Suppl. t.p. 14 glumella  
exteriora tote pilosa. — Inter haec varietates a Panth. lolas sola var. l. constanter distinguari potest. M.  
ciliata reservat quoque a Travnik ad Vlasich, ad Suzja prope Bosovagleva et civita Lione (Bosnia) Sentner  
 nec non in regiobustis ad Cettinje et in monte Zavich (M.N.) Pančić.

*Ad* *Airam caryophyllea* *S. capillaris* *H.* *St. John*, p. 68. *adde syn.* *A. elegantis* *Wierzb.* cat. 1821. *Pantk.* adn. p. 16  
et locum in germinis ex circa d'andrea frid. (RCN), *Kraenik*, (Boemia) *Schenk*.

- 20<sup>28</sup>
- Ad Avenam medium L. Viss. Palm. I. p. 67 adde 170. Deschampsia juncea Beauv. A. ~~juncea~~ Vill. pl. no 2  
 Dauph. 2. p. 86 ~~Viss. et locum~~ et locum supra Borovaglava, et a Cicer ad Luso (Bosnia) ~~scindens~~.
- Ad Avenam capitoam L. Viss. Palm. I. p. 339 adde 170. Deschampsia capitoam Beauv. Pantk.  
 1. 1. p. 16 et locum in graminis Peruviana Dol infra Kom (M.N.). Addatur  
 Avena flexuosa L. sp. p. 96. Host. Fl. austri. I. p. 15. Richb. fl. exc. p. 50. Pan. cl. gl. var. p. 98.  
 A. panicula patent<sup>nudata</sup> rami flexuosi, floribus glumae inaequali vix longioribus basi aristatis, foliis levatis filiformibus, ligule truncata.
- Syn. Richb. ic. bot. ix. tab. xciv fig. 1698-1699. Host. ic. gram. 2. tab. 43. Leers fl. herb. tab. 5. f. 1.  
Hab. in spongiis sub monte Durmitor (M.N.) Pan. et ad Trnjeva (Bosnia) ~~scindens~~.
- Avena alpestris Host fl. austri. I. p. 123. Richb. fl. exc. p. 51. Pantk. ad. p. 16.  
 A. panicula erecta aquoli diffusa rami tri-quinquefloris, spiculis trifloris, glumae valva superio  
 ve trinervi levigatae, ovario apice pubescentes, summae folio interiore setaceo-breviglatae,  
~~et~~ ~~pubescens~~ foliis plenis vaginisque pilosis, geniculis glabris
- Syn. Richb. ic. bot. x. tab. 102 fig. 1704-5. Host. gram. austri. III tab. 39.  
Hab. in pratis circa Riblje Jezero, et circa pegum Kovice ad pedem m. Mali Durmitor (M.N.) Jul. Per.  
 Avena flavescens L. sp. p. 118. Host. fl. austri. I. p. 125. Richb. fl. exc. p. 51. Pantk. t. 16.
- A. panicula erecta aquoli diffusa rami 5-8floris, spiculis trifloris, glumae valva superiori trinervi  
 oblongo-lanceolatae, ~~et~~ ~~glaucis~~ glumellae valva inferioris setaceo-brunneatae, foliis planis, ex  
 quinque geniculatisque pilosis.
- Syn. Richb. ic. bot. tab. 99 fig. 1694. Host. fl. austri. III tab. 38. Leers fl. herb. tab. 10 f. 5.  
Hab. in gramineis circa Kovice (M.N.) ~~scindens~~. Jul. Perenn.
- Ad Avenam sterilis L. 173. 1. c. ~~fig.~~ 330 adde locum Cattaro in monte Vermei (Salmo)  
Ad Avenam aethiopantham Presl substitutae A. barbata Brof. fl. Lusit. p. 108 (1804)  
 Pantk. I. 1. p. 16 et adde locum in gramineis circa Trebinje (Herzeg.) Sgn. A. hispida  
 Roth catal. bot. III. p. 19 (1806) A. aethiopantha Presl typ. et gram. III. p. 30 et enum. p. 116. T. p. 44.  
 Vis. fl. salm. I. p. 69. Addatur
- Avena alpina Sm. engl. fl. I. p. 165. Richb. ic. bot. XI p. 63. Pan. cl. gl. var. p. 98.  
 A. panicula contracta racemosa, spiculis sub-<sup>ramis</sup> trigeminis, sub. glomeratis, floribus supra medium dorsi aristatis,  
 glumae valva superiore trinervi, rachide pilosa, ovario apice piloso, foliis serrulatis  
 supra rachis, <sup>inferioribus</sup> pore ligulam ciliatis.
- Syn. A. procta Richb. fl. exc. p. 140<sup>3</sup>.
- Syn. Richb. ic. bot. XI. tab. 103 f. 1703. Sm. engl. bot. tab. 2141.  
Hab. in pratis sub monte Durmitor (M.N.) Jul. Perenn. Non vidi.
- Avena capitoam ~~Viss. Palm. I. p. 339 (1785)~~ Host fl. austri. I. p. 127. Richb. fl. exc. p. 51.
- A. panicula oblonga racemosa, rami gemini spiculum unicum binas gerentibus, spiculis sub-5floris,  
 floribus in media dorso aristatis, glumae valva superiore trinervi, rachide pilosa, ovario apice piloso,  
 foliis laevibus. (1786-7).
- Syn. A. vesicatoria Willd. pl. dauph. II. fig. 142. Pan. cl. gl. var. p. 98. tab. IV. f. 5.  
 Richb. fl. austri. I. c. bot. XI tab. XCIX fig. 1699. Host. ic. gr. austri. II. tab. 52. Vill. I. p. 116. tab. IV. f. 5.  
Hab. in Saxonij montis Durmitor iugo Sjeme. (M.N.) Jul. Perenn. Non vidi.

- Avena tenera* Moench meth. pl. p. 195. Host fl. austri. p. 130. Rehd. fl. ex. p. 51. Panč. et pl. var. p. 98.  
*A. panicula aequali, spinulis subtriangularibus valvis 7-9 nervis, flore inferiore apice in aristam acuminata, dorso mucrone, reliquis apice cuspido-biaristatis, seminatis foliis rotundatis, radice fibrosa*  
*Syn. Visetum tenuis R. et Sch. syst. veg. II. p. 53. A. transiliana Willd. pl. de Daug. II. p. 143. A.*  
*dubia Leers fl. herb. p. 41.*
- Syn. Rehd. ii. bot. XI. tab. LXVII fig. 1690. Host ii. gram. II. tab. 55. Willd. I. c. II. tab. IV. Leers I. c. tab. 9. f. 3.*
- Hab. & Travnik ad Cenizza (Boemia) Sendtner. Ann. Inst.*  
*Avena carpatica Host fl. austri. I. p. 125. Rehd. fl. ex. p. 52. Panč. et pl. var. p. 98.*  
*A. panicula erecta patente, spinulis subquadrigularibus, glomeris basi quadridentata glomerella ciliata ciliata sequentiis, foliis lanceolatis atropurpureis, vaginis conpresso-pilosis, ligula truncata, radice repente*  
*Icon. Holt ic. gram. austri. IV. tab. 31.*
- Hab. in graminosis montis Savovje (MN) ubi legit grot Pančić, sed non vidi.*  
*Ad Avenam Neumayer Vis. II. tab. III fig. 339 quae item ac A. compacta Boiss. add. plantam hanc lectam quaeque fructu in rupestribus sub morte siccissimae habet in Bjela Gora. Et grot Pančić et pl. var. p. 98.*
- Post Dauthoniam calycinam Rehd. Vis. fl. tab. III. p. 345. cuiusvisq. D. provincialis DC. Panč. et pl. var. p. 98 et locum in parvus saxorum ultra Hrkovička Luga (MN), addatius Dauthonia decumbens DC. fl. fr. III. p. 33. Pavlat. II. tab. I. p. 207*
- D. panicula racemosa subspinulosa parviflora, spinulis sub-3-floris, glomeris foliis subaequantibus, glomerella inferiore ciliata-pilosa, foliis linearibus planis vaginisque pilosis, ligula conica pileiformis, culmis decumbentibus.*
- Syn. Tridia decumbens Pal. de Beauvois agrot. p. 76. Ponth. I. c. p. 18. Poa decumbens Scop. fl. carn. ad. A. tom. I. p. 69. Holt fl. austri. I. p. 151. Festuca decumbens L. p. 110.*
- Icon. Rehd. ii. bot. XI. tab. LXVI fig. 1572. Host ic. gram. II. tab. 72. Leers fl. herb. tab. 9. f. 9.*
- Hab. in pratis circa Zara, Sinj, in Pastrebica in Bjela Gora (Hercegov.), Danilov Grad i propr. m. Crno Planina (MN) et in prati m. Duvniciot grope Labljak (MN) Pančić*  
*Ad Koeleriam Pers. Vis. fl. tab. I. p. 81 add. locum in lapidosis circa Ragusa (Dalmat.)*  
*et iisdem locis circa Trebinje (Hercegov.) Pančić, et ad Kastelatam Pers. in parvis Carina infia Korn (MN) in m. Glava circa Trebinje (Hercegov.), et in asperis m. Lovcen (MN) Pančić.*
- Dein add. L. grandiflora Beckst. in rupestribus no. Strovnich et Veliko Pastrebica (MN)*  
*et vox? subaristata, in declivity herbito m. Korn, Pančić, quemum utique nuchi invisa*
- Ad Bromus fl. tab. VI. I. p. 72. et suff. p. 341 addatius*
- Ad B. tectorum L. Vis. I. c. III. p. 340 add. locum in incultis circa Ragusa (Dalmat.) et Trebinje (Hercegov.), et ad B. squarrosam L. Vis. I. c. I. p. 74 locum in incultis circa Trebinje, et in valle Zajla et Savina in Bjelagona (Hercegov.). vel non vox? B. villosus L. Vis. I. c. III. velutinus Rehd. et*  
*bot. XI. tab. LXVII. p. 1599. glomerata dorso villosa, quea exsiccat in raroq. circa Cattaro (Dalmat.) ubi legit Ponth. I. c. p. 13.*

Ad Br. molle L. Vis. I.c. p. 73. adde locum circa Trbinje (Herzeg.) et Cetinje et Dantov  
Grad (MN) Ranth. I.c. p. 13.

Ad Br. erectum L. Vis. I.c. p. 73 adde var. v. australis Gris. in Panth. I.c. foliis angustis  
lineariibus, ciliis recurvatis: quem habitat in raxoni circa Trbinje et in raxoni Vraca gorica  
dictis prope Gospic et circa Lukovo (MN) Panth.

Ad datus Bromus asper Musc. prod. fl. goett. p. 49. Hott. fl. austri. p. 166. Ranth. fl. ex. p. 111  
Br. panicula ramosa laxa nutante, spiculis linearis-lanceolatis & gloris, compensis per  
brevitatis, glomeris inferioris brachione bidentata, inter dentes aristata anastomosae lon-  
giora 5-nervi, superiores pubescens-viriles, vaginis inferioribus foliisque hispidis.

Ikon. Rchb. ic. bot. XI. tab. LXXXVI f. 1605. Hott. fl. ex. p. 111. Sm. engl. bot. tab. 112.

Hab. in raxonis sub m. Vojnik (MN) Panic. et Ceniza prope Subgacka (Bohemia) Sendtn.

Post Br. ricotinum L. Vis. flor. I.c. p. 23 addatur

Bromus ricotinus L. I.c. fl. ex. p. 111. Rchb. fl. ex. p. 13. Panth. adn. p. 13.

Br. panicula patente creata, deflora contracta, spiculis 8-12 floris oblongis glabris denudatis  
obtusis apice subincisatis, aristis glomeris superioribus, vaginis inferioribus foliisque pilosis.

Ikon. Rchb. ic. bot. XI. tab. LXXXV f. 1590. Sm. engl. bot. t. 1079

Hab. in herbitis prope Cattaro (Dalmatia) Panth. Sul. beina.

Ad Festuca L. Vis. fl. Dolm. I.c. p. 76 et Regn. p. 18-19. adde Seguentem

Ad Festuca durissimula L. Vis. I.c. p. 74 adde syn. F. ovina var. durissimula in valle Radus  
Brodo prope Kruja in Bjelagora (Herzeg.) et F. ovina L. in raxibus ad pedem in Glava prope  
Trbinje (Herzeg.) et in Vraca Dol infra m. Cna Planina (MN); ad F. durissimula L. ad  
de F. glauca Schrad. in herbitis m. Glava (Herzeg.) et Korn (MN); ad F. violaceam Gaed. adde  
syn. F. ovina var. violacea et loc. in paucis alpinis m. Korn et Mali Durmitor (MN) Panth.  
Addatur etiam Festuca alpina Gaed. agr. I.p. 232 syn. F. ovina p. alpina  
Koch syn. p. germ. II. p. 928: humilior, panicula pauciflora, spiculis majoribus, aristis longioribus.

Ikon. Rchb. ic. bot. XI. f. 1323

Hab. prope Dravnik (Bohemia) Sendtn.

Ad Festuca Myuros Ehrh. Vis. I.c. p. 75 addetur in prati circa Danilo Grad et Komani (MN).  
Ikon. Rchb. ic. bot. XI. tab. LXVII. Hott. fl. ex. p. 111. Sm. engl. bot. tab. 2056.

Hab. in herbitis Kukura. Brodo sub monte Korn (MN) Panic. et in calcinaria, elatiori monte  
Vlastich, in Mali Sandik, et in Velika Ravne (Bohemia) Sendtn.

Festuca spadicea L. 1556 nat. ed. 21 vol. II. p. 732 in add. Hott. fl. ex. p. 153. Rchb. fl. ex. p. 10. Ranth.  
I.c. p. 14. Panic. cl. p. 100.

F. panicula compactata, florante pectinata, rarius glabris, spiculis tub. gloris, submatibus, glomeris inferioris  
5-nervis, nervis 3 <sup>conspicuis</sup> foliis angustis linearibus glaberrimis plenis.

Ikon. Pan. Gerardi Allioni Spec. II. p. 243. Barthoanthem paniculatum L. sp. p. 40

Ikon. Rchb. ic. bot. XI. tab. LXVIII f. 1561. Hott. fl. ex. p. 111. tab. 20. Gerard. fl. gallo. tab. 2. fig. 1  
Hab. in paucis sub monte Durmitor (MN) Panic. et in prati subalpini m. Sivnjazna Planina (MN) Panth.  
Sul. Perun. Glomeris specieae

Ad Festucam variam Haenck. Vis. fl. dalm. 1 p. 19 addat. synonymon F. dimorphpha Lussuon  
pl. v.v. pag. 34 tab. 6. Panč. et pl. var. p. 100. quam tamen non videt ex Bertol. fl. it. t. 396.

Ad F. pratense Huds. Vis. fl. dalm. 1 p. 74 preponere syn. F. elatioris L. fl. vee. ed II.

F. gracilis antiquius et habitacionem ad Begun-Beg, et ad Kulla ad Sura (Bosnia) sendit.  
Festuca pumila Vill. hist. des fl. de Daugl. II p. 102. Host fl. austriac. p. 153. Rechb. fl. exc. p. 38.

F. panicula erecta contracta paniciflora, ramis subgeminatis, spiculis 3-floris breviter aequaliter  
glumella inferiore oblongo-lanceolata rugosa medium subito aminuta foliis complicato-foliformibus  
Dion. Achb. i. bot. XI tab. LXV f. 1551. Host. icon. gramm. IV tab. 91. sub testiculis glumis.  
Hab. in saxonij montis Orien. super Castellum i. Cattaro, ubi legit Neumayer. H. J. L. P. spiculae violaceae.

Festuca pilosa Hall. fl. in Sut. fl. helv. I. p. 56. Koch. syn. flagellaris ed. II. p. 96. Panč. p. 100.

F. panicula patentia oblongo, ramis erectis semi-verticillatis, spiculis subtropicis, radice sub  
floribus pilosa-barbata, ovario glabro, foliis infimis subtesticulis, ligula oblongo-lanceolata  
syn. F. panicularis Host fl. austriac. I. p. 157. Rechb. fl. exc. p. 39.

Hab. in saxonij Mycenov Do sub monte Kom. Sub. Per. Panč. t.c. Mihici autem invisa.

Festuca sylvatica Vill. hist. de fl. de Daugl. II p. 105. Host fl. austriac. p. 153. Rechb. fl. exc. p. 39. Panč.  
et pl. v.v. p. 100.

F. panicula erecta diffusa, ramis 1-2 br. inferioribus 3-4 r. spiculis superioribus acutissima  
mutica 5-r. r. tibus conspicua, ovario apice piloso, foliis lanceolatis - lanceolatis 1-2  
pro glumis subtypis viridibus, ligula obtypis, radice fibrosa.

Syn. F. calamaria Host fl. austriac. I. p. 153

Non. Achb. i. bot. XI tab. LXVII f. 1562. Host. icon. gramm. IV tab. 60 et II tab. 60.

Im. engl. bot. Tab. 1505. Oct. fl. Dan. tab. 1145.

Hab. in periat. sylvestribus montis Durnitor (M.N.) Panč., id michi invisa.

Ad Festuca latifolia (L.) Host. fl. austriac. p. 153.

Ad Dactyloctenium hispanicum Roth Vis. fl. dalm. 1 p. 25 adde Panč. t.c. p. 10. in  
incultis circa Trabinje (Herzeg.) et a Vacca ad Boroglavu et Lionu (Bosnia) <sup>long.</sup>

Ad Poa Vis. fl. dalm. 1 p. 83. addatur

Poa bulbosa L. Vis. fl. c. t. p. 79.  $\beta$ . prolifera adde syn. P. bulbosa L. B. vivipara  
Kunth, ~~var. 1~~ et locum in apice circa Billerke (Herzeg.) Panč. t.c. p. 9.

Ad Poa alpina L. (ub. P. collina Host) Panč. ad. p. 14 adde locum in parvissimis  
alpinis montis Crno Planino et Kori, <sup>am</sup> et ad apices in Lovcen et Uvala Testenica et Kamen. Panč. dig. p. 19 (M.N.) sp. p. 39.  
var. B. vivipara L. Specie abortivi proliferis in parvissimis montibus Kom et Malo Durnitor et var. p.  
brevifolia Guad. fl. helv. I p. <sup>245</sup> (non DC.) foliis culmeis brevissimis Panč. t.c. p. 14.  
in parvissimis montibus Kom et Durnitor (M.N.).

Ad Poa annua Vis. fl. dalm. 1 p. 80 adde locum circa Tattaro (Dalm.) Dantov Grad et m. Crna Planina <sup>1811</sup> et m. Tavore  
Vis. fl. c. t. p. 81. et locum circa Makastir Duga Dantov grad et m. Crna Planina <sup>1811</sup> et m. Tavore.

Ad P. compressum L. adde locum circa Makastir Duga Dantov grad et m. Crna Planina <sup>1811</sup> et m. Tavore <sup>et in valle Tare Panč.</sup>

Add. Poa pilosa L. p. 100. Host fl. austriac. I. p. 150. locum in cultis circa Rijeka Panč. et in valle Tare Panč. (M.N.)

Panicula <sup>1811</sup> et m. Crna Planina <sup>1811</sup> et m. Tavore <sup>1811</sup> et m. Rijeka Panč. (M.N.)

- 2 Ad *P. megastachyam* Kost. Vis. fl. dalm. I. p. 82 adde locum in præmoxijs circa Trebinje (Herceg.) adatus variiplexisoides Presl fl. ne. E. p. 44 panicula contorta, spiculis biquadrifloris, que crescit in locis humidis circa Cattaro (Dalmat.) ubi legit Pantk. I. c. p. 15.
1. Ad *P. Eragrostis* L. adde locum in campis circa Rieka et Danilov grad (MN) Pantk. I. c. p. 15 sub *Eragrostide gracilis* Beauv. Agrost. p. 71. Panč. et al. p. 98 in campis ad Vir.
- Ad *P. turan* Scop. Vis. I. c. I. p. 82 adde locum circa Zara (Dalm.) et Trebinje (Herceg) sub Telerchloa dum Beauv. Pantk. I. c. p. 14.
- Ad *P. rigidam* L. Vis. I. c. adde locum circa Zara et Cattaro (Dalm.) circa Trebinje et Gračevac (Herceg) in Pantk. adn. p. 13. sub *Telerchloa* et *Panicellus* elgl. p. 99 sub Festuca. Hinc adde Var. <sup>Y</sup> hemipoda: panicula subcuneata spiculis approximatis lanceolata-linearibus. Typ. *Telerchloa hemipoda* Parl. Fl. Ital. I. p. 182 Gris. in Pantk. I. c. p. 13. *Dritium hemipoda* Delit. in Denor. ff. nap. 4. p. 18 - Icon. C. Bauh. Theatr. p. 31. fig. p. 32 - Hab. in incultis circa Ragusa (Dalm.) Pantk.
- Ad *Poa nemoralis* L. Vis. I. c. III. p. 342 adde Var. <sup>Y</sup> glauca Koch syn. fl. germ. ed. II. p. 929 Pantk. I. c. p. 15: glauco-vires, culmis vaginisque scabriunculis, spiculis copiosis. Hab. in saxonij circa Crno jezero, ad pedem m. Mali Durmitor (MN): Var. <sup>Y</sup> montana Koch. I. c. Panč. I. c. p. 99: panicula rara spiculis magnis 2-5 floribus longe pedicellatis. Hab. in apenninon. Durmitor.
- Ad *P. pratense* L. Vis. fl. dalm. I. p. 81 adde Var. <sup>Y</sup> paniculatum Gaud. helv. I. p. 260: culmis, culmo com. prosp. Hab. in herbis in Glina prope Trebinje (Herceg) Pantk. I. c. p. 15.
- Ad *Poa rupestris* Haenck. fl. rupestr. p. 120. Host fl. austri. I. p. 142. Reich. fl. exc. p. 48. P. panicula patula ruris inferioribus geminis, spiculis sub-5floris, ~~glumella~~ <sup>habitat</sup> ~~conspicua~~ <sup>Glumella inflexa</sup> 5-herris culmo vaginisque <sup>compositis</sup> ~~conspicua~~ foliis lanceolato-linearibus, ligula abbreviata.
- Icon. Reich. ii. bot. XI tab. XL<sup>1</sup>. 1637-1658. Host. ic. gramin. III tab. 13. Vill. hift. 181. pl. du Dauph. II. tab. 3. Hab. in saxonij silvestribus montibus Durmitor versus in Stolac. (MN). Panč. I. c. p. 99. Non ut var. <sup>Y</sup> hybrida Gaud. Pantk. I. c. p. 15: ramis paniculæ elongatis apice pendulis. - Hab. in pastuis alpiniis montis Mali Durmitor. (MN)
- Ad *Poa canescens* Allion. aust. fl. pedem. p. 40. Host fl. austri. I. p. 147. Reich. fl. exc. p. 48. Panč. el. pl. viss. p. 99.
- P. panicula patente, ramis inferioribus geminis, raro quinibus, floribus dorso et margine pubescentibus lano connexis, glumelle valva inferiore quinqueventris, novis lateraliibus obsoletis, ligula abbreviata, radice stolonifera septeante.
- Icon. Reich. ic. bot. XI cent. XI tab. <sup>XXI</sup>, fig. 1632 (sub *P. hispidocephala* Gaud.) Bellard. app. fl. ped. in act. taur. V. p. 215 & tab. 3.
- Hab. in saxonij schistaceis ad Myčovo 50 sub monte Kom (MN) non vidi.
- Ad *Poa concinna* Gaud. agrost. helv. I. p. 169. (non Br.) Reich. fl. exc. p. 46. Pantk. adn. I. c. p. 16.
- P. panicula erecta <sup>erecta</sup> patente, ramis 10 lateribus geminisque divergentibus, spiculis 4-8flosi, floribus marginae dorso pubescentibus latoe (ligulis oblongis acutis, foliis <sup>completato</sup> - laterali), radice caespitosa.
- Icon. Reich. ic. bot. XI tab. XXXI. f. 1617. - Hab. in muris ubi Zara (Dalm.) et in vegetib. m. Glina prope Trebinje, Draga, et in Koviste Sreda prope Vučje in Biograd. Pantk. (MN) ad Gračevu Panč. I. c. p. 99 (MN) et in insula Šarengo (Dalm.)

5 Ad Moliniam caeruleam Munch Vis. I. c. III p. 343 adde locum in herbis montis  
Pantk. l. c. p. 14 et in Durmitor Pani. (M.N.)

*Briza media* L. et *B. maxima* L. Vis. fl. dalm. I. p. 84 evanit quoque in (M.N.)  
 et (Herceg.) et (Bosnia). testibus Pantk. l. c. p. 14, Pani. I. c. p. 98 et Sestinae.  
*Cynosurus cristatus* et *ciliatus* L. Vis. fl. dalm. I. p. 85. evanit quoque in  
 (M.N.) testibus Pantk. et Pani., in (Dalm. et Herceg.) et in (Bosnia) fide Lindstr.  
 Ad *Glycerias* Vis. fl. dalm. I. p. 83. adde locum *Gl. fluitans* R. Br. Vis.  
 fl. dalm. I. c. in hemicryptis circa Danilov Grad ad rivulum Susica (M.N.) et  
Pantk. l. c. p. 15 circa Travnik (Herceg.) Pantk. l. c. (Bosnia), et iterum in (M.N.) Pani. l. c. p. 99  
 in fonte ad Vis. addatur

*Glyceria spicata* Guisan. fl. sic ign. II. in add. et emend. p. 88. Parlat. fl. etat. I  
 p. 37. *Eris.* in Pantk. adn. p. 15.

*G. paniculata* subsecundae ramis inferioribus subgeninijs, spiculis latero-  
 libus subresiliibus 5-15 florib. florulis oblongis, glumellae valva inferior  
 obtusa nervis visibilibus, superiori oblonga obtusa.

Hab. in hemicryptis Vireja Dot. infra montem Crna Planina (M.N.). Aut. Perenne.  
*Glyceria spectabilis* Mert. et Koch deutsch fl. I. p. 586. Pani. et pl. var. p. 99.

*Gl. paniculata* ampla ramosissima, spiculis 5-9 florib. floribus obtusis, glumellae  
 valva inferiore rectanguli, nervis validis, radice repente

Syn. *Gl. aquatica* Wahlbg. gothob. p. 18. Rechb. fl. ex. p. 45. *Poa aquatica* L. sp. p. 98  
 Host fl. austri. I. p. 142

Icon. Rechb. ic. bot. XI. tab. LXXX f. 1614. Host fl. gram. II. tab. 60. Leers fl. herborn. tab. V. fig. 5.

Hab. in paludosis ad rivum Moravae et ad lacum Stodranum. H. Sud. Per. Non vidi.

Ad *Moliniam caeruleam* Mch. Vis. fl. dalm. III p. 343 adde locum ex Pantk. l. c.  
 p. 14 in herbis montis Mali Durmitor Pantk. et Pani. l. c. p. 99 (M.N.).

Ad *Seslerias* Vis. I. c. I. p. 87 adde *Sesleriae elongatae* Host Vis. fl. dalm. I. p. 88  
 loco in saxonis montium *Gliva*, *Lector*, *Crkvica* et *Drača* prope *Trebinje*  
 (Herceg.) et ad pedem montis Mali Durmitor (M.N.) Pantk. l. c. p. 16. ad S.  
 argenteam *Savi* Vis. fl. dalm. suppl. p. 20. *S. elongata* var. *argentea* Vis.  
 in Pantk. adn. p. 16. evanit in ripibus montium *Gliva* (*Crkvica* et *Drača*)  
 prope *Trebinje* (Herceg.) in qua observandum, nomen *specificatione* a *Savi*  
 compositione sua *testacea argentea*, prioritate cactera antecedit. addatur  
*Sesleria coerulea* Reichenb. spec. alt. p. 17. Host fl. austri. I. p. 139. Rechb. Herceg. p. 34.

*L. thyrsoides* sp. uniformi compacto ovoidi-oblongo, spiculis bi-trifloris, glumella inferiore  
• *Lestes* apice bi-quadrata, aristata intermedia, brev, foliis linearibus  
planis marginatis, obtusifasciatis, apice in cuspide abutente contractis.

Var. 3. alba *Sibth. et Sm. fl. gr. pr. 1. p. 52. Gris. in Panth. adn. p. 16. thyrsos*  
pallide caeruleo-scente, foliis hispidatis.

Icon. *Sibth. et Sm. fl. gr. 1. tab. 82 (excl. analys.)*

Hab. in rupestribus montis *Glova* supra *Trebinje* (Herceg.) *H. Bul. Perenne*

*Lestes marginata* *Gris. 1. fl. rum. p. 442 Panth. 1. c. p. 16.*

*L. thyrsoides* sp. uniformi compacto ovoidi-oblongo, spiculis subsessilibus, spiculis bifloris,  
floris superiori glumella apice triseta aristam exstans subaequante,  
foliis late linearibus raro marginatis in cuspide acutis ~~attenuatis~~ levem  
attenuatis.

Syn. *L. caeruleans* *Friedls. in Regensb. flor. 1836 p. 432.*

Hab. in saxonis montium *Pastrebica* in *Bielagora* (Herceg) et *Korn* (MN.)

Ad *L. interrupta* *Ris. 1. c. p. 87. add. Panth. 1. c. p. 16. et loca in saxonis  
montis *Pastrebica* in *Bielagora* (Herceg) et *Korn* (MN.) et loca in rupestribus  
m. *Lovien* *Velika Pastrebica* et ad *Noveacu* Do sub m. *Korn* *Panc. 1. p. 95 (MN)*  
*neon non a Gradeczka* supra *Spomina* ad *Rebenik* (*Bosnia*) *Sentnar*.*

Ad *L. juniperifolia* *Host* in *Ris. fl. dalm. 1. c. p. 87* add. *lyn. L. tenuifoliae*

*Schmid. fl. germ. 1. p. 112* quod prioritate alterum antecedit, et loca in rupestribus  
valle *Tuzina* prope *Brahovac*, et in m. *Pastrebica* in *Bielagora* (Herceg) et *Korn* *Panc.*  
*bryophyta* in montibus *Durnitor* et *Korn* *Panc. 1. c. p. 98 (MN)*, et in m. *Vlasich* et *Mali*  
*Sandici* (*Bosnia*) *Sentnar*.

Ad *Pilularia* *nardoidea* *Trin. Vis. fl. dalm. 1. p. 89 add. loc. in asperis ad *Ostrog* et prope  
Vix dist. *Cymidea*. *Panc. 1. c. p. 101**

Ad *Nardum strictum* *L. Ris. fl. dalm. III. p. 346 add. loc. in præcipiis alpinis *Bile Carini*  
infra *Korn* et in m. *Mali Durnitor* *Panth. 1. c. p. 12. et iisdem locis (MN) Panc. 1. c. p. 101.**

Ad *Aegilopem ovatum* *L. Vis. fl. dalm. 1. p. 90 et III. p. 144. add. locis circa *Lettars* (*Dalm.*) et  
*Trebinje* (Herceg.) *Panth. 1. c. p. 12. Panc. 1. c. p. 101* in vicinij ad *Klopac*, et prope *Vix* (MN)*

Ad *Aegilopem tristis* *L. Vis. 1. c. p. 90* in vicinij circa *Trebinje* (Herceg) *Panth. 1. c. p. 12. Ad hanc*

*Aegilopis tristis* *W. 1. p. 14. p. 943. Reichb. ff. exc. p. 17. Gris. in Panth. adn. p. 12.*

*A. spica* *ovata*, superne attenuata, spiculis 4-5 florib, glumis hispidis 2-3 aristatis, basi marginis  
glabris, sursum scabris, glumellis inter aristas ciliatis.

Icon. *Ribesi. bot. xi tab. VIII fig. 1864. Scheuchz. agrost. tab. I. fig. 2-*

29-30-31

Hab. in vicinibus montis Vernai prope Cattaro (Salona) Panck. Sub. Ono.

Rd *Lolium perenne* L. Vis. K. dalm. p. 92 ad loc. circa Callaro (Dalm.) et Trabinje (Herceg.) Pantk. et in cultis ad Cetinje, Gračac (MN.) Panić. et ad L. temulentum L. Vis. K. dalm. p. 91 inter vegeta circa Trabinje (Herceg.), Pantk. et inter vegeta ad Njegos Panić. (MN.) et ad L. robustum Rebbo. sive syn. L. temulentum var. gracile Bieb. Gris. in Pantk. l. c. p. 13 euan loco inter vegeta prope Callaro (Dalm.) et Trabinje (Herceg.) Pantk. Jul. Ann. — Adduntur *Lolium multiflorum* Gaud. fl. helv. I p. 35k. Rebbo fl. exq. 16. Gris. in Pantk. adn.

*Lolium multiflorum* Gaud. fl. helv. I p. 35k. Rich. Fl. exq. 16. Gris. in Pant. adn  
p. 13. Pommeria, veg. di Vergin p. 70.

*L. spica compreta diffusa, gluma apicula non tripla breviora, parvulis attenuatis acutis 15-20-floris, floribus lanceolatis arte imbricatis, superioribus aristatis-  
zion. Schb. cc. bot. x1 tab. v fig. 1345*

Hab. inter vegetes circa Trebinje (Herceg.) H. Lat. ann. Panth.

Ad Triticum Vis. fl. dalm. I p. 96. adde Triticum tolinaceum Sm. ~~syn.~~ syn. Cata  
podium tolinaceum Link host ber. 1 p. 45. Gris. in PantK. I.c. p. 13 in in multij cira  
Ragusa: T. pinnatum Mönch. Vis. I.c p. 95 adde locum in m. Sliva prope  
Rebinje, et in valle Tarina prope Orahovac in Bjelagora (Herzeg) cum syn.  
Brachypodium pinnatum Beauv. Pani. I.c. p. 100 et loc. in in multij sub  
clivo Mali Zonac m. Sutoriman; Tandek. 1 grauvinid ad Cetinija, sin  
prope Rebinje m. Vlastich: ad Triticum ciliatum DC. Vis. fl. dalm. I p. 94 adde  
syn. Brachypodium diphyon Beauv. Gris. in PantK. I.c. et loca in in multij  
circa Ragusa, nec non Pani. I.c. p. 100 in taxois supra Lumbani distr. Crmn:  
cne, et Dav. monostachyos: spiculis solitariis, in taxois ad pedem multij  
Sliva prope Rebinje (Herzeg.) Gris. in PantK. I.c. p. 13. — Ad Triticum caninum  
~~Ad Triticum L. Vis. I.c. p. 94 adde locum in terribidis circa Danilov. Grad PantK.~~

p. 13; et in sylvestribus vallis Tarae et in Kukuraj Brdo sub m. Korn Pani. p. 100  
(M.N.); ad Triticum repens L. Vis. fl. Idem. 1. p. 93 locum Pani l.c. in pratis ad progo  
(M.N.) et Senther in m. Bologh (Bosnia), et adde var. B. glaucescens Vis. super p. 22. T. glaucescens  
in Panth. l.c. in herbibis circa Trbinje (Herceg); ad T. villosum Bieb. Vis. l.c. in  
monte Glova, in valle Zastav (Herceg) et circa Cetinje (M.N.) Pantek. l.c.,

~~addition~~ Tritium durum Desf. fl. atl. 2. p. 114. Rich. fl. exs. p. 21.

*J. spica quadrangularia imbricata compacta, (peculiar habet 4 floribus axillatis), glomeris valvis carinatis subventricosae,  
apice bifidis obtusis, glomeris bidentatis longiori, cyme axillaris, rachide tenue, maxime pilosa.*

*Post* *Secale dalmaticum* Vis. bij gr adde

*Secale montanum* Gasson. ind. um b. Bosnae 1825 et prodv. Fls. I p 145. Eris. in Pantek.  
I. c. p 13. Pantek. fl titl. I. p 517.

*L.* *spicis* *subnudante* *comprepta*, *rhizide* *articulata* *fragili*, *istrinque* *filoso*-*barbata*,  
*glumae* *wolvif* *anguste* *linearibus* *acuminatis*, *margine* *hippoidif*, *radice* *perenni*.

*Syn.* *L.* *eribrium* Pani. *fida* Eris. in Pantek. I. c. p 13.

Hab. in herbīs ura Brzovac et Dubovac in Bielagore (Herceg) H. Jel. Petren. Pantek.  
Obs. An specie hacce, quam habui sub dicto nominis a prof. Panicū ex Serbie, cum s.

dalmatico upulanda? Deest in Kora serbica ejusdem auctoris

Ad Hordeum maximum L. Vis. H. dalm t p 98 adde locum in multis Trebinijs, et  
Biljetki (Herceg), <sup>Pantek</sup> Cetinje et Danilev frnd (MN) Pani. et circa Zrmanik et ad  
pedem m. Vlasich (Bosnia) Sendtner.

Ad Hordeum bulbosum L. Vis. I. c. adde locum in herbīs montis Glove prope  
Trebinijs (Herceg) Pantek. adn p 13 —

Icon. Reb. i.e. bot. IX tab. CCCXLVII fig. 882-883-884. Monch. l.c. tab. V. Ged. fl. Dan. tab. 1099.  
 Hab. in humidis ad virulum Succa prope Danilev, Grad (M.N.) Pantk. Aestet. Pinus  
 Ad Lulgulas DC. Vis. f. folior. I. p. 114 et supp. p. 22 adde locis Lulgulae campestris Desv.  
Nis. l.c. in prati civica Dobrovaz in Bjelagora (Herzeg), in sylvis montis Cerna Planina  
civica orilia Savorec dicta, et in parvus Carines infra Kovač (M.N.) Pantk.; in prati vicis  
ins. Veglie ad Dobroje, S. Maria di Capo (Dalm) Domumac. l.c. p. 65., et civica Travnik  
ad Gradacchar ad Trebenišić, in monte Planici, et in Ečendakia (Bosnia) Scudner.  
Ad Lulgulan campestrem var. β congesta Nis. l.c. adde syn. Reb. fl. exc. p. 91. ad  
Reb. l.c. var. β. congesta.

Ad Lulgulan altidam DC. Nis. l.c. adde locis in prati montis Tastrebitza in Bjel-  
 agora (Herzeg) et in sylvis montis Cerna Planina prope orilia Dobroje dicta E. Pantk.  
 l.c. in sylvaticis vallis Dara Panč. l.c. p. 93 (M.N.), et in Parhonkonak, Savito-  
 vici, Šeboška, Lubina, et Dobčišpolje (Bosnia) Scudner.  
 Ad Lulgulan Forsteri DC. Vis. f. folior. supp. p. 28 adde locum in sylvis S. Maria di Capo  
 et S. Elena in ins. Veglie (Dalm) Domumac. l.c. p. 65. — Addatur  
Lulgula multiflora Lejeen. fl. de spa I. p. 169. Reb. fl. exc. p. 91. Gris. in Pantk.  
adn. p. 22. Panč. et pl. p. 93.

L. radice fibroso, caule foliolato, foliis linearibus marginis <sup>longe acuminatis</sup> petiolis demum  
 glabratibus, umbellae spicis orati sessilibus pedunculatisque, perianthii  
 phyllis acuminatis mucronatis capsule subrotunda obtusa mucronata  
 Syn. Luzula multiflora Ehrh. calam. n. 127. I. vetus Pers. syn. l. p. 386. L. erecta Desv. journ. bot. 1. p. 156.

Icon. Reb. i.e. bot. IX. tab. CCCXLVII fig. 838. Ged. fl. Dan. tab. 1333. ~~Hab. in sylvis~~

Hab. in sylvaticis montis Glava prope Trebinje, civica Bileći, et in m. Tastrebitza  
 in Bjelagora (Herzeg). Pantk., et in prati Savoie (M.N.) Panč. l.c.

Var. β. nigricans: Koch deutsch. fl. II. p. 602: umbellae spicis atro-purpureis approximatis,  
 foliis sola basi pilosis. — Syn. L. nigricans Desv. journ. de bot. 1. p. 158. Gris. in Pantk.  
 l.c. p. 22. — Icon. Reb. i.e. bot. IX. tab. CCCXLVII fig. 836. Host i.e. grana. IV tab. 99. Sturm.  
 deutsch. fl. 27-n. 98. — Hab. in sylvaticis civica Kovičić ad pedem Malo Darmitor (M.N.)  
 Pantk. H. Mayo, Junis. Perennis.

Lulgula spicata DC. fl. fr. III. p. 161. Reb. fl. exc. p. 91. (ext. syn. Desv.) Gris. in Pantk.  
 l.c. p. 22

L. caule foliolato, foliis canaliculatis basi pilosis, florum capitulis intermixta spicatis,  
 spica recta, perianthii phyllis acuminatis mucronatis aristatis capitulo ciliis  
 pilis subrotunda trigona mucronata paucis brevioribus.

Syn. Juncea spicata L. ip. pl. p. 169. Host fl. austri. I. p. 454.

51 - 52

Icon. Rehb. ic. bot. IX. tab. CCCLXXIX fig. 844. Host ic. gram. IV. tab. 100. Oed. ff. dan. t. 270.

Linn. H. Lapp. t. 10 f. 4.

Hab. in præriis alpinis montis Horn (MN) Panth. H. aestata. Perenn.

Luzula sylvatica Gaud. fl. helv. II p. 58. Rehb. ic. bot. IX. p. 16.

L. caule foliato, foliis lanceolatis marginis pilosis, capitulis apice trifloris, perianthii phyllis subaequalibus, exterioribus acuminato-mucronatis aristatis, interioribus obtusis capsulam ovatam triquetram subaequalibus.

Syn. Tunne pilosus L. sp. pl. p. 468. I. maximus Reichd. H. franco-franc. p. 92. (1782) Host fl. austri. S. p. 452. I. sylvaticus Huds. H. angl. p. 151 (1762) L. maxima DC. H. fr. III. p. 160. Rehb. H. exc. p. 92. Gnis. in Panth. adn. p. 22. Pani. cf. pl. v. p. 92.

Icon. Rehb. ic. bot. IX. tab. CCCX. fig. 845. Host ic. bot. III tab. 98. In engl. bot. p. 737. Moris. heit. pt. act. 8. tab. 9 f. 2.

Hab. in graminosis sylvaticis m. Tastrebeca in Bielagora (Herzeg.), in m. Horn et Mali. Dumicitor, Panth. fl. sub m. Dumicitor et in Kukurici Bielo sub Horn Pani b.c. (MN), et in monte Vlasich supra Baklari (Bosnia) Sandtner.

Luzula pilosa W. en h. berol. I. p. 393. Rehb. fl. exc. p. 93. Parlat. ff. ital. II. p. 296. L. rhizomate brevi, caule foliato, foliis lanceolatis sparsè pilosis, floribus conjuncto-umbellatis proliferis, pedunculis fructiferis repens, unifloris, perianthii phyllis late lanceolatis subaequalibus, exterioribus mucronatis capitulo ovata triquetra obtusa mucronata brevioribus.

Syn. Tunne pilosus L. sp. pl. p. 468. (excl. nom. syn.) Host fl. austri. S. p. 452. Luzula vernalis DC. H. fr. III. p. 60. Gnis. in Panth. adn. p. 22.

Icon. Rehb. ic. bot. IX tab. CCC. fig. XXI. fig. 848. Host ic. bot. III tab. 100. In engl. bot. tab. 736. Leers H. helborn 13. f. 10.

Hab. in graminosis sylvaticis montis Tastrebeca in Bielagora (Herzeg.), in sylvis circa oricha Savorie dicto m. Crna Planina, et in m. Horn (MN) Panth. Jul. Pevny. Luzula flavescens Gaud. agrost. II p. 239. Rehb. fl. exc. p. 92. Parlat. ff. ital. II. p. 293.

L. rhizomate stolonifero, caule foliato, foliis brevioribus abbreviatis perice pilosis, floribus conjuncto-umbellatis proliferis, pedunculis unifloris erectis, perianthii phyllis subaequalibus acuminatis late lanceolatis capsula ovali triquetra mucronata brevioribus.

Syn. Luzula Hostii Desv. in journ. bot. 1. p. 140; Juncus flavescens Host fl. austri. I. p. 450.

Icon. Rehb. ic. bot. IX tab. CCCLXXXIII fig. 851. Desv. 1. c. tab. 6. f. 1. Host ic. bot. gram. III tab. 94.

Hab. ad ossino supra Kiseljak, Duvica, Podgorovo, ad Ebendahin, in monte Vlasich, et in Mali Sandrich (Bosnia) Sandtner. H. aestata. Perenn.

# Iridaceæ Russ.

Vis. fl. dalm. I. p. 115.

† Iris florentina L. sp. pl. p. 55. Rchb. fl. exc. p. 82. Pertot. Fl. Ital. II. p. 251. Poelt. Fl. Ital. III. p. 27.  
I. caule tereti glauco folio superante sub-trifloro, floribus pedunculatis, perianthii tubo  
ovario longiore, lacinia apice rotundatis, exterioribus oblongo-spathulatis, interiori  
bus oblongo-ellipticis basi angustatis, lacinia stigmatibus acutis, margine extiriori  
fimbriatis, rhizomate horizontali.

Icon. Rchb. ii. bot. ix tab. CCCCCXIX fig. 166. Curt. bot. mag. tab. 671. Sibth. et Sm. Fl. gr. I. tab. 39.  
Redout. Lilac. I. tab. 23.

Hab. in Taxois Horistna Greda prope Vraca in Bjelagora (Herzeg.) Panth. adn. p. 26. H.  
albi odori. H. vere. Penn.

Ad Iridem pumilem L. Vis. fl. dalm. I. p. 115 adde loco in agro monte Glava prope  
Trebinje, circa Dubovac in Bjelagora (Herzeg) et in Taxois Orsova Skala sub monte  
Kom (M.N.) Panth. I. c.

Ad Iridem gramineam L. Vis. I. c. p. 117 adde loco inter dometa circa Dubovac in Bjel-  
agora (Herzeg) ~~in agro~~ Panth. I. c. in graminetis sylvestribus monte Turmitor (M.N.)  
Panc. et fl. var. p. 89. et in monte Organ ins. Veglin (Dalm.) Domenec. I. c. p. 68.

Ad Iridem Pseudacorus L. Vis. fl. dalm. I. c. adde loco in lacu Scodruzo (M.N.) Panc. I. c. et ad  
lacu et fonte Capriufo, Panighe, Valle di Besca ins. Veglin (Dalm.) Domenec. I. c. - addatur  
ad Iris pallida Lam. enc. bot. III. p. 294. Rchb. fl. exc. p. 82. Pant. Fl. Ital. III. p. 27. Panc. I. c. p. 89.  
I. caule subtereti folia superantes sub-quadrifloro, floribus sessilibus, perianthii tubo ova-  
rio subaequali, lacinia apice rotundatis, exterioribus obovato-spathulatis, inferioribus late obova-  
tis inferno angustatis, lacinia stigmatibus obtusis, margine extiriori dentatis, rhizomate horizontali.

Lyn. I. odoratissima Jacq. h. Schoub. I. c. p. 5.

Icon. Rchb. ii. bot. ix tab. CCCCCX fig. 167. Redout. Lilac. I. tab. 366. Curt. bot. mag. tab. 685. Jacq. I. c. I. tab. q.

Hab. in rupestribus ad Ostrog et supra conosum S. Stephanii Moraca rup. (M.N.) H. pallide violacei ingratte olen-  
tes. H. Mayo. Penn. Legit Panc. Non vidi.

Ad Iris variegata L. sp. pl. 56. H. aust. I. p. 45. Rchb. fl. exc. 81. Panc. et fl. var. p. 89.

I. caule tereti folia glauca falcata subaequante tri-quadrifloro, floribus pedunculatis, perianthii  
tubo ovario sublongiore, lacinia apice rotundatis, exterioribus basi angustatis, spatulatis, interiori-  
bus oblongis, lacinia stigmatibus acutis, rhizomate nudo.

Icon. Rchb. ii. bot. tab. CCCCCXIV fig. 161. Jacq. fl. aust. I. tab. 5. Redout. Lilac tab. 292. Curt. bot. mag. tab. 16.

Hab. in Taxois supra Grkovo (M.N.) H. late, lacinia exterioribus venis purpureis pictis. H. Mayo.  
Penn. Legit Panc. sed non vidi.

84-33  
Ad. *Crocus reticulatum* Stev. Vis. fl. dalm. I. p. 118 adde locum in prot. saxo*ris* ins.

Veslia (Salv.) Tommas. veg. Vestl. p. 68 (nub C-variegata Hoff.).

Ad. *Crocus vernum* All. Vis. fl. dalm. I. p. 118 adde locum in declivibus herbis monte duriori in iugo exelso Stjeme (?) MN. Panic. et pl. p. 89 et Bukovilla prope Travnik (Bosnia) Sendtner. Adde var. parviflorum Gay in Tunis. ann. des sc. nat. 1827 t. II, p. 271. florum limbo pollinari. Hab. ad rurum deliquescentem in monte Sastrebac in Biela gora (Herceg.), in peñuis alpinae Cariño dicti infra Kom (MN) Pantk. adn. p. 26. et ad Han Kopitnja, et prope Travnik (Bosnia) Sentner. — Dein addatur —

*Crocos bonmatius* Hoffm. Bot. Zeit. 1835 p. 255. Reichl. ic. fl. germ. IX. p. 10.

Cr. tunici nervosis denum in fibra solatis, folijs rectangulis lanceolato-linearibus sub geminis spathis univalvis, perianthii partitionibus oblongo-obovatij obtusis, facie nuda obscurioris, stigmatibus inclusis stamina superantibus tubuloso dilatatis circundato-incisis.

Icon. Rechb. ic. fl. germ. IX. tab. CCC LXI fig. 800-801.

Hab. prope Travnik (~~Stjeme~~ in Bosnia) sed sine tubere; in (MN) Cetinje in dumetis Panic. p. c. p. 89. Flores violacei, venis obscurioribus. Fl. vere - Prenum.

Obs. In diagnosi Reichenbachiana tunicae tuberum dicuntur parallele nervosae, in ione vero sunt reticulatae.

Ad. *Gladiolus regulus* Guss. Vis. I. c. p. 122 adde locum inter vegetas circa Izchiaje (Herceg.) Pantk. adn. p. 26, et ins. Veslia, Bornibo, Elena (Dalm.) Tommas.

Ad. *Gl. triphyllum* Sibth. Vis. I. c. p. 123 adde locum ad vegetas ins. Cizola (Dalmat.) Potteri et in paucis vallis Sajna prope Crakovce, circa Dabrovac, in valle Nadre Brodo prope Velicia in Biela gora (Herceg.) Pantk. I. c. p. 26, et in saxo*ris* clivis Gruanca prope Cetinje (MN) Panic. I. c. p. 89.

Ad. *Gl. Myricum* Hoch. I. c. adde locum in prot. humidi circa Skodjege in Biela gora (Herceg.) Pantk. I. c. et postea

*Gladiolus imbricatus* L. sp. pl. p. 52. Host fl. austri. I. p. 44. Rechb. fl. aust. p. 82.

Gl. tenue ~~variegata~~ ~~multiflora~~ ~~spica multiflora~~ floribus secundis approximatis, laciniis perianthii lateraliibus rhombo-ovatis, anthers filamento tricoriorebus, laciniis stigmatibus sensim dilatatis papilloso-ciliatis, foliis linearis-eniformibus, tunici radicalibus dentate et parallele nervosis, superne ~~confusa~~ reticulatis.

Icon. Rechb. II. bot. germ. IX. tab. CCC fig. 878. Sturm. ic. fl. germ. tab. 83-4.

Hab. a Gruanca supra Kalecian ad Sutynska (Bosnia) Sentner. Fl. rubro-violaceas. H. aestate. Prenum.

II As Inde germanicum L. excludatur syn. *I. illyrica* Theophr. et austori veteri, et post  
illam addatur

*Iris illyrica* Tonmas. veg. Vegl. p. 63.

*Iris caerulea* bifida subtilior foliis glauco-lineariformibus, foliatis longiore, florus  
brevis pedunculatis altitudine subaequalibus petiolaris tubo ovarium argenteum,  
laevis omnis apicem rotundatis, exterioribus crenato-pastulatis, interioribus  
obovatis ~~quam~~, laccinis stigmatibus ~~semicirculis~~ acuminatis, rhizo-  
nata nodosa.

Syn. *Iris Cengialte* Ambros. fl. tyrol. austri. I. p. 643. Kerner nuber I. Cengialte  
Wien 1871. (in Oester. bot. Zeitschr. n. 9). *I. Clusiana* Dauich. Reichb. fl. ex. p.  
80 (fide Kern) *I. germanica* Rchb. ic. fl. germ. IX. p. 5. et herb. norm. non alio.

Icon. Rchb. - icon. germ. IX. fl. tab. CCCXXVIII.

Flab. in locis rupestribus Carrione, Besançonna, Scoglio S. Marco et monte Trishkawaz  
in ins. Veglia (Dalmat.) unde nupse dom. Smith Glorie et el. Tommasini.

fl. pallide violacei odore Lambreii rugosa S. Mayo - Perunij.

C61. Primiti nomen plantae huic restitutum *I. illyrica* a cl. Donmas incis.  
ut pote quod multe aptius, et regionem multoties majorum exprimens -  
*Iris Clusiana* Dauich juxta icones a cl. Rchb. das, valde dubia. Non  
issa, ibidem oblate ab. aut. cl. pro *I. germanica*, huic *I. illyrica* referenda  
testa Tommasinio in litt. juxta iconem Reichenbachianam, et ejusd. herb. normale.

- Amaryllideae R. Br.
- I Ad. *Luzula astrovina* L. Vis. fl. dalm. I. p. 122 ad locum in monte *Velika Jastrebica* ad *Bosiljevo* (Bošnjak) *Sentica*
- II Ad. *Narcissum radiiflorum* Salisb. Vis. fl. dalm. III p. 351 ad locum in monte *Velika Jastrebica* mons montis Leutor prope Trebinje (Herzeg.) Panth. ad. p. 26. et in hercidiis saxonis sub monte *Sutorman* (M.N.) Panic. at. pl. vasc. p. 89 et ad *Narcissum sylvaticum* L. Vis. fl. dalm. I. p. 126 ad locum in sylvaticis ins. Vegle (Dalm.) Dost. Cubich. in Tommas. veg. Belg. p. 63.
- III Ad. *Lilium Cattolicum* Vis. fl. dalm. sup. p. 64 ad locum in sylvaticis montis Glava prope Trebinje (Herzeg.) et in *Peniticia Dol* infra *Kom* (M.N.) Panth. l.c. p. 24. et ad *Lilium albanicum* Vis. spic. St. rumel. II. p. 385 Panth. l.c. p. 24. Panic. at. pl. vasc. p. 90.
- L. foliis lanceolatis, reprioribus, acuminitis margine rectis, subtriglobatis, medijs. confortatis, glauco nutantibus, perianthii phyllis oblongo-linearibus apice callatis, subrotundis nervis lateraliibus subflexuosis, anthemis floris.*
- Hab.* in præriis alpinis Bielle Carine in monte Kom, Simej avina Planina, et Malo Durmitor (M.N.) Panth. et in monte Vlastich (Bošnjak) Sestica.
- Ad. *Lilium canariotum* Bernh. Vis. fl. dalm. I. p. 132 ad locum in præris sub monte Durmitor versus jugum Stulac (M.N.) Panic. et in monte Vlastich (Bošnjak) Sestica.
- Ad. *Lilium Martagon* L. Vis. fl. dalm. I. p. 132 ad locum Svetynska usque ad Borovizza (Bošnjak) Sestica, et in tunctis ad Grakovo (M.N.) Panic. et pl. p. 90. Sed non vid.
- Ad. *Trillium messanense* Rafa. Vis. fl. dalm. III. p. 351. ad locum in monte Kom et in Peniticia Dol infra Kom (M.N.), in rupes tribus m. Glava prope Trebinje, et in m. Sajtice biia in Bielagon (Herzeg.) circa Cetina (Dalm.) Panth. l.c. p. 23-24.
- Ad. *Trillium montanum* Hoff. Vis. fl. dalm. I. p. 131 ad locum circa Cetina (Dalm.), Necvica (Herzeg.) et Rijeka (M.N.) Panth. l.c. p. 24. et in saxonis clivis Grаницa prope Cetinje, et sub Cetino Styene in m. Durmitor (M.N.) Panic. l.c. p. 90. et in ins. Vegle ad Matangovo (Dalm.) J.D. Smith in Tommas. p. 64.
- Post *Tulipa sylvestris* L. Vis. fl. dalm. I. p. 133 addatur
- Grisbachiana* : phyllis perianthii extenuis basi pubescens - Typ. G. Grisebachiana Panth. sp. in Berl. Bot. Zeitsch. XXIII n° q. p. 265. et ad. p. 23. Hab. in rupes tribus montis Glava prope Trebinje (Herzeg). H. Moja. Rvene. Obs. Perianthii phylla variant extenuis dorso viridula vel viridiora flavo; apice pubescens vel glabra vel exteriora tenuiter pubescentia; folia latissimata vel angusta: hinc *Grisbachiana* Panth. subsp. *pubescens* Panth.
- Ad. *Allium saxatile* L. Vis. fl. dalm. I. p. 133 ad locum in saxonis sub monte Lovcen, Velika Jastrebica, Biela Gora, et ad *Mecanov Do* vel monte Kom ubi legit Panic. l.c. p. 91.
- Ad. *Allium pallax* Schult. Vis. l.c. p. 134 ad locum ins. Vegle ad Besanov, et circa Panighe (Dalm.) Tommas. l.c. p. 64.



Var.  $\beta$ . *complanatum* Fries nov. ed. II. p. 85. *Panth.* L. c. p. 24: folijs tres lineas latij, planis  
Icon. Hall. de Allio n. 24 t. 2 fig dextr.

~~Stab.~~ in portis ad Ribljezero prope pagnum Kovice infra montem Mati Durmitor. Pantk.

*Allium scorodoprasum* L. sp. pl. p. 426. Host. Fl. austriac. I. p. 122. Rehbein. ger. x. p. 20. Tonnumas,  
veg. di Vegl. p. 84.

*A. foliis caule tereti ad medium foliis 10 foliis linearibus raro leviter, apice planis, 3-5 striatis, laevibus  
spathe bivalvis spathis bivalvis persistenti, orbo aliore longissima, umbella effusa, pedunculis nutantibus  
pendens, fl. perianthii & hylli elongatis apice coracis obtusis, A. flexuosa Host f. aucta T. M. 22*

*Sign. Codonophragmum cavinatione* Richb. p. 114. *Allium flexuum* W. Kitz. pl. Hung. III. p. 307. *A. flexuum* Hoffm. ex Richb. p. 222.

Zon. rho. n. germ. x. lab. (1111111111111111) fig. 1037. W. Krt. I. C. Tab. 228.

stab. in Iunetis et sybortis ad Bescaueakie, et m. Triskavar in ins. Vegia (Dalm)  
Tommasi: i. e. *H. acuta* *H. violacei* Peremson vidi —

Ad Feilam autumnalem L. Vis. l.c.p.142 adie locum in vallis dist. Cuci, et in canyis circa  
Grotto (M.N.) Pan. l.c. qd. et in ins. Veglio ad Capriccio (Salas) Tommas. l.c. p. 66.

83 *Silium bipinnatum* L. Vis. fl. Dalm. t.c. p. 143 ad e locis in ins. *Vegla*, *Capriolo*, *Ponnes*.  
t.c.p. 54 (Dalm), in diversis ad *Cetinje* (M.A.) *Poni*. t.c. p. 91. et a *Bukovina* ad *Bra-*  
*nik*, in m. *Vlahich ruga* *Bresch*, in *Mali Sandz*, et alibi (Bosnia) *Scutell.*

*Ed. Sikkam pratense* W. et Kots. Vis. fl. Estrem. p. 443. et ade locis in saxonis montis *Gliwice* pro  
pe *Trzebinje*, et in m. *Tashkobica* in *Bielogora* (Hervag) et in saxonis inter *Lastva* et *Czestochowa*  
per totum dipp. *Czestochowa* et *Lublin* (M. A.) Paris 1860.

*Ostrothecium umbellatum* L. Vis. t. et p. 145 abe locis in graniticis m. Lector prope Tschinje (~~Thessag~~) et circa Dubrov in Bielgora (Herzeg.) ad Cetlinje et super Brodjevi  
in dist. Cunice (M. N.) Panj. t. p. 91 ad Dobrinje, Bercanova, et Kastavica in  
Velebit.

ms. Veglia (Dalm.) Tommasi. l.c. p. 64  
Ornithogalum caucasicum L. Vigl. sp. 146. Speciem in vegetatis Cassiene, ~~Baccanum~~, in ins. Veglia Tommasi. P. sp. 54  
Ornithogalum flavum Boreale notis. 3d-n. 3 et fl. centr. ed. II. p. 507. Gren. et Godr. f. de Le  
III. p. 190. Pausa adn. p. 24.

III. p. 190. Panthe adn. p. 24.

O. foliis linearibus exstis canaliculatis linea alba longitudinali notatis, capo multifloro,<sup>10 baequilibus,</sup>  
ramulis inaequalibus patentibus, post anteflosim refractis, bracteis lanceolato-linearibus  
acuminatis pedunculo suo brevioribus, filamentis subulatis.

Hab. circa Zara et Ragusa (Dalm.), Drabinje et Billiki (Herzeg.) in prati valleis Medu  
infra Iastrebitza, in monte Iaspesica (Herzeg.), circa Savore in m. Cna Planina, in pas-  
cuis m. Kom et Mali Durnitov (R.N.) Pantk. Heretis viridis inter alii. Flora.

*Brithysatum authenicum* Bouché <sup>Kuntze ex pl. IV. p. 363</sup> *Vari.* cl. ph. var. p. 90 *Revera*  
B. foliis scapo duplo longioribus, pedunculis intercalatis patentibus refractis, bracteis lacinia  
lato-lanceolatis, vario colorib[us] pedunculis non duplo longioribus, intercalatis planis <sup>interioribus</sup> levibus  
obtusis, non recurvatis, lacinia levioribus, non rotundatis, non rotundatis, non rotundatis, non rotundatis,  
stamineo clavato. Bas. & lata contigui, interioribus nubibus luteoribus.

Hab. in riparis trachyticis ad Cricenio Stena m. Durmitor (MN) H. ext. vnde H. Mart. Person  
Obs. Specie dubia e speciem delecto nominata et descripta a prof. Panicu. L.C. Non ordi Belus haec  
produc.

- 60-81 - 62

~~82~~ *Oreithragium exscapum* W. K. Vier. f. *dalm.* I. p. 148 adde locum ad grecinorum inter daret circa Trebitzij, et vicin in Bjelagor (Herzeg.) et Cetina (MN) Panth. l.c.p. 24. *Panic.*

~~83~~ *Oreithragium* <sup>albifl. var. glauca</sup> *pyrenaicum* Poen. et Sch. Domoras. in legg. vesp. p. 66. *Panthe* <sup>l.c.p. 24.</sup> *Panic.*

*Oreithragium pulcherrimum* Poen. et Sch. Domoras. in legg. vesp. p. 66. *Panthe* <sup>l.c.p. 24.</sup> *Panic.*

~~84~~ *Oreithragium nasbonense* L. Vis. I. p. 146. adde locum inter reges circa Trebitzij (Herzeg.) Panth. l.c.p. 24. Post adie

*Oreithragium Ricanicum* Domoras.

*O. folia viridi-glaucostib., carna tricarinata tenuis, raceme pyramideo lati-*  
*tiforo, pedunculis floriferis patentibus bracteis amovatis/ cuscum acuminato - rotundato -*  
*subaequalibus, fructiferis bracteis longioribus erectis scapeque adspiciens, venas*  
*hinc phyllis ellipticis 3-7-nervis unicarinalibus obtusis, alterius apice orbiculari-*  
*lis, staminibus perianthio testa parte brachioribus, planioribus ovalibus apice rubi-*  
*lati, ovario ovato apice angustatis.* *interpret. Legit form. Dom. Haenisch.* N. mag. herba  
*stab. in valle ins. Pelješac <sup>l.c.p. 24.</sup> D. abutitur ad Sidiun. N. utrinque 3-5 nrv. viridi-*  
*Descr. Bulbus turricatus simplex (nigroster) ovario arcuatus, basi oblique truncatus*  
*et fibris fibris radicibus fibilis squamis plurimis, crinibus intermixta. Folia*  
*unilaterali tamicia vix alterna inaequales: stylo stamnia tuberculantes, stigmata capitate*  
*Officij. O. nasbonense L. a quo differt. floribus duplo majoribus, et perianthio*  
*phylliis ellipticis-lanceolatis, planis nec margine rugosis involuti, venis striatis*  
*(nec dorsi viridi) sed undique <sup>l.c.p. 24.</sup> levibus, et ovario ovato apice attenuato*  
*nec subcordato, recte aut emarginato. Folia clavis lata in ristretto*  
*corporat cum foliis plantae habentes robustiori.*

~~v. 85~~ Ad *Raphidophora* <sup>albina</sup> Willd. Kf. l.c. I. p. 153 adde locum in herbis ad Savud, et in

gratis alpestribus sub m. Durnjic (MN) Panth. l.c.p. 90 <sup>in grecinorum in Glori grope</sup>  
<sup>Durbinj, et in Vrska dolops m. Crno Planino (MN) Panth. l.c.p. 25 et in m. Pelješac</sup> (Bosniæ fonte)

Ad *Raphidophora* <sup>virginica</sup> Willd. Kf. l.c. I. p. 153 (d. ramosa <sup>L. Kf. l.c. 153</sup>) adde locum in ristretto

m. Glori grope Trebitzij (Herzeg.) et in valle Savina grope Bjelagora et Bjelagora

(Herzeg.) Panth. l.c.p. 25

Ad *Raphidophora* <sup>virginica</sup> Willd. Kf. l.c. I. p. 153 adde locum in herbis

mutuorum in Apus Liburnianum Ried et ad locum

Vrske Panth. l.c.p. 25 <sup>in lacu m. Lestva Egeria rupi</sup>

Ad *Raphidophora* <sup>virginica</sup> Willd. Kf. l.c. I. p. 153 adde locum in lacu m. Lestva Egeria rupi

Vrske Panth. l.c. et in dumetis rupi caeruleis. <sup>Panthe</sup> <sup>l.c.p. 25.</sup> (MN).

Ad *Raphidophora* <sup>virginica</sup> Willd. Kf. l.c. in asperis Pirine forese Mor-Katunica (MN) Panth. l.c. et in lego-  
 si in cava (lego-dolom) et Trebitzij (Herzeg.) Panth. l.c. et in Raphidophora lata L. Tenuiss. vesp. p. 66 in  
 aquilis vegetibus altiorum Belanovaca, Dornitovo, Dobrinje, Vrgoča in ins. Vegla (Dalm.)

Amaryllidaceae R. Br.

Vis. fl. dalm. I. p. 123

- Ad *Lemnium aescinum* L. Vis. fl. dalm. I. p. 126 adde locum <sup>a</sup> Selle nichii  
ad Brod (Bosnia) Scandt.
- Ad *Galanthus nivalis* L. Vis. I. c. adde locum in tybericij ins. Vegl  
(Dalm.) Dact. Cubich in Tommas. veg. Vegl. p. 63.
- Ad *Narciuum posticum* L. Vis. fl. dalm. I. p. 127 adde locum in monte Vlasic  
(Bosnia) Scandt.
- Ad *Narciumpum radiiflorum* Salisb. Vis. I. c. III. p. 128 adde locum in graminis  
is montis Leutor prop. Trebitzje (Herceg) Pauth. ad. p. 26, et in herbitis  
saxosif sub m. Sutormen (M.N.) Panic. el. pl. vasc. p. 89.

Liliaceae DC.

Vis. fl. dalm. I. p. 129.

- Ad *Fritillaria missouriensis* Rafin. Vis. fl. dalm. III. p. 357 adde locum in m.  
Kom, et in Perucica Dol. infra Kom (M.N.) in vegetribus m. Gliwice  
prop. Trebitzje et in m. Istrikobica in Bjelagora (Herceg) Pauth. b.c. p. 23-24.
- Ad *Fritillaria montana* Hoff. Vis. fl. dalm. I. p. 131 adde locum circa  
Cattaro (Dalm.), Seewicke (Herceg) et Rijeka (M.N.) Pauth. b.c. p. 24, in  
saxosif clivi Granica grope Cetinje, et sub Crvena Hijena in m.  
Durmitor (M.N.) Panic. b.c. p. 90, et in ins. Vegl (Dalm.) ad Nallanya Dom.  
Smith. in Tommas. veg. Vegl. p. 64.
- Ad *Lilium Cattaniae* Vis. fl. dalm. supp. p. 64 adde locum in tybericij montis  
Gliwice prop. Trebitzje (Herceg) et in Perucica Dol. infra Kom (M.N.) Pauth.  
I. c. p. 24, et syn. L. Martagon Dalmaticum Malp. in Van Houtte fl. de Terv.  
(\*) XX. p. 121 t. 2128.

- Lilium albanicum* Gris. sp. fl. rum. II. p. 385. Pauth. b.c. p. 24 Panic. el. pl. p. 90  
L. foliis lanceolatis, superioribus acuminatis, margine rotundis, subtilis glabris,  
mediis confertis, flore nutante, perianthio phyllis oblongo-lineariis,  
apice cattallis revolutis, nervis lateribus reflexuosis, anthoris flavis fructu.  
Hab. in partibus alpinis Bjel. Cattaro m. Kom, Sutorma Plavina, et Mali  
Durmitor (M.N.) Pauth. et in gratis montis Tavore (M.N.) Panic. H. Flavi. H. Tomis.  
Ad *Lilium Martagon* L. Vis. fl. Dalm. I. p. 132? adde locum Sutynska usque ad  
Borovica (Bosnia) Scandt., et in demutis ad Grishovo (M.N.) Panic. el. pl. p. 90-12  
non vidi. En idem ac *L. Cattaniae*?
- Ad *Lilium corniculatum* Bernh. Vis. fl. dalm. I. p. 132 adde locum in gratis sub m. Durmitor  
versus jugum Stolac (M.N.) Panic. b.c. p. 90? in monte Vlasic (Bosnia) Scandt. et in demutis  
ad *Julipum syriacum* L. Vis. fl. dalm. I. p. 183 addatur *Julipa Grisebachiana* Pauth. n. sp. in  
Oest. bot. Zeitschr. XXIII n. 9. p. 265 et adnot. p. 23. Hab. in vegetribus montis Gliwice prop. Trebitzje  
(Herceg) H. Mayo. Perenn. — Obs. Perianthio phylla variant dorso viridula, vel unicolora, flava;

*apice omnia pubescentia vel glabra vel extorris tenuum capi pubescens  
caeteris barbatis; folia latiuscula vel angusta. Hinc species T. Sisymbriana?*

*Pautk. infirmis characteribus non distinguenda.*

Ad *Allium saxatile* L. Vis. fl. Dalm. I. p. 133 adde locum in saxonis sub monte Lok,  
cum Vitika Tastrebiec, Bicla Gora et ad Merenos Do reb m. Kom (M.N.) Panc.  
Ad *Allium falcatum* Schult. Vis. I. c. p. 134 adde locum ins. Veglia ad Besamova at  
circa Panighie (Dalm.) Tomas. I. c. p. 64.

Ad *Allium roseum* L. Vis. I. c. p. 133 in graminaria circa Rugosa et gravosa (Dalm.)  
et ad Drebinje, Podgora Pridvorice (Herceg.) Pautk. I. c. p. 24, et ad sopu et invaltu  
circa Dobroje Veglia, Cagnicchio, Campi in ins. Veglia (Dalm.) Tomas. I. c. p. 64.

Ad *Allium neapolitanum* Cyp. Vis. fl. Dalm. I. p. 135 adde locum in graminaria et in  
horto publico circa Zera (Dalm.) Pautk. I. c. p. 24.

Ad *Allium nigrum* L. Vis. fl. Dalm. I. p. 137 adde locum in saxonis ad Ostrog  
et inter vineas ad Klopot dist. Bratonačići (M.N.) Panc. I. c. p. 91.

Ad *Allium pulchellum* Don. Vis. fl. Dalm. Suppl. p. 33. adde locum in saxonis m.  
Savore (M.N.) Pautk. I. c. p. 92. et syn. A. carinatum p. capitiferum Koch  
syn. fl. germ. II. p. 832.

Ad *Allium pallens* Schlecht. et Sm. non L. praeponere nomen A. paniculati L.  
Iff. fl. p. 128 et adde locum in saxonis circa Sindžon (M.N.) Pautk. I. c. p. 24,  
et in herbitis agricis ins. Veglia (Dalm.) circa Besamova et večerin, Mr.  
organ. Tomas. veg. di Veglia p. 65.

Ad *Allium flavum* L. Vis. fl. Dalm. I. p. 138 adde locum in saxonis circa Lek-  
lin et Stavnik (M.N.) Pautk. I. c. p. 24; in repertibus montis Sutorman  
(M.N.) Panc. I. c. p. 92.

Ad *Allium Portorum* L. Vis. fl. Dalm. p. 140 et suppl. p. 33. adde locum in cultis ins. Veglia et  
ad Besca (Dalm.) Tomas. I. c. p. 64.

Ad *Allium Angeloprasum* L. Vis. fl. Dalm. I. p. 141 adde locum inter vineas ad Klopot  
dist. Bratonačići (M.N.) Panc. I. c. ad non vidi.

Ad *Allium sphacelophyllum* L. Vis. fl. Dalm. I. c. adde locum circa Cetina ad pedem  
montis Vermac (Dalm.) et circa Cervo, Regani, Bioč, Krapavica, Lukovo, Sjever  
(M.N.) Pautk. I. c. et ad Cagnicchio Cancione Veglia, Plavnik, Besca vraka ins.  
Veglia (Dalm.) Tomas. I. c. p. 64, et inter Travnik et Scopia (Bosnia) Sandren.

Ad *Allium margaritaceum* Schlecht. et Sm. Vis. I. c. adde locum in saxonis ad Cetinje  
(flore rosco) (M.N.) Panc. I. c.

Ad *Allium fistulosum* Waldst. et Kit. Vis. I. c. p. 159. adde locum in repertibus Cetinje et ins.  
pro Gostovo (M.N.) Panc. I. c. ad non vidi.

Post. *Allium intermedium* Lour. adde

*Allium olusatrum* L. sp. fl. p. 429. Hoff fl. austri I. p. 422.

*A. caerulea* Terci ad medium folios, folij linearibus canaliculatis scabridis, subtilis striatis, sparsae  
bulbibus velutina longissima umbella effusa bulbifera longioribus, pedunculis non  
aequalibus, subtentibus pendulisque, perianthii angustiati, hyalis elliptico-oblongis  
obtusis genitalia inclusa aequalibus.

- Syn. *Codonophragma leucocarpum* Rehd. f. ex. p. 144.  
 Icon. Rehd. il. genn. tab. CCCCLXXXVII fig. 1067. Sm. engl. bot. t. 488. Hall. de Alt. n. 26 f. 2  
 Hab. in dumetis et silvulis Besan virens m. Triskavac in ins. Veglia (Dalm.) Domenas. veg.  
 Veg. p. 61. fl. aestate. Hallo-virens, vel cordata umbell. fl. aestate. Peregr.  
 - *B. complanatum* Fries nov. ed. II p. 85. Pantk. l.c. p. 24: foliis tres linearibus latibus planis  
 - Icon. Hall. de Alt. n. 26 f. 2. fig. dextr. - Hab. in partibus ad Ribbie Tegro prope  
 pagum Kovice in præ monte Mali Duvnitor (MN) Pantk.  
*Allium carinatum* L. sp. pl. p. 428. Host fl. austri. p. 22. Rehd. il. genn. n. p. 20  
Domenas. veg. Veg. p. 61  
 a. caule tereti ad medium foliis. foliis linearibus canaliculatis laciniis apice  
 planis, 3-5 striatis, petioles levibus peristylis valva altera longissima,  
 umbella effusa longioribus pedunculis mutatibus pendulisque, perianthii  
 angustissimi phyllis oblongis apice concavis obtusis.  
 Syn. *Codonophragma carinatum* Rehd. f. ex. p. 144. *Allium flexuum* W. Kit. II p. 30  
 a. flexuorum Host fl. austri. I. p. 422  
*Glossa Rehd. fl. genn. X. tab. CCCCLXXXVII fig. 1057. W. et Kit. t. III tab. 228.*  
 Hab. in dumetis et silvulis ad Besan virens et in m. Triskavac ins. Veglia (Dalm.)  
Domenas. fl. aestate. fl. violacei. Peregr. Non vidi.  
 Ad *Silium autumnale* L. Vis. f. c. p. 142. additum in saxonij distr. Cucu, et  
 in campis circa Grakovo (MN) Panic. l.c. p. 91, et in ins. Veglia ad Capriccio  
 (Dalm.) Domenas. l.c. p. 91  
 Ad *Silium bifolium* L. Vis. fl. dalm. I. p. 143 additum Veglia et Capriccio in ins. Veglia  
 (Dalm.) Domenas. l.c. p. 91, in dumetis ad Cettinje (MN) Pantk. l.c. p. 91, et a Butka  
 usqua ad Dravnik, et in m. Vlastich super Bresch, in Malisandik et alibi (Bosnia) Kit.  
 Ad *Silium portentum* W. et Kit. Vis. fl. dalm. I. p. 143 additum ~~Veglia~~ <sup>saxonij</sup> in  
 montibus ~~L.~~ Glossa prope Trebinje, et in Tastrebecia ad Bielagora  
 (Herzeg.) Pantk. l.c. et inter Lastva et Ostrogo per totum distrit. Cebelic  
 et Cucu (MN) Panic. l.c.  
 Ad *Ornithogalum umbellatum* L. Vis. fl. dalm. I. p. 145 additum in gramineis  
 ijs montibus Leutori prope Trebinje et circa Dubovac in Bielagora (Herzeg.)  
 ad Cettinje et super Boljericie distr. Crmnica (MN) Panic. l.c. p. 91. in  
 Guerigora et ad Varech et Samishovac (Bosnia) Tendr.; etiam ad Dobrovic,  
 Besanovac et Ostropotno in ins. Veglia (Dalm.) Domenas. l.c. p. 91. Additum  
*Ornithogalum rubrenicum* Bouché in Kreuth ex. pl. IV p. 363, fide  
Panic. et. pl. var. p. 91  
 B. foliis scapo multifloris duglo linearibus, pedunculis inequalities, petio-  
 lis reflexis, bracteis linearibus linearibus linearibus, pedunculo non florido  
 duglo linearibus, petiolis et phyllis inequalities, interioribus paucitatis  
 linearibus obtusis, aculeatis callosa terminatis, terminalium filamentis  
 brevi dilatata contingens, interioris multo latioribus.  
 Hab. in asperis hachtingis sub Crvena Stijena m. Duvnitor (MN) fl. ex. p. 20  
 H. Mast. Peregr.

O. Specie dubia e specimine defflorato nominate et descripto a Dr. J. P. G.  
Panic. Bulbus non prolifer. Non vidi.

A) Ornithogalum comosum L. Vis. fl. de lbn. T. p. 146 ad locum inter rive-  
mibus Cassione, Valle di Bona, T. Maria di Cosa et m. Organi in insula  
Veglia (Dalm.) Tommasi. T. c. p. 164 — add.

Ornithogalum divergens Borbas not. 36 n. 3. et fl. centro. ed. II. p. 509.  
Gren. et Godr. fl. de Fr. III. p. 190. Panth. add. p. 24.

O. foliis linearibus rectis canaliculatis, linea alba longititudinale utatibus  
scapo multifloro subaequalibus, pedunculis inaequalibus poteris  
bifurcatis, post anthesis reflexis, bracteis lanceolatae lineariibus an-  
nulatis, pedunculo basi linearibus, terminali filamentis subulatis,  
Hab. circa lava at Tagus (Dalm.) Trebisje et Killeki in prati  
valley Medou imper. Rastrebica et in m. Saptinia (Herczeg.), cir-  
ca Tavolteia in m. Cava Plavina in parco monte Kom et Mala Kurni-  
za (M. N.) Pauli K., H. ext. virga recta albi. H. vers. Person.

B) Ornithogalum excepum L. Vis. fl. de lbn. T. p. 145 add.  
fonte H. Ad. Ornithogalum excepum L. Vis. fl. Dalm. I. p. 145 exil. syn. O. excepum  
ad. Ornithogalum pyrenaicum L. Vis. fl. Dalm. I. p. 352 ad locum in gynniesis<sup>White</sup>  
inter dumenta circa Trebisje et Uricia in Bilegora (Herczeg.) et Cetinje  
(M. N.) Panth. I. c. p. 24; in dumenti sub m. Sutorman vallis Crnoica (M. N.)  
Pant. c. fl. vase. p. 91. Huc quaque dico O. sulphureum Roem. et Sch. 19th. veg. VII  
p. 519 Tommasi. in veg. Veg. p. 61 (Dalm.) in longi ejundem insulae Veglia, Besca-  
nove, Plavnik, Bosnib, Rastrebica et scopulis T. Mariae. Crassit quaque ad Genissi  
et Zminica (Bosnia) Senjtu, nec differt ab O. pyrenaicum L.

B) Ornithogalum nelsonense L. Vis. I. c. p. 146 ad locum inter reges rive Trebi-  
nje (Herczeg.) Panth. I. c. p. 24. Post add.

Ornithogalum Vipanicum Tommasi.

O. foliis glaucis levibus immixtis canaliculatis late linearibus, va-  
cimo pyramidali multifloro, pedunculis floriferis patentibus bracte-  
ovata scaphi acuminate - clavata subaequalibus, fructu perig  
bracte linearibus erectis scapoque ad grossis, perianthio phyllis ellipti-  
cis 3-4 mm. unicoloribus obliquis, alterius apice crassi apiculis, 1/2  
mm. perianthio testa parte brachioribus, filamentis ovalis apice  
subulatis, ovario ovoide apice angustata.

Hab. in cultis int. Pelagonia que Dalmatum et Sicilium interjacet. Flores  
altissimis virgente, varieg. viridulis. H. Maj. Junio. Person. Legit  
dom. Haenisch, communicebat cl. Soc. Mat. Tommasi.

Deser. Bulbus tuniciatus simplex (ne prolifer) ovatus acuminatus, basi obtusa  
que truncatus et fibillatus, fibris radiis libus filiformibus plurimis, evanis  
ribus intermixtis. Folia unicolora. Stamina vid alterne inaequale in 2  
stylos laticepholis subaequalis. Stigma capitatum. Affinis O. nelsonense.

*Z.* a quo differt floribus duplo majoribus, et perianthii phyllis ellipticis co-lineariibus, planis ne margine sursum involutis, unicoloribus (nec dorso viridulis) sed undique citriniis, et ovario ovoide, apice attenuato (nec subrotundo), retro ales emarginato. Polia etiam latiora in rostris, quod consonat cum totius plantae habitu robustiore.

Ad *Gagea arvensis* Schult. Vis. fl. Dalm. I. p. 147 adde locum in agri circa Trebinje et in monte Drala prope Pridvorca (Herceg) Pantk. I. c. p. 23 — addatur *Gagea lutea* Roem. et Schult. syst. veg. 2. p. 138. Achb. fl. ex. p. 108 Pantk. Ann. p. 23.

*G. bulbo ovoide, folio radicali unico linear-lanceolato plano, bracteis geminis suboppositis ciliatis, pedunculis glabris, perianthii phyllis oblongis obtusis.*  
Syn. *Ovithogalum luteum* L. sp. pl. p. 439. Hart fl. austri. I. p. 429.  
Icon. Achb. fl. germ. X. tab. CCCXXVII fig. 104t. Sm. engl. bot. t. 21.  
Hab. in sylvestris佩西維亞 Dol iuxta m. Kom (M.N.) Pantk. et a Butkovizza ad Travnik et in monte Vlasich (Bosnia) Sandtr.

Ad *Melampyrum botrysoides* Mill. Vis. fl. Dalm. I. p. 149 adde locum in saxonis graminosis m. Sastrebića in Biograd (Herceg) et in m. Kom (M.N.) Pantk. I. c. p. 24 et a Butkovizza ad Travnik et in m. Vlasich (Bosnia) Sandtr.; in sylvestribus m. Sutorman (M.N.) Sutorman Pantk. I. c. p. 92.

Ad *M. racemosum* Mill. Vis. I. c. adde locum in agri et graminosis circa Trebinje et Bileći (Herceg), et in cultis et vineis ad Bescanova, Dobrinje, Veglia (Dalm.) Tommas. I. c. p. 65.

Ad *M. comosum* Mill. Vis. I. c. adde locum in agri circa Raguza (Dalm.) ad Trebinje et Bileći (Herceg) et Lettinga (M.N.) Pantk. I. c. et in herbis sub monte Loučen (M.N.) Pantk. I. c. p. 92. Syn. *Leopoldia cornosa* Parlak. Pl. galerm. I. p. 263. — Ad *M. neglectum* Guss. in Tenuor. fl. nap. 148. opp. V. p. 13, et syn. fl. II. c. p. 411. Pantk. I. c. p. 24.

*M. foliis linearibus canaliculatis, dentibus laxis scapoem subaequantibus, racemo brevi decipitato, floribus pedunculatis nutantibus, superioribus neutris erecto-patentibus, perianthio oblongo, dentibus obtusis recurvis.*

Syn. *Botryanthus neglectus* Kunth en. pl. IV. p. 609. Parlak. fl. Ital. II. p. 502. Hab. in graminosis circa Trebinje ne flumen Trebinjista (Herceg) Pantk. I. c. H. saturate corculi. H. vere. Perenn. — Obs. *M. moschatum* W. etatius a Sandtr. in ejusdem Catalogo plantarum Bosniacarum sub n. 1228 utpote lectum a Czerny supra Kolasciu ad Sutorman, sed best in herbario his in Museo monachensi servato.

Ad *Antherium Liliago* L. Vis. fl. Dalm. I. p. 151 adde locum in lapidosis m. Glina prope Trebinje (Herceg) Pantk. I. c. et in pratis ad Maljenko in ins. Veglia (Dalm.) Tommas. I. c.

- Ad *Anthoxanthum ramosum* L. Vis. fl. dalm. l.c. adde locum in collibus sylvestris  
ad Veglia, Capriccio, Castelnuofchio (Dalm.) Domino veg. Vegl. p. 64; in Lapidis  
monte Glava prope Trebinje (Herceg.), et iisdem locis Vicia Govna dictis prope  
Gvozd Han (M.N.) Pantk. l.c. p. 25 et supra Kostjaga ad Koprivnica (Bosnia) Sendtn.
- Ad *Asphodelum album* Mill. Vis. fl. dalm. t.p. 153 adde locum in herbis ad Gvozd, et  
in pratis alpestribus sub m. Durmitor (M.N.) Panić l.c. p. 90, in graminosis  
m. Glava prope Trebinje (Herceg.), et in Vraca Dol infra montem Crna Planina  
(M.N.) Pantk. l.c. p. 25, et in monte Prolog (Bosnia) Sendtn.
- Ad *A. microcarpum* Vittian. Vis. fl. dalm. sept. p. 36 (A. ramosum L. Vis. fl. dalm. t.p. 153)  
adde locum in saxonis m. Glava prope Trebinje, et in valle Tazino prope  
Orshovac in Bjelagora (Herceg.) Pantk. l.c. p. 25.
- Ad *A. fistulosum* L. Vis. fl. dalm. t.p. 153. adde locum in herbis circa Ragusa (Dalm.)  
et ad Trebinje (Herceg.) Pantk. l.c.
- Ad *Asphodelineum creticum* L. Vis. l.c. nunc nomen in Asph. liburnicum Rabb.  
et adde locum in saxonis m. Lastva Čevska super Voinici Pantk. l.c. (M.N.)  
et in dumetis supra coenotium Ostrog (M.N.) Panić l.c. p. 90.
- Ad *Asphodelineum luteum* Rabb. Vis. l.c. adde locum in asperis Piscine Strane distri.  
Katenika (M.N.) Panić l.c., et in Lapidis uria Ragusa (Dalm.) et Trebinje (Herceg.)  
Pantk. l.c., et sub Asphodelo lutes L. Domino veg. Vegl. v. 64. in aperiis rupes tribus  
collibus Bescanov, Corvibo, Dobrinje, Veglia in inf. Veglia (Dalm.).
- Ad *Erythronium* Dens canis L. Vis. fl. dalm. t.p. 154 adde locum in sylvestris m. Trst.  
bica in Bjelagora (Herceg.) Pantk. l.c. p. 23, et a Gradacach usque ad Srebrenic  
(Bosnia) Sendtn.

### Colchicaceae DC.

Vis. fl. dalm. t.p. 155

- Ad *Veratrum album* L. Vis. fl. dalm. l.c. adde locum in pratis montis Leutor prope  
Trebinje, in Medov Dol circa Begova Korita infra m. Iastrebice, et eisdem et in  
valle Radus Brodo in Bjelagora (Herceg.), in Vraca Dol et in m. Crna Planina,  
in pratis m. Kom, Smijavica Planina in Mali Durmitor, et in pratis Lastva  
Čevska dictis supra Voinici (M.N.) Pantk. l.c. p. 23; in pratis pinguisibus sub monte  
Durmitor (M.N.) Panić. ~~et fl. p. 92;~~ ab Ousino supra Kostjaka Turia Berg Podcelova,  
et Travnik ad Butkovica et altibi (Bosnia) Sendtn. Huic adde Var. B. lob.  
leuca Koch syn. H. gem. II. p. 836 floribus dilute viridis obsoletius venosus. — Syn.  
V. lobelianum Bernh. in Transvers. journ. Vol. 16. p. 200. Rabb. fl. exc. p. 97 — Iran  
Rabb. t.c. germ. x. tab. CCCXXII f. 338 — Hab. a Borovica supra montem Ponikica  
ad Vareček et a Mari Sandik ad supra Baklavu in m. Vojnić (Bosnia) Sendtn.
- Ad *Veratrum nigrum* L. Vis. l.c. adde locum in pratis m. Lastva Čevska dictis supra Voinici  
(M.N.) Pantk. l.c. et in herbis ac saxonis in Niškička Zupa (M.N.) Panić. l.c. et  
a Begir-Beg-Konak ad Sušica (Bosnia) Sendtn.
- Ad *Colchicum* sp. Vis. l.c. p. 156 adde

*Colchicum autumnale* L. f. pl. f. 485. Host fl. austriac. p. 403. Rabb. fl. exc. p. 98.

*C. folij hysteranthis late lanceolatis utrinque attenuatis, perianthii limbo tubo uno molte brisorio, lacinia modulata nervosis lanceolatis unicoriatis*

Icon. Rchb. ii. p. 63. tab. CCCXXVI. fig. 949. Syn. engl. bot. t. 133. Stevns deutsc. fl. n. 3.  
Gastru. de fr. et em. I. tab. 18. Panck. i.e., et ad Vranduk prope Sebesch (Bosnia) Sendlr.

Hab. in pratinis sub monte Durmitor (MN). H. autumn. H. vix. Perenne.

Obs. In asperg. et agric. (MN) vixit alia forma capitulo basi oblongo profunde umbonata, sive Panck. i.e. Holsteinum non vidit.

Ad *Colechium montanum* L. (*Colechium Berolinense* Stevns. fl. dalm. p. 156), et typ. p. 36) ade locum in saxo ad pedem m. Glava prope Trebinje (Herzeg.) Panck. i.e. ade *Colechium Kochii* Pustat. fl. ital. III. p. 188. Tommas. veg. Vegl. p. 65.

*C. folij hysteranthis lanceolato-linearibus utrinque attenuatis canaliculatis viridis*  
bus, perianthii limbo tubo uno subtus brisorio, lacinia angusta linearis-lanceo-  
lati recte nervosis, unicoriatis parollo minoribus, stylis apice incurvis.

Syn. *C. arcanarium* Koch. syn. H. germ. II. p. 836 non Walost. et Hilt.

Hab. in locis herbis T. Mariae i. Capo, et in scopulis T. Matre et Petrichio ins.  
Veglio (Dalm.) Tommas. t. c. H. 521c. H. Oct. Noventri. Perenne.

Obs. Ab hoc differt *C. arcanarium* W. et Kit. floribus majoribus, lacinia perianthii  
lateralibus oblongo-lanceolatis apice oblique dilatatis, stylis rectis. Tuber que  
que ex viridi abscent.

### Smilacaceae R Br.

Vis. fl. dalm. I. p. 158.

Ad *Pavidium quadrifolium* L. Vis. fl. dalm. I. p. 159 ade locum in sylvestribus  
et in Virusa Dol infre montea Cerna Planina (MN.) Panck. i.e. p. 25,  
et in summitate Mali Sandick (Bosnia) Sendlr. et icon. Rchb. i. germ. tab. 430.

Ad *Aquilegia aculeata* L. Vis. fl. dalm. I. p. 159 ade locum in saxo et in dampno  
ad pedem m. Virsa prope Cattaro (Dalm.), circa Trebinje, Nedevicelle, Grmica  
revo (Herzeg.), et Rijeka, Manastir Duga, et Poje (MN.) Panck. i.e.; in saxo  
ad Ostroj et neas Grahovo (MN.) Panck. i.e. p. 90; in nemoriai rupi Borniho, Mr.  
Trskava, Capriccio, T. Elena, Cangji in ins. Veglio (Dalm.) Tommas. t. c. p. 64, et  
ad Vranduk prope Sebesch (Bosnia) Sendlr. Dalm. <sup>tab. 431</sup>

Ad *Aspergillum tenuipolium* Lam. Vis. fl. dalm. II. p. 321 ade locum in sylvestribus  
Nitska Kapo (MN.) Panck. i.e. p. 89, in umbrosi circa Skodjevo in Bielogom  
(Herzeg.) Panck. i.e. et in sylvestribus herbis m. Trskava, Bescaus, Veglio in ins.  
Veglio (Dalm.) Tommas. t. c. p. 63 et icon. germ. tab. DIXIX p. 9691

Ad *Aspergillum nobilium* Brign. Vis. fl. dalm. I. p. 161 ade locum in solo salso aquiloto ad  
Capriola, et Val Salina ins. Veglio <sup>Dalm.</sup> Tommas. t. c. et sub fl. marina Clus. Rchb.  
fl. aust. p. 118 et ic. germ. p. 970; et in liquido m. Glava et Draca prope Trebinje et  
circa Bileki (Herzeg.) Panck. i.e. p. 25.

Ad *Aspergillum antifolium* L. Vis. fl. dalm. I. p. 161 ade locum in dampno circa Trebinje  
et Bileki (Herzeg.) et Rijeka (MN.) Panck. i.e., in saxo ad Letnje, Ostroj, Danilo Grad,  
et Vir (MN.) Panck. i.e.; in dampno et aqua ad Veglio, Borniho, Capriola, T. Maria  
di Capo ins. Veglio (Dalm.) Tommas. t. c. et icon. Rchb. i. germ. X. tab. DXX p. 972. Ex aqua detra-  
hente praestat in acetariis.

> Ad *Aspergillum officinale* L. Vis. fl. dalm. I. p. 160 ade locum in ins. Veglio (Dalm.) R. M. Smith, et in ins. Veglio  
(Dalm.) fort. statio.

Ad *Smilacem asperam* L. Vis. l.c. p. 161 adde locum in sybericis calidioribus  
ad Veglie, Caprius et Cappadocia ins. Veglie (Dalm.) Tommas. l.c. p. 65,  
et in saxonis ad vis. dict. Comitice (MN) Pani. l.c. p. 90, et adde locum  
in germ X tab. CCCXVIII fig. 920.

Ad *Cornuallarium majale* L. Vis. fl. dalm. I. p. 162. adde locum in sybericis montibus  
Glier prope Trebinje (Herzeg.) et in Perucica Dots infra Kom (MN) Panth. l.c.  
f. 921; in sybericis m. Durmitor usque m. Stolac (MN) Pani. l.c. p. 89, et in  
monte Vlasich (Bosnia) Sentn.

Ad *Cornuallarium Polygonatum* L. Vis. l.c. p. 162 adde locum in Perucica Dots  
infra Kom (MN) Panth. l.c. sed locis erroneous ex noct. in litt., et circa Bosna  
vizgo (Bosnia) Sentn. adde Rich. l.c. germ X tab. CCCXXXVII fig. 964.

Ad *Cornuallarium multiflorum* L. Vis. l.c. adde locum in sybericis m. Glava  
prope Trebinje (Herzeg.) et a Borovica super montem Ponikva ad Varesch  
(Bosnia) Sentn. adde queque Rich. non germ X tab. CCCXXXIII f. 962—Addatur  
*Cornuallaria vestita* L. sp. pl. p. 481. Host fl. austriac. p. 440. Rich. fl. exc. p. 100  
C. caule erecto angulato, foliis verticillatis linear-lanceolatis planis, glauco-argenteis  
sub cylindricis.

Icon. Rich. l.c. germ X tab. CCCXXXV fig. 966. In engl. bot. t. 128. Ord. fl. Dan. t. 86.

Hab. in pratis valle Perucica infra Kom et in Strujavina Planina (MN) Panth.; in  
sybericis m. Durmitor (MN) Pani.; et a Borovica super m. Ponikva ad Varesch  
et a Malo Sandic ad Baklari super Vlasich (Bosnia) Sentn. Flores albiti  
et vindicti. Fl. Mayo. Perven.

### Dioscoreaceae R. Br.

Vis. fl. dalm. I. p. 163.

Ad *Zannum communum* L. Vis. fl. dalm. I. p. 164. adde locum ad sepius circa  
Ragusa (Dalm.), et Trebinje et Bileki (Herzeg.) Panth. adn. p. 25; in demetia  
ad Obrug, et ad coenobium S. Stephani valle Moraca superioris Pani. (MN) Pani.  
et p. 90; et circa Vlasich et a Baklari (Bosnia) Sentn.; et ad sepius ins. Veglie  
vix Borvito, m. Trskaval, Caprius, S. Elena, Campi (Dalm.) Tommas. l.c. p. 64.

### Orehidaceae Linn.

Vis. fl. dalm. I. p. 164 et III. p. 352 et suppl. p. 57

Ad *Platantheram bifolia* Rich. nom. de Mus. Hist. nat. IV. p. 29. Vis. fl. dalm. I. p.  
165 adde loco a Gravnik ad Zenica, a Varesch et Savinj ad Samischowanken  
ad Sutynska et Borovica (Bosnia) Sentn. et icon. Rich. fl. i. germ. XIII-IV tab.  
CCCXXIX, et adde quidem Vara et a Ponikva et ad locum in graminosis m.  
Glava prope Trebinje (Herzeg.) Panth. l.c. p. 28; ad loca umbrosa Paperdas et Garica  
et. Veglie (Dalm.) Tommas. l.c. p. 62; et ad Ebenzelin et Borovica (Bosnia)  
Sentn. adde Rich. fl. i. germ. XIII-IV tab. CCCXXX f. 53 sub Plemoniana. Rich. fl.

Ad *Orchides tuberosa* indensis praedita Vis. fl. dalm. I. p. 166-181 adde

Ad *Orchidem Mario* L. Vis. fl. dalm. l.c. adde locum in pratis m. Glava prope Trebinje

Syn. *Nigritella globosa* Reichenb. f. ex. p. 121.

Hab. in prati valley Radas Broto in Bjelagora (Herzeg) *Panth.* in Viroj Dol  
inter Cava Planina et in *Uvala* *Panth.* et in *Viroj Dol* infra monte Cava Planina (M.N.)  
et circa Bileka (Herzeg) et in *Viroj Dol* infra monte Cava Planina (M.N.)

*Panth.* l.c. p. 26, et in ins. Veglia ad S. Elena et Bosco Giemicello (Dalm.)

*Dominus.* l.c. p. 62; a *Gradischke* ad *Trubnik*, ad *Passinkonak* su  
per *Sandvik*, *Sebsche Lubina*, et ad *Vranduk*, ad *Ebenbach* et in *Borovič  
ja* (Bosnia) *Sendtn.* Huic subspicatur *Orchis Morio* Var. *picta* cum syn.  
*O. picta* Lois. in prati rupis Dobrija, *Rastopatne* ins. *Veglia* (Dalm.)

*Dominus.* l.c. p. 62. - Dein addat

Orchis *Spitzelii* Saent. p. 40 ex Reichenb. f. ex. germ XIII-XIV pag. 183. Koch  
ed. 1866. Part. fl. ital. III p. 508.

O. labello trilobato subciliatum pendulo, lobis latip. excavatis, medio emarginata  
calcare conico-cylindraceo, verticaliter descendente ovario paucis brachis  
re, perianthii phyllis obtusis, laterilibus patentibus, intinuis distibus  
et truncatis emarginatis, bracteis unicoloribus amineoribus, ovarium  
sequentiis, foliis oblongo-ovatis obtusis.

Hab. Reichenb. f. ex. germ. <sup>XIII-IV</sup> pag. XXXIII fig. 1-2.

Hab. a *Gradischke* supra *Gradischke* et *Bojela* ad *Trubnik*, et in monte *Vlastich*  
et supra *Baklari* (Bosnia) *Sendtn.* H. *geopurpurei*. H. *Tun.* *Peregr.*

Bis. Ad plantam in monte *Vlastich* ledam referenda est var. *Sendtn.* Reichenb. f. ex. l.c. calo  
re granulata, labello basi punctata via differvens. - Post hanc

*Brachys pallens* L. mant. pl. p. 292. Hassk. fl. austri. II p. 526. Reichenb. f. ex. p. 122

O. labello leviter trilobato subintegro basi holosticho, lobis laterilibus rotundatis  
radius maiore, calice cylindrico horizontali vel ascendente ovario  
subaequante, perianthii phyllis onto-oblongis atro-purp., tribus interioribus sub  
acutilibus conniventer, laterilibus demum reflexis, bracteis unicoloribus  
ovario desquamatis, foliis oblongo-lanceolatis obtusis.

Syn. Reichenb. f. ex. germ. XIII-IV tab. CCCXXXVI. Cast. bot. mag. tab. 256q (ab O. *ulgharensis*)  
Targ. fl. austri. I. tab. 45. Segu. fl. veron. III. tab. 8 f. 3.

Hab. in *Gradischke* supra *Gradischke* ad *Trubnik* (Bosnia) *Sendtn.* H. *pallidiflava*  
ad *Orchidem provincialem* Batt. Vis. fl. dalm. I. p. 161 adde loca in *Tarolje* circa *Papuka* (Dalm.)  
H. *Majus* *Peregr.* in *Uvala*, *Cekovica* et *Drava* prope *Drebinja* (Herzeg). *Panth.* l.c. p. 27 ad *Veglia*, S. *Maj  
sia di Capo*, *Dobrija* et *Bosco Giemicello* in ins. *Veglia* (Dalm.) *Dominus.* l.c. cum *Variegata*  
Gris.

Ad *Orchidem provincialem* Batt. Vis. fl. dalm. III p. 352 adde locum in prati *Peregrino* *Dol* infra  
Kose (M.N.) *Panth.* l.c.; a *Passinkonak* supra *Sandvik*, *Sebsche Lubina*, *Dobrija* prope  
prope *Vranduk*, et in *Borovičja* (Bosnia) *Sendtn.*; et in Var. p. 3 speciem Koch Vis. fl.  
dalm. I. c. in m. *Vlastich* supra *Baklari* (Bosnia) *Sendtn.*, et in prati montis *Lector* prope  
*Drebinja* (Herzeg.) *Panth.* l.c.

Ad *Orchidem laxiflorum* Lam. Vis. fl. dalm. I. p. 167. adde locum in prati turforum circa *Kodjegor* in  
*Bjelagora* (Herzeg) *Panth.* l.c. et in prati paludosis ad *Capriccio*, *Vale Di Belca*, *Dobrija*, ins. *Veglia* (Dalm.)

*Tomas*. l.c. p. 62.

Ad *Ostium rubrum* Jacq. Vis. fl. dalm. I. p. 169 substitutus nomen antiquum *O. positionae*  
L. sp. pl. p. 1351, et ad loca Maria di Lago ins. Veglia (Dalm.) *Tomas*. l.c. p. 62, et  
locis raro clivis Graiae prope Cetinje (M.N.) *Pani*. l.c. p. 88.

Ad *Orchidem variegatum* All. Vis. fl. dalm. I. p. 169 primitus nomen anterior *B. trianae*  
totae sup. fl. conv. II. p. 199, et ad loca Dobrinje, Rastovacu, Permanova in ins. Veglia  
(Dalm.) *Tomas*. l.c. et ad *Draznik* ad *Bukovica* et ad *Guciagovo* (Bosnia) *Sentn.*  
Ad *Orchidem fasciam* Jacq. Vis. l.c. p. 169 ad de locum *Srebenik* ad *Fusta*, ab  
Bosino super Kieljak, Duria, Podolovo et ad *Passin Konak*, a *Travnik* ad  
*Bukovica* et *Cerkeva* (Bosnia) *Sentn.* Primitus nomen *O. purpurea*  
Huds. fl. angl. ed. I. p. 334 (1762) ob prioritatem.

Ad *Orchidem Flavos* Tratt. Vis. fl. dalm. l.c. p. 168 praeponere nomen anterior  
*O. quadruplicatae* Cx. in *Tenore*, prodri. fl. neap. p. 6111 et excl. syn. *O. quadruplicatae*  
Ad *Orchidem Simianum* Lam. Vis. l.c. p. 180 ad de locum in prati *igloboating* <sup>Biv.</sup>  
*Bosio* *Komicello* in ins. Veglia (Dalm.) *Tomas*. l.c. p. 62 (nob. *O. lychnantha*)  
Addatur: *Orchis tectorum* Link in Schrad. Journ. bot. II. p. 233. Rehd. f. ic. germ. XXIII-IV  
p. 33. *Pantk.* Adr. p. 26. *Pantk.* fl. tab. III. p. 479.

*O. labellae* tripartita, <sup>lacinia</sup> ~~labellae~~ lateribus abbreviatis anguste linearibus, media plus  
duglo majore bifida lobis anguste linearibus medo interjecto angustissimo  
calice linearis apice submarginato pendulo subincavo ovarium dimidium  
subquadratum, perianthii phyllis conniventibus, exterioribus distinctis, interioribus  
obtusis minoribus uncinosis venosis, bracteis uncinosis venosis ovario plus diglo-  
brerioribus, foliis oblongo-lanceolatis.

Syn. *Orchis tectorum* Link in Schrad. Journ. bot. II. p. 309 (non Vill.) *O. undulatifolia* Bivon. sic.  
fl. cent. II. p. 124. Rehd. f. ic. germ. p. 124.

Non. Rehd. fid. ic. germ. XIII-XIV tab. CCCLXXV. Sibth. et Sm. fl. gr. X. tab. 927. Biv. l.c. p. 6.  
Hab. in graminis in silva prope Trebinje (Herzeg) *Pantk.* Specia ovata densa. H. vio-  
lacea. H. vire. Prenn.

Ad *Orchidem coriophoroides* L. Vis. fl. dalm. I. p. 170 addatur locus in prati *Kemicija*  
circa Skadrigra in Bjelajom, et circa pagum Kovice infra Malo Darmitor (M.N.)  
*Pantk.* l.c. p. 26; in prati Garice et *Laperda* in ins. Veglia (Dalm.) *Tomas*. l.c. p. 62,  
et circa *Travnik* (Bosnia) *Sentn.*

Ad *Orchidem restitulatum* L. Vis. fl. dalm. l.c. p. 181 addetur locum in prati *Rumica* dol. infra Kom.  
(M.N.) *Pantk.* l.c. Addatur.

*Orchis cyathosa* L. sp. p. 1332. Hort. fl. austri. II. p. 525. *Pantk.* l.c. p. 26

*O. labellae* <sup>lacinia</sup> ~~labellae~~ lacinia oblonga, media latiore truncata-emarginata, unicolor interjecta, calice  
re subcylindrica subincava dependente ovario non subtroplo briora, perianthii phyllis campa-  
nulato - conniventibus evanescens cuspidi spathulata terminali, bracteis uncinosis ovario sublongioribus foliis  
uncinatis.

Syn. *Nigritella globosa* Rehd. fl. et sp. p. 125.

*Ion.-Rehd. fl. ic. germ. XIII-IV tab. CCCXXXI. Drog. fl. austri III tab. 266.*  
fl. helv. ic. tab. XXXII fig. sinist.

Hab. in gratic vally Raus Broto in Bjelovara (Herzeg) Panth. in Virujs Dol  
infra Cerna Planina et in Ponicea Dol et Tara Dol infra Korn (M.N.) Panth.  
et in Bosnia Sredna cat. 1328. Fl. purpurei, labello punctata. H. aestate Ponicea.

Obl. specie compacta globosa aut breviter cylindracea.

Ad Orchideas pyramidalem L. Vis. fl. Salm I. p. 173 adde locum Transilv prope  
Cernica (Bosnia) Sredna, in dampfis circa Rječina (Panth. I. c. et in gratic  
ylvostribus Vrgin, Borovo, Dobrovje in int. Vrgin (Salm.) Tomes. I. c. sub Bonnam  
plute pyramidalis (Lich.)

Ad Orchides tuberibus palmatisque glandibus adnatur sequentes

Orchis Grisebachii Panth. 2d. ed. pl. p. 27

O. labello tuberculato integrō, basi cuneato, perianthii phyllis exterioribus oblongo-  
acutis, interioribus oblongis obtusis acutis, calice conico-cylindraceo ovarium dimi-  
nutione subsequente, bracteis acutis flores inferiores superentibus, spica ex sessu!  
tillora laxiflora, foliis oblongo-lanceolatis acutis, superioribus bracteiformibus.  
Hab. in gratic humidis ad Virujs Dol infra montem Cerna Planina, et in Ponicea  
Dol infra Korn. Flores purpurei, labello lineis paucisque saturatisque variegato-  
rum. Labellum magnum. Ovarium contortum. Radix tubo oblongo divisa. H. sal.

Ad Orchidem sambucinam L. Vis. fl. Salm I. p. 171 adde locis in gratic Ponicea  
montis Jastrebice in Bjelovara (Herzeg), in Ponicea Dol infra Korn, et  
Javorce in Cerna Planina (M.N.) Panth. I. c. in m. Vlastich rupi Ba-  
klari (Bosnia) Sredna. Et ad Var. B. purpuream Koch. Vis. I. c. in codet-  
a m. Vlastich (Bosnia) Sredna, et sub Var. maculata W. in graminosis m.  
Jastrebice in Bjelovara (Herzeg) et in montibus Korn et Mali Durmitor  
(M.N.) Panth. I. c. Dein addatur

Orchis maculata L. sp. fl. p. 1335. Host fl. austri II. p. 533. Rehd. fl. exc. p. 126  
Panth. ad. v. O. labello trilobo, lobis lateribus duplo latioribus cretatis medio ovato  
calice conico-cylindraceo pendulo ovario breviori, perianthii phyllis ex-  
terioribus distinctis, lateribus patulis, interioribus obtusis commixta-  
bus, bracteis subtrinerviis, inferioribus ovario longioribus, foliis niger-  
ioribus per rectas bracteiformibus, inferioribus oblongo-lanceolatis.

*Ion.-Rehd. fl. ic. germ. XIII-IV tab. CCCVII. Oed. fl. Dan. t. 933. Bonann. pumph. int. 30*  
Hab. in gratic humidis ad riuem Passiva voda prope pagum Kovicea infra  
montem Mali Durmitor (M.N.) Panth. —, et ad Transilv prope Cernica  
(Bosnia) Sredna. H. violacei. H. aestate. Ponicea. Spica cylindracea oblonga foliis rupi nigro-  
cubae.

Orchis latifolia L. sp. fl. p. 1331. Host fl. austri II. p. 531. Rehd. fl. exc. p. 126. Panth. ad. v.  
O. labello trilobo, calice conico-cylindraceo pendulo ovario subsequente, pe-  
rianthii phyllis exterioribus distinctis, lateribus erectis, interioribus obtusis  
commixtaibus, bracteis flor longioribus terminis venosis, foliis maculatis,  
inferioribus oblongis obtusis, superioribus lanceolatis acuminateis.

Syn. *Orchis maculata* Rich. fl. exc. p. 120. *O. cornuta* Stev. Scarr. II. p. 198.

Dear. Rich. fil. ic. germ. XIII. IV tab. CCCL. Sturm. Dusseldorf. II. tab. 7. Oed. Kdan. t. 266.  
Hall. ic. habs. tab. XXI fig. dext.

Hab. in graminosy m. *Tastatica* in *Bjelovar* (Herceg), in *Penitica*. Dol infra  
Korn et in partibus *Stajavinae* *Planinae* (M.N.) *Panth.*; in *Sucringon*  
et a *Dražnik* ad *Cerigge* (Bosnia) *Sandtr.*; et in partibus humicis  
sub m. *Durmitor* (M.N.) Panč. I. c. p. 88. Post rupes peras maculatas. H. purpurea. Bl.

Od. *Orchidum conopseum* L. Vis. fl. delin. I. p. 172 ad locum circa *Vares* h. *vastate*. *Rosa*  
*Baklari* in m. *Vlasich* ad *Mali Sandik* (Bosnia) *Sandtr.*; et in partibus montis  
Gliša prop. *Trbižje* (Herceg), et in *Penitica* Dol infra Korn, et circa pagum Krov.  
Tunc infra *Mali Durmitor* (M.N.) *Panth.* I. c. - addatur

*Orchis odontophora* L. sp. p. 1335. Host fl. austri. II. p. 533.

O. *labello triste*, lobis oratibus obtusis, calice filiforme ovarium subaequante, perianthii  
thecis phyllis exterioribus obtusis, lateribus patentibus, supremo concavata,  
interioribus obtusis concavis, bracteis triangularibus ovario sublongioribus, foliis  
lineari-lanceolatis linearibusque, superius bracteiformibus.

Syn. *Gymnadenia rupestris* Rich. fl. exc. p. 126 (excl. syn. Vill.) *G. odontophora* Rich.  
mea. du Muf. IV. p. 52. Rich. fil. p. 121.

Dear. Rich. fil. ic. germ. XIII. IV tab. CCCXLV. Tsch. fl. austri. III t. 264. Hall. ic. habs. tab. 28.

Hab. in partibus subalpinis circa *Borovičje* (Bosnia) *Sandtr.* H. purpurea, rufa, alba, odontophora  
ma. H. *vastate*. *Penitica*.

Od. *Orchidum fabridanum* Stev. Vis. fl. delin. III p. 313 ad locum in graminosy apie  
nis infra Korn et in *Mali Durmitor* (M.N.) *Panth.* I. c. (sub *Gymnadenia*) - 133.

Od. *Orchis viridis* Cossat. austri. p. 191 (1796) Host fl. austri. II. p. 534.

O. *labello sublineare* *ludicula*, lobo medio brevior pendulo plane, ab hac brevissime  
creso incauto obtuso ovario nec quadrupliciter brevior, perianthii phyllis laterali-  
bus ovali-lanceolatis obtusis in galero subgloboso conniventibus, bracteis  
triangularibus linearibus floribus subaequantibus, foliis inferioribus ovalibus obtusis,  
superioribus lanceolatis.

Syn. *Satyrium viride* L. sp. p. 1337. *Himantoglossum viride* Rich. fl. exc. p. 119.

*Platanthera viridis* Rich. fil. ic. germ. XIII-XIV p. 129. var. a. *Ceolochlomum*  
viride Hartm. Scand. fl. id. I. p. 329. Koch. sp. K. germ. Tsch. p. 295.

Dear. Rich. fil. ic. tab. CCCXLV-V. Nees ab Gegen. pl. V. tab. 8. Oed. Kdan. t. 27.

Hab. in monte Korn et *Sinjavina Planina* (M.N.), in graminosy m. *Gliša* prop.  
*Trbižje*, in valle *Radeš Boča* prop. *Uvica* in *Bjelovar* (Herceg) *Panth.* I. c. p. 28;  
in muscosy m. *Tavorje* (M.N.) Panč. id. pl. p. 88; et in m. *Vlasich* supra *Baklari*,  
non in m. *Mali Sandik* (Bosnia) *Sandtr.* Post ade genus.

*Nigritella* L. C. Rich.  
le Orchid. adnot. p. 19

Char. Perianthium petiolatum subcampanulatum resupinatum, phyllis distinctis ac  
qualibus. ~~Bractea~~ ~~petiolata~~ ~~rotundata~~ ~~obcordata~~ ~~obcordata~~. Labello exsertum brevi-  
conicum rotundiforme brister absente, ~~anthers~~ exserte loculis parallelis. Pollinia  
via caudiculis elongatis, retinaculis subruberis, liberis - *C. Gymnadenia* Ord. Diandra Syst. ic.

II. *Orchis Spitzelii* Saut. Koch syn. nom. p. 68. - Parlat. fl. Ital. III. p. 508.  
*O. labellae* tuberculae paucis, lobis latis crenatis, medio emarginatae, calcare  
 unica cylindracea, verticale ter dependente ovario paucis brevior, perianthii lacinia  
 phyllis obtusis, lateribus paleatus, intinis dorsi apice truncatis emarginatisque,  
 bracteis uncinatis ovarium aquantibus, foliis oblongo-obovatis obtusis

Syn. O. spitzelii Rech. fil. germ. CCCXXXIII

Icon. Rech. n. ger. m. tab. 783 fig. I-II.

Hab. a Vraniku supra Gradischke, et Biela ad Vranik, et in monte Vlastiv (Bosnia)  
 Serdica. Fl. purpurea. H. f. v. Perenn.

N Ad *Orchis masulenii* L. Vir. fl. dum. III. p. 332 alio loco in pratis allij Senica infra  
 Kom (MN) Panth. l. c. p. 273; a Sankt Renak supra Saridovich, Sibische Lubina,  
 Doberspolje prope Vranik, et in Bosnija (Bosnia) Serdica, et ad var. specie  
 tam Koch. Vir. l. c. in monte Vlastiv supra Baklari (Bosnia) Senica: et in  
 orati meridi Leutor prope Dobrije (Herzeg.) Panth. l. c. Dicit adatus

\* ~~1~~ *Orechis* globores L. Sp. f. idem Host. fl. austr. I. p. 525. Koch fl. ex. 7.  
*O. labellae* seminimbis lacinia oblonga, media latiore truncata-emarginata mucrone inter-  
 jecta, calcare subcylindrica <sup>subcylindrica</sup> <sup>rectangulis</sup> expandente ovario subtriangulari brevior, perianthii  
 lacinia <sup>(convergentibus)</sup> <sup>oblongo-</sup> <sup>ovali</sup> ovaris cuspidate apiculatae truncatis, bracteis  
 arcuatis rotundis, foliis lanceolatis.

Syn. Orechis globores L. fl. tab. CCCXXXI — Tag. fl. austri. III. tab. 268. Hall. fl. helv. tab. XXVI sinist.

Icon. Orechis globores Rech. fl. ex. p. 21.

Obs. Specia compacta, glabra aut cylindrica.

Hab. in pratis valle Rades Brod in Bjelagora (Herzeg.) et in Vrini dol infra Cava Plavina, et  
 in valibus Peruvica infra Cava Plavina et Peruvica et Dara infra Kom (MN) Panth.  
 l. c. et (Bosnia) Serdica cat. 1328. Fl. purpurea, labella punctata. H. aest. Perenn.

Ad *Orchis reticulata* L. Vir. fl. dum. I. p. 121 alio loco in pratis valle Peruvica infra Kom (MN) Panth.

Ad *O. coriophoroides* L. Vir. fl. dum. I. p. 120 addatur loco in pratis haematicis circa Kostjern in  
 Bjelagora (Herzeg.) et circa pagum Kovice infra Mali Dravnik (MN) Panth. l. c., in pratis Garize,

et Payerda in ins. Vegla (Dalm.) Sommer. b. c. p. 62 et circa Dravnik (Bosnia) Serdica. Addatur

~~1~~ *Orechis longiermis* Link in Schw. journal bot. II. p. 233. Parlat. fl. Ital. III. p. 479.

*O. labellae* trifoliae lacinia lateribus obtusis, anguste linearibus, basidia plus duplo magno bifida,  
 perioribus angusto linearibus, media angustipima intersecta, calcare linearis apice submarginata  
 nato pendente subimpresso ovario <sup>dimidio</sup> quadratus, perianthii phyllis conniventibus, extatioribus  
 distinctoribus, interioribus duplo minoribus, bracteis brevi duplo brevioribus, foliis oblongo-lanceolatis.

Syn. *Orechis tephroanthos* Desf. fl. aust. II. p. 319. *O. undulatifolia* Buron. in pl. cent. II. p. 44. Rech.  
 icon. fl. ex. 124.

Icon. Rech. fl. ex. germ. XIII-IV. tab. CCCXXXV. Sibth. et Sm. fl. gr. 2. X. tab. 92. Buron. in pl. II. tab. 6

Hab. in graminosis montis Glava prope Dobrije (Herzeg.) Panth. l. c. Specia ovata, densa. Et. v. tab. 7. v. Perenn. Ad.

pelmatif

41.68

*Brachis maculata* L. sp. pl. 1333. Host K. austri. II. p. 533. Rehb. fl. exc. p. 126

O. labello trifida lobis latib. longo - cylindrica pendulo ovario ovato, perianthii phyllis extimo obtusis, interioribus acutis, petalibus, interioribus obtusis conniventibus, bracteis subtriangularibus inferioribus ovario levigatis, foliis superioribus parvulis bracteiformibus, superioribus oblongis. Ion. Rehb. fl. I. c. tab. CCCVU. Oed. fl. Dan. tab. 933. Bonnem. prophyt. sic. tab. 30. Hab. in præstis humidi ad riveam Savina unde prope pagum Kovice supra m. Male Dalmator (M.N.) Panth. l.c. et ad Travnik prope Cernica (Bosnia) Scandt. 26 viss.

Lacci. Pl. vegetale Pannon. Spicæ cylindraceæ oblongæ. Folia sagittif. nigra - subrotundata. Ob. Huc justa. Rehb. fl. C. sauvage Brong. var. f. sp. 88. Orchid. rubra L. tab. 170 adde locum in præstis syberetiis, Bosco pinie celo in ins. Dalm. Tommasi. l.c. p. 62 sub O. tephrocartha.

palmar. Orchis labellata L. sp. pl. 1331. Host K. austri. II. p. 521. Rehb. fl. exc. p. 126. Panth. adn. p. 28.

O. labello trifida, calcare conico-cylindrica pendulo ovarium subaequante, perianthii phyllis extimo rotundatis, lateribus exaltatis, interioribus acutis, petalibus, interioribus obtusis conniventibus, bracteis floræ longioribus trinerviis venosis, foliis superioribus oblongis obtusis, superioribus lanceolatis acuminatis.

Syn. O. majoris Rehb. fl. exc. p. 120. O. cornosa Scop. fl. carn. II. p. 198.

Icon. Rehb. fl. ii. germ. XIII-IV tab. CCCII. Strom. Deut. fl. II tab. 1. Oed. fl. Dan. t. 266. Hall. i. h. h. t. XXI. Tab. in graminis m. Taffetaria in Bielgorod (Hercy), in Peruviana Del inf. Rom. et in præstis Stomoxina Savina (M.N.) Panth.; in Gueldrigora, et a Travnik ad Cernica (Bosnia) Scandt. et in præstis humidi sub m. Dalmator (M.N.) Panth. l.c. p. 88. Folia sagittif. parvulae H. purpurea. H. mag. R. Scandt.

IV Orchis pallens L. mant. pl. p. 292. Host K. austri. II. p. 526. Rehb. fl. exc. p. 122. O. labello, leviter. bisloba subintegriæ basi holoscrepæ calcaris cylindricis horizontaliæ vel adspicente dente ovarium subaequante, perianthii phyllis ovato-oblongis obtusis, tribus inferioribus subaequalibus conniventibus, lateribus demum reflexis, bracteis uniuersis ovario aequalibus acuminatis, foliis oblongo-lanceolatis obtusis.

Icon. Rehb. fl. ii. germ. XIII-IV tab. CCCIX-XXXVI Curt. bot. meg. tab. 256g (sub O. sulphurea)

Tacq. fl. austri. I. tab. 45. Seguier fl. veron. 3. tab. 8 f. 3.

Hab. ad granaščaz suerz Špionijsa ad Šrebernik (Bosnia) Scandt. fl. pallide flava. H. Major in the hills

ad Orchidem rubraam Tacq. fl. fl. tab. I. p. 169 adde syn. O. papilionacea L. sp. pl. p. 1331, cuius nomen prioritatem siti vindicat, et adde loco Mariae bi Capo ins. Veglia (Dalm.) Domnes. l.c. p. 62 et loca sarrasini clivi Graniča prope Lettinge. Panth. l.c. p. 88.

Ad O. cornuta All. H. - Vis. fl. Dalm. I. p. 169 præmitte synonymon anterior O. tridentata Scop. fl. carn. II. p. 190 et adde loca Dobrinje, Rastovatno, Bešenovo in ins. Veglie (Dalm.) Domnes. l.c. et a Travnik ad Buhovica, et ad Šučajgora (Bosnia) Scandt.

Ad Orchidem puscam Tacq. I. p. 169 adde locum a Šrebernik ad Rusla, ab Uessino regio Kislegat, Turcia Pod Selovo et in Pasdin-Kona, a Travnik ad Bohorizza, et Cernica (Bosnia) Scandt. Progenies namque Cernicenses habet ad Orchidem multitudinem L. His fl. Dalm. I. p. 171 adde loco in præsti m. Taffetaria in Bielgorod (Hercy), in Peruviana Del inf. Rom. et Javrice et Cernica (M.N.) Panth. l.c. in m. Vlastiva super Baklavu (Bosnia) Scandt. et ad vrb. Špionijsam t. c. in eadem m. Špionijs (Bosnia) Scandt., et (sub var. inexacta H.) in graminis Taffetaria in Bielgorod (Hercy) et in montibus Karst et Male Dalmator (M.N.) Panth. l.c.

十九

*Abd. Orchidaceae conosperma* L. Vig. f. *Orchidaceae* p. 172 ad locum circa Varesch (Boemia) fact. niger Baldrian  
in m. Valesic, s. ad Malo Lanich (Boemia) hort. et in topography m. Jawa granae rebrey (Boemia) et in Ponca  
Orchis ~~conspurcata~~ <sup>oblonga</sup> R. & P. T. 1235. ~~ad~~ Imp. Rom. circ. pag. 20 Novices infra Nelle Darmato <sup>Praha</sup>

Syn. *Gymnadenia ruaveana* Rebb. fl. exyp. 120 exst. syn. Witt. *G. odorata* Linn. ~~Rebb.~~ - *Poly. mem. de*

Proc. d'Hist. nat. IV. p. 57. Recd. H. exc. p. 121.

*Icar. Relb. fid. ic. germ.* ~~XVII~~ tab CCCC ~~XVII~~ Hall. 1c belb. tab. 28.

Hab. in præstif. subalpinis circa Borovica (Bosnia) Serdž. H. prosperei, raro aut alibi. Dorsum <sup>Gastratae Petri</sup>  
ad Orchidum pyramidalum L. vis. f. delin. I. p. 173 ad locum Travnik <sup>Dalm.</sup> Prope (Zenica (Bosnia))  
Serdž.; in deinceps circa Rječina Panth. l. c. et in præstif. lykovitibus Vrgor, Bosnia, Dalmatia in  
ins. Vrgor (Dalm.) Pomares. l. c. (sub Anacamptide pyramidale Rich.). Ad datum  
Orchis albidæ <sup>Hab. f. delin. III p. 333</sup> ssp. <sup>longipetala</sup> longipetala L. et ad locum in graminosis aperte supra Kom. et in Mali.

*Pastinaca sativa* L. var. *lutea* (L.) Benth. (sub *Gymnodenia*)

*Vest adiacens Nigrifolia C. Rich*  
ad *Oryzopsis archipetala* Huds. Viz. A. Tsch. p. 177 add locum ad *Brandst.* supra *Gradische*  
et *Bicla* usque ad *Pravnik*, (Borsig) heddin, et ad *Vlasick* usque *Baklari* (Borsig) Scutin.

6 Ad Ophrydion cornutum Stev. Vis. ff. delm I p. 172 adde locum in grammatica ad pedem montis Glava  
prope Rebinje et circa Vucin in Bjelagon (Herzog) Panth. adi. p. 28; et ad Travnik ad Cenjica  
et super Kalovin ad Lutynska (Boemia) Senofon. et longioribus ad Cagrinico in ins. Serbia (Dalmatia)  
Domus, t.c.  
c Ad Ophrydion Bertolonii Moreth. Vis. ff. delm I p. 178 adde locum in grammatica ad pedem m. Glava

*prope Dobrinje (Herceg Novi) Prath. l'c, et ad Dobrinje et Cetinje (in vic. Vrgin Dalm.)* *Proemium - 1c*  
*Dichis viridis (Vantz austri. p. 491 (1869) Holt ff. acerifl. D. p. 534*  
*O. labello rubricinan tridentato lobo medio breviori, calcare brachypus ex quo effusio esse  
 rivo quadruplo breviori tractu tenui linearibus floris subaequantibus, perian-  
 thia phyllis lateraliis ovali-lanceolatis obtusis in glosum subglobosum conis-  
 ventibus, foliis rufescens oratibus obtusis, supensionibus lanceolatis ascendit.*

*Syn. Patrinia viridis* L. sp. p. 1337. *Grimmialopulm viride* Reb. H. ex. p. 119. Plateau.

*There* *windy* *Feb.* *fl.* *x* *III*-*IV* *p.* *129* <sup>var.</sup> *\*a.* *Coccyglophorum* *virens* *Hartmann*. *Scand*. *fl.* *ed.* *T.* *p.* *329*. *Koch* *147*.

*Lobelia* Rehd. fil. t. c. tab. ccccxxiv-v. Bed. f. dan. t. 37. Nees ab Gj. gen. gl. v. tab. 8. II p. 195.

Hab. in monte Kom et Kuyavine Planine (MN), in gramineto m. siccopate Zerbino, in valle Padus Brodo nera Mela in Bistagno (Hes.) Pauph. 1. c. 1. 18 in musco m. fiorito (MN)

*Naemus* Brovko prope Ucina in Belagora (Herceg) *partit.* 1, fig. 28. in museo in Jaworze (MS)  
Part. et. pl. p. 88, ta m. Vlajnik, super Boklan, in Mali Sandik, (Bosnia) Scut.

- Ad *Ophiopeltis heteromorpha* Cavanilles Rich. Nic. H. Det. l.c. p. 175 adde locum in Capo ~~Capo~~  
 b. Punto di Casione, et Dobrinje in ins. Veglie (Dalm.) Dominus v. d. Vegli. p. 68  
 Ad *Cephalanthus apiflorus* Huds. Nic. H. Det. l.c. p. 187 adde locum in gratiis humidis ad Capri, I-  
 maria di Capo, et Dobrinje in ins. Veglie (Dalm.) Dominus l.c.  
 Ad *Cephalanthus pallidus* Rich. Nic. H. Det. l.c. p. 188 adde locum ad Buccigora (Bozna)  
Sent. et in iglokrinie habitat ad Dobrinje in ins. Veglie (Dalm.) Dominus l.c.  
 Ad *Cephalanthus corymbosus* Rich. Nic. H. Det. l.c. p. 181 adde locum a Gradischer ad Kostanjevick  
 et a Borovica ad Barash (Bozna) Sent.  
 Ad *Cephalanthus sabiceus* Rich. Nic. H. Det. l.c. adde locum in iglokrinie valle Madre Broda  
 et in Koristna Greda prope Vraca in Bjelazora (Herceg) Pantk. l.c. p. 28. super Sutjaga  
 ad Kopitnica (Bozna) Sent., et in saxonie sub Vraca stojane in m. Durmitor  
 (N.W.) Panić et al. p. 88.  
 Ad *Lindernia abrotanoides* Sw. Nic. H. Det. l.c. p. 186 adde locum in nemoris Bosca ad  
 M. Organ, et s. Maria di Capo in ins. Veglie (Dalm.) Dominus l.c. et a Dravnik  
 ad Cenigia (Bozna) Sent.  
 Ad *Neottia nidus-avis* Rich. Nic. H. Det. l.c. p. 182 adde locum in iglokrinie in Pastobicas in  
 Bjelazora (Herceg) et in valle fluminis Tara infra Kom (M.N.) Pantk. l.c. p. 28  
 et a Sutjaga ugn Poljane prope Bonjica (Bozna) Sent.  
 Ad *Epipactis latifolia* All. Nic. H. Det. l.c. p. 183 adde locum a Sutjaga ugn Borovoglavu  
 et ad Crno prope Ljivo (Bozna) Sent.; et super Sutjaga ad Kopitnica (Bozna) Sent.  
 Ad *Epipactis palustris* Crantz. Nic. H. Det. l.c. adde locum in paludosis circa Kodragon  
 in Bjelazora (Herceg) in Vraca dol ugn Cima Planina et ad riveum Parine  
 unde infra M. Durmitor (M.N.) Pantk. l.c. Ad.  
 Epipactis ~~latifolia~~ rubiginosa Koch 1791. H. Det. l.c. p. 801  
 E-labellum anterius acuminate apice recurvo perianthia campanulata petiolata  
 rufa tuba extenuibus parve pubescens gibba basi glabro - visu, bracteis  
 lanceolatis acuminatis multo rufis ~~et~~ subtomentosis, foliis crassis lanceolatis rufis  
 Syn. *Lemnia atrocubensis* Schult. var. Nic. H. Det. l.c. p. 58. H. Det. l.c. p. 139. *Epipactis*  
*Helleborine* a. rubiginosa Crantz. sib. auct. VI. p. 462. H. Det. l.c. geom. XIII-V. p. 140  
Nic. H. Det. l.c. p. VIII. et Helleborine Crantz. Pantk. l.c. p. 88.  
Nic. H. Det. l.c. tab. CCCCLXXXV. Gurn. fl. novi. tab. V fig. 3-4. Crantz l.c. fig. 6.  
Hab. in iglokrinie montis Durmitor (M.N.) Ibidem indicates a prof Panicum. H. Det. p. 140  
 Old later genus

Listera R·Br

in Act. h. Kew. ed. III. p. 20

Char. Perianthium virgines <sup>hyalina</sup> ~~leucostoma~~ in glandem coniventeribus. Labelium calcareum pen-  
sulum. Gynostemium postice prolapso ex parte terminatum, in quo anthers invertit. Anthers  
liber sessilis persistens. Pollen granulatum. Ovule bilamellatum. Ovarium rectum.  
Cl. Gyneridinae Ord. Diandria Syst. sex.

*Nigritella angustifolia* Rich. l.c. Abb. p. exc. p. 21 Koch syn. p. gen. II  
p. 296. Pantk. dn. p. 25.

*N. spic compacta* ovoides perianthii phyllospadiceo-lobato-accuminatis, lobulae ovato-lanceolatae undulatae, subintegras, calice obsoato ovario tripli breviorae.

Syn. *Tolyrium nigrum* L. sp. p. 1338. Host p. exc. t. p. 535.

Icon. Rich. fil. s. gen. XIII-XIV tab. CCCX-XVII. Targ. fl austriac tab. 298. Hall. i. tab. tij. 2  
Hab. in graminis et alpinis Picea Carex Licht. prope Kom. et in montibus Balkani (M.N.) Pantk. fl. atropurpurei odontophyllum

Meli Dumetorum et Cyne Planaria prope Bosnia (Dalm.) Pantk. fl. atropurpurei odontophyllum

Hastata Peregrina Radix palmetta

Ad *Ophydium armiferum* Huds. Vis. fl. delm. t. p. 178 ad locum ad Vranjat p. 178 ad locum in graminis ad pedem montis Gline prope Trstenje et rivis Viria in Bjelagora (Herzog.) Pantk. dn. p. 28, et Trstenje ad Crenica, et super Kalesija ad Sutynska (Bosnia) Sentra, et in locis herbitis ad Lagrinis in ins. Vrgin (Dalm.) Domenes. l.c.

Ad *Ophydium cornatum* Stev. Vis. fl. delm. t. p. 177 ad locum in graminis ad pedem montis Gline prope Trstenje et rivis Viria in Bjelagora (Herzog.) Pantk. dn. p. 28, et Trstenje ad Crenica, et super Kalesija ad Sutynska (Bosnia) Sentra, et in locis herbitis ad Lagrinis in ins. Vrgin (Dalm.) Domenes. l.c.

Ad *Ophydium stratum* Lich. Vis. fl. delm. t. p. 176 ad locum in herbitis ad Brenova in ins. Vrgin (Dalm.) Domenes. l.c.

Ad *Ophydium bestiolae* Montt. Vig. l.c. p. 178 ad locum in herbitis ad Dobrije et Cassione in ins. Vrgin (Dalm.) Domenes. l.c.

Ad *Ophydium arachnition* Reich. Vis. fl. delm. p. 175 ad locum in Rante et Cassione et Dobrije in ins. Vrgin (Dalm.) Domenes. l.c.

Ad *Ophydium apiciferum* Huds. Vis. l.c. p. 177 ad locum in prati humidis ad Lagrinis I. Mariae, et topa et Dobrije in ins. Vrgin (Dalm.) Domenes. l.c.

Ad *Cephalanthus pallidus* Rich. Vis. fl. delm. t. p. 180 ad locum ad Sutynska (Bosnia) Sentra, et in hygrophilis herbitis ad Dobrije in ins. Vrgin (Dalm.) Domenes.

Ad *Cephalanthus cornifolium* Rich. Vis. fl. delm. t. p. 180 ad locum a Grindischer ad Trstenje, et a Bosnija ad Varesch (Bosnia) Sentra.

Ad *Cephalanthus rubrum* Rich. Vis. l.c. ad locum in hygrophilis valley Radas Brido, et in Koristna luka prope Vrgin in Bjelagora (Herzog.) Pantk. l.c. p. 28, super Sutynska ad Kapljuna (Bosnia) Sentra, et in saxosum sub Crenica Vrgin in m. Duvnitor (M.N.) Pantk. l.c. p. 85.

Ad *Limodonaea abotinum* Sw. Vis. l.c. p. 181. ad locum in nemorosis Bosca ad m. Organ, et I. Mariae et Cgo in ins. Vrgin (Dalm.) Domenes. l.c.

Ad *Hottiam Ridleyi* Rich. Vis. l.c. p. 182. ad locum in hygrophilis m. Tepet et in Bjelagora (Herzog.) et in villa Flaminia Tara infra Kom (M.N.) Pantk. l.c. p. 28, et ad Sutynska super Polyana prope Bosnija (Bosnia) Sentra.

Ad *Epipactis helleborine* All. Vis. l.c. p. 183 ad locum a Sutynska super Bosnija et ad Cugia prope Ljuns, et super Sutynska ad Bosnija (Bosnia) Sentra.

Ad *Epipactis palustris* Crantz Vis. l.c. ad locum in poluds of cina (Kodijen in Rich. gor (Herzog), in Virija Del infra Cina Marina, et ad nivum Pastina volle infra Meli niutor (M.N.) Pantk. l.c. Post hanc add.

*Epipactis rubiginosa* Koch 1901. p. genn. p. 80.  
*E. latifolia* anteriori cuminata apice rotundata, perianthia campanulata petiolata  
 linearis tubus exterioribus parva puberula, gibbosus basi planteo - crispis,  
 bracteis terminali cuminatis multiorum perianthia linearis saltem  
 rufa, foliis ovatis lanceolatisque.

Syn. *Liparis atropurpurea* Schult. - auct. f. 1. p. 58. *Epipactis atropurpurea*  
 Richb. f. ex. p. 133. *Epipactis Helleborine a rubiginosa* Crantz 1759. auct.  
 v. 1. p. 162. Richb. f. i. genn. XIII-IV. p. 141. *Panzeri* et. plur. p. 88.

Non. Richb. pl. crit. VIII et Richb. f. i. genn. XIII-IV tab. CCCCLXXXV. *Gussain* fl. nov.,  
 tab. V. f. 3-h. Crantz l. c. fig. 6-c

Hab. in syriacis montis Duximides (MN). ubi indutus a prof. *Panicci* l. c. & C. atropur-  
 pura. - H. aestate. Perenne. - Adular genus

### *Listera R. Br.*

in Act. hort. Kew. ed III. p. 201.

Char. Perianthium rufum, phyllis distinctis in galeam convervatis. Labellum  
 exsertum pendulum. Gynostemium postice stigmata corpora ova terminalia  
 tenui, in quo anthera insuta. Anthera liber, sessilis persistens. Pollen far-  
 naceum. Ostellum bilobatum. Ovarium rotundum, pedicello contortum. El. Gymn-  
 diae Ord. Diandria Syst. sec.

*Listera ovata* R. Br. in Act. h. Kew. I. c. Host Pl. austr. II. p. 533. Richb. f. ex. p. 133.

Dommas. Veg. di Veg. p. 63.

*L. caerulea* L. f. latifolia, foliis cordatis ellipticis, labello trilobato pendulo, lobis lateris  
 atque minorum rufis maximo perianthia phyllis exterioribus subtriangulari longiori,  
 linearis bipinnata, bracteis ovatis cuminatis pedicello brevis rufis, foliis oppositis appa-  
 rimentatis ellipticis.

Syn. *Ophrys ovata* L. p. 1340. *Neottia latifolia* Rich. in mem. du Mus. IV. p. 59.

*Neottia ovata* Bluff et Fingerh. comp. pl. genn. p. 453. Richb. f. i. genn. XIII-IV. p. 59.

Non Richb. pl. crit. VI tab. 812. Richb. f. i. genn. XIII-IV tab. CCCCLXXXIX. Ord. Pl. don. f. 133. Hall. i. c. tab. CCCCLXXXIX.

Hab. in graminosis montis Glava prope Dubrovnik (Herzeg.), a Stranduk supra  
 Gradistej et Biela ad Monach et Shendrik (Bosnia) Scardia, et in locis umbrosi  
 iij ad Dobrinja in ins. Veglia (Dalm.) Dommas. I. c. p. 63. —

### *Callaeeae Barth.*

V. 15. H. dalm. I. p. 183.

Ad Arum maculatum L. V. 15. H. dalm. I. p. 183 ad locum in Haute Zillach  
 (Bosnia) Scardia.

Ad Arum italicum Mill. V. 15. H. dalm. I. p. 183 ad locum in taxoie urba Trstino  
 ad pedem montis Glava (Fareg.) *Panzeri* l. c. p. 183 super Cassione, Bosnico et aliis  
 in ins. Veglia (Dalm.) Dommas. l. c. p. 62. —

- Ad *Arum orientale* Vis. fl. dalm. t. p. 185. corr. *Arum Petteri Schott* syn. aroid. t. p. 182  
 et subjungo synonymon *Ari orientalis* Vis. non Bieb. nec Rebb. ex Schott l.c., addo  
 iconem Rebb. fl. germ. VII tab. 9, et ad locum in Dumetis saxosif ad clivum *Braunii*  
 prope Lettinge (M.N.) Pani. l.c. p. 88, et montium *Ghiai*, (Bellega) et *Draia* prope Trebisio  
 (Herzeg.) Pantk. l.c. p. 29, propter loca jam citata ad Bergata et Bogdansich  
 Ad *Bistrium tenellifolium* Vis. l.c. citatur synonymon ~~pro~~ *B. angustifolae* Schott prod. syst.  
 aroid. p. 62 ~~discreta~~.

### Typhaceae Tuss.

- Vis. fl. dalm. t. p. 187  
 Ad *Typha latifolium* L. Vis. fl. dalm. l.c. adde locum in aquosif circa Skodjegro  
 in Bjelagora (Herzeg.) Pantk. adn. in fl. p. 29 et in laur. Sodano (M.N.) Pani. cf. p. 88.  
 Ad *Typha angustifolium* L. Vis. fl. dalm. III p. 38 adde locum in aquosif inter Marathic  
 Zrebanick et Martonii (M.N.) Pantk. l.c. et ad fons Panighi in ins. Veglia (Dalm.) Sommer  
 veg. Vegl. p. 62.
- Ad *Sparganium erectum* L. Vis. fl. dalm. l.c. adde locum in aquosif circa Skodjegro  
 in Bjelagora (Herzeg.) et ad riuulum Sušica prope Danilov Grad et circa Stojinici  
 (M.N.) Pantk. l.c. cf. fl. Sp. ramosa Huds., in fonte ad Vis (M.N.) Pani. l.c. ad fonte  
 in Valle di Bessa et Panighi in ins. Veglia (Dalm.) Sommer. l.c. et in m. Vlastici  
 super Baklari, ad Tussintan prope Kiseljak, et a Capinovi ad Voivica (Bosna) Kentm.

### Najadeae A. Rich

Vis. fl. dalm. suppl. p. 40 t. p. 188

- Ad *Zannichellia majorum* Boroni. Vis. l.c. fortior referenda est *Z. palustris*  
Sommer. l.c. p. 61. in stagnis ad Besanova crescent et sub m. Triskava in ins. Ve  
 glia (Dalm.) sed haec non vide <sup>suppl. p. 39</sup>

- Ad *Ruppia maritima* L. Vis. fl. dalm. Sommer. l.c. p. 61 adde locum in fonte aqua  
 marinae ad Besanova sub m. Triskava et alibi in ins. Veglia (Dalm.).

- Ad *Nyponia majorum* Rott. Vis. fl. dalm. suppl. p. 40 adde locum in palustre sub monte  
 Darmitor versus m. Stulac (M.N.) Pani. adn. p. 88, et ad Lago di Caprius ins. Veglia (Dalm.)  
Sommer. l.c. p. 62.

- Ad *Polygonum Caulinum* Koch. Vis. fl. dalm. t. p. 189. adde locum ad mare ins. Veglia (Dalm.) Sommer. l.c.

- Ad *Zosterae marinae* L. fl. p. 1874. Host fl. aust. I. p. 1. Vis. fl. dalm. III p. 355. Rebb. fl. her.  
 375 novit. Z. palustre late lanceolatum, petiolae pedunculo superne dilatato, nucibus striata.

Syn. Phragmites minor Caulin. phyt. p. 14

Non. Rebb. fl. germ. VII p. 1. Sm. engl. bot. t. 267. Bed. fl. dalm. t. tab. 1501. Caulin. phyt. l.c. tab. 2  
 Hab. in mari adriatico ad ins. Veglia (Dalm.) Sommer. l.c. propter loca citata.

*Epihydris subaginea* Hoch. syn. & germ. II p. 801.  
*P. latello anterior* acuminate apice recurva, perianthia cum gametophyto petiolis  
 laevis tubo exterioribus per se puberulis, gittis basi plante - crispa  
 brachys lanceolatis acuminatis multioris rami gerantibus.

Ad *Potamogeton natans* L. Vis. fl. dum. I. p. 192 ad locum in fluvio Trebinjë  
 et prope Trebisjë (Horvay), et in Rible Jezeru infra Mali Durnitor (MN.)  
 Pantk. I. c. p. 28, et Panč. I. c. p. 87, et in lacibus et stagnis Velež (Dalm.)  
 ad Caprius, Panighe, Campi Tommasi. I. c. p. 61.

Ad *P. fluctuans* Roth. Vis. fl. dum. I. p. 190 ad locum in Lacu Scodruš ad officia  
 Chernojevic Rijeka (MN.) Panč. I. c.

Ad *P. crispum* L. Vis. I. c. ad locum in fluvio Trebinjë prope Trebinjë (Horvay)  
 et in Rible Jezeru infra Mali Durnitor et Rijeka (MN.) Pantk. I. c., in Lacu  
 Scodruš ubique (MN.) Panč. I. c., in Valle di Bosanovë sub m. Tristkovac in ins.  
 Velež (Dalm.) Tommasi. I. c. p. 61, et ad Oussino supra Kisalgat, Turia Podvelovo ad  
 Passin-Konak (Bosnia) Scudr.

Ad *P. lucutum* L. Vis. I. c. ad locum in Rible Jezeru sub m. Durnitor (MN.) Panč.  
 et al. p. 87.

Ad *P. perfoliatum* L. Vis. I. c. p. 191 ad locum in Lacu Scodruš ad Sjenja (MN.)  
 Panč. I. c. - syn. *P. denia* Pantk. I. c. non L. et ad locum in fluminis Trebinjë prope  
 Trebisjë (Horvay) et in lacibus Rible et Cno Jezeru infra Mali Durnitor (MN.)  
 Pantk. I. c. in quo crescit Var. p. foliis ovato-lanceolatis Richb. f. i. ~~g. 1800~~ VII tab. 54.

Ad *P. pectinatum* L. Vis. I. c. ad locum in Cno Jezeru infra Mali Durnitor et in  
 aqua p. Molho dicti prope Biela (MN.) Pantk. I. c.

Post addatur

*Potamogeton rupestris* Schrad. in Chamin. adn. in Kunth fl. boot. p. 5  
 Richb. fl. ex. p. 8. Pantk. adn. p. 78.

*P. foliis submersis sessilibus membranaceis pallentibus, attingue attenuatis, marginae  
 laevis, rotundatis, coriaciis obsoletis obtusis, in petiolum folis brevioram et  
 tenuiorum, caule simplici, drogic lenticularibus, margine acutis.*

Ikon. Richb. il. crit. II tab. CLXXXIV fig. 322 et icon. germ. VII tab. 32 f. 16. Gaud. fl. helv.  
 I tab. 6. Sm. engl. bot. tab. 1286.

Hab. in aquis Rible Jezeru infra montem Mali Durnitor (MN.) 71. Jul. Perren.

*Potamogeton compressa* L. sp. pl. p. 183. Cod. n. 1040. Host fl. austro. I. p. 223 Richb. f. i. <sup>1808</sup>  
*P. foliis 5-nerviis breviter acuminatis, caule comperto tetrapetala ramoso, pedunculis  
 sub florae inversatis crugianatis, perianthia phyllis transverso rotundatis, basi via alte  
 natis, drogic ellipticis acutis laevis, dorso tricarinatis.*

Icon. Richb. crit. II tab. 208. et in germ. VII tab. 24. Cod. fl. aust. 200. Lin. engl. bot. 418.  
 Schumach. en. 1 p. 50.

Hab. in aquis Rible Jezeru infra Mali Durnitor (MN.) et in vallestribus ejusdem. Vesip. m. Strela  
 7 Jul. Perren.

*Listera ovata* R. Br. in Act. h. Kew. V. p. 201. Richb. fl. ex. p. 193.  
*L. caule* bifolia foliis cordatis oppositis, lobillo ~~trifoliis~~ <sup>trifoliis</sup> lobis <sup>lobis</sup> ciliatis  
 longe alterius media bifida minima, media maxima, penicillata <sup>penicillata</sup> stylis exte-  
 nisibus subtigrise longior, linearis bipinnata pedicello bruni-  
 bus foliis approximatim ellipticis -

Syn. *Ophrys ovata* L. 17. fl. p. 1340. *Neottia latifolia* Rich. in mem. de Mus. t. p. 59.  
*Neottia ovata* Bluff. et Forster. comp. pl. geom. p. 453. Richb. fil. XIII-V. p. 142.

Icon. Richb. fl. cit. VI tab. 812. Richb. fil. ic. germ. XIII-XIV t. c. tab. ~~ccc~~ CCCIX. Ord.  
 fl. Dan. 137. Hall. ic. helv. tab. XXXIX.

Hab. in graminibus montis *Riva prope Trbinje* (Henry.) a *Vranduk* regni  
*Gradischkiae* et *Bielae* ad *Braunick*, *Ebcudetina* (Bosnia) *sendit*. et in loca  
 umbrosa ad *Dobrinje* in ins. *Veglia* (Salm.) *Tommas. t. c.*

Callaceae BARTH. V. 16. Dalm. 1. p. 183

Ad *Arum maculatum* L. vis. P. Dalm. I. p. 184 ad e locum in Haute Bellac (Bosnia)  
*Senecta*.

Ad *Arum italicum* L. vis. t. c. addi locum in saxis circa Trbinje ad pedem m. *Riva*  
 (Henry.) et ad sept. Cassione, Bosnico et alibi in ins. *Veglia* (Salm.) *Tommas. veg. Veglia* p. 62

Ad *Arum orientale* *Pis.* fl. Dalm. I. p. 185. com. *Arum Petteri* Schott 191. t. p. 12  
 et *ubiqui* synonimorum A. orientalis vis. t. c. (non *Pis.*) ex Schott t. c.

Ad *Biarum tenuifolium* Vis. t. c. substitutus nonne *B. anguillaris* Schott p. 68  
 syst. Aroid. p. 62. et exst. syn. W. *Albiconum* Albicon tom. VIII tab. 9

Dypheaceae *Tug.* Najaedae *Tug.* Vis. fl. Dalm. 3. p. 187

Ad Vis. fl. Dalm. I. p. 187 *Dypheae leptophylae* L. addi locum in aquosis circa *Kodrigon*  
 in *Bielagon* (Henry) *Pantk.* adn. p. 29. in *lauri* *Scodano* *Panic.* et p. 88; et *Anton*  
 Ad *Dypheae angustifolium* L. p. 187 *Dypheae* *flavovir. 3* Host fl. dalm. II p. 184 Richb. *floroprot.*  
 inter *Manganis* *Zvezdani* et *Martinic* (MN) *Pantk.* t. c. et ad foras circa *Panig* t.  
 in ins. *Veglia* (Salm.) *Tommas. veg. di Veglia* p. 62.

Ad *Sparganium erectum* L. Vis. fl. Dalm. I. c. addi locum in aquosis circa *Kodrigon*  
 in *Bielagon* (Henry) et ad *nivale* *Suisse* prope *Danieloo* *Pis.* et circa *Stajnici*  
 (MN) *Pantk.* t. c. in foras ad *Vrs* (MN) *Panic.* t. c. et ad foras in *Valea* *de Besa*  
 et *Panighe* in ins. *Veglia* (Salm.) *Tommas. t. c.* et in m. *Gradischk* regni *Baklarji*  
 et a *Tufintar* super *Kiseljik*, et a *Lepinija* ad *Vrsnje* (Bosnia) *sendit*.

Ad *Lamiastrum majoranum* Roth. Vis. t. c. addi locum in polystachyis, sub m. *Surmitor*  
 referend. et 2 p. 187 *Tragopogon* *leptophyllum* *Najaedae* A. Rich.

in foras ad *Perca* *majorana* et al. in *Nishari* Vis. fl. Dalm. 191. p. 188

Ad *Najaedae majorana* Roth. Vis. t. c. addi locum in polyphybris, sub m. *Surmitor*  
*Terpnus* *leptophyllum* vis. in *Sulan* (MN) *Panic.* t. c. et al. *Lago di Capriolo* ins. *Veglia*

Ad *Requienia multiflora* (L.) Tommas. t. c. et al. locum in *Imperata* *marina* et *Requienia* et al. in *Prisca*  
 et alibi in ins. *Veglia* (Salm.) *Tommas. t. c.*

~~ante~~  
de Loffman nominum Aethiopis Galanum non est nisi primitus

(xx) ad *Pontederia caroliniana* Koen. Vif. H. Dalm. p. 189

ad *Pontederia marina* L. sp. pl. p. 137. Hoff fl. austri. 1. p. 1. Visch. Dalmat. p. 355

couplet digrediens. *Pontederia* laticephala bivalvis quinqueangulis

2. foliis lanceolatis, petiolis reduplicatis, ramos distato, racemos strigatis

Syn. *Phengodium* Linnae. Cope. Fl. Dalm. p. 146. tab. 196.

Flor. Soc. Eng. 5. 664. t. 207. tab. 4. Den. 1501. Carl. phyt. 191. c. tab. 2

Rec. Ad. N. 1. 1. 1. 1. et ad locum

Hab. in mari adriatico *Pontederia* L. Veglio (Dalm.) Bonnem. Pl. Dalm. P. 189.

ad *Potamogeton natans* L. Vis. H. Dalm. I. p. 192. add locum in flaminis Trebinjica prope Trebinje (Herceg.) et in Rijeka Tepero infra Mali Durnitior (MN) Panth. 1. c. p. 28. et Panic. 1. c. p. 87; in lacubus et stagnis ins. Veglio ad Capriccio, Panigher, Caughi (Dalm.) Dom. mar. 1. c. p. 61.

ad *Potamogeton fluctuans* Roth Vif. H. Dalm. I. p. 190. add locum in lacu Scodra ad oppidum Cnojensis Rijeka (MN) Panic. 1. c.

ad *Potamogeton crispus* L. Vis. 1. c. add locum in flaminis Trebinjica prope Trebinje (Herceg.) et in Rijeka Tepero infra Mali Durnitior, et Jeka (MN) Panth. 1. c. in lacu Scodra ubique (MN) Panic. 1. c. et in valle d. Bepeunovo sub m. Trskava in ins. Veglio (Dalm.) Bonnem. Veglio p. 61, et ad Oressino regn. Rijekar, Jurie, Podgora ad Panjin Konak (Bosnia) Sest. tab. 1. p. 29 (no 1) et alii locum in flaminis Trebinjic prope Trebinje (Herceg.) hab. locum publice et Cnojensis ins. Mali Durnitior (MN) Panth. 1. c. et ad. B. Krk. - Bonnem. ad *P. pectinatum* L. Vis. 1. c. add locum in Cnojensis Tepero infra Mali Durnitior, et

agnoris Molto dictis locis prope Biela (MN) Panth. 1. c.

Post addetur *Potamogeton* ~~lanceolatus~~ L. repens Schrad. in Champl. ad. in Kunth fl. bor. tab. 55 p. 5. Reh. fl. ex. p. 8. Panth. ad. p. 28

P. foliis submersis semiboy membranaceis pallidis, unicoloribus alienatis; marginae lacinibus, natantibus coriaceis, obvolutis, obtusis, in petiolatum folio brachiorum attenuatis, caule simplici, drapet, lepidulantenibus marginis acutis.

Iam. Reh. rig. merit II. tab. CLXXXIV p. 322. Gaud. fl. helv. i. tab. 4. Somm. bot. tab. 128.

Hab. in aqua Rijeka Tepero infra montem Mali Durnitior (MN). H. Nut. Seren.

*Potamogeton conicus* L. sp. pl. p. 163. id. n. 1040. Hoff fl. austri. p. 223 Reh. fl. ex. p. 8

P. foliis 5 nervis breviter arcuatis, caule conproptere tricostato ramos, pedunculis sub florib. incrassatis complanatis, segmentis phyllis transversis rotundatis basi via attenuatis, drapet ellipticis austi lacinibus, dorso tri-lanatis

Syn. *P. mucronatus* Schrad. in Flora et Schult. 1811. p. 517. Panth. 1. c. p. 29. R. 202. nobilis Schumach. en 1 p. 188. Leon. R. 1. c. crit. tab. 308. sp. 1. genn. 1. c. VII tab. XXIV. O. d. 1. c. tab. 200. Somm. tab. 418. Herbaria agris Rijek. Seren. 1890.

(\*) ad *P. luculentum* L. Vis. 1. c. ad locum in Rijeka Tepero sub monte Durnitior (MN) Panic. 1. c. p. 61

(xx) ad *Potamogeton carolinianus* Koen. Vif. fl. Dalm. 2. p. 189. ad locum ad mare in ins. Veglio (Dalm.) Bonnem. 1. c. p. 62.

78-79 = 80

Tommasi f.c.p. 60

P. foliij omnibus subnervis multiorumque pellucideum laciniaque basi virginantibus,  
caule <sup>fibroso</sup> ramoso composto, spicis longe pedunculatis <sup>pendentibus</sup> interraptis, drupis obovato-angulis  
globosis carinatis vol VII

Bon. Feb. in groen. ~~vol~~ VII tab. XVIII. Bacon. pl. 22 p. 91 tab. 20 f. 5.  
tab. in aquos Cris Leyero infra Meli Duranior. Hedysarum Pant  
et laurum Capricorni in ins. Virgin Panama.

*Potamogeton gramineus* L. sp. pl. p. 184. Hort. Fl. austri. t. p. 223. Juss. Pl. ex - p.

P. plaj infirmitatej alternej scutellaj membranaj pellucidej lanceolato-cinereis  
albovittis, emarginatis oppositis lanceolato-ovali acutis longe pedatae, caule ramoso  
spicis longis laxisque, duplo contractis - concretae longe pendentes oblongo-

Icon. *Acanthoceraspis* sp. gen. et sp. n. fig. 23-24. Baltic miocene bat 1. tab. 3.

- var. *p. heterophylla* Hoch 14 n. sp. gen. II. p. 117: foliis submersis triviorientata rigi  
heterophylla 11 submersis 21. Pabst's Genus 1850 p. 16

Ad P. juncifolium L. Vis fit Dolom. app. p. 41 adit locum in Cambria Capitale et Panigher  
in ins. Virgine (Dolom.) ~~formosa~~. f. c. & in loco pedans ad Siria ac (MM) Parv. f. 1.

Ad Leucas minorum L. Wigg. delinq. 1871, p. 42. add locum in Corse et Nibbia  
Sicero et circa popum Cekkia et in Mokro groga Bjela (MK). Paul R. Bo et sub  
in Durmitor (MK) Panić 1. exp 88, et in lave ad Capricio in ins. Vegli (Palm.) Toromay  
1. exp. 62.

*O. Lernaria orthogyna* Alismaceae L.C. Rich.

Kris. fl. salm 1 p 191

(2) *Aleuria Plantago* L. Vir. & K. dalm. p. 92. add locum in recessibus lacus Scodruze,  
et Sinjæ et Vir (MN) Panī. et pl. p. 87, et ad var. *B. angustifolia* add locum  
Capriæ et Panighe ins. Verific (Dalm.) Tomm. t. c. p. 66

Bulomeae L.C.Rich.

U.S. Fish Comm. L. p. 193

*Ad Butomum umbellatum L. var. f. dentata* Taf. 193 ad locum afoem ad Rijeka, Div. panzer  
~~Panzer~~ et. gal. p. 87.

Polygonaceae Juss. f. Riffelberg 226  
Agraria decipiens Benth.  
Sphær.-bot. LXVII f. 241

Ad *Ricciotrichia cleopatra* L. Vis. ff ordin. 1. p. 195 add locum ad regis circa Trubing (Aust)  
 Panth. L. p. 35. (Lam.) L. p. 35. (MNA) ad *Cryptula super Boscis* ad *Sutynskia* (Bosnia) sentit et in campi  
 vicini ad Boglie et Herce in ins. Vegor (Balkan) Journe. regis Veg. p. 29. (Parvijug.)  
 Ad A. rotundata L. Vis. 1. add locum inter fructu in lacrym. circ. Trubing. p. 100 (MNA) Panth. L. p. 35. Indicatur  
 etiam R. longa L. a Sevier a Potica et Sellenitsch in (Bosnia) stat. 215. sed non vid.

ad *Ariptochilum pallidum* Walther. Vif. l.c ad locum inter fontes in monte Gliaz  
prope Drinje et circa Beliški (Harvey) Panth. l.c, et in drumu ad Cetinje (MN)  
ad *Apium europeum* L. Vif. l.c ad locum in sylvis Pernica et Tata Dol supra Kom (MN)  
Panth. l.c, in sylvis vallis Barje et in monte Suboran (MN), et a Bakorija ad  
Travnik, et super Biela ad Graditkic (Bosnia) Scutell.  
Eupetraea Nutt. gen. 2 p. 233

Coniferæ L.

Vif. B. dalm. 1 p. 198.

ad *Pinus sylvestris* L. Vif. l.c p. 199 ad locum in monte Kom et Mali Durmitor (MN)  
Panth. idem p. 30

ad *Pinus nigra* L. Vif. l.c<sup>200</sup> in alpinis montibus Mali Durmitor (MN) Panth. l.c  
ad *Pinus nigra* L. Vif. l.c<sup>201</sup> ad locum in monte Kom et Mali Durmitor (MN) Panth. l.c  
ad *Pinus nigra* L. Vif. l.c<sup>202</sup> ad locum in monte Kom et Mali Durmitor (MN) Panth. l.c

ad *Pinus laricio* Poir. quod habitat in montibus monte Lovcen et Veliko Tschibin  
(MN) Panth. non curia Drinova et in montibus in Bičajev (Harvey) et in monte Kom  
(MN) Panth. referenda quae <sup>vera</sup> species est *Pinus nigra* Willd. *Pinius* Host.

ad *Pinus laricio* Poir. quod habitat in montibus monte Lovcen et Veliko Tschibin  
(MN) Panth. non curia Drinova et in montibus in Bičajev (Harvey) et in monte Kom  
(MN) Panth. referenda quae <sup>vera</sup> species est *Pinus nigra* Willd. *Pinius* Host.  
H. austr. 2 p. 628 cum icono Rech. pl. banat. tab. 39 fig. 81. (sub *P. Pinaster*). Cui addatur  
*Pinus Peuce* Griseb. ex S. Scrum. p. 319. Panth. idem p. 30 ex. syn. Pan. c. 1 p. 86.

*P. pinaster* stricta, stricta aequilatera, stricta cylindrica, quamvis rotundata vel oblonga,  
glabra, venae ~~obtuse~~ brevissime alata

Hab. in nemoribus dist. Donež Vasovici in Alborzica regno pagum Erianie et  
Takutar (MN) Pan. et in montibus Brezkalove Skali, praeceps Drenina usq.  
vistige austriacae dictis versus Kom (Albania) Panth - Skop. Motika -

ad *Pinus Abietum* Desv. ff. 10m. 1 ab locum in monte Tschibin in Bičajev  
(Harvey) et in monte Kom (MN) Panth l.c p. 30, sub m. Durmitor (MN) Pan. l.c  
et sub m. Durmitor Panth l.c et in monte Tschibin et Borovica super m. Ponikva et Vares (Bosnia) Panth -

ad *Pinus excelsa* Lam. H. K. II. p. 202

*P. pinaster* solitariae conpresso-planis mucronatis subtetragonis utrinque viridis  
strobilo cylindrici pendulis quamvis eroso-distrubatis apice brebis.  
*Pinus Pinaster* Desv. ff. 10m. 1 ab locum in monte Tschibin in Bičajev  
Syn. *Pinus pectinata* L. ff. 10m. 1 p. 202.

Icon. Rish. 200 tab. m. 2 p. 15.

Hab. sub m. Durmitor (MN) Pan. l.c p. 30, et in Bosnica super m. Ponikva et Vares (Bosnia) Panth

char. foliis unisexuatis. Calyx oblongatus, rectirostris intricatus. Flos tripetala, pedunculo obtuso  
strobilo cylindrico, pendulis, apice brebis. Brachia liberae. 3 coenosas longitatem 3-6  
lanceolatae, basi rotundatae, apice acuminatae, glabrae, subintegerrime. Stigma 6-g radicum. Dryas 1-6  
magis 6-10 mm. *Eupetraea* L. gen. ff. 109 - host. M. Melia. Stigma 6-g radicum. Dryas 1-6  
*Pinus nigra* L. sp. ff. Host fl. 2 p. 236.

## Callaceae Bartl.

Vis. ff. dalm. I. p. 183-184

- Ad *Arum maculatum* L. Vis. ff. dalm. I. p. 184 adde locum in Fellaiac (Bosnia) Sentn.  
 Ad *Arum italicum* Lam. Vis. I. c. adde locum in saxo civico Vrbnje ad pedem m.  
Globo (Herzeg) Pantk. ad p. 29, et ad sepe Cattione, Borribo et alibi in. Vegl. (Dalm.) Dommer. p. 62  
 Ad *Arum orientale* Vis. ff. dalm. I. p. 185 corr. *Arum Petetti* Schott 1st aroid. I. p. 12, et  
 sub hunc synonymon *Arum orientale* Vis. I. c. (non Bieb.) ex Schott I. c. Adde  
 Ad *Biarum tenuifolium* Vis. I. c. *Arum tenuifolium* Robb. fl. et p. 10, substituta non  
*Biarum tenuifolium* Schott 1st aroid. p. 62 <sup>exclam.</sup> Wild., et addit. icon. Robb. n. gen. VII tig.

## Pyrophoraceae Tres

Vis. ff. dalm. I. p. 187

- Ad *Typham latifolium* L. Vis. ff. dalm. I. c. adde locum in aquo civico Skodjegro in  
Bjelagovo (Herzeg) Pantk. ad p. 29.  
 Ad *Typham angustifolium* L. Vis. I. c. III. p. 38 adde locum in aquo inter Marenska  
Zvrbunick et Martinički (M.N.) Pantk. I. c. et ad foras civico Pužke in Vegl. (Dalm.) Dom-  
mas veg. Vegl. p. 62.  
 Ad *Sparcianum ericetum* L. Vis. ff. dalm. I. p. 187 adde locum in aquo civico Skodjegro  
 in Bjelagovo (Herzeg), et ad viresum Susica civico Davilov Grd (sub I. vanoro Hudj.),  
 et civico Streinici (M.N.) Pantk. I. c.; ad foras in vallis Besca et Pužke in ins.  
Vegl. (Dalm.) Dommer. I. c.; et in monte Vlastich ad Baklari, a Durintian <sup>1400m</sup> Kopšak,  
 et a Lepinjic ad Voinica (Bosnia) Sentn..

## Najadeae A. Rich.

Vis. ff. dalm. I. p. 188 et suppl. p. 10

- Ad *Lamniellatum majorum* Boenningh. Vis. I. c. p. 188. probatibet referri debet 2.  
 foliis Dommer. deg. 3. Vegl. p. 6 que habitat in Stagaj ad Bespanova et sub monte  
Trskava (Dalm.) sed haue non vidi.  
 Ad *Najaden majorum* Roth Vis. suppl. ff. dalm. p. 10 adde locum in palupribay sub  
 monte Duvnitor usq; Strelac (M.N.) Panić. I. c. p. 88, et ad lacum Lagoricis in  
 ins. Vegl. (Dalm.) Dommer. I. c. p. 62.  
 Ad *Ruppia merittionis* L. Vis. ff. dalm. suppl. p. 39 adde locum in foresta aquae me-  
 rinae ad Bespanova, sub m. Trskava, et alibi in ins. Vegl. (Dalm.) Dommer. I. c. p. 62.  
 Ad *Potidonia Caulicis* Koen. Vis. ff. dalm. p. 189. *P. oceanicum* Delit. Vis. suppl. p. 35  
 adde locum ad more in ins. Vegl. (Dalm.) Dommer. I. c. p. 62.

- Ad *Zostera namam* Roth Vis. I. c. p. 189 ponatur coractio in diagnosi  
Zostera marina L. ff. ff. p. 1374. Host. ff. auct. I. p. 1. Robb. fl. ex p. 6 Vis. ff. dalm. III. p. 355.  
 Z. foliis late lanceolatis 3-5 nervis, spathae pedunculo superne dilata, mucibus striatis.  
 Ins. Robb. ii. geom. VII tab. 4. Ins. engl. bot. t. 267. Oed. ff. dan. CXV tab. 150.  
 Hab. in aqua marinis talibus Dalmatiae tum continentem tum insularum. H. acetate - Peruvia.

(W. Ver. II)

## Ceratophyllaceae Gray

Gray Brit. pl. arrang. II p. 354.

- Floris axillaris monoicis masculis, antherrh. plurimis involucris polyphyllis, phyllis linearibus truncatis

*Glechoma hederacea* (L.) Pers. (syn. *Scutellaria* L.) - *Scutellaria galericulata* L. (syn. *Scutellaria galericulata* L. var. *hederacea* (L.) Benth.)  
Herba immixtae vestigillatae rigidulae; foliis pinnatis - dicotolis dichotomis.

Ad. var. petiolatum - Ceratophyllum L.

Gen. pl. pag. 1055

Char. Stor. monosici inter nivolum pphyllum, raroq; auctis numerosis clavig.,  
fascinis ex orbe oblongo calyci inclusis, style et stigmate simplici. Vir-  
monspicua drageaceo. — Class. Monocot. Ord. Palmar. Sect. ex

*Centrophyllum decoloratum* L. sp. pl. p. 160. Host & aufgr. t. p. 618. Rich. f. excep. 151  
foliis bis tenui distichomis, style longissimo, fructibus valde agresti trianguliforme,<sup>tricuspidatibus</sup>, terrena-  
nali fructum exente aut superante.

Ixon. Lam. enc. bot. tab. 772 fig. 2. Sm. cap. bot. tab. 947. Gaertn. de fr. et germ. t. tab. 44. f. ult.

*Stab. in stagnis et aqua lente fluentibus ins. Veglio* (Salm.) *Tournefort* 1. c. p. 32.

Ad Polynemeton notatum L. Vis. fl. dela. 1-p-192 adde locum in flemine Verbenifolia  
grise Verbenia (Herzg.) in Ribes Tegen infr. Male Darmiter (MN) Pantl. 1-c-p-28  
et Pari cl. fl. var. p-87; in Lamium int. Caglio (Balm.) Junc. ad Caprinus, Pari  
grise Campi. Somnus. 1-c-p-81

*Ad Potamogeton fluitantem Roth vix fit datus. 19. 190 adie locum in tunc Madone  
ad osium Cnapovica Rieka (MN) Panic. l. c.*

*Ad Potamogeton crispus* L. Vis. fit dolm. f. c. ad locum in fluminis Trebujenii prope Trebujen (Herzeg), in flum. Tuzca iuxta Mari Devanior et Rijeka (M.N.) Panic l.c. et in lacu Sodranus ubique (M.N.) Panic l.c. et in Valle d. Bessarava Ery. Voglio (Dalm.) Bourrius l.c. p. b. et ab Orense regno Kiselyak, Duvic, Podsalovo ad oppia Konak (Bosnia) Sandtner.

Ad Potamogeton luculentum L. K. C. J. 190 ad locum in Bilge Reservoir sub m. Dunmitor  
(M.N.) Panic T. c.p. 87.

82 Potamogeton perfoliatus L. Viz. H. Salom. p. 191 adde locum in lacu Sedano ad Sinu  
(M.N.) Panth. l. c. et adde Ver. p. densam: foliis ovato-lanceolatis - syn. P. densa  
Panth. adn. p. 29. non P. densa Bon. Rechb. ic. geom. VII tab. 54. - Hall. in equip. Crno  
et Ristic. Sejero infra Mali Dvorinjci (M.N.) et in fluvio Drebinjic prope Drebinjic  
(Herceg.) Panth. l. c.

Ad Potamogeton pectinatum L. Vis. l.c. adde locum in Cerro Peñero infra Mali Durmitor  
et in aqua Mokro Tichy prope Bjela (MN) Panth l.c. p. 29. — Post addatur

*Potamogeton villosus* Schrad. in Chamer. edn. in Kuntze Fl. Berol. p. 5. Rehd. p. 202  
f. 8. Dauth. t. c. p. 28.

*P. foliis submodestis* (sic) *lvs membranaceis* *pellucidis*, *attingue attenuatis*, *margine levibus*,  
*nervatis*, *coriaceis*, *obovatis*, *oblongis* in petiolum foliis *triangularibus* <sup>(sic)</sup> *attenuatis*, *drypis*,  
*lanceolatis*, *margine*  
*ellipticis*, *acutis*, *glandulis*.

Ideas. Arch. ii. crit. II tab. Ch XXXIV et icon. germ. VII tab. XXXII p. 56. Gard. H. helv. I. tab. 4  
S. engl. tot. t. 1286.

*Hab. in aqua Ribece Serre infra m. Mala Dux mutor (M.N.) Paul K. St. Julie. Pereyry.*  
*Potamogeler congrepro L. sp. p. 183 et loc. n. 160. Host f. aufst. p. 223. Rich. f. ex. p. 2*  
*P. felix quinquecavus. leviter auminatus; caule congrepro-tuberoso summo 10 pedem  
nob spica incrassata; corylanolig; penicillata; phyllis transverso rotundata; basi vix attenuata;*

*Drosera elliptica* austriacae, dorso tricarinata.  
 Tyr. *P. mucronata* Schrad. in Proc. et Sch. Hist. Veg. III p. 551. Pantk. l.c. p. 29  
*P. heterophylla* Schrenk - en. p. 30

Icon. Rich. II. edit. II fig. 208, et icon. germ. VII tab. XXIV. Ord. ff. Jan. t. 206. Sm. engl. bot. tab. 438.  
 Hab. in aqua Riblje Jezero infra Moli Duvnitor (MN). H. Julij. Perennif.

*Potamogeton maritimus* L. sp. pl. p. 184. Rich. ff. enc. p. 7. Pantk. ad. p. 29. Tommas. l.c. p. 61.  
*P. foliis omnibus submersis membranaceis pallidis* Linnéi, basi vaginatis, caule planiforme compresso ramo, spicis longe pedunculatis interrotis multifloro,  
*drupe obovato-subglobosis carinatis.*

Icon. Rich. II. edit. VII tab. XVIII. Boccon. obsv. p. 41 tab. 20 f. 5.

Hab. in aquo Riblje Jezero infra Moli Duvnitor (MN) Pantk., et ad lacum Caprius  
 in ins. Veglia (Dalm.) Tommas.

*Potamogeton gramineus* L. sp. pl. p. 184. Host s. auctt. I. p. 223. Rich. ff. enc. p. 8.  
*P. foliis inferioribus alterius resistenter membranaceis pallidis* Linnéi - linearibus aluminatis, emarginatis, oppositis, lanceolatis ovatis acutis longe petiolatis  
 caule ramo, spicis longis laxiusculis drupis testiculatis - compressis, longe procurrentibus, obliquis.

Var. *P. heterophylla*: Trich. nov. ed. II p. 36. Koch syn. f. germs. p. 221. Pantk. l.c. foliis sublongo-  
 bravioribus rigidioribus - Tyr. *P. heterophyllus* Schrad. spicis ff. lig. p. 21 - Icon. Rich. II.  
 germ. VII tab. XLII fig. 73, Th. - Hab. in aquo circa pagum Ceklja et in Riblje Jezero (MN)

Pantk. l.c. p. 222: Koch. l.c. Pantk. l.c. major, foliis superibus oblongis unicoloratis undulatis.

Tyr. *P. Zizii* Med. et Koch. - Icon. Rich. II. germ. VII tab. XXXVIII fig. 66-67 - Hab. in  
 aquo Riblje Jezero sub Moli Duvnitor (MN) Pantk. l.c. H. Julij. Perennif.

Ad *Potamogeton pusillus* L. Vis. ff. dalm. 191. p. 41 add. locum in lacu Caprius  
 et Panighe in ins. Veglia (Dalm.) Tommas. l.c. et in lacu Sedrani d. Sisjane (MN) Pantk. l.c.

### Lemnaceae Link.

Vis. ff. dalm. III p. 355.

Ad *Lemna minorum* L. Vis. ff. dalm. 191. p. 42 add. locum in aqua ad Covo  
 et Riblje Jezero, et circa pagum Ceklja et in Moko grope Sjela (MN) Pantk.  
 l.c. et sub monte Duvnitor (MN) Pantk. l.c. p. 88. et in lacu Caprius ins. Veglia (Dalm.) Tommas. l.c. p. 62.

### Akimaceae L. C. Rich.

Vis. ff. dalm. I. p. 191. (ad form. virga Cattara (Dalm) et Rieka (MN)) Pantk. l.c. p. 26.

Ad *Alisma Plantago* L. Vis. l.c. add. locum in recessibus lacus Scodrae ad Virje et other  
 (MN) Pantk. l.c. p. 87, et ad Var. *P. angustifolium* add. locum Caprius et Panighe ins.  
 Veglia (Dalm.) Tommas. l.c. p. 61.

### Butomaceae L. C. Rich.

et Danilov Grad (MN)

Vis. ff. dalm. I. p. 193. in pratinibus circa Rieka, Vis. Pantk. l.c. p. 26.

Ad *Butomus umbellatus* L. Vis. ff. dalm. l.c. add. locum in forez ad Rieka, Vis.  
 (MN) Pantk. l.c. p. 87.

### Ceratinae Agardh

Vis. ff. dalm. I. p. 194.

Ad *Arthropodium Ctenatum* L. Vis. ff. dalm. l.c. add. locum ad reges virga Drabinge (Hercz)  
 Pantk. l.c. p. 35, et ad rupes vallej Zeta sub Danilov Grad (MN), ad Crenica super Kalocsin

66. Sib.

ad Sutjarka (Boemia) Sendt., et in campis et vicini ad Bosunova et Veglie in  
mo. Veglie (Dalm.) Dominus. I.-c. p. 59

ad Arispochiam rotundum L. Vis. I.-c. adde locum inter pristes in Taroxij a curia Tribinje (Herzeg)  
et Ploča (MN.) Pantk. I.-c. et in pratis humicis vallis Beska, Capuccio, Panige in mo.  
Veglie (Dalm.) Dominus. I.-c.

Obr. Indicatrix etiam Arispochia longa L. a Scutellaria circa Potscha ad Tallernische (Bo-  
nia) cat. 215, sed non vid.

Ad Arispochiam pallidum Walst. et Kit. Vis. I.-c. adde locum inter pristes in m. Glev-  
grope Tribinje et circa Bilekti (Herzeg.) Pantk. I.-c. p. 35 et in dumos ad Cetina (MN.) Pani. p. 82.

Ad Afaron europeum L. Vis. fl. dalm. 2 p. 195-6 adde locum in Mlyavici Porečica  
et Raca Dol (MN.) Pantk. I.-c. et in Hrebrenik ejusdem loci et in Kotarne (MN.)  
Pani. I.-c. et a Bukovica ad Braunić, et super Bjelo ad Gradnichki (Boemia) Sendt.

### Empetrum Nutt.

Scpl. II. T. 233.

Flores unisexuales. Calyx tripartitus aereiorum imbricatus. Corolla trigaetita, laciniis  
cum sepalis alterantibus. Staminis tria libera sepalis opposita, antheri bilocularis.  
Ovarium liberum disco carnis in positione 3-6 locularia. Laciniis unisquamatis.  
Style subnudus, stigma rotundatum fuso. Entro in axi elongatione rectus, indica-  
ta ad hilum versa.

Fructus alpinus, foliis parvij semipervenientibus, corolla rosca, 1 taminius purpureus  
stigmata & radiata — Class. Disocia Brd. Triandria Syst. est. —

Empetrum L. gen. fl. p. 1100. Host. Flora p. 1650. Hort. Flora p. 656

Class. Flores siccis. Stigma q. radiatum. Druja unicocularis & q. sperma. — Class.  
Disocia Brd. Triandria Syst. sex.

E. nigrum L. sp. fl. p. 1650. Host. Flora p. 656. Reb. Koenig. p. 205. Pantk. cl. p. 82.  
E. caeruleum proeminentibus, foliis oblongis linearibus ex margini revolutis, marginibus  
subhyalinae altae conjunctis

Jean. SchK. deutsch. fl. tab. 818. Nees ab Spur. gen. fl. III tab. 17. Camer. epib. p. 47.  
Hab. sub monte Durnitor (MN.) Pani, et ad Borovica super m. Ponikar ad Vareš.  
(Boemia) Sendl. fl. rosca. H. vere. Bas. lignorum.

### Nymphaeaceae Salisb.

Vis. fl. Dalm. I. p. 196

Ad Nymphaea alba L. Vis. fl. dalm. I. p. 197 adde locum in Flumine (Vnosjevice)  
Reka prope Pjeka et Ploča (MN.) Pantk. I.-c. p. 97.

Ad Nuphar luteum L. Vis. I.-c. p. 197 adde locum ibidem, et in Ribnica Bezero infra  
Mali Durnitor (MN.) Pantk. I.-c.

### Coniferæ L.

Ad Pinum sylvestre L. Vis. fl. dalm. p. 199 adde locum in montibus Korn et Mali Durnitor  
(MN.) Pantk. I.-c. p. 30.

Ad Pinum Mughusum Scop. Vis. fl. dalm. p. 200. adde locum in m. Mali Durnitor (MN.) Pantk. I.-c.  
p. 30.

Callaceae Barth.

Vis. H. Dalm. 1. p. 183-184.  
Ad Curum maculatum L. Vis. H. Dalm. 1. v. 1.

Lentu.

Qd. Anemone italicum Lam. Vis. l.c. adde locum in Saxoniā circa Trebiingia ad pedem montis Glava (Hercyn.) Pantl. adn. p. 29, et ad sept. Cassione, Bonnito et alibi in ins. Veglie (Dalm.) Tommas. veg. d. Vegl. p. 62.

Ad *Avium orientale* Hs. fl. delm. t. p. 185 corr. *Avium Petteri* Schott. syst. Aroëd. I. p. 42  
et subjunge synonymon *Ari orientalis* Hs. t. c. (non Bieb.) ex Schott t. c. Adoë

Ad Biarium tenuisplenum Vis. l.c. substitui nomen Biasi <sup>(nominum Reichb. ex gen. Willd.)</sup> Anguillarum <sup>1804</sup> prod. yst. Aroid. p. 62 et excl. syn. Willd. Ad iconam Reichb. ex gen. Willd.

Dypheaceae Tuss.

Vis. fl. Tatton. I. p. 184

*Ad Pyxum latifolium L. Vis. f. dlm. c. p. 187. adde locum in aquosij circa Riedi  
grm in Bielagora (Herzeg) Pantk. adu. p. 29.*

Ad Typham angustifolium L. Vis. l.c. III p. 38 adde locum in aquacis inter Ma-  
nestre Zdebanum, et Martinicem (M.N.) Pant. l.c. p. 29, et ad foras circa Peniche  
in ins. Veglia (Salm) Donoras. veg. di Vegl. p. 62.

Ad Sporangium erectum T. V. f. dalem I. p. 187 vide locum in aquisq circa Skodjevra  
in Bielgora (Herceg) et ad rivulum Tivica circa Danilev Grad (nob. T. ramo 10  
Huds.) et circa Strajnici (M.N.) Pantk. I. c. ad foras in Dalle di Besca et Pnighe  
in ins. Veglia (Dalm.) Doramas. I. c. et in m. Vlastiv. ad Baklari, a Gussintaa  
super Kiselyak, et a Lopinica ad Voinica (Balnia) sendta.

Najadaceae A. Rich.

Vis. fl. palm. 1. p. 188. et suppl. p. 40

Ad Zannichellian majorum Borninghi: Vis. l.c. probabilitate refertur. Iacob L. paleympij  
Tommasi, veg. di Veg. f. 61 quae habitat in Stagnis ad Besanova, et sub m. Trishawaz (Salom.)  
sed hanc non vidi.

*Rida Najadum majorum* Roth. Vis. suppl. fl. dalm. p. 40 adde locum in palustribus sub monte  
Durmitor versu[m] *Strelac* (MN) *Pani*. l. c. et ad lacum Lepričić in ins. Vrgića (Dalm.)  
*Fommas*. l. c. p. 62.

Ruppia maritima L. Vis. fl. Dalm. suppl. p. 39 adde locum in præg. aquæ marinae ad  
Beronova et sub monte TrisKavez et alibi in ins. Vegia (Dalm.) Tommas. v. Vigl. p. 61.

Ad Polidonium Caulini Koen. Vis. Stockholm. 1.c.p. 189 adde locum ad mare in ins. Vegelin (Palm.)  
Dromedaria. 1.c.p. 62.

*Zosteran nanam* Röth Vis. I. p. 189 ponatur correctior atque perfectionis in diagnosis:  
*Zosteria marina* L. sp. p. 137. Host fl. austri. I. p. 1. Röth Fl. ex. p. 6. Vis. fl. Salen. II. p. 355.  
2. late linearibus 3-5 nerviis, spathe pedunculo inservit dilatata, mucrone striata.

*Phasmas grossly variegata* CXV.

Hab. in aged marlins left in Dalmatia. Tum contumex. tum in inv. H. aristata. Perea.

Hab. in open meadows taking Salicornia from salt marshes in vicinity. H. australis occurs. *Hordeum* (*Ceratophyllum*) *leucanthum* Gray Brit. pl. 1854 p. 554. *Hordeum* (*Ceratophyllum*) *leucanthum* Gray Brit. pl. 1854 p. 554. *Hordeum* (*Ceratophyllum*) *leucanthum* Gray Brit. pl. 1854 p. 554. *Hordeum* (*Ceratophyllum*) *leucanthum* Gray Brit. pl. 1854 p. 554. *Hordeum* (*Ceratophyllum*) *leucanthum* Gray Brit. pl. 1854 p. 554.

*Potamogeton* inter *ceratophyllum* *maritimum* *menthae* *cladophyllum* *forsteri* ex ovario & foliis  
et veluti foliis vix, 1795 et 1796 menses Novembris - Marzo - Aprili - Maii - Junii - Julii - Augus.

Ad *Potamogeton rotundatus* L. Vis. f. dolm. t. p. 192 adde locum in flumen  
*Trbinjica* prope *Trbinje* (Herceg) et in *Ribnje* *Tegero* infra *Mali Durmitor* (MN)  
*Panth.* t. c. p. 28, et *Panic.* t. c. p. 87; in lacubus et stagnis ias. *Vrgin* (Dalm.) ad *C.*  
*varicosa*, *Panighe*, *Lampi*, *Tomars*. t. c. p. 81.

Ad *Potamogeton flexuosa* Roth. Vis. f. dolm. t. p. 190 adde locum in lacu *Loc-*  
*rano* ad oppidum *Crnojevica* *Rijeka* (MN) *Panic.* t. c.

Ad *Potamogeton crispus* L. Vis. f. dolm. t. c. adde locum in flumen *Trbinjica*  
*sica* ~~flexuosa~~ prope *Trbinje* (Herceg), in *Ribnje* *Tegero* infra *Mali Durmitor* et  
*Rijeka* (MN) *Panth.* t. c., et in lacu *Sodrača* ubique (MN) *Panic.* t. c.; ad  
*Vale di Besanovo* sub m. *Trškačev* in iis *Vrgin* (Dalm.) *Tomars*. t. c. veg. v. cyl.  
publ., et ad *Ostrovina* super *Kiteljak*, *Duvie*, *Podgora*, ad *Passin* *Konak* (Bosnia)  
*Potamogeton luculentus* L. Vis. t. c. adde locum in *Ribnje* *Tegero* sub monte  
*Durmitor* (MN) *Panic.* t. c. p. 87.

Ad *Potamogeton perfoliatus* L. Vis. t. c. p. 191 adde locum in *Crije Tegero* et in *Uglača*  
*Durmitor* in lacu *Ribnje* *Tegero*, in flumen *Trbinjica* prope *Trbinje* sub nomine  
*N. decaide*, quod est *Var. 3* foliis ovato-lanceolatis; *Ribnje* (c. gerum. VII tab. 54) (Herceg) *Pan-*  
*tic.* t. c. p. 29, et speciem in lacu *Sodrača* ad *Svirje* (MN) *Panic.* t. c. p. 87.

Ad *Potamogeton pectinatum* L. Vis. t. c. adde locum in *Crije Tegero* infra *Mali*  
*Durmitor*, et in aqua *Mokro dno* prope *Rijeka* (MN) *Panth.* t. c. p. 29. — Postaddatur  
*Potamogeton rufescens* *Schrad.* in *Chemn.* adn. in *Kunth* f. 1. v. 3. *Ribb.* p. 190  
8. *Panth.* adn. p. 28.

P. foliis subnervis resiliens membranaceis, pellucidis, utriusque attenuatis, marginis  
laevibus, rotundatis coriaceis & levatis obtusis, in petiolam folie briviorum atque  
rursum, caule simplice, drupis lenticularibus marginis acutis.

*Hab.* in aqua *Ribnje* *Tegero* et *Crni Potok* (MN). *f. 1. v. 3.* *Ribb.* p. 190. *Fl. belar.* t. tab.  
4. *Fl. engl. bot.* tab. 1286.

*Hab.* in aqua *Ribnje* *Tegero* infra montem *Mali Durmitor* (MN). *f. 1. v. 3.* *Pereuni.*

*Potamogeton compressus* L. sp. p. 183. et Cod. n. 1040. *Hab.* f. 1. v. 223. *Ribb.* p. 190  
exc. p. 8. *Panth.*

P. foliis quinquenerviis breviter cuminatis, caule comppresso-tetragono ramoso, pe-  
dunculis sub *Utria* inusitatibus conglomatibus, perianthae phyllis transverso rotundatis, basi  
vis attenuatis, drupis ellipticis acutis laevibus, dorso tricarinatis.

*Syn.* *P. mucronatus* *Schrad.* in *Nom.* et *Schr.* 191st. veg. III p. 517. *Panth.* t. c. p. 29. *P. Zosteræ-*  
*folius* *Schrenk.* en. t. p. 50.

*Hab.* *Ribb.* ic. (crit. II fig. 208, et ic. *gerum.* VII tab. XXIV. *Oed.* f. 1. datu. t. tab. 206. *Im. cyath.* t. tab. 488.  
*Hab.* in aqua *Ribnje* *Tegero* infra *Mali Durmitor* (MN). *f. 1. v. 3.* *Pereuni.* — Addatur

(\*) Ad *Potamogeton perfoliatus* L. Vis. f. dolm. t. p. 191 adde locum in lacu *Sodrača* ad *Svirje* (MN)  
*Panic.* t. c. et adde *Var. 3* decaide: foliis ovato-lanceolatis — *Syn.* *P. densae* *Panth.* adn. p. 29 non *L.*  
*Syn.* *Riccia* ic. (crit. II fig. 54 — *Hab.* in aqua *Crije* et *Ribnje* *Tegero* infra *Mali Durmitor* (MN) et  
in fluviis *Trbinjica* prope *Trbinje* (Herceg) *Panth.* t. c.

*Potamogeton matricariae* L. sp. p. 184. Rich. fl. ex. p. 7. Pauth. ad. p. 29. Tommas. l.c. p. 61.  
*P. foliis omnibus submersis membranaceis pallidis linearibus, basi rugosantibus, rami*  
*le foliorum compacte ramoso, spicis longe pedunculatis interratis multifloris,*  
*drupis obovato-subglobosis carinatis.*

Japon. Rich. ic. geru. VII tab. XVIII. Boen. gl. II. var. p. 41 tab. 20 f. 5.

Hab. in aqua circa Jezero iuxta Mali Durnitov (MN) Pauth. et ad lacum Caprius  
 in ins. Veglia (Dalm.) Tommas.

*Potamogeton granularia* L. sp. p. 184. Host. fl. austri. I. p. 223. Rich. fl. ex. p. 8.

*P. foliis inferioribus attenuatim rotundatis membranaceis pallidis lanceolato-linearibus acu-*  
*minatis, convisis oppositis lanceolato-ovatis acutis longe petiolatis, cante ramosis,*  
*spicis longis laxi-pulchris drupis canticulari compresis, longe pedunculatis, obtusis.*

Vari. *P. heterophylla*: Dries. nov. ed. II. p. 36. Koch 1891 fl. geru. II. VII. Pauth. l.c. foliis  
<sup>membranaceis</sup> submersis rigidioribus - syn. *P. heterophyllus* Schreb. spic. fl. hirs. 21. - Rich. ic. geru. VIII  
 tab. XLII fig. LXXXII-LXXXV. - Hab. in aqua circa pagum Cetina et in Ribnje Jezero (MN) Pauth.

Var. p. *Zizii* Koch. l.c. Pauth. l.c.: major, foliis superioribus oblongis mucronatis undulatis que -  
 - syn. *P. Zizii* Mert. et Koch. Rich. ic. geru. VII tab. XXXVIII fig. 66-67. - Hab. in aqua circa  
 Ribnje Jezero sub Mali Durnitov (MN) Pauth. Hor. Julis. Perenn.

(D) *Potamogeton pusillam* L. Vis. l.c. pugl. p. 41. in lacu <sup>ad</sup> Caprius et Panighe. in ins.  
 Veglia (Dalm.) Tommas. l.c. et in lacu Scodano ad Sinjac (MN) Pauth. l.c.

### Lemnaceae Link

Vis. fl. dalm. tab. 355.

Ad *Lemnaceae minorum* L. Vis. fl. dalm. tab. p. 42. adde locum in aqua ad Crno  
 et Ribnje Jezero, et circa pagum Cetina et in Mostro prope Bjela (MN) Pauth.  
 l.c. et sub monte Durnitov (MN) Panić. l.c. p. 88. et lacum Caprius in Veglia (Dalm.)  
<sup>Tommas. l.c.</sup>

### Aldismaceae L. C. Rich.

Vis. fl. dalm. I. p. 191.

Ad *Aldima Plantagoides* L. Vis. l.c. adde locum in recessibus Lacus Scodani ad  
 Sirje et Vis. (MN), et ad Var. 3. <sup>partim</sup> *angustifoliam* adde locum Caprius et  
 Panighe ins. Veglia (Dalm.) Tommas. l.c. p. 61.

### Butoeaceae L. C. Rich.

Vis. fl. dalm. I. p. 193.

Ad *Buteomus umbellatum* L. Vis. fl. dalm. <sup>l.c.</sup> tab. p. 49. adde locum in foris ad  
 Rijeka, Vis. (MN) Pauth. Panić. cl. fl. p. 87.

### Cesariaceae Agardh

Vis. fl. dalm. I. p. 194

Ad *Aristolochia Clematitis* L. Vis. fl. dalm. tab. l.c. adde locum ad reges  
 circa Trebinje (Herceg) Pauth. l.c. p. 25. et ad reges vallej Zeta sub Danilov Grae (MN)  
 Panić. l.c. p. 82. (MN), ad Genicula <sup>partim</sup> *alta* Kalocsa ad Selyanka (Bosnia) Pauth. et in  
 campis et vallis ad Bosanova et Veglia in ins. Veglia (Dalm.) Tommas. l.c. p. 69.

Ad *A. rotundata* L. Vis. l.c. adde locum inter foecis in foris circa Trebinje (Herceg) et Novi (MN)  
 Pauth. l.c. in gratis humidis vallej di Bosca, Caprius, Panighe ins. Veglia (Dalm.) Tommas. l.c. p. 59.

Obs. Indicativa etiam *Aristolochia longa* L. a Tschirner circa Potcha ad Setenicki (Bosnia) cat. 215 videtur vide.

n

Ad Aristotelia pallidum Walst. et Kit. Vis. l.c. adde locum inter pratinus in monte  
Glor. prope Trabzon (Herczg.) Panth. l.c. p. 35. et in denario ad Collage (M.N.) Pani. p. 82  
Ad Aporum europeum L. Vis. l.c. p. 195. b. adde locum in sylvestris Peruvia et Parodis inter  
Sol (M.N.) Panth. l.c. et in sylvestris Dara Sol. et monte Asturian (M.N.) Pani.  
l.c. et a Butorissa ad Dravnik. et prope Biela ad Gradashkic (Bosnia) fundens.

### Eupetreeae Nutt.

Flores unisexuales. Calyx trifiditus aestivatione imbricatus. Corolla trigastris  
sepali alternata. Stomina tria libera, sepali opposita, anthers bicoculae ribus.

Bavarium liberum dips carnosum impositum 3-0. loculicis unius veluti 1. style  
submucro, ~~trigono~~, stigmata radiatione fuso. fructus drupaceus. ~~fructuosa~~ ~~fructuosa~~  
Prunus foliis parvif. crenopinnatis, corolla rosea, staminibus purpureis, stipulis 3 radiis.  
Empetrum foliis gl. p. 1102.

Clad. Flores digiti. Stigma 9-radiatum. Drupa unicostulata 8-9. sperma oblong. Doccia O.D. Troadis p. 92.  
E. nigrum L sp. p. 1650. Host fl. cult. et p. 856. Nbb. fl. ex. p. 4810 Pani. cl. of v. p. 82

E. u. libygoemimeticus, foliis oblongis laevicostatis margine rotundatis, marginis in

lato albo conjunctis, stipulis.

Iacob. Schkr. Deutsch. fl. tab. 818. Nec ab Ef. gen. et III. tab. 17. Camer. epil. p. 48.

Hab. sub monte Durmitor (M.N.) Pani. et p. 30 et ad Borovica regia monte  
Ponikva ad Vares (Bosnia) Sestra. H. vire. fl. vire. Bass. lignosum -

### Nymphaeaceae Salicis.

Vis. fl. salicis. I. p. 196

Ad Nymphaea alba L. Vis. l.c. p. 197 adde locum in fluminis Cyanopirica Bička  
prope Bička et Plaća (M.N.) Panth. l.c. p. 93

Ad Nuphar lutea Sm. Vis. l.c. p. 197 adde locum. indecum, et in loco Ribije-Sepuro infra Moli  
Durmitor (M.N.) Panth. l.c. p. 30

### Coniferæ A Brong.

Vis. fl. salicis. I. p. 198

ad Pinum sylvestre L. Vis. l.c. p. 199 adde locum in monte Konj. Kali.  
Durmitor (M.N.) Panth. l.c. p. 30

(xx) Ad Pinum nigra Host significans Hosty Vis. l.c. p. 199 adde synonimam P. Laricio  
var. B. nigricans: foliis crassioribus rigidissimis, pesco-ondib. Parlat. scat. IV.  
p. 55. P. Laricio B. austriaca Antonii conf. p. 4. et aeneum Antonii (fl. tab. 2. p. 20)

Pinus Laricio Boiv. in Lam enc. 5. p. 359. Koch. syn. fl. germ. II. p. 18. Parlat. fl.  
p. 55. P. foliis geminis viridis, quinque-lanceolatis, subulatis, late ullo, raro geminate,  
apertis, brevibus, acutis, subtiliter ciliatis, ciliis ciliatis, longioribus, ciliis ciliatis, pedunculis  
apicibus aliis, pinnetatis, striolis nitidis, ericiis, longioribus, pedunculis, pedunculis,  
striolis non multo longioribus, materiis resiliens patulis, <sup>D. 14</sup> longioribus, longioribus, longioribus

Iacob. Schb. il. germ. XI. Tab. Nov. Durham. v. tab. 67 et 71 f. 2.

Hab. circa Crakovae et in monte Tastrubica in Bjelovar (Herczg.), et in m. Konj (M.N.) vixit  
constans sylvis. Panth. l.c. p. 30 ab Ossiano supra Kiselskak, Turia, Podsolova ad Ponca-  
Konak. (See et in m. Vlasicz iugr. Balkari (Bosnia) Sestra. in ripariis in locis  
et in Veli Koja Tastrubica (M.N.) Pani. et p. 86. H. vire. Arbor.

xx ad Pinum Mugilans Scop. Vis. fl. salicis. I. p. 200 adde locum in aliquo monte Moli Durmitor (M.N.)  
Panth. l.c. p. 30.

Ad Pineum nigricansum Host. Vis. f. dalm. I. p. 199. add. syn. Pinus Laricio Desv. p. 3.  
*nigricans*: foliis sessiliis orbibus rigidis pulchris fuscocinereis Parlat. fl. Ital. V. p. 53.  
P. Laricio p. austriaca Bentham. Conf. p. 4 et iconum I. c. tab. 2. f. 2. Rochel sp. nov.  
 tab. 39 f. 81

Pinus Laricio Poir. in Lam. enc. V. p. 339. Koch syn. fl. germ. II. p. 267. Parlat. fl. Ital.  
 Panth. I. c. p. 30.

P. foliis geminis viridisibus, quamvis pilosatisbus lanceolata-rebuletis, late albo marginatis,  
foliis apicem acutis pinnatis, amentis rosulis cylindricis valde elongatis, strobilis  
latis arietis exsertis conicis pendulis, strobilis non multotis triseriatis, materiis  
semilibus pulchris, ala non leviora tripla longiora

Ikon. Rich. in germ. tab. DXXIV. Nov. Duham. V. tab. 67 et 81 f. 2.

Hab. circa Borovica et in m. Jaffrebita in Bjelagora (Herceg) et in m. Kom vostok  
 constitutus 1400m (MN) Panth. I. c. p. 30, et ab Ovissis super Kiseckik Durzi, 1000  
 metrorum ad Passin-Konak et in m. Glasinich super Baklava (Bosnia) Sedatn.; in rugo  
 strobilis m. Lovien et in Velika Japetka (MN) Pani. cl. p. 86. f. 2. vira. Obar.

Pinus Peuce Grisea Spic. Fl. rum. p. 349. Panth. I. c. p. 30 (exd. P. cerifera Will.)

P. foliis quinque strictis viridisibus, quamvis obtusatis, strobilis solitarius, ulcatus,  
glabris, semine brachiatim late

Hab. in nemoribus district. Donji Vojnjevici in monte Sjekirica super pagum Le-  
 kuler et Gračanica, 1100m. Mali Ka, Pani. cl. p. 86, et in montibus Drakaleve  
 (Bosnia), praecipue in Drćina ujoristje Kučke dictis usque Kom (in Albanie) Pan-  
 th. I. c. p. 30 (exd. P. cerifera Will.). <sup>1000-1200m. Albanie</sup>  
 Ad Pineum Abies Durzi Vis. f. dalm. I. p. 200. ade 1yn P. picea Rich. fl. exc. p. 159, et  
 locum in m. Jaffrebita in Bjelagora (Herceg) et in m. Kom (MN) Panth. I. c. p. 30, et sub  
 m. Durmitor (MN) Pani. I. c. p. 86, et ad Borovica super montem Ponikva et  
 Vares (Bosnia) Sedatn. - Cedatn.

Pineus exaltus Lam. fl. fr. II. p. 202.

P. foliis solitariis compreso-planois mucronatis pubescens, attinguens viridisibus, simi-  
bilis cylindricis pendulis, quamvis exato-dentatulatis parallele bilobis.  
 Syn. P. picea Durzi Karbh. vol. 2 f. 110. Obis exaltus Poir. in Lam. enc. VI. p. 618. Rich.  
 fl. exc. p. 159.

Ikon. Rich. in germ. XII. tab. DXXII. Rich. conf. tab. XIV f. 2 et tab. XV. Lamec epiphys p. 48.

Hab. sub monte Durmitor praecedente rivo (MN) Panth. I. c. et ad Borovica  
 super montem Ponikva et Vares (Bosnia) Sedatn. H. Obar.

Ad Tuniperum communem L. Vis. f. dalm. I. p. 205. ade locum in rjaboticijs ad  
 pedem Mali Durmitor circa pagum Kovčice (MN) Panth. adn. p. 29, in rivo 1400m  
 Grškovo (MN) Pani. I. c. p. 86, et a Maglic ad Novac et Doboj (Bosnia) Sedatn.

= Ad Tuniperum nanum L. Vis. f. dalm. I. p. 203. ade locum in rjaboticijs m. Jaffrebita  
 in Bjelagora (Herceg), et in montibus Kom et Mali Durmitor (MN) Panth. I. c. p. 30.

Ad Tuniperum Brevicadrum L. Vis. f. dalm. I. I. c. ade locum in ~~parte~~ <sup>Taxodii in</sup> Gleva  
 prope Trestinja, et Draca prope Pridvorice (Herceg) Panth. I. c. et in rjaboticijs Lovica  
 (MN) Pani. I. c., et iisdem locis ad Vrgles et Cugiono et aliis (Bosnia) Sedatn. I. c. p. 61.

Ad T. phoeniceum L. Vis. f. dalm. I. c. ade locum in parte australi ins. Vrgles et Pažuge (Bosnia)

Ad T. Sabina L. Vis. I. c. ade locum in monte Bjelagora, Durmitor et Kom juxta Panth. I. c. illyr.

Sonime.

- Ad *Ephedra campyligynum* C. A. Mey. tip. l. c. adde locum in vegetibz circa  
Herceg (Herceg) Pantk. l. c. et in vegetibz grad Ottog. (MN) Pantk. l. c.  
Ad *Dactyloctenium baccatum* L. Vis. l. c. p. 205 adde locum in vegetibz monaj Dacmito  
(MN) Paní. l. c. Myr. Tisovina.

### Ramentaceae

Vis. fl. Dalm. l. c. p. 206.

- Ad *Fragaria sylvestris* L. Vis. l. c. p. 206 adde locum in sylvestribz montium Bjelolasca  
(Herceg) et in toto (MN) Pantk. l. c. p. 31. et in montibz Lovcen, Tivica, Savoje,  
et in corallibz Moraca et Jara Paní. l. c. p. 84. et ad Potokom usque ad Sutle  
nici, et a Gradacibz ad Srebrenik, et in Vlastich usq. Baskaci (Bosnia) Sestrov.  
Ad *Quercus Robur* L. tip. l. c. p. 207 adde syn. L. pedunculata Hoch. Arbor. p. 73.  
et locum in dumosibz valle Zeta sub Danilov grad (MN) Paní. l. c. p. 84. et a Stan  
dak usque ad Sutle, ab Uffjane usq. Kiseljak, Drini, Podgorje ad Popin-  
Konak, a Gradacibz usq. Srebrenik, et in Vlastich usq. Baskaci (Bosnia) Sestrov.,  
non non in locis paludosibz ad Capriciose in ins. Veglia (Dalm.) Tommas. l. c. p. 60.  
Ad *Quercus pubescens* W. tip. l. c. p. 208 adde locum circa Martinice (MN)  
Pantk. l. c. in collibus apenni sub m. Sutorom, sub Velika Sutjeska et ad  
Ottog. (MN) Paní. l. c. ad Suja usq. Bosnijava, et a Cizer ad Livno, et  
non in monte Brogle (Bosnia) Sestrov. deinde in nemorosis Veglia et Bela  
nova (Dalm.) Tommas. l. c. - Ad *Q. pubescens* B. intermedium Vis. l. c.  
suppl. p. 45 adde syn. Q. Tommasini Rotsch. Q. pubescens Var. racemosa Tommas.  
l. c. p. 60, quae habitat in nemorosis valle Bela et Savine in ins. Veglia (Dalm.) Tommas.

- Ad *Quercus Cerris* L. Vis. fl. Dalm. l. c. p. 208. adde locum in monte Glava grope  
Trboje et circa Bilecki (Herceg), Martinice, Manastirska Duga, Lukovo et  
Skradnicki (MN) Pantk. l. c. p. 31. et in sylvestribz sub m. Javorje, in valle  
Moraca superiori, et sub m. Sutorom (MN) Paní. et p. 84. et a Gradacibz  
usq. Srebrenik (Bosnia) Sestrov. Additum quodque synonymum *Quercus* ~~Europaea~~  
W.-p. fl. IV. p. 654. et locum circa Panjica, Veglia, Savine in ins. Vegli. (Dalm.) Tommas. l. c. p. 60.  
Quercus castaneifolia C. A. Mey. fl. caucas. p. 44. Pantk. adn. p. 31. Paní. adn.  
et p. 84.

- Q. romana petiolata velutina, foliis oblongis undulatis sinuato-dentatis, ven-  
tibus mucronatis, stipulis linearibus, anthis petiolis, fructibus subcavatis, capsule  
hemisphaerica squamis sericeis reflexis, inferioribus orato-cuspidaatis.  
Icon. Rotschy excha. tab. 40.

- Hab. circa Martinice in valle Jasla (MN) Pantk. et in saxon. Pinne Straße, in  
Hochste Hikrsicka Rega, et ad Dobro Stane distr. Ceklici - Myr. Cesmin. ex Paní.  
l. c. p. 84.

- Quercus lesseliiflora Sm. fl. brit. III. p. 1026. Host fl. austriac. II. p. 622. Hoch. syn. n. fl.  
gemin. II. p. 836. Paní. l. c. p. 84.

- Q. foliis longe petiolatis strobilis sinuatis glabris, lobis rotundatis, nutatis, pedunculis pa-  
tibus subaequalibus brachioribus usque, squamis capillaceis adpresso.

- Syn. Q. Robur B. L. fl. 1801. c. II. p. 340. Q. Robur Roth. tent. I. p. 408. Schb. fl. exc. p. 177.

- Icon. Schb. deutsch. K. t. 301. b.

- Hab. in sylvestribz valle Moraca usq. (MN) Paní. fl. Mayo, Junio. Arbor.

IV Quercus conferta Kit. Rehb. ic. germ. XII p. 8. Panie l.c. p. 8k.

~~2. foliis subcordatis basi cordatis, obovatis, subrotundatis - pubescentibus  
angustissimis et recte pinnatis, petiolis leviter levigatis, amentis mucronatis  
basit laxifloris, apice clavato-confertis. Stipulis anguste obovatis - oblongis, bracteis  
spatulatis, stipularibus obovatis bifidis, pedunculis brevissimis, ramosis cuneolae  
adpresso~~

~~Lvs. & fructu~~

~~angustissime et recte pinnatis, petiolis leviter levigatis, amentis mucronatis  
basit laxifloris, apice clavato-confertis. Stipulis anguste obovatis - oblongis, bracteis  
spatulatis, stipularibus obovatis bifidis, pedunculis brevissimis, ramosis cuneolae  
adpresso~~

Syn. Q. Farnottii Denov. tab. h. n. op. 1819 p. 63 (per err. Rainetto) / s. conferta. Agh.  
DC. prodr. XVI sect. II. p. 11.

Zon. Rehb. ic. germ. XI tab. DCXLVI. Kotsch. eichen. tab. 14.

Hab. in dumentis district. Bralonoviči, et inter Danilos Grad et Savica distr. Biće  
Topavlići (MN.) Panie.

ad Corylum avellanae L. Vis. f. dalm. I. c. p. 209. Host fl. austri. p. 628. Rehb. f. exopt. p.  
ad locum in Dumenti m. Glava prope Trebinje, circa Vraca et Bjelagovo (Hrvac.)  
circa Danilos Grad, in Vraca dol. Erna Planina, in Perušica dol. et Šara dol.  
infra Kom, in valle riuuli Bistrica circa Nižin Luk, circa pagos Lipovo, Kovića  
Luk et Drvenić (Mlt.) Panth. I. c. p. 31, in Dumenti prope Četinje, et ad marginem  
sylvorum in valle Moraca et Zeta (MN.) Panie. l.c. p. 8k; et ad Pruzine, ad Novi  
Luk et Skopje (Bosnia) Sandor. Adstatuer

Corylus Colurna L. sp. gl. p. 141. Rehb. f. exopt. p. 186. Panie. l.c. gl. p. 85.

C. stigmalis linearibus acutis, foliis cordato-subrotundatis obovatis incisis-angula-  
tis, nunc abbreviata calyx fructus exterior multiguttata, interior tri-  
partita, lacciniis palmatis, pectinatis

Icon. Rehb. ic. germ. XII tab. DCXXXVIII fig. 1303. Leb. mes. I. tab. 2 p. 2. Kosch. pl. p. 11.  
Hab. in taxoij ad Kosarice var. grossa a Četinje, et sparsum in toto dist. Lekići  
et Kuci. Febr. ad Majum. Illuv. Semisijka ex Panie. l.c., sed non vidi. Fructus.

- 26-8837-88-89
- Ad *Corylus Colurna* L. 1411 Host. fl. austri. II p. 627, Hab. fl. exq. p. 176. Panic Engl. p. 55.  
*Corylus* subspicata - brachy cordatis rump - angustata, prae aberrante foliis fructuosa non  
*C. avellana* L. - angustifoliae foliis ex parte extenuis, ex parte multi-petiolata interior  
 tripartita, lacinia palustre trifida, foliis subobcordatis cordatis rump angustata.
- Hab. in aliorum XII tab. DCCXXXVIII p. 130<sup>2</sup>
- Syn. Schlecht. deutsch. fl. & 305. Sch. med. I. tab. 27. p. 2. Clar. hist. p. 16-11  
Hab. in saxonij ad Kopariice non squalid a Cettigia, sed sparsim in toto districte Cettigia & Saxonia  
H. nobr. ad Mojum - Hlyz. Semisylpha et Panic. L. c. Leaven wood.
- Ad *Carpinus Betulus* L. Pis. I. c. p. 210. ad locum in sybericus montis Veteris grape Bra-  
ta mojici (MN) Panth. I. c. p. 31, in syberibus ab m. Lovicea, in valleby Zete et Norze (Mlyz)  
Panic. I. c. p. 85. a Vranduk ad Sebreke (Bosnia) Sentnor. et var. squamata a Varech ad Savnia  
Velat et ad Samitovat (Bosnia) Sentnor.
- Ad *Carpinus* Quinquefida Stev. Vis. I. c. p. 210 ad locum in sybericus m. Glina grape Trebitz  
 (Herzeg) Panth. I. c. ad Bukovizza, ad Crničica rump Kalecian ad Sutynska et in Roloch  
 (Bosnia) Sentnor. in collibus mysticibus ad Borovo, Capriccio, S. Maria di Capo ins. Veglia  
 (Dalm.) Domunc. I. c. p. 60, et sub nomine C. orientalis Lam. in saxonij ad Cettigia  
grape, Grashov (MN) Panic. I. c. p. 85. Hab. in germ. XII tab. DCCXIV  
 (Balt. region). XII tab. DCCXXV hab. O. v. v. g. 57.
- Ad *Ostrya carpinifolia* Stev. Vis. fl. dum. I. p. 211 ad locum in sybericus montium Glina  
 et Družin prope Trebitz, circa Bilaki, in villa Nadej Bozo, et circa Vilic in Bjel-goša (Herzeg), in syberibus ad Ostryg (Mlyz) Panic. I. c. p. 31 Vranduk versus Sebreke (Bosnia)  
Sentnor., et in nemoreij ad Borovo, Vale di Besca, Ruggeria, Pasigha in ins. Veglia  
 (Dalm.) Domunc. I. c. p. 61.
- Ad *Alnus glutinosa* Gaertn. Vis. fl. dum. I. p. 211 ad locum in aquacu ad rivalem  
Plavna grape Lipovo (MN) Panth. I. c. p. 30, a Turintian rump Kiseljak et  
Lipenice rump ad Zoinica (Bosnia) Sentnor. - Hinc ad latius Panth. c. p. 30.
- Alnus incana DC. fl. dum. I. p. 304. Hab. fl. austri. II p. 624 Hab. fl. exq. p. 125. r.  
A. foliis ovalis acutis argute duplice - serratis subtriangularibus subtomentosis, mentatis  
glabris perianthio quadrifido. syn. Betula inana L. fl. exq. p. 417. 4
- Hab. in germ. XII tab. DCCXXV. Clar. hist. p. 12. f. 2. f. Baum kipp. p. 154.
- Hab. ad riga fleminis Tar infra montem Korn (MN) Panth. leaves, ad Turintian rump  
Kiseljak, ad Lipenice rump ad Zoinica (Bosnia) Sentnor. H. nobr. Agr. Arbor.  
post autem genua Betula L.
- Gen. pl. n. 1052
- Char. Nervis unisexuatis monosperma. americana Monocotyledon Ma. 803  
trigynophloio pedicellato, staminibus sex, foecundis squamis bei dilatatis, decurrentibus fl. tab.  
basi concreta deciduis, tri-infras. Ovarium biloculare, trigonum trigynum, nerve oblique mon-  
Betula alba L. sp. p. 1593 Host. fl. austri. II p. 824. Hab. fl. exq. Koch 159. fl. exq. p. 260  
B. foliis rhombico-triangulenter longe acuminatis duplice - serratis glabris, amentis  
fructuosis longe pedunculatis pendulis, foliis latitibus squamis ruscis, ruscibus lobis  
ala nucis nra diglo lobation. Panth. I. c. p. 30
- Syn. B. verrucosa Host. Betula 6. 98. Hab. fl. exq. p. 174 que var. B. pubescens Host. r.
- Hab. fl. exq. bet. t. 2698. fl. dum. t. 1467. Hab. fl. exq. p. XII tab. DCCXXXI.
- Hab. in sybericus Peruvica Dol infra Korn, et riga grape Lipovo ad potam montis Sinjalicha  
Planina Vratlo diam. fl. Agr. Mayo. Arbor excelsa.
- Ad Fosche ad Titteniche, a Vlastich rump Baklan, a Zoinica ad Kavnick (Bosnia) Sentnor.

Vis. b. C.E.P., 211

- Ad *Salicaceae* L. Vip. p. 212. ad locum ad ripas fluminis Trebinjice circa Trebinje (Hab.) Panth.  
 via valle Zeta super Danilov grad, prope Grabovo (MN) Panth. cf. pl. 85. in Grandasch (ad  
 Šebernik (Bojana) Sestrn. et ad foras et loca humida ad Vogli, lagunis (Dalm.) Panth. t. e.  
 Ad *Salicaceae* Schleb. Vip. t. 1. p. 213 ad long ad ripas rivuli Tuzine in Biograd (Hab.)  
 circa Rijeka, et in valle flum. Tara infra m. Korn (MN) Panth. t. c. Ad ripas Timjane et Vir (MN)  
 Panth. t. c. p. 85, circa Dravnik (Bosnia) Sestrn.  
 Ad *Salicaceae* L. Vip. t. c. in heudic circa Rijeka et Melica prope Bjelo (MN) Panth.  
 t. c. in Vranduk ad Šebernik, a Šebernik ad Šebernik, et ad Gospicja (Bosnia) Sestrn.  
 et ad loca Vara. aquatilium (Hab.) Panth. t. c. p. 85. foliis obvolutis Koch vgn. fl. germ. II. p. 248.  
 quae habitat ad rurum Passira voda prope pagum Koviceva infra m. Mali Drenicor (MN)  
 Panth.  
 Ad *Salicaceae* L. Vip. t. c. p. 212 in rybnici m. Riva prope Trebinje, et Pogoribice  
 in Biograd (Hab.) et in Peršica et Dar Dol infra Korn (MN)  
 Natur. *Salicaceae* L. Vip. t. c. p. 85. *Parlat. fl. Ital. 117* p. 239  
*Salicaceae* L. Vip. t. c. p. 85. *Parlat. fl. Ital. 117* p. 239  
*Salix grandifolia* Swingle. sal. helv. p. 20. Rchb. fl. ex. p. 120. Koch. vgn. fl. germ. II. p. 239  
*S. glauca* var. *erecta*, foliis oblongo-obovatis planis obsoletis undulatis serratis glabris, petiolis  
 cuneatis glaucis puberulentibus, stipulis reinforcing, genuinis glabris, anthers rotundatis,  
 lobatis, fructificans pedunculatis, capitulo ovato-lanceolatis pedicellatis, style brevissimis.  
 Icon. Rchb. II. germ. XI. p. 444 MN XXV.  
 Hab. in monte Vlastik regio Boklari (Bosnia) Sestrn. fl. Agr. Mejo, Bobovac.  
*Salix* ~~Wolffiana~~ L. Vip. fl. p. 165. Rchb. fl. ex. p. 168. *Parlat. fl. Ital. IV. 2. 269*  
 1. foliis opacis, vel errectis rufis, ramulis geniculatis pubescens, foliis petiolatis. Lanceolatis  
 serratis, glandulosis, ruginosis, glabris, vel his glaucis, 1.5-2 cm. longis, anthers rotundatis,  
 acutangulis, maribus breviter pedunculatis, fructificans longis pedunculatis, pedunculis foliatis, capi-  
 lis ovato-conica, tomentosa, breviter pedicellatis, style longis.  
 Syn. *S. glauca* L. fl. p. 162 f. Weigeliana W. fl. IV. p. 878. *Parlat. fl. Ital. I. 17* p. 22  
 IV f. 679.  
 Icon. Wahlenb. fl. legg. p. 263 tab. 16 f. 2. L. fl. legg. 1. 8 f. 2. *Tecophilae* fl. t. 16 f. 28  
 Hab. in graniticis monte Sjenjavina Planina (MN) *Parlat. fl. Ital. I. 17* p. 22 f. 28  
 (Bosnia) Sestrn. fl. Turia, Reko.  
*Salix Glabra* Scop. fl. carn. 2. II. tom. II. p. 255. Koch vgn. fl. germ. II. p. 252. *Parlat. fl. Ital. 117* p. 253  
 1. foliis opacis, ramulis rufis, glabris, foliis petiolatis glabris rubris glaucis, densestis subciliatis  
 pedunculatis, pedunculis foliatis, capitulo ovoides, subulatis, glabris, perianthatis.  
 Syn. *Salix Welfariana* W. fl. p. 660  
 Icon. Rchb. icon. germ. XI fig. 44 MN XI  
 Hab. in monte Vlastik, et aqua ad Boklari, et a Mali Sandik ad Velika Ravan (Bosnia) Sestrn.  
 fl. Turia.  
*Salicaceae* L. Vip. fl. dalm. 3. p. 213. Natur.  
*Salicaceae* L. Vip. fl. dalm. 3. p. 213. Natur.  
*Salix repletiorifolia* L. Vip. fl. dalm. 3. p. 213. Koch fl. ggn. fl. germ. II. p. 258. Rchb. fl. ex. p. 1667  
 1. foliis opacis, foliis linearibus aut lanceolatis, lanceolatis acuminatis, planis, 1.5-2 cm.  
 longis, stipulis lanceolatis, anthers rotundatis, fructificans pedunculatis, breviter pedunculatis, pe-  
 denatis foliatis, capitulo ovato-lanceolatis, longe pedicellatis, style brevi.  
 Syn. *S. virginalis* - regens Larch. Panth. t. c. p. 52. *S. farvi* Larch. et longus Host fl. germ. II. p. 642. *S. literaria*  
 Host. fl. germ. II. p. 643. *S. farvi* Larch. et longus Host fl. germ. II. p. 642. *S. literaria*  
 Host. fl. germ. II. p. 643.  
 Hab. ad lacum Rijeka prope Bogum Koviceva 20 faden in. Mali Drenicor (MN) Panth. fl. Rijeka.

- B-90-91-32
- Ad *Salicem fragilis* L. Vis. l.c.p. 212 ad locum in duaretis ad rivo Zeta et *Morava*  
 (MN) Panč. l.c.p. 85, ac addaties *S. fragilis* L. V. *Querciana* Koch. l.c.p. 71  
 et loco iuxta Travnik (Bosnia) Scandta.
- Ad *Salicem amygdalaeum* L. Vis. l.c.p. 217 ad locum ad rivo Zeta et prope *Banjac*  
 (MN) Panč. l.c. et ad Mravich, Doboi, Kotorško usque ad Totscha (Bosnia) Scandta.  
 Autobella in tab. p. 112 nec non ad marginem fonsarum *Jarice*, *Cognice* iuxta Voglie (Dalm.) *Dominus*. l.c.p. 61
- Ad *Salicem purpureum* L. Vis. p. 213 ad locum ad rivo *Tinjue* et *Viv.* *Panč.*  
 circa Travnik (Bosnia) Scandta. et ad marginem aquarum, et loca humida iuxta Voglie (Dalm.)  
*Dominus*. l.c.p. 61.
- Post addaties
- Panč. l.c.p. 8. *Panth*. l.c.p. 32.
- Salicem veterana* L. sp. pl. p. 1445. *Hartl* fl. aust. II. p. 654. *Rchb* fl. a. p. 166. *Panth*  
*S. effuticosa* ~~Krapen~~, foliis brevifloris petiolatis obtusatis aut crenato-oblongis obtusis  
 glabris, amentis pedunculatis, pedunculo foliato, fr. capitulo ovo-coriaceo globoso bracteis  
 pedunculatis
- Syn. *Salix rosguttifolia* Scop. fl. carn. c. II. p. 255. *Jacq.* fl. austri. III. tab. 298
- Icon. *Rchb.* c. gen. XI tab. 1186, 1187, 1183. *Bacon* mus. n. c. tab. 1. *Scop.* l.c. tab. 61.
- Hab. in saxonis montibus *Tascibica* in *Biogradzka* (Herceg) et in montibus Kom et *Mali Dur-*  
*mitor* (MN) *Panth*. et istem locis in *M. Durmitor*, cum *Vav.* *B. majore*, foliis  
 petiolatis, longi amentis multijloris Koch. l.c.p. 89 - Syn. *S. Kitaibeliana* W. sp. fl.  
 18 p. 683. que habitat in iugo Strelac sub *Uvena* *Stjena* (MN) *Panč.* *N. Sul.* *Aeg.*
- Ad *Populeum album* L. Vis. l.c.p. 24 ad locum ad rivo *Valla* *Morava* (MN) *Panč.* l.c.p. 85,  
 circa Mravich, Doboi, Kotorško usque ad Totscha, et ad *Majlac* (Herceg) Scandta.; et  
 in locis humidis *Jarice* in ins. *Voglie* (Dalm.) *Dominus*. l.c.p. 61.
- Ad *Populeum tremulae* L. Vis. p. 214 ad locum in iugis montibus *Glica* prope *Va-*  
*brijie* (Herceg), in valle *Perevica* Dol iuxta Kom et in *Sinjalica* *Neretva* (MN)  
*Panth*. l.c.p. 33; in iugis montibus in *M. Durmitor*, in valle *Morava* et *Tara* (MN) *Panč*  
 l.c.p. 85; et Travnik ad *Bjela* et *Gardische* (Bosnia) Scandta.
- Ad *Populeum nigrop* L. Vis. p. 315 ad locum in iugis circa *Dubovac* in *Biogr-*  
*ad* (Herceg) *Panth*. l.c. ad *Majlac* usque ad *Mravich* et *Doboi* (Bosnia) Scandta.  
 et in locis humidis, ad *Dobrinje* in ins. *Voglie* (Dalm.) *Dominus*. l.c.p. 61
- Faglandaceae* DC.
- Ad *Faglandem regiam* L. Vis. p. 215 ad locum circa *Voglie* (Dalm.)  
Viv. fl. dalm. I. p. 215 ad locum circa *Voglie* (Dalm.)  
 circa *Dominus*. l.c.p. 60 et in loca *Zala*. Herceg. et *Biogradzka* *Panth*. ad. p. 112.
- Arctiaceae* DC.
- Viv. fl. dalm. I. p. 215
- Ad *Urticam urentem* L. Vis. l.c.p. 216 ad locum in cultis circa *Grubinje* (Herceg) *Panth*. l.c.p. 32  
 circa *Domos*, ad rivo *Voglie*, *Beskanova* (Dalm.) *Dominus*. l.c.p. 60 et in *gratibus* rivo *Viv.* (MN)  
*Panč.* l.c.p. 83. et in Travnik, in *Vlajka*, et *Bunabsoshin* (Bosnia) Scandta.
- Ad *Urticam dioica* L. Vis. l.c. ad locum ut supra, et *Capriac* (Dalm.) *Dominus*. l.c., et in cultis ad  
*Grubinje*, *Sljeka*, *Viv.* (MN) *Panč.* l.c.
- Ad *Urticam glauca* L. Vis. l.c.p. 217 ad locum et *deser*. *Panth*. ad. p. 32.
- Ad *Urticam membranacea* L. Vis. l.c. ad locum in rivo *muromac* iuxta *Prevara* (Dalm.) *Panth*. l.c.  
 et in cultis ad *Viv.* (Dalm.) *Panč.* l.c.

Ad *Pentstemon officinalis* L. Vis. fl. Doln. 1997 p. 46 ad locum in saxonij circa  
Trebinje (Herceg) et circa regnum Bosniee infra Montem Durmitor (MN) Panth. l.c.  
var. *durmitoreus* (P. B.) Tsch. f. 1997 MN. et in saxonij montibus ad Cetinje et Vis (MN). Parc.  
in Vrgor (Dalm.) c.p. 83, et loci umbroris ad horavaeum Veglie (Dalm.) Tommas. l.c. p. 60  
et a gradusbas ad Sabacnik (Bosnia) Santic. sub P. ex. recta MN.

Ad *Himularia Lupulina* L. Vis. l.c. p. 219 ad locum in demetia circa Trebinje (Herceg) et  
Bihać, Daulica Grad, et Nigra Lek (MN) Panth. l.c. p. 32, in valle vallis Lete cum  
Danilov Grad (MN) Panth. l.c. p. 84, ad leges ad loca humidae, Callobromeliae in vallis  
(Dalm.) Tommas. l.c.

Ad *Moschata album* L. Vis. fl. Doln. l.c. p. 219 ad locum circa Trebinje (Herceg) Panth. l.c. p. 36.

Ad *Ficaria Circa* L. Vis. l.c. ad locum in regione riparia circa Zagreb (Dalm.) Trebinje (Herceg)  
circa Bjelka, Manastir Duge et Posav (MN) Panth. l.c. in saxonij ad Konavle, Stjepac et Vis  
(MN) Panth. l.c. p. 84, in vallis culta ea nec Veglia (Dalm.) Tommas. l.c.

Ad *Celidium austrole* L. Vis. fl. Doln. l.c. p. 221 ad locum circa Trebinje (Herceg) Panth. l.c. et in  
Saxonij ad Ostrog, in dicto Konavle (illyr. Kostola), Etiam in vicinorum S. Maria di Capo, Flaminio  
Beccarese in vallis (Dalm.) Tommas. l.c.

Ad *Ulmus campestris* L. Vis. l.c. p. 221 Panth. l.c. p. 86. ad locum in demetia sub m. Lovcen, sub  
Danilov Grad. et ad Vis (MN) Panth. l.c., ad Maglar upon ad Novi Grad et Doboci (Bosnia) Santic  
ad datam.

*Ulmus effusa* W. P. Schafft. f. brev. n. 296. et sp. l.c. p. 1325. Hett. f. auct. n. p. 320

fl. foliis duplicate-lanatis lsf. inaequalibus, floribus pedunculatis pendulis, fructibus marginis vallis  
ulicatis pedunculis multo bruniorebus Koch. syn. f. genn. ad sp. p. 735.

Syn. U. effusa Schafft. Adib. f. ex. p. 180

Icon. Schafft. t. tab. 57. a. b.

Has. cum precedente (Bosnia) Santic. H. Martin, Argenti - Sedmer.

### Tantillaceae R. Br.

Vis. fl. Doln. l.c. p. 222.

Ad *Thefium Linophyllum* L. Vis. fl. Doln. l.c. p. 222 ad locum Var. major Neid. fl. v. Niedermüller  
p. 381, et typ. T. montanum Stev. cum icono R. Sch. iconogr. f. 1997. et in bot. XXI p.  
1161 et locum in graminis in Glava prope Trebinje, circa Dubrovnik prope Orahovac  
in Bjelgora (Herceg) Panth. l.c. p. 34. et agri Sutjaga ad Koprivnica (Bosnia) Santic.

Ad *Thefium divaricatum* Tsv. Vis. l.c. ad locum in vallis circa Trebinje (Herceg), et Bogetice (MN)  
Panth. l.c. et in saxonij ad Ljubnici sub m. Drvica (MN) Panth. l.c. p. 82 et ad Ljuba prope Bon  
voglavu, et ad Ljuba upe ad Ljuno (Bosnia) Santic. Dein adas  
*Thefium humifusum* A. DC. f. r. v. p. 386.

Th. radice perpendiculare ramosa, caulinis persistens vel ascendentes, ramosis, ramulis floriferis  
deinceps petiolis, ramis superiorum marginis scabris, foliis linearibus, <sup>obsoleta anatomico</sup> <sup>fractis</sup> acuminatis,  
vel media <sup>longioribus</sup> <sup>longioribus</sup>, rarae ovata subrotundis, perianthio fractis <sup>longis</sup> bracteis toruus.

Icon. Adib. ii. genn. XI tab. 384. l.c. p. 1153.

Hab. in graminis montis Glava prope Trebinje ad <sup>in vallis</sup> Brod prope Uzice in Bjelgora (Herceg). Panth.  
l.c. et in ripariis ad Ostrog, et in saxonij Kostola Luka (MN) Panth. l.c. H. Ante. Perenn.

Ad *Thefium Pavonis* A. DC. Vis. fl. Doln. applicata ad locum in saxonij m. Favore et m. Velika Kaprice (MN)  
Panth. l.c. p. 82. Dein adas

*Thefium alpinum* L. f. p. 301. Hett. f. auct. I. p. 212. Adib. f. ex. p. 137

Th. radice fusiforme, caulinis persistens, ramulis floriferis exsertis, foliis linearibus acuminatis,  
bracteis toruibus, raro longioribus, perianthio rotundis, bracteis <sup>longioribus</sup> <sup>longioribus</sup> - Icon. f. R. Aug. v. 1997. R. Sch. iconogr.  
hab. in ripariis in Crna Planina p. m. Mol. Lovcen (MN) Panth. l.c. perianthio rotundis, bracteis <sup>longioribus</sup> <sup>longioribus</sup> - Icon. f. R. Aug. v. 1997. R. Sch. iconogr.

ad M. Kriva, supra Kostola, Dale Santic et Velika Kaprice (MN) Santic. 21. May. Tunc. Perenn.

Juglandaceæ L.

Ad Juglandem regiam L. <sup>Vit. 11. folio 213.</sup> f. dalm. I. p. 216 adde locum <sup>ad</sup> Veglia, Gari  
ze (Dalm.), sed culto. Toscanas. I. c. p. 60, ~~et in toto Dalmatia~~  
Hercegovina et Crnojora, Panth. adn. p. 112.

Urticaceae DC.

Kir. fl. dalm. I. p. 215

Et ultimum resurrexit C. Vir. 1. c. p. 216 add. locum in vallis uia Trebinger  
(Hercz) Panth. 1. c. p. 32, circa domos et ad reges Vegio, Berenice (Bala)  
Domus. v.g. Veg. p. 60, in plateis vici Vir. (M.N.) Pan. 1. c. p. 83, et ad Trajanis  
in monte Vassich, et ad Bunar boshie (Bomia) Senectu.

ad Utricam dioeciam L. Or. 1.c. adde locum ut in precedente, et ad Capriacum  
in insula Vigilia (Dalm.) Tomarus 1.c. et in cultis ad Cettio, Ricola, Vix (Alt.)  
Pani. 1.c.

*Ad Urticam glabratam* Clem. Nir. l. c. p. 217 additum in tyberinij Regno  
Korita in Biclagora (Herzeg.) et in valle Viperae infra montem Vna Plana (Heg.)  
et obsco in loca. Pauli. l. c. p. 17.

Ad Urticam membranaceam Pers. Var. f. delatae (L.) - ad locum in vicinij numerosim circa  
griseo (Salon) Panth. 1.c. et in collis ad Vir Panth. 1. (MN)  
Ad Panicarium officinale L. Var. longifolium (L.)

in variorum circa Trabagine (Heras) et circa pagum Kovice infra Muli Durni-  
tor (M.) Pant. l. l. <sup>32</sup> P. Lippa, <sup>33</sup> apud numeros Voglie, Bornice, et Bergocchia  
(Dolan) Tommasi. veg. Reg. p. 60, sic non a Gradenitzia ad Lebecki (Rosaceae)  
varia.

<sup>ad</sup> Hymenium Lugubris L. Vir. f. Salm. L. c. p. 19 adde locum in dampnoꝝ circa Trebisjje  
(Harv.) et Apoll. Danielov Grnd et Rijin Lukk (M.N.) Panic <sup>thk</sup> l. c. p. 32; ad 1999 et  
loc. Humide ad Cedetmechis in ins. Vegla (Dalon.) Toromay. l.c., et in valley  
valley Zeta sub Danielov Grnd (M.N.) Panic l. c. p. 84.

*Ad. Morus alba* L. et *Morus nigra* L. *Nir.* 1.c 1.p. 219 add locum circa *Trebizondi* (Kersey) *Pantk.* 1.c.p. 31.

Ad *Nivon* *Cavicorn* L. Ni. 1. c. add locum in regione piperis circa Regula (Balma) circa Zubraj (Herceg), circa Rijeka, Monaster Duge, et Povia (MN) Paedt. 1. c.; in saxonij ad Komani; Sinjuc et Vir (MN) Paedt. 1. c. op. 86; in vinenij pmo. Iudum culta in ins. Veglia (Balma) Tommas. 1. c.

*Ad Celtidium australum L. Nic. Kordelin, p. 221 addit locum circa Drobinge (Hwsg.) Pantz l.c. et in saxonij ad Betzig in dvrc Komoni (Illyr. Koszela) Pantz l.c. p. 94, et in nemorosis S. Maria di Cope, reg. Plannit, et Bercanova in ins. Vigat (Salus) Tournefort l.c.*

Ad Ulmum compactum L. Vis. fl. dalm. t. p. 221. adde locum in dumetis sub monte Lovcen  
sub Danilov Grad et ad Vor. (MN) Panic. t. c. p. 84., Mezlac usque ad Murach  
et Doboci (Boemia) Sendlner. Addatur

Ulmus effusa W. prodr. fl. berol. n. 296. et 4. fl. 1. p. 1329. Host fl. auct.  
1. p. 130.

U. foliis duplicito - serratis basi inequalibus, floribus pedunculatis pendulis, &  
fructibus margine villoso - ciliatis, pedunculo multo brachioribus Koch syn. fl. germ.  
ed. II. p. 235. Chrh. beitr. 6. p. 88

Syn. Ulmus ciliata Etch. Rechb. Fl. auct. p. 180.

Icon. Schkr. I. tab. 57 a. C. Rechb. ii. germ. XI. tab. 26 LXI. f. 1337.

Hab. cum precedente (Boemia) H. Martio, Aprili. — Sendlner.

### Santalaceae Q. Br.

Vis. fl. dalm. t. p. 222.

Ad Ihesuum Linophyllum L. Vis. fl. dalm. t. c. adde var. majus Neits. fl. v. Nieder  
Öster. p. 301, et syn. Th. montanum Etch. cum icon. Rechb. icon. V. tab. 644, et  
icon. Germ. XXI fig. 1161, et locum in graminosis m. Gloa prope Trebizje, circa  
Dubovac prope Bukovac in Bjelagora (Herzeg) Panth. t. c. p. 36, et rurum Suplje  
et Kapulnica (Boemia) Sendlner.

Ad Ihesuum divaricatum Jan. Vis. t. c. adde locum in apriis circa Trebizje (Herzeg)  
et Bogetice (MN) Panth. t. c. et in saxonis ad Saxenici sub monte Triven (MN)  
Panic. t. c. p. 82, et ad Suiza super Borovaglava, et a Uzec usque ad Ciono (Boemia)  
Sendlner. Dein addatur

Ihesuum humifusum DC. fl. fr. V. p. 386. Koch syn. fl. germ. II. p. 61, Panic. t. c. p. 82  
Th. radice perpendiculare nonosa, caulinis portatis vel ascendentibus racemoso,  
ramulis floriferis ramis rotundis, angulis macrouris foliorumque superiorum  
marginem latris, foliis linearibus obsolete uncinatis, bracteis ternis fructu. usque  
tibus vel media fructu longiora, rure ovato-subcordata, perianthio fructiferis laevis  
nive triplo brachioribus

Icon. Rechb. ii. germ. XI. tab. 26 LXII fig. 1153.

Hab. in graminosis montis Gloa et in valle Rados Prope Vraca in Bjelagora  
(Herzeg), et in rupestribus ad Ostry, et in saxonis Nikšićka Zupa (MN) Panic. t. c. Rest. Sal.

Ad Ihesuum Pannesi R. Br. Vis. fl. dalm. 1. p. 147 adde locum in saxonis m. Taborje  
et m. Velika Lastibica (MN) Panic. t. c. p. 82. — Dein adde

Ihesuum alpinum L. sp. fl. p. 301. Host fl. auct. T. p. 312. Rechb. fl. exc. p. 157. Panth. t. c. p. 82  
Th. radice perpen., caulinis subciliatis, ramulis fructiferis erecto-patulis recurvis, foliis linearibus uncinatis,  
bracteis longis, usque triplo, foliis linearibus, perianthio tubuloso nivea seu sublongiora

Icon. Jagn. fl. austri. V. tab. 416. Rechb. ii. germ. XI. tab. 26 LXII fig. 1151.

Hab. in parvis in. Cina Plana et Mali Javorac (AN) Panth. in parvis ciliatis in Dunavac et Carac (AN) Panic. t. c. et 2

Vipava super Bastoz, Mali Savich et Velika Ravan (Boemia) Sendlner. H. Maji, Tres. H. viriis. Perenne

34

Ad Oxytropis album L. Vis. fl. Dalm. I. p. 223. in siccis circuim Regaea (Dalm.) et  
circuim Trebiscia (Herrig.) Pantl. adi. p. 34. et in collibus agri Virgilia, Biso, Dobrojia  
in ins. Veglia (Dalm.) Tomm. I. c. p. 59.

### Rhynchosaceae Juss.

Vis. fl. Dalm. I. p. 223.

Ad Daphne Mezereum L. Vis. fl. Dalm. I. p. 224. ad locum in nemoribus vallis Virgula  
infra Cava Planina, in valle Perusina et circa pegnum Horicee ad pedem montis  
Mels Durmitor (MN) Panici et gl. p. 82 et in m. Vlastiv. regn. Bosni, et  
regn. Battalovi (Bosnia) Sestini. Dein addatur

Daphne jasminnea Schlecht. In. Pl. gr. prod. p. 260 — Pantl. Diag. p. 35

D. floribus terminalibus rubris sericeis, foliis oblongo-obovatis obtusis velutinis  
subtus glanduloso-punctatis ramulisque striatis.

Syn. Daphne glandulosa Bertol. fl. Ital. IV p. 33 Rchb. Fl. exs. p. 164. D. lusitanica Loisel. <sup>11/13</sup>  
Icon. Rchb. et Sm. fl. gr. II. tab. 358 — Loisel. Fl. gall. t. 1. p. 280 tab. 25. Rchb. et Germ. XI  
Hab. in siccis Horistre greda dictis prope Viria in Biologon (Herrig.) Pantl. H. alibi.

Ad Daphne alpina L. Vis. fl. Dalm. I. p. 224 ad locum in rugosibus Viciae sub (MN)  
Panici et gl. p. 82 qui legit qui legit ab aliis non est protinus id haec non vidi. Post addatur

Daphne Blagayana Vrey. Koch 146. Rchb. et Germ. XI tab. 615. Panici. Sp. Var. p. 82.

D. floribus terminalibus rubris sericeis, foliis obovatis punctatis, tubo perianthii velutino-  
lacinios ovatis tubo triglo trichoriibus rubris sericeis, repinorum linearis — ~~ramulis~~ ligulis  
subaequalibus, foliis oblongo-obovatis obtusis glabris

Icon. Rchb. et Germ. XI tab. DLV fig. 1180.

Hab. in herbis siccis rabe monte Durmitor non procul a lacu Rijce Tepes (MN). H. —  
ochroleucus. H. Major. Perun. Non vidi.

Ad Papaverum aurantium Wickstr. Vis. I. c. p. 225. ad locum inter regit, Dobrojia  
et Bore in ins. Veglia (Dalm.) Tomm. I. c. p. 58.

### Lauraceae Vent.

Vis. fl. Dalm. I. p. 225.

Ad Laurus nobilis L. Vis. I. c. p. 226. ad locum ad regem Veglia, Carrione (Dalm.)  
Tomm. I. c.

### Polygonaceae Juss.

Ad Polygonum viviparum L. Vis. fl. Dalm. I. p. 227 ad locum in pastis vallis m. Kom., in  
viviparae Planina et Mala Durmitor (MN) Pantl. in pastis clatibus m. Durmitor et m.  
Kom (MN) Panici. I. c. et in m. Vlastiv. (Bosnia) Sestini. — Adi.

Polygonum Bistorta L. sp. gl. p. 516. Hartmann. I. p. 483. Rchb. Fl. exs. p. 573

P. caeruleo-margine monopodialis recta, foliis oblongo-ovatis subcordatis undulatis, petiolatis palatis.

Icon. Cad. K. Dan. t. 421. Lin. engl. bot. t. 509. Bull. hist. nat. tab. 574. Cler. hist. pl. p. 574.

Hab. in pastis Medov. infra m. Saffebies in Biologon, in vale Virgula infra Cava Planina, in valle Perusina infra

Kom., in m. Simjavina Planina et circa yagum Kovicec infra Mali Dvorinac  
(MN.) Pantk. l.c. et in insulis ad Margita Voda sub m. Kom (MN) Paní. l.c.  
H. vesi. H. Iva. Tel. Panna.

Ad *Polygonum amphibium* L. Vis. II. delo. 1. p. 227 adde locum in aquari ad Cunipice  
Reka prope Rijeka (MN.) Pantk. l.c. et Var. A. velas Mel. Vis. II. delo. I. p.  
227, et in lacu Sidruo ad officium rivi Crnica (MN.) Paní. l.c.

Ad *Polygonum nodosum* Pers. Vis. II. delo. 1. p. 228 adde syn. *Polygonum* ~~leptophyllum~~  
ad p. 33 et locum in humidi circa Cetina (Dalm.) Pantk. et in ins. Veglia  
(Dalm.) Tommas. l.c. p. 88, et ad Var. B. incanum Vis. I. c. locum in humidi circa Trebisje  
(Herceg) Pantk. l.c.

Ad *Polygonum laxiflorum* Weiz. Vis. II. delo. 1. c. adde syn. *P. minus* Huds. et Tommas.  
Ad *Polygonum aviculare* L. Vis. I. c. adde locum ad viag et in prati circa Trebisje  
(Herceg), in valle Drinica infra Crna Planina et circa Cetina (Dalm.) Pantk.  
l.c. p. 33, in calciis ad Kjegos, Letenje (MN.) Paní. l.c. p. 82, et in longis rurebus car.  
Veglia (Dalm.). Tommas. l.c.

Ad *Polygonum Bellardii* All. Vis. I. c. adde locum in viag circa Trebisje (Herceg) Pantk.  
l.c. p. 34, et inter vegeta Zuppania et Passigha in ins. Veglia (Dalm.) Tommas. l.c.

Ad *Polygonum corniculatum* L. Vis. II. delo. I. p. 229 adde locum in culti circa Trebisje (Herceg)  
et Kovicec (MN.) Pantk. l.c. et in campis et insulis Veglie, Caprije, Resenov (Dalm.) Tommas.

Ad *Polygonum demissum* L. Vis. II. delo. I. p. 230 adde locum in culti ad Sujal (MN.) Paní. l.c. p. 82.

Ad *Polygonum fogopyrum* L. Vis. I. c. adde locum (ad cultum) ad Besanov et alibi in ins. Veglia (Dalm.)  
Tommas. l.c.

Ad *Rumicis-Aacetosa* L. Vis. I. c. p. 230 adde locum in prati m. Leutor prope Trebisje (Herceg)  
in valle Drinica infra Crna Planina et circa Kovicec infra Mali Dvorinac (MN.) Pantk.  
l.c. p. 34, in prati sylvestris ubi m. Dvorinac (MN.) Paní. l.c. p. 81, et a Gred  
schor ad Trebenick ad Dolaz, circa Kovacik et alibi in prati (Bosnia) Senta et in  
prati ins. Veglia (Dalm.) Tommas. l.c. volgari

Ad *Rumicis aristatum* L. Vis. I. c. p. 231 adde locum in prati Carina dicti infra  
Kom (MN.) Pantk. l.c. ad Mali Sandek, et rupes Baklari (Bosnia) Senta  
et a Gredrech ad Trebenick, et ad Jelair, et Ousine rupes Kisejek, Turie, Reg.  
- Potselovo ad Pschiakonok, et alibi in (Bosnia) Senta. Ad Var. p. multifida Vis.

l.c. adde syn. *R. multifida* L. et Pantk. l.c. et locum circa Danilov Grad (MN.)  
Ad *Rumicis sentatum* L. Vis. I. c. p. 232 adde locum in prati aliq. montium Kora, Simjavina Planina  
et Mali Dvorinac (MN.) Pantk. l.c. in glaucis montium Dvorinac, Savojna et Kora (MN.) Paní. l.c.

et in locis rugositis montium Driskavae et Organ et ad Bespanova et Ropavnik  
ins. Velebit (Dalm.) Tonnet. l.c. p. 58. — Dein addatur

Rumex alpinus L. sp. pl. p. 480. Host fl. aust. l.p. 458. Rich. Fl. exc. p. 589.  
R. foliis infimis subtriangularibus cordatis oblongis, petiolis canaliculatis, racemiis  
dense paniculatis coryphyllis, ~~lodiculis~~ perianthie fructiferi cordato-ovatis ~~integerrimis~~  
integris evertentibus.

Icon. Tm. engl. bot. Tab. 127. Meissn. polyg. Tab. II. E. Blackw. herb. t. 262.

Hab. in praevis alpinis montium Cava Plavina, Korn, Sinjavina Plavina et Mala Dru-  
mitor (M.N.) Pantk. l.c. et ad rupes et circu oritis sub m. Velika Testrebita (M.N.) H.  
Lyc. Ravent. (A.S.) Panč. l.c.

Ad Rumicis pulchrorum L. Vir. H. dalm. I. p. 232. ad locum in cultis circa Trboje et Bileški  
(Herceg) Pantk. l.c. in cultis ad Lettinge, Danilov Grad (M.N.) Panč. l.c.; et a Travnik  
ad m. Vlašić (Bosnia) Šestra, et ad marg. agronom in ins. Vegla, in m. Driskava et Toplo  
Plavnik (Dalm.) Tonnet. l.c.

Ad Rumicis crispum L. Vir. H. dalm. I. p. 233 ad locum in agri circa Bileški (Herceg)  
Pantk. l.c. in partibus ad Sirjak et grope Kr. (M.N.) Panč. l.c. ad Gvođazov et a Travnik  
ad m. Vlašić (Bosnia) et in partibus et loca herbita in ins. Vegla (Dalm.) Tonnet. l.c. p. 58.

Ad Rumicis conformatum L. Vir. fl. dalm. I. p. 233 ad locum ad polje et loca herbita  
Vegla, Caputina, Boroviča, Panighe (Dalm.) Tonnet. l.c. et a Varash et Savniakhe ad Savnišche  
varhan (Bosnia) Šestra — Dein addatur

Rumex sanguineus L. sp. pl. p. 486. Sm. pl. brit. p. 396. Koch 14n. fl. germa. II. f. 705.

R. foliis infimis cordato-oblongis aut subquadriangularibus, mediis cordato-lanceolatis sec-  
undariis, ramis rufis exsertis, petiolis <sup>flavis</sup> petiolulis <sup>flavis</sup> rufis, vel infimis foliis meni-  
tis, phylloperianthie fructiferi interioribus linearis-oblongis oblongis integerrimis,  
unice ciliatis.

Icon. Hab. a Travnik ad pedem mont. Vlašić loc. Bunačevski (Bosnia) Šestra H. P. Pećan.  
Obs. folia ramea omnino viride (R. sanguineus B. viridis Sm.), non venia foliorum truncorum  
rubris (R. sanguineus B. querinae Koch) — Addatur

Rumex rutilus Hegelshew. et Hear. fl. dalm. p. 345. Koch 14n. fl. germa. p. 345. Pantk.

R. foliis infimis exterioribus subtriangularibus cordatis, interioribus cordatis  
oblongis et hastatis, caule simplici vestitellata — racemos phylloperianthie fructiferi  
interioribus subtriangularibus cordatis integerrimis basi ciliatis — ciliatis, exterioribus rufis.  
Hab. in glasocoris alpinum Korn, in Sinjavina Plavina et Mala Drumitor (M.N.) Pantk. Julia. Rana.

### Phytolaccaceae R. Br.

Vir. fl. dalm. I. p. 234.

Ad Phytolaccam decandram L. Vir. fl. dalm. l.c. ad locum circa Trboje (Herceg) et ad Cava  
Plavina Raka prope Rijeka (M.N.) Pantk. adn. p. 108, et in demetis ad Boljevići Šib. Cvetište  
(M.N.) Panč. cl. ph. p. 80.

### Chenopodiaceae Vent.

Vir. fl. dalm. I. p. 236.

Ad Salicorniam herbaceam L. Vir. l.c. p. 235 ad locum ad mare in ins. Vegla (Dalm.) Tonnet. l.c. p. 57.

Ad *Salicorniam fruticosa* L. Vis. l.c.p. 237. adde locum in locis salinis ad me-  
ritate ins. Veglia, Dolomites (Dolom.) Tommas. l.c.

Ad *Atriplicem portulacoidem* L. Vis. l.c.p. 236 adde locum ad mare circa curvula-  
glia (Dolom.) Tommas. l.c. sub *Oenanthe portulacoides* Moq. - Dand.

Ad *Atriplicem hortorum* L. Vis. l.c. adde locum in agri cultu et in vallis Ror-  
gnier, Tessinio, in ins. Veglia (Dolom.), et in cultu ad *Celidio* et *Grosso* (M.  
Pani) l.c.p. 81. Dein adatav.

*Atriplex nitens* Reichenb. exod. fl. neomorph. p. 126, Hostmanni. p. 126  
Rohr. p. exp. p. 577 Tommas. l.c.p. 57.

R. caule herbaceo erecto, foliis cordato-triangularibus sinuato-dentatis, rugi-  
nitis, glabris, subtilis argenteo-glaucis, superioribus longe acuminatis, pen-  
tratis fructiferis ovalis venoso-reticulatis integerrimis basim aquae  
bipartitis.

Syn. *A. acuminata* Waldb. et Kit. pl. fruct. nov. II. p.

Nom. - Waldb. et Kit. I.C. p. 103. Schuhm. Deutsch. fl. tab. 348.

Hab. cum precedente in ins. Veglia (Dolom.) Tommas.

*Atriplex hastata* L. p. 149. Rohr. p. 518. Koch 1yn. p. 200. <sup>170</sup>  
C. caule erecto herbaceo, rami inferioribus diversitatis, foliis inferioribus triang-  
ulari-hastatis profunde sinuato-dentatis viridis, superioribus hastato-lance-  
atis, summis integerrimis, penultimis fructiferis cordato-triangularibus ra-  
diato-dentatis basim usque perstatis, dentatis acuminatis subulatisisque.

Icon. Rohr. pl. crit. I. tab. 93. Oed. H. Dan. tab. 1635.

Hab. ad mare circa Cassione et Veglia (Dolom.) Tommas. l.c.p. 58. H. hastata. annua  
et *Chenopodium Vulvaria* L. Vis. p. dolom. I. p. 237 adde syn. Ch. stolidum. Non vidi.

Icon. Tommas. veg. Veg. p. 57 et locum ad vias, puncta et in moderatis in Veglia (Dolom.)  
Tommas. l.c. et circa Veglia (Hervag) Pauth. l.c.p. 33.

Ad *Chenopodium polyppermum* L. Vis. l.c. adde locum in inuallis et ruderibus in Veglia  
(Dolom.) Tommas. l.c.

Ad *Chenopodium album* L. Vis. l.c. adde locum in inuallis ad Nigeyus, Cittanico (MN)  
Pani l.c.p. 81 et ipsorum locis in ins. Veglia (Dolom.) Tommas. l.c. Adde Var. ~~ad~~ sp. qui  
locum: glomerulis florum spicatis: et locum a ~~var.~~ ad pedem m. Valsenich  
(Bolma) Sordtn. Adde

*Chenopodium opulifolium* Schrad. ap. Koch et Ziz. cat. pl. paleat. p. 6. Rohr.

fl. exp. p. 579. Koch 1yn. p. 200. Pauth. adn. p. 33.

Ch. albo-purpureum, foliis subrotundo-thombeis subtilibus obtriangularibus eroso-dentatis,  
superioribus elliptico-lanceatis, cymis florum tuberculatis, secundis leucibus nictidis,  
Icon. Vaill. bot. pars. tab. VII fig. 1.

Hab. in inuallis circa Billeki (Hervag) et Rijeka (MN) Pauth. H. Jul-sept. Annuum.

Ad *Chenopodium murale* L. Vis. l.c. adde locum in ruderibus circa Trebizi (Hervag) Pauth. l.c.

Ad *Chenopodium urbicum* L. Vis. l.c. adde Var. intermedium M. Koch. foliis sinuato-dentatis, dentibus  
triangulari-lanceolatis acuminatis Koch l.c.p. 666 - Icon. in engl. bot. tab. 217. et locum in inuallis circa Trebizi  
(Hervag) Pauth. l.c. H. austri. p. 322 sub Ch. urbico l.c. - Adde

*Chenopodium hybridum* L. sp. p. 319. Host fl. austri. I. p. 322. Rich. fl. exc. p. 530. Panth.  
adv. p. 81. *Panic.* cf. fl. p. 81.

*Ch. viride*, foliis cordatis, dentatae-angulatis, dentibus acuminatis, intermedio majoro  
elongato, cymis paniculatis divaricatis, aglyptis terminalibus prolate-punctatis.

Icon. C. Aden. t. 2020. Vail. l.c. tab. VII f. 2. Lin. engl. bot. tab. 1919. Barad. iugl. tab. 540.  
Hab. in vallis ad Klopot dist. Bratovacii (M.N.) *Panic.* Non vidi. Et adde

*Chenopodium rubrum* L. sp. fl. p. 318. Host fl. austri. I. p. 322.

*Ch. foliis nitidis rhombatis, basi cuneatis, sub hastatae trilobis sinuatae-dentatis, denti-  
bus lanceolatis, spicis axillariis exsertis foliatis congestis, terminalibus exser-  
tis laevibus, terminali glomerulorum horizontale.*

Syn. *Blitum rubrum* Rich. fl. exc. p. 582. *Dominus.* l.c. p. 57.

Non *Dalechampia* p. 342. f. inf. C. Aden. t. 1149. Lin. engl. bot. t. 1221.

Hab. ad vias in ins. Veglie (Dalm.) *Dominus.* fl. sub. Sept. Annuum.

*Chenopodium glaucum* L. sp. fl. p. 320. Host fl. austri. I. p. 323. *Panic.* cf. fl. p. 81.

*Ch. caerule diffuso*, foliis oblongis obtusis cuneatae-dentatis, subtilis glaucis, spicis cylindri-  
cis, terminalibus laevibus.

Syn. *Blitum glaucum* Koch syn. fl. germ. p. 57. *Panic.* l.c. p. 81.

Non *Blitum glaucum* C. Aden. tab. 1151. Lin. engl. bot. t. 1456. fl. sub. Sept. Annuum.

Hab. ad foras ad Vir (M.N.) *Panic.*

*Chenopodium Botrys* L. sp. fl. p. 320. Host fl. austri. I. p. 323. Rich. Fl. exc. p. 583. *Panic.* l.c. p. 81.

*Ch. glandulosus* pubescens, foliis oblongis subcinnamatis, obtusis dentatis rugo-  
nis bracteae formulis lanceolatis integrerimis spicis in raceme longos dispergitis.

Icon. Galath. hist. p. 314. Blaekw. herb. t. 314. Rich. fl. p. 189. Dost. p. 59. p. 34.

Hab. in glaziovii vallis Cornicka Pijaka prope Vir (M.N.) *Panic.* Haustore. Annuum. Non vidi.

Ad *Agrostophyton* Bonnius Henr. Moq. Tand. Vir. fl. dalm. I. p. 241. adde syn. *Chenopodium*

Bonnius Henr. L. et locum in pratinis alginis circa virile Savoree dicta  
in m. Cnoe Planina, in parvis Cervina infra Kom. et circa Kovice infra Mali.

Durnitor (M.N.) *Panic.* et syn. *Blitum* Bonnius Henr. C. A. May et *Panic.* l.c. p. 81.

et locum in cultis reb. m. Durnitor et m. Velika Istrikia *Pantic.* l.c. —

Ad *Campborosma monspeliacum* L. Vir. fl. dalm. I. p. 242 adde locum ad rupes et osas  
maritimam ins. Veglie (Dalm.) *Dominus.* l.c.

Ad *Succowia maritima* Moq. Tand. Vir. fl. dalm. I. p. 242 adde syn. *Schoteria maritima* C. A.  
May. *Dominus.* l.c. p. 57, et locum in rupi calca ad Ponte, Dobrinje, Cattione et Veglie  
in ins. ejusdem nominis (Dalm.) *Dominus.*

Ad *Salicornia Kali* L. Vir. fl. dalm. I. p. 243 adde locum in campis arenosis ad Cettinje  
(M.N.) *Panic.* l.c. p. 81, et in cultis salinis Dobrinje, Veglie (Dalm.) *Dominus.* l.c. p. 81.

Ad *Salsola soda* L. Vir. l.c. adde locum Dobrinje, Veglie, Bescanova (Dalm.) *Dominus.* l.c.

### Amaranthaceae R. Br.

Vir. fl. dalm. I. p. 244.

Ad *Amaranthus* *Blitum* L. Vir. fl. dalm. I. p. 245. adde locum in ruderali circa Dobrinje (Herceg)  
Panth. l.c. p. 33, et in cultis ad Savica dist. Komani (M.N.) *Panic.* l.c. p. 80.

Ad Amaranthum syriacum Desf. Vir. l.c. add locum in cultu circa Rijeka (M. N.)  
Panth. l.c. p. 33, et in vicinitate Valle di Besca, Veglia (Dalm.) Tonnumat. p. 37

Ad Amaranthum deflexum L. Vir. fl. dalm. suppl. p. 48. cum syn. A. prostratum  
Balt., et locum ins. Veglia (Dalm.) Pani. l.c., et in cultu circa Trabia (Herzeg.)  
Panth. l.c.

Ad Amaranthum retroflexum L. Vir. fl. dalm. l.c. add locum in cultu ad Cettigne,  
Rijeka, Vir (M. N.) Pani. l.c. p. 80.

Ad Polygonatum avicinum L. Vir. fl. dalm. I. p. 246 add locum in agro circa Trebi  
vje (Herzeg.), Rijeka et Romanj (M. N.) Panth. l.c., et in campis aridis ins.  
Vegla (Dalm.) Tonnumat. l.c.

Scleranthaceae Link  
Vir. fl. dalm. I. p. 246 et suppl. p. 48.

Post Scleranthus annuum L. Vir. fl. dalm. I. p. 247 additae  
Scleranthus uncinatus Sch. in agro montium Vojnič, Durmitor et Kom  
ia sybisteribus in Durmitor prolixus, gracilis, floribus in axillarum foliorum  
divisitis, in agro in kom. Crnogorac Bay, floribus in opere ramorum fasciculatis  
Panc. et al. p. 31. — Ob. Vir. attingendus et probabilitate binas species com-  
prehendens. —

Ob. Alias quaque species ob Herzegovina et Montenegro collectas recessuit  
quae et Reichenbachio pati communicauit, et quae non difformitas ab illis et re-  
verendo Scleranthus monographo p. 100 et 101 exspectamus. Tales sunt  
Scleranthus Bjelagoracius, S. celtinensis, S. curvirostratus, S. celinensis hom.,  
S. Eragadinus, S. fastigianus, S. montenegrinus, S. Pantorensis, S. subnudus  
notus, S. Umnogollus, S. uncinellus, S. uncinateus, S. coryneolatus Rchb.,  
Panc. ego quaque inde etiam primo hinc Scleranthus monographio, e quibus pro novis habeo  
Scleranthus Viscosus Rchb. Scl. ovatus Rchb. et Scl. Cattaranum Rchb. quem exactius  
non inveniatur Scleranthus asinifolius, cum nomine utq; Cattara antiquis Asinivium sive  
solevet.

Pantth. cl. pt. p. 34

*Ruevex nivalis* Hegel sch. et Heer f. der Schweiz p. 345. Koch - 1901 f. Germ. p. 365.  
*R. polystigma* extirpata subrotundata by Staphanid subcordata, cuticularis rotata  
 oblongior hirsutus, caule simplici verticillato - racem., lacinia perianthii fructiferi  
 interna subrotundata cordata longior a basi deflexo - radiata, extirpata deprectata  
 Hab. in glaucis algeis Koen. in Creuzaeina Planina et Mali Divinito (M.N.) partibus  
 Ad Rupestres concretum Mure prope f. gallo p. 218 f. folia p. 233 ad locum ad  
 fons et loca humi Velez Capricorni, Bonito, Paesque (Dol.) Somer. t. 1; et a Vares  
 ad Savieches et Samichovskou (Boemia) Seadne.

*Ranunculus angustifolius* L. sp. pl. p. 486 In Brit. p. 396 Koch 150. Kerner sp. 705.  
*R. foliosus* (L.) C. A. Mey. aut *R. sanguineus* L. var. *sanguineus*, med. ex corde. Corolla lat. acuminata  
 semis recte erecta, petalibus, vix rufis, floribus rufis vel rufinis, foliis manuatis, basim  
 petioli in thesa predisparsis internodis breviori. Stängel ciliatum, unica calix  
 Hab. - Novi Beli ad pedem montis Vlastici, loco Benavoshi (Bosnia) Knaut. H. Polio. Peanae  
 Ob. Galio. nunc omnis virido (*R. sanguineus*, *R. viridis* Linn.), nunc viridis foliis tenuis et rufis.  
 (*R. sanguineus*, *R. gracilis* Koch)

Phytolaccaceae R. Br.

Vis. fl. Salm. E. Jr. 234

ad Phytolacca decandra L. vis. t.c. nro locum circa Tribunj (Korug) et ad  
Crnojevica (Korug) prope Rijeka (MN) Panck. adn. p. 108, in dimicij ad Sogovici distri-  
Crnica (MN) Ponić et. g. p. 80

Chenopodiaceae Vent

Fig. 4. - Salvinia. - L. p. 234.

Ad Saliciniam herbarium L. Viscariae 235. ad h. locum ad meum in ins. Neglecta (Salin.)  
Dormit. veg. Vest. f. *Thlasius* L. 57.

*Ad Salicinianum fruticosum* L. *Vit.* 1. c. p. 236. *Domenec.* 1. c. in locis talibus ad mare, Dobrogea.  
*Ad Astragalum esculentum* L. *Biz.* 1. c. p. 236. *ad terram* in locis variis. *Constit.*

Ad Anthonem hirtipes L. Vis. te addi locum in campis cultis et in vallis Paraguae, Bonanova  
in Ucayali (Dobr.) Junius. 1. c.

Ad Atriplex parthenocaulis L. f. c. adic formae ad mure et ad rupes ins. Vegla (Dalm.) Domen. C.  
et in cult. in Cibatu (M. N. Pan.) f. c. p. 81. Dix adiectum  
sob A. hastata et potosia ~~Luzia adiecta~~ Host ff. austri. t. p. 320.

*Atrichia nitens* Reichenb. prod. & recensavit p. 126. Reichenb. ex. p. 577. Domus. C. p. 57.  
A. caerulea herbacea erecta foliis cordatis triangularibus runcinatis - dentatis, super runcinis globosis,  
rubro argenteo - glaucis, <sup>irregulariter</sup> longe acuminate, (penicillata) fructiferis ovatis vena pro - reticulis inter  
- nus basin usque bipartitis.

Syn. A-arruminata Walst. Kit. pl. hung. 11. ~~1903~~ Schleierm. Det. f. lab. 348

Hab Picn. Waldst. Kit. I. c. tab. 103 Schkr. deutsch. fl. t 348

~~Hab. die litteras tuas cum precedente in ius. Vagia (Salv.)~~

*Atryplex hastata* L. - sp. pl. p. 149k. *Hastifolia*. *Hib.* p. 528  
*A-Corbis hastata* var. *inferioribus* *divaricatis*, foliis *inferioribus* *triangularibus* *hastatis* *prospic- Hib. 528*  
*entes* - dentata <sup>var. *hastata*</sup> *superioribus* *oblongo-lanceolatis*, ramulis *integerrimis*, percurrentibus *fructuosa-*  
*riangulis* *lanceolatis*, *ramis* *virginis* *partitis*, *dentatis* *acuminatis* *subobtusatis* *spiculae*  
*spiculae* *racemosae* *l. tab. 15* - 33. *Cod. Virg. t. 1638.*  
*Hib.* ad mare *civis* *Carissae* *et* *Vitis* (*Dolm.*) *H. astata*. *Russia - Domus.* l. c. p. 58 - Non *vera*.

*Hib ad mare circa Cattione, et Vaglio (Balun) H. acetata. Russica - Domus. l.c. p. 58 - Non vide*

100

Vaill. botanij. tab. VII f. c.

hab. in insulz civce Billiki (Henz.) et Ryka (N.W.) Paabk. l.

Aeon

Will cast my lot with France

Hab. in vicinis ad Kłopot dicti Brzozowicki dicitur Connica (M.W.) Panie. t.c. Nowiny.

*Chenopodium Botrys* L. sp. p. 320 Hoffst. auf H. L. p. 323 Rebh. Fl. Max. p. 580.  
*Ch. glandulosum* - pubescent, blüht öfters; subannually - linearly oblong scale  
tip, rugosus; bracts few, linear, lanceolate, integerrimus; cymes florum in rachis  
elongated, divergent

Icon. Blachv. herb. f. 214.

*Heb. in glaciis rivi (venerabile Rieka prope Vir. (CMN) Paul. H. acetosa. Camma Nonne  
Chenopodium vulgare L. Carol. 318. Hoffmanns. 322.*

*Chenopodium rubrum* L. (p. pl. p. 318. Flora Krausiana I. p. 322.

The *folij* *ridiculif* rhombic *tinctoria* <sup>obtuse</sup> ~~acute~~ *subtriangularis* - *lanceolata* - *linearis* - *dentata* -  
densely *campanulata*, (spiciflora), *foliis* *angustatis*, *caeruleo* ~~greenish~~ *yellowish* *white*,  
the *sericea* *terminata* *glomerata* *longipetala*.

*Syn. Oltusa rubra* Reb. fl. ex. p. 582. Domus. veg. di Vegh. p. 57

lon -

Rediffusion 1972 Second Sat 12/12

Hab' ich viele in unsr. Vogelkästen - Thomas W. Aug. hat Amurum. Nun ist

*Chrysopidium glaucum* Lipp. f. sp. 320 Holtst. aufgr. f. sp. 323.

*Chrysophyllum cainito* Linn. - B. 1686

*Bletia glaucum* Koch syn fl. geran. ~~Leybold~~ II. Panc. l.c. p. 81.

Icon.

ed. fl. don. t. 1151. Sm. engl. Bob. t. 1454

Hab. in foris ad Vir (MN) Punc. Non vidi. Fl. cestata. Cumum

Ad *Camporum monegetae* L. B. c. p. 242 add locum ad rupes et omnes  
maritimes vix Veglie (Dalm.) Tornimonti - c.

Ad *Succowia maritimea* Moq. Tard. Kri. l.c. p. 242 add ipsa Schobaria maritimea  
C. A. Meyr. Tornimonti l.c. p. 54 et locum in solo salto Ponte Dobrinje, Cattaro  
Veglie in ins. Veglie (Dalm.)

Ad *Salsola Malte* L. Kri. l.c. p. 243 add locum in campis arenosis ad Cattaro  
(M. N.) Panz. l.c. p. 81 et locis saluis Dobrinje, Veglie (ins. Veglie) Tornimonti l.c.  
Ad *Salsola Latifolia* L. Kri. l.c. add locum Dobrinje, Veglie, Herceg Novi (Dalm.)  
Tornimonti l.c.

### Amaranthaceae R. Br.

I. Kri. fl. dalm. I. p. 244

Ad *Amaranthus blitum* L. Kri. l.c. p. 245 add locum in ruderibus circa Trbojje  
(Herceg.) et in cult. ad Tauricu dict. Komani (M. N.) Panz. l.c. p. 80

Ad *Amaranthus glaucescens* Desf. Kri. l.c. add locum in cult. circa Rijeka (M. N.)  
Pauth. l.c. p. 33. in ruderibus, Valle di Besca, Veglie (Dalm.) Tornimonti l.c. p. 57

Ad *Amaranthus polystachys* L. B. c. fl. dalm. suppl. p. 48. add ipsa *Amaranthus*  
~~polystachys~~ Belo, et locum vix Veglie (Dalm.) Panz. l.c. et in cult. circa Trbojje  
(Herceg.) Pauth. l.c. Rijeka, Viz.

Ad *Amaranthus retroflexus* L. Kri. l.c. add locum in cult. ad Cattaro (M. N.)  
Panz. l.c. p. 80.

Ad *Polygonatum avicinum* L. Kri. f. c. p. 246 add locum in aqua circa Trbojje  
(Herceg.) Rijeka et Komani (M. N.) Pauth. l.c. et in campis arenosis ins. Veglie  
(Dalm.) Tornimonti l.c.

### Scleranthaceae Link.

Kri. fl. dalm. I. p. 246. et suppl. p. 48.

Post *Scleranthus annuum* L. Kri. l.c. add iter

*Scleranthus uncinatus* Schlecht. ex Pers. non Montan. Vojnik, Durnikov et  
Kom.; in lychnibus in Durnikov prolixus, grossulus, floribus in axillulis po-  
licem dicatis, in apice vix compactus, floribus in apice racemosum  
principale. Obs. sit extricatus, et probabilitate e binis speciebus conpositus.

Alio sp. in M. N. Allegit Pauth. quod il. leichtenbachi communicaat, que vis  
differet a cl. et variorum determinantur expectant. Tales sunt *Scleranthus*  
*Bigelovianus*, *S. attenuatus*, *S. carbonicola*, *S. edentulus* Horv., *S. engelmannii*, *T.*  
*jaffensis*, *S. montenegrinus*, *S. Pantorensis*, *S. tuberculatus*, *S. Uvarozii*,  
*S. uncinatus*, *S. umbellatus*, *S. unguiculatus* Reb. Itas quoque nup. huius cl.  
autem, e quibus novas statuit *Scleranthus Vojnikii* Pitt. *S. Drimiciflora* et *S. Cattaroanus* R.  
quem existens nominatio in *Scleranthus annuum* ex <sup>et</sup> *spp. nomen loci Cattaro*, ubi hanc  
speciem inveni.

## Addenda et Emendanda

~~in~~ Post *Bromum squarrosum* L. Vis. fl. Ital. I. p. 84 addatur

*Bromus macrostachys* Desf. fl. atlant. I. p. 96. ~~Grenet~~  
~~gracilis~~ p. 603

*Br. panicula* subtriangularis exerto oblonga contracta, spiculis 10-15.  
Floris lanceolatis compressis pedunculo multo longioribus semicirculari,  
verticillatis, aristis ab apice subcontorta divaricatis glomeratae  
resquilocoloribus, vaginis pubescentibus.

Syn. *Serrafalceus macrostachys* Parlat. fl. Ital. I. p. 397. ~~Grenet~~  
Godr. fl. de France III. p. 503. *Bromus lanceolatus* Roth cat. bot.  
2. p. 18. Guss. pl. var. p. 41 Var. a. *Br. divaricatus* Rhode in Lois.  
notit. p. 22. Richb. fl. exc. p. 43 var. a.

Ikon. Desf. fl. atl. I. tab. 19 f. 1 (rec tab. 18. f. 2). *Gusson.* pl. var. tab. 8 f. 1.  
Richb. ii. germ. XI f. 1597

Var. 3. pubescens: spiculis pubescentibus, culmo raro. — Ikon. Bo-  
mann. pauph. sic. tab. 3.

Hab. in saxis sub castro Post' Afino dicto ins. Lissin, ubi legit et com-  
municavit S. Freyn. Fl. Mayo. Annus.

Obs. Differt a *Br. squarrosum* L. quem simulat, panicula aequali excta  
nec secunda rotunda pedunculis multo brevioribus et spiculis lan-  
ceolatis nec ovuli-lanceolatis.

Ad *Festucam Myuros* L. post verba Panth. t. c. inseratur diagnosis  
*Festuca subra* L. sp. p. 109. Host fl. austr. I. p. 58. Richb. fl. exc. p. 39. *Panicaria* p. 100.  
Panicula florente patula, spiculis sub 5-florij, floribus lanceolatis aristatis, foliis  
infimis complicato-setaceis, culmi planis, ligula truncata, radice stolonifera  
caespitosa.

Al Reale Istituto di Scienze  
Lettere ed Arti  
in  
Venezia