

Ordo VI Cyperoideae

Juss. gen. pl. p. 26.

Flores glumacei hermaphroditi aut unisexualis, spicati
et tunc singuli sessiles in axilla bracteoae sive glumae,
vel raro solitarii ⁱⁿ gluma bivalvi aut multivalvi. Perian-
thium vel nullum, vel e rebz ^{vel utriculari apice perianthii} hypogynis. Stamina tria,
raro unum vel duo, hypogyna, filamentis masculinis,
antheris erectis connectivo destitutis. Stylus unicus,
stigmatibus tribus linearibus, interdum bifidis, ovario libero
uniovulato. Carexula saepe trigona, raro complanata,
quibusdam styli basi rostrata. Semen liberum, albuminum
farinaceo, embryone in basi axis albuminis posito, centrico.

Herbae annuae aut biennales perennantes, aut herbosae,
culmo simplicissimo basi foliato, aut vaginato, raro
ramoso foliato, foliis alteris simplicibus vaginantibus,
ligula nulla. Spicae solitariae, ^{aut} fasciculatae, aut
~~umbellatae~~ ^{umbellatae}, aut spicatae, aut capitatae, saepe bracteatae

Clavis analytica generum

1. Floribus hermaphroditis. 2. Floribus unisexualibus

Carex

2. *Glenis distichij* 3

~~3. *Floribuf umbellatis*~~

Cyperus

3 *Inferius spicatis*
Pendulobis ca. multo

4. *Glenis superius* 1
Abocens

5 *Alveolata* 6

6 *Stylis filiformi* *lysi* *dictus*, *stylis* *trifloris* *peristylis*
Surgens

^{undique}
Glenis imbricatis 5

~~*Floribuf apicatis*~~

Blissurus

Quamobis *subulatus*
Pendulobis *stipite*

Blissurus

Glenis *sp.* *longistylis*

Cyperus

Cyperula *Drupen*
Alveolata

Uladium

Stylis