

Conteglia del Trovignino quodam dal ch. Sig.
 Fel. Samard per la detennaz. ^{grana} ~~grappa~~
 An 1864.

Indicazioni Samard.

- | | | | |
|-------|----|-----|---|
| Helle | n° | 1. | <u>Helle pomatica L.</u> |
| " | " | 2. | <u>Helle aspersa Müll.</u> |
| " | " | 3. | <u>Hell. nemoralis L.</u> (quattro varietà ^{grana} grappa) |
| " | " | 4. | <u>Hell. frutescens Müll.</u> (var. <u>fasciata</u>) |
| " | " | 5. | <u>Hell. cinetella Drap.</u> et var. <u>rufa</u> . |
| " | " | 6. | <u>Hell. obvoluta Müll.</u> (specie <u>veneta</u>) |
| " | " | 7. | <p><u>Due specie distinte</u> : 1° <u>esemplare</u> più <u>largo</u> <u>ment</u>,
 <u>ombellicato</u>, coll' <u>ultimo</u> <u>aspetto</u> <u>distinto</u> e
 <u>piegato</u> <u>per</u> <u>davanti</u>, <u>con</u> <u>apertura</u> <u>obliqua</u>,
 <u>lunetta</u> <u>ovale</u> e 1° <u>Hell. nitens</u> <u>Sted.</u>
 2° <u>esemplare</u> ad <u>ombellico</u> <u>più</u> <u>stretto</u>, coll' <u>ultimo</u>
 <u>aspetto</u> <u>sempre</u> e coll' <u>apertura</u> <u>appena</u>
 <u>obliqua</u>, <u>depressa</u>, ad <u>obliquamente</u> <u>lunetta</u> e
 1° <u>Hell. cellarii</u> <u>Müll.</u></p> |
| " | " | 8. | <u>Hell. striata Drap.</u> |
| " | " | 9. | <p><u>Hell. caudifurca</u> <u>Sted</u> (i 2 <u>esemplari</u> <u>piccoli</u>
 <u>con</u> <u>rotte</u> <u>fascie</u> <u>brune</u> <u>sull'</u> <u>aspetto</u> : <u>mentre</u> il
 <u>2° esemplare</u> è <u>non</u> <u>piccolo</u> <u>H. castellaniana</u> <u>Müll.</u>)</p> |
| " | " | 10. | <u>Hell. castellaniana Müll.</u> (<u>non</u> <u>Drap.</u>) |
| " | " | 11. | <u>Hell. hispana L.</u> var. <u>uicinos</u> . |
| " | " | 12. | <u>Hell. rotundata Müll.</u> |
| " | " | 13. | <p><u>giovane esemplare</u> dell' <u>Hell. hispana</u> <u>Müll.</u>
 <u>(H. chelostoma Drap.)</u></p> |
| " | " | 14. | <u>Hell. germanica</u> <u>Fis.</u> (<u>H. isolaena</u> <u>Jan</u>) |
| " | " | 15. | <u>Specie</u> dell' <u>Hell. pulchella</u> <u>Müll.</u> |
| " | " | 16. | <p><u>Due specie distinte</u> : 2° <u>esemplare</u> <u>più</u> <u>grande</u>
 <u>più</u> <u>globoso</u>, e <u>il</u> <u>aspetto</u> <u>più</u> <u>forte</u> e 1° <u>Hell.</u>
 <u>incarnata</u> <u>Müll.</u></p> |

2 esemplari più piccoli, globosi - Papavero, il soffuto
leggero ed ispido è l'Hed. lucida Dragh.

- Clausilia* n. 1. Clausilia plicatula Dragh. var. minor
 " " 2. C. papillaris Dragh.
 " " 3. C. alboguttulata Wagn.
Pupa n. 1. Pupa parentum Dr. var. minor
 " " 2. Psithyrus tridentatus Müll. (Pupa tridentatus Dragh.)
 " " 3. Leucter species Müll.
 La più grande, a soffuto ferrigno, cogli anfratti
 costolati, l'ultimo dei quali rispecchiante nel
 davanti, col margine ista sempre nella sua
 metà, coll'ombelico infundibuliforme, è la Pupa
pygmaea Desfont.
 L'altra grandetta, sublungata, ad apertura femoreale
 con un punto dentino sulla metà curva della parete
 dell'apertura è la Pupa unispinosa L.
 La più piccola, lungata, ad apertura femoreale,
 3-dentata (1 dente parietale, 2 subumbelici e 2 palatali)
 è la Pupa pygmaea Dragh. (Vertigo pygmaea Hoffm.)
 E finalmente quella piccola, brevifossa, liscia, coll'ultima
 anfratto compresso-globoso, solcato lateralmente, ad ap-
 ertura subterangolare, con 4 denti (2 parietali, 1 subumbelico
 obliquo, ed 1 palatale allungato) è la Pupa Venetici
 (Lug.) (Vertigo Venetici Hoffm.)

- Psithyrus* Psithyrus subreus Müll.
Glandina Glandina aurata (Müll.) De Betta.
Cyclostoma Cyclostoma elegans Müll.
Pomatias Pomatias maculatum Dragh.
Lacinaea Lacinaea Pfeifferi Hoffm.
Physa Physa fontinalis L.
Veronica

Due specie distinte:
 Un'espansione, cioè quella oscura, ornata da fascie
 regolari, brevi, strette e angole e la Veronica
fontinalis Reigl.

L'altra a fondo chiaro reticolato in senso, o con
 3 fasce crociate nel senso della spirale e una

varietà delle Meretrix rhodostoma Zan.

Vittoria Vittoria trigland Drap. (esemplari incompleti)

Planorbis n. 1. Planorbis caerul. L.

" " 2. P. caerulatus Müll.

" " 3. Seguenbiana nitida Müll.

Encyclus Encyclus fluvialis Müll.

Pachyderma n. 1. P. tentaculata L. (P. impura Drap.)

" " 2. P. fasciata Müll. (P. achata Drap.)

" " 3. P. viduaria L. (var. ansoni)

" " 4. P. expansilabris. esemplari giovani.

" " 5. P. expansilabris Müll. (P. patula Bonn.)

" " 6. P. plumineus Lang (sp. Villa)

Limnaea n. 1. Limnaea perplexa Müll.

" " 2. L. perplexa variet.

" " 3. L. stagnalis Müll.


" " 4. L. palustris Müll.

Cycloas n. 1. C. cornea L. (non Drap.) - Valva ansoni

" " 2. C. laevis Müll.

Valvata Pirans esemplari. Forse la Valvata alpestris Müll.?

Unio Unio cellensis Schrot. (forma molto ventricola)



In tutto specie 51.