

Paris 11 Mars 1882

Monsieur & cher confrère

M^r Prilleux a fait hier
soir à la Société botanique
une assez brève communication
sur un *Hypomyces* qui aurait
compromis en tout ou en grande
partie la récolte des olives aux
environs de Porto-Maurizio
et dans la province de Gênes,
l'année dernière.

La présence se manifeste d'abord
à la partie supérieure des fruits,
par des taches de couleur charnue,
dans lesquelles l'examen microscopique
lui a révélé la présence de
nombreux filaments, plus ou
moins anastomosés, confus im-
-menses dans l'éther, pour les
dissolvent de la matière grasse,
à parois très épaisses, séjournant
transversalement par de très
minces

très minces cloisons, et chargés
latéralement de nombreuses
conidies simples, ovales, à galien
dimension ? . . . M^r Prilleux
a communiqué une figure du
Dematium pallidum de Bary
avec lequel la plante semble avoir
beaucoup de ressemblance et propose
de la nommer Dematium obscurum
j'avais songé un instant au
Fusarium microspolytoides Montagne
Syll. 294, mais celui-ci a des
conidies cloisonnées et M^r Prilleux
dit que les siennes sont simples.
Même à savoir s'il les a observés
à différents degrés de développement.
D'autre part, si ma mémoire ne
me fait pas défaut, il me semble
avoir déjà lu une communication
sur ce sujet. Où ? je ne le saurais
dire et comme je crois M^r Prilleux
peu au courant de la bibliographie
du sujet, il y aurait peut-être
intérêt à éviter un double emploi.
Quoiqu'il en soit, j'en ai fini
que la question

pouvai vous intéresser
puisque il s'agit de flares
de votre pays et je me permets,
dans un intérêt scientifique
de vous en donner la primeur.

Veillez agréer Monsieur
& cher Souffrier, l'expression
de mes sentiments bien dévoués

Gaudet

12, rue d'Aboukir
