



5 Clatsop
Esanito

40/0005-1

5 Clatsop

Esanito



M. P. Saccaro

Prof. de Botanique à l'Université

de Padoue

Italie

ESPERANTISTA
CENTRA OFICEJO
51, Rue de Clugny, PARIS

Clitocybe Compositus synoptheus specierum

capallatus ad non hypophaeus

I = Pileus carnosus; color pilei scabritate immutabilis; caro firma, non aquosa, nec in lamellas scissilis

1) Pileus umbonatus obtusus aut depressus

A) Pileus convexo, phaeus depressusve, obtusus, subaequaliter carnosus. Lamellae adnatae vel aequaliter adnato-decurrentes. Normaliter solitariae. **[Ditriciformes]**

a. Pileus albus, candidans.

α = Stipes solidus

A₁ = Lamellae confertissimae; sapor nitidus; pileus carnosus - 1 Clit. cerussata
* Eriopileta *var. difformis*

B₁ = Lamellae confertae; sapor acres; filius carnosulus - 2 Clit. gallinacea

β = Stipes farctus aut cavus.

A₁ = Pileus hard nitidus - 3 Clit. psitrophila

B₁ = Pileus pilis minusve nitens

a₁ = Pileus umbonatus, micore sericeo circa marginem argenteo-luteo; lamellae ex albo tuberculif. - 4 Clit. phyllophila

b₁ = Pileus non umbonatus, obtusus, lamellae non tuberculif.

α_1 = Stipes subtubulosus, nitidus - 5 Clit. candidans

β_1 = Stipes farctus

+ Stipes tobus fibrosus, apice subtuberosus *spora 4-5 μ longae* - 6 Clit. dealbata

++ Stipes glaber, strigulosus, basi pubescenti *spora 5-6 μ longae* - 7 Clit. formata

b. Pileus coloratus

α = Pileus cinereus aut fuscus

A₁ = Stipes farctus

a₁ = Pileus unguinum ultra 2 cm. latus, stipes subtubulosus - 8 Clit. hirneola

b₁ = Pileus 4 cm. vel ultra latus, stipes homoginicus - 9 Clit. nebularis

α_1 = Pileus compactus, lamellae arcuatae - 10 Clit. clavipes

β_1 = Pileus mollis; lamellae descendentes - 10 Clit. clavipes

B₁ = Stipes solidus

a₁ = Stipes aequalis

α_1 = Stipes et lamellae albi - 11 Clit. folia

β_1 = Stipes et lamellae grisei - 12 Clit. inornata

b₁ = Stipes inaequalis

α_1 = Stipes minus inaequaliter, curvus + Lamellae adnatae confertissimae, candidae - 13 Clit. curtipes

++ Lamellae decurrentes, confertae, albicae - 14 Clit. dothiphora

β_1 = Stipes basi inaequaliter, subtubulosus, odor foetens.

+ Stipes strabus, lamellae albo-rosidae, caro nigrescens - 15 Clit. gangraenosa

++ Stipes squamulosus, squamulis nigrescentibus, lamellis albis, caro inter articula scissa - 16 Clit. nimbata

β = Pileus aliter coloratus

A₁ = Pileus viridis, pallidus

a₁ = Stipes solidus, aequalis, lamellae candidae - 17 Clit. virens

b₁ = Stipes farctus, inaequalis, lamellae concolorae vel albae; odor amarus - 18 Clit. odora

B₁ = V. requito

B₁ = Pileus lobosus rufescens, vel incarnatus

α₁ = Pileus pubescens

β₁ = Odor nullus vel gratus

19 Clit. Veneris

+ Pileus 9-10 cm. latus, lamellae venosae-coniatae
stipes crassus - - - - - 20 Clit. Tuberaster

++ Pileus 2.5-5 cm. latus; lamellae adnatae
currentes, stipes vix 1 cm. crassus - - - - - 21 Clit. subalutacea

β₁ = Pileus rufescens vel incarnatus

α₁ = Stipes fractus aut carnis

+ Lamellae albae, pileus fulvus, brunneus, punctatus, floccosus - - - - - 22 Clit. cryptarum

++ Lamellae rufescentes, vel incarnatae - albidae
○ Pileus squamulosus, lamellae decurrentes, rufescentes, stipes basi rufus-nigrescens - - - - - 23 Clit. lutescens

○○ Pileus glaber, lamellae adnatae - decur.
rantes, incarnatae - albidae cum stipe intus - - - - - 24 Clit. rivulata

β₁ = Stipes solidus, pileus rufescens

+ Lamellae pubescentes, stipes rubellus - - - - - 25 Clit. socialis

++ Lamellae et stipes albi, vapor amarus - - - - - 26 Clit. amara

B = Pileus ex umbonato irregulari, irregulariter carnosus, velut disco carnosus, marg.
gine hinc. Lamellae inaequaliter decurrentes. Connatis. caespitosa [Biformes]

± α = Pileus n. n. angulato-
precis. subgrato alba

α = Stipes cavus, tuberoso-connatis, glabri - - - - - 27 Clit. connata

β = Stipes lanuginosus - - - - -
var: hepatoidea

β = Stipes fractus, inaequalis, flavescens - - - - - 28 Clit. opaca

β = speciosus plus minusve colorata

α = Stipes solidus

A₁ = Lamellae decurrentes

α₁ = Lamellae ex albo emescentes, pileus umbrinus, stipes floccosus - - - - - 29 Clit. lunulata

β₁ = Lamellae fuligineo-rosidae albidae; pileus e fuligineo
nigro viridis vel carnis, stipes nectus - - - - - 30 Clit. ampla

β₁ = Lamellae adnatae v. subdecurrentes

α₁ = Lamellae e carnis pallentes, pileus fuliginosus
subspatiatus - - - - - 31 Clit. mollior

β₁ = Lamellae albae, ~~stipes~~ - - - - - Clit. decipiens

β = Stipes fractus vel carnis

A₁ = Lamellae rosidae albicanes - - - - - 32 Clit. coffata

β₁ = Lamellae albae coloratae

α₁ = Stipes fractus, pileus den. v. roseo-ochraceo
Clit. insh

α₁ = Lamellae fuliginosae den. caeruleo-ochraceae - - - - - 37 Clit. castaniceola

β₁ = Lamellae flavae carnosae - - - - - 38 Clit. aggregata

β₁ = Stipes cavus - - - - - 39 Clit. hortensis

β₁ = Stipes cavus - - - - - 39 Clit. trigonospora

Q = Pileus II sporas angulo-subspora
lae descendentes, pericarpis longe et aequaliter decurrentibus [Infundibuliformes]

A = Pileus candidus, punctis sub-
micridibus adspersis aut glabratus

α = Stipes solidus subterrestribus; pileus infundibuliformis - - - - - 40 Clit. neapolitana

β = Stipes fractus vel carnis

α = Stipes basi attenuatus

A₁ = Odor gratus pileus 2.5 cm. latus, albus, lamellae breviter
decurrentes, latae venosae-coniatae, stipes glaber - - - - - 41 Clit. ericetorum

β₁ = Inedula; pileus 7-10 cm. latus, albus-plumbeus; lamellae
longe decurrentes, angustae; stipes basi villosus - - - - - 42 Clit. Panicinii

β = Stipes aequalis vel mirum attenuatus

A₁ = Pileus minor, ovato-candidus, convexo-planus
umbilicatus, stipes mox carnis - - - - - 43 Clit. suba

β₁ = Pileus glaber e plano infundibuliformis;
stipes fractus - - - - - 44 Clit. calmus

B = Pileus en. v. angulatus

- * pileus subochraceus
* pileus cinereus v. fuliginosus
+ stipites a tubero orientes
+ stipites tubero carentes
a pileus fuliginosus
b pileus cinereus

32 Clit. Decastes

33 Clit. conglobata

34 Clit. carbonacea

35 Clit. cinereus

B = Pileus plus minuse coloratus, glaber aut imato-flocculosus

a = Pileus superius imato-flocculosus vel verrucosus, fibrilla, non ada.

α = Stipes carnosus; pileus lateribus - ruber - - - - - 45 Clat. incilis

β = Stipes farctus vel spongiosa farctus

A₁ = Lamellae imbricatae, griseo-albivantes vel e

caudis lobositas, stipes farctus

α₁ = Color farinae recentis, pileus ruber dein capillatus

stipes vix 3 cm. longus - - - - - 46 Clat. sinopica

β₁ = Color diversus; pileus e junior vel griseo

subcapillatus, stipes 6 cm. longus - - - - - 47 Clat. parilis

B₁ = Lamellae distinctae vel subimbricatae, albae

α₁ = Lamellae venosae - concolorae, stipes farctus 48 Clat. trulliformis

β₁ = Lamellae vix 22 liberae, stipes spongioso-farctus

α₁ = Pileus 10-35 cm. latus, albus - palli-

deus vel albidus, odor farinae - - - - - 49 Clat. maxima

β₁ = Pileus nunquam ultra 8 cm. latus;

odor diversus - - - - - 50 Clat. squamulosa

+ Squamulae pilei obscuriores - - - - -

++ Squamulae pilei concolorae - - - - - 51 Clat. infundibulifor-

nis

⊙ Stipes aequalis, tenuior 52 Clat. membranacea

b = Pileus glaber (jove pluvio) latus

α = Lamellae ramosae e pallido rubrae - - - - - 53 Clat. gilva

β = Lamellae nudae vel bifurcatae, non ramosae

A₁ = Stipes glaber

α₁ = Lamellae semper albae vel albo-pallidiores

α₁ = Pileus et stipes lactei, lamellae albivante-oliva-

rentis, compactissime, saepe furcatae - - - - - 54 Clat. candida

β₁ = Pileus et stipes gilvi, loboscentes, lamellae

longe decurrentibus, compactae, crassiusculae - - - - - 55 Clat. splendens

β₁ = Lamellae ex albo loboscentes vel flavoscentes

α₁ = Stipes aequalis - - - - - 56 Clat. subinvoluta

β₁ = Stipes sursum attenuatus

+ Pileus 10 cm. latus, stipes 5-7 cm. longus

albivante-olivaceo, sporae 9 μ diam. globulo-

sae, spinulosae - - - - - 57 Clat. spinulosa

++ Pileus 11 cm. latus, stipes 16 cm. longus;

sporae sphaeroidae, ellipsoideae 6-7 μ longae 58 Clat. gestropa

B₁ = Stipes farctus vel carnosus

α₁ = Lamellae obscurae cinereae - - - - - 59 Clat. caratua

β₁ = Lamellae albae, flavae, vel rufescentes

α₁ = Stipes fibrillosus vel basi tantum villosus, farctus

+ Pileus ex albidis canosus, subimbricatus,

sporae 9 μ diam. spinulosae [Clat. spinulosa]

++ Pileus flavo-ferugineus, rufescentis, lac-

cidus; sporarum ultra 5 μ longae 60 Clat. flaccida

β₁ = Stipes glaber, tenuis carnosus

+ Lamellae albae, compactissime; pileus e rubro

carneis albidus - - - - - 61 Clat. vermicularis

++ Lamellae pallidae, dein rufescentes, pileus

lobosus, rufescens, dein albidus, odor

aridus - - - - - 62 Clat. nivosa

II Pileus carnosus, membranaceus, hygrophanus. Caro tenuis, molli, agrose, hygrophana.

1) = Pileus e depresso cyathiformis, disco non compacto, lamellae primo distinctae dein densae, ramosae, decurrentibus [CYATHIFORMES]

A. Stipes inaequalis

a. Stipes sursum attenuatus, solidus, e violaceo rubellus, odor fortis 63 Cl. calathosus

b. Stipes sursum attenuatus vel basi inaequalis; farctus vel subfarctus 64 Cl. suarcolinus

α = fragrans, odor amarus

β = Inodora

A₁ = Lamellae imbricatae, stipes flocculosus, basi inaequalis;

pileus farina plumbea conspersus - - - - - 65 Cl. pruinosa

B₁ = Lamellae distinctae, partice junctae, stipes fibrillosus, rubic-

latus, sursum attenuatus; pileus nudus - - - - - 66 Cl. cyathiformis

B. v. nq.

I-1)-B = Stipes regularis

a = Lamellae fuliginosae - - - - - **87 Clit. concava**

b = Lamellae albidae vel cinerasc.

α = Stipes flavolentis; pilulis squamulis fuscis punctatis, odor fenniae recentis **68 Clit. Pucletiae**

β = Stipes glaber, vel basi solum villosus; pilulis glabris, odor nullus vel diversus **69 Clit. brumalis**

A₁ = Plus margine levii aut undulatus; lamellae pallidae

B₁ = Plus margine striatus

a₁ = Lamellae distantis, caesio-cinereae demum albidae-purpureae; plus fusco nigrescens; stipes fusco-cinereus argenteo-striatus **70 Clit. obtata**

b₁ = Lamellae leviter distantis albo-cinereae

α₁ = Plus griseo-lividis, sicus albidus **71 Clit. iribicina**

β₁ = Plus fuscescens, sicus argenteo-albidus **72 Clit. expansilis**

2 = Plus convexus aut applanatus, aut vix depressus. Lamellae adnatae vel dentibus laevibus demum.

A = Plus applanatus, glaber, subcarneus, non squamulosus aut farinosus, Lamellae tenues, undae, haereticatae, confertae. **[CORBIFORMES]**

a = Lamellae immixtas, pilulis primis obtusis.

α = Grandis, odor fenniae recentis; lamellae obscure cinerasc. **73 Clit. ditoposa**

β = Inodora

A₁ = Lamellae pallidae cinerescens; stipes sursum pubescentia-pinnatis **74 Clit. metachroa**

B₁ = Lamellae lividae; stipes molis **75 Clit. obolus**

b = Lamellae albidae vel coloratae.

α = Fragrans, odor garbis, anisus

A₁ = Plus unicolor, aquose albidae albicans, stipes sufflavescens **76 Clit. fragrans**

B₁ = Plus sicus lactescens, plus, undae pallide lividis vel argillaceo-incarnatis, stipes rostris **77 Clit. obsoleta**

β = Inodora

A₁ = Plus ex aquose-albidae albicans, margine striatus, et in latius, lamellae confertissimae **78 Clit. angustissima**

B₁ = Plus plus minus coloratus, margine non striatus, non ultra 4 rem laevis.

a₁ = Plus umbrosus dem opacioribus, sicus subcaesius, lamellae confertissimae **79 Clit. mortuosa**

b₁ = Plus ex incarnatis alutaceis sicus albidus, lamellae confertae **80 Clit. diatreta**

B = Plus cinerascens, irregularis, tenuis, squamulosus aut subperforatus. Lamellae subdistantes, crassiusculae, albo-purpureae. **[VERSIFORMES]**

a = Lamellae saepe primis albidae vel pallidescens.

α = Stipes farinosus squamulis fuscis aciculatis apice albo-lanaceis **81 Clit. apula**

β = Stipes carnis vel subcarnis, vel subtiliter fistulosus, non squamulosus.

A₁ = Plus flavus, muris; inodora **82 Clit. granulata**

B₁ = Plus squamulis flavicinctis imbricatis, striatis; inodora **83 Clit. ectypa**

a₁ = Plus purpureo-pallidus, sicus demum lividus, plus depressus **84 Clit. diffusis**

b₁ = Plus molis, plus subundulatus

b = Lamellae saepe coloratae.

α = Stipes farinosus

A₁ = Lamellae ex albidis cinerascens **[Clit. apula]**

B₁ = Lamellae laevi coloratae demum albo-purpureae.

a₁ = Plus et stipes dense violacei, demum lividus (**Laccaria**) **84 Clit. anethysea**

b₁ = Plus et stipes sic dense violacei, nec lividus **85 Clit. laccata**

α₁ = Sporae sphaeroidales, reniculae, pilulis lateribus, carnis, profusius (**Laccaria**) **86 Clit. proxima**

β₁ = Sporae ovatae, minute echinulatae; pilulis fulvo-aurantiis (**Laccaria**) **87 Clit. pachyphylla**

β = Stipes carnis vel subcarnis

A₁ = Lamellae lividae (**Laccaria**) **88 Clit. pumila**

B₁ = Lamellae purpureascentes, roscae, vel imbricatulae **89 Clit. tortilis**

a₁ = Stipes lobus vel flexuosus, pilulis lobatis (**Laccaria**) **90 Clit. sandrina**

α₁ = Plus idus, lateribus carnis, sicus obscurus **88 Clit. pumila**

β₁ = Plus subperforatus (**Laccaria**) **89 Clit. tortilis**

a₁ = Lamellae subnidae, profusius carnis (**Laccaria**) **90 Clit. sandrina**

β₁ = Lamellae albo-lanaceae + Lamellae pallidescens, demum imbricatulae **[Clit. ectypa]**

+ + Lamellae roscae carnes demum fulvo-aurantiis **[Clit. proxima]**

Sandwichia 1924

Color obscurior; pileo submembranaceo,
e convexo plano, umbilicato, d. Hornii;
levi, hygrophanus, demum griseo-fa-
rinaceo, margine fasciato; lamellis ad-
natis, confertis, ventricosis, purpurascens,
subnudis; ~~stipite~~ tenuibus, saepe ramosis;
stipite cav, inaequali, glabro,
purpurascens, ~~sub~~ subnudo; sporis glo-
bis, aequalis, 10-11 μ diam., hyalinis.

Observ. ^{Sp. di} Di raro occorrono esemplari,
di statura molto diverse, che sem-
brano presentare ^{un} aspetto peculiare
più prossimo a quello di Clit. laccata
variante allo stesso modo.

90 *Chrysothrix sandwicensis* (Fr.) Sacc. *Syll.* V p. 196 (1887)

Agaricus sandwicensis Fr. *S. M.* I p. 157 (1821)

Fr. Guetland, Forging. et Merl. Champ. Sud-Ouest t. 7 p. 6

Bol. 417, 418, 1031

Hab. in hibernicis, ~~improvisis~~ ^{et frondosis} ~~acerosis~~ Trentino, Veneto; Belluno (d. Sacc.)

Area disto Europa.

: Valle Lagarina (Cob.);

(Aut.)

Tortilis 198

Caespitosa, admodum fusilla, irregularis.
pileo membranaceo, e convexo-plano
depresso, striis obscurioribus distan-
tibus radiatis, subferrugineis; lamel-
lis adnatis, crassis, subdistantibus,
carneo-roseis; stipite protulso,
torto, fragili, subferrugineo;
sporis globosis, verruculosis, hya-
linis 10 μ diam.; sterigmatibus binis.

Ussero. È forse una progenie
mostuosa di Clit. laevis?

Spore secondo Bresadola My.

12 - 14 μ , aculeolate
basidii 40 - 50 = 11 - 13.

89 *Claviceps tortilis* (Bolt.) Gib. Champ. Fr. p. 174 (1874), Sav. *Hyb. Fung.* V
p. 198, *Agaricus tortilis* *Bot. Fung.* I p. et t. 41 f. A (1788)
Icon. Bolt. l. c., Patouill. *Tab. anal.* f. 105, ~~Boiss. *Cham. et Champ.*~~
Bibl. 198³ Bresad. MS., 1301 Liguria: (Piemonte: Vall. Valdes (Fayo). Aert. Aut.
Hab. in nemoribus subhumidis - Trentino: Inzenga (Bresad. MS.), ~~et~~
area dist. Europa.

Valde aff. Cl. coccata.

pumila 17.13

~~Elegantissima species~~

Filo pelliculoso, primo campanulato, 5 mm. lato, limbo
appianato, centro depresso, undulato, radiatim striato,
1-1,5 cm. lato, udo lateritio-carneo (mahagoni-
colore) centro saturatiore, subitico ochraceo;
lamellis adnatis, submarginatis, carneis;
stipite 1,5 mm. crasso, sursum incrassato,
in pileum expanso, 2 cm. longo, flexuoso, fi-
stuloso, concolore, basi gossypino, albo; basi-
dis 2 sterigmaticis haud emergentibus, cysti-
dis ~~ca~~ curtis, clavato-globosis; sporis ascae-
ricis, echinulatis, 12-18 μ diam..

88 *Clitocybe pumila* (Fayod) Sacc. *Syll. fung.* XVII p. 13 (1905) Laccaria

pumila Fayod *Cons. Fung. d. val. Valdes.*, 1893, p. 91

Icon. ~~in~~ Fayod, *Prod. agar.* 1889, t. 6, ^{f. 80} Plat. 1301

Hab. catenatum ad terram arenosam, locis humidis, ad margines viarum
— Piemonte: pro Torse Pellicia, Vall. Valdes. (Fayod) — Elegantissime specie del
topo d. Cl. laulata.
Aestates - Aut.

Area viti. Helix bor.

pachyphylla 192


(*Lolitaria* vel *caespitosa* minor)
odori amarus

~~Minor~~; pileo subcarnoso, convexo - flavis
uscule, flocculoso - squamuloso, ferrugineo
ruinoso, disco depresso, sordide lutescente
vel rufescente 2-3 cm. lato; lamellis
adnatis, crassis, distantibus varie
adnexis, subcurrentibus et interdum
secedentibus, luteis; stipite
subfarcto, tenaci, luteo, 2,5-3,5
cm. longo, 2-3 mm. crasso; sporis
7-8 = 3-4.
tertib.

Offert. La lamelle ^{microtana} ~~in bono~~
~~portans~~ ^{quelle} come in Clit. laucata

87 *Clitocybe pachyphylla* (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 169 (1876)
Sacc. Syll. II. p. 192, *Agaricus pachyphyllus* Fr. 661. T. p. 48 (1815)
Tron. Fr. Non Hymen. t. 60 f. 2, Patouill. Tab. anal. fig. 1.

2) Hab. in stratis sub arboribus ^{coniferis} Veneti: Padova, orto botanico. Aestate

1) Mitt. 209. 
area distr. Europa.

proxima 9-26

Pileo convexo, centro appianato vel depresso, hygrophano, fulvo-aurantiaco, demum appresse fibrilloso et squamuloso, margine tempore udo striato; carne concolori, lamellis latis, distantibus, crassiusculis, roseo-carneis, margine pallidioribus, demum pileo concoloribus, albo-farinosis; stipite elongato, eodem fibrilloso, aequali vel basi vix incrassato, intus pileo concolori; sporis ovatis, minute echinulatis.

86 *Chrysope proxima* Bond., Bull. Soc. Bot. Fr. 1881 p. 91, t. 2 p. 2.

Sau. Syst. IX p. 26


Catonⁿ. Tab an. fig. 666

Loc. Bondier l. c. Barle Champ. Alp. Marit. t. 66 p. 17-20 (Laccaria)

Bibl. 94, 95, 983, 1301

Hab in h^{is} sabulosis, Jemudetis - Nizza ^{and} ~~Alpes Maritimes~~, Piemonte ^{J. Lanza} Valli Valdesi (Feytaud)

Aree dist. Italia, Gallia, Tunisia

(Vere aut. )


Att. ~~È una specie di Laccaria loc. Patouill. Hymen. Europ.~~


85 *Chitoybe laccata* (Scop.) Quél. Champ. Vosg. 91 (1872)

Sacc. *hyb.* V p. 197 *Agaricus laccatu* Scop. Carn. II 144 (1792)

Ess. M. V. n. 806, M. S. n. 407, Rob. F. Ess. n. 395 (Vulsi, Baglietto), Reb. *in* It. n. 1346
Bon. Dalla, Champ. Alp. Marit. t. 64 f. 1-6, Lam. F. d. Roma, t. 91 f. 3

Sacc. Myc. Ven. spec. t. 4 f. 20 (spora), Battarra F. Arim. t. 18 f. G-I (*Omphalomyces
abingue sulcatis*).

Bibl. 103, 90, 61, 94, 95¹²³, 209, 244, 245, 246, 316, 417, 418, 430, 434, 585, 638, 853, 616,
661, 704, 803, 866, 923, 927, 983, 1015, 1062, 1133, 1236, 1253, 1258, 1265, 858,
1284, 631, 564, 1049. 1514 

Hab. in nemorosis, umbrosis. Liguria, Piemonte, Lombardia, Venetia, Trentino, C. Ticino,
Emilia, Toscana, Lazio, Neapolitana, Sicilia, Sardegna, Corsica, ^{Vera-Ant} 

Area dist. Europa, Amer. bor., Asia, Africa, Australia; Tunisia

~~Var *serpilis* (Rob.) Quél. Champ. Vosg. p. 174 (1874), ^{with} Sacc. *hyb.* V p. 198 - Y. Pat. Tab. and. f. 105~~

~~Bibl. 983 Hab Liguria sp.?~~

~~Var. Lam. Roma t. 91 f. 3 95 244 125,~~

Laccata

197

Statura in fructe ludens; pilea sub-
membranacea, e convexo vertiformi,
subumbilicata, adalto farinoso, sub-
squamuloso, hygrophanus, ^{primo et udo subter, tumum striato} 2,5-5
cm. lato; lamellis adnatis, crassis
distantibus, lacte coloratis, demum
albo-farinosi; stipite farcto, aequali
tenaci, fibroso, lacte colorato, demum
albo-farinoso; sporis 2,5-15
cm. longo; sporis sphaeroidis 9-10
 μ diam. verruculosi, basidii cla-
vatis-oblongis 27-30 = 7-8; sterigma
liby quaternis 3-4 = 2-3.

lamelle variabile
Del pileo e delle
indumenti porporacei, flocculosi.
nella *Deconmyza*
nella *Styple* e del pileo,
subumbilicata
nelle spore tuberculata an.

III
Oltres. Le varietà più costanti paleolarie dovute al colore
sono:

- (a) negra carneae col cappello secco submembranaceo;
 - (b) lutacea colle lamelle carnee
 - (c) pilea luteo-violacea, secco, ~~ad~~ oraceo e lamelle
violacee;
 - (d) oscuramente violacea col pileo fresco carnescente.
c. F. Rom. p. 285 t. 91
 - (e) lota alba Lauri ^{Prodr.} ^{Langi Rom.} p. 23 t. XIV n. 15.
- La quale per l'aspetto e specialmente per le spore ellisso-
ace ~~linea~~, sembra piuttosto una lota decubata
o una specie affini. specie distinta.

Anche *Porcariella* (M.) ricorda molte forme e varie
tà di questa specie.

1 Forse non a torto sia per
l'indole del tubetto che per
le spore, questa specie è stata
ascritta ad un genere proprio (Laccaria
Berk.)

III

VI. *Varia* anni: nelle *gandeyge*, nel colore
Del rosso, al negro al violaceo, nell
subumbilicata
nelle spore tuberculata an.

amethystea

p. 237

84 *Clitomyces amethystea* (Bull.) Sacc. *Agaricus amethysteus* Bull. Champ. t. 198 (1784) et 570 f. 1.; *Ag. amethysteus* Bull. Fung. t. 63 (1788)
 Icon. Bull. l.c., Bull. l.c., Krombh. Abb. t. 72 p. 19-20, Sow. Ps. t. 187 (1799)
 Bibl. 209, 95, 244, 123, ¹³⁰¹ ecc. ^{promissum} (in moth. *Sci. N. citati* per *Cl. lacata*)
 Hab. in ambrosia, adis, horti in tota fere Italia, ubi *Cl. lacata* ♀
aree nati. Europe. Vere aut.

Piles Myrteae primitus sicutate violaceis, demum hincis u. cineraceis
 hinc; ~~cerata~~ cetera *Cl. lacatae*.

~~sign. & quid.~~

ectypa 193

Caespitosa vel solitaria; odor primo gratus aniseus, demum
foetens; albo-comissans, pileo subcarneo, explanato, de-
num depresso, revolutoque, hygrophanis fibrillis fuliginis
adpressis subtiliter virgato, margine strabulo, melles, 5-8 cm. lato,
lamellis adnatis, subdistantibus, pallidioribus demum rufo-ma-
culatis, albo-farinosis; stipite subcavo, elastico, ~~fibrilloso~~
5-10 cm. longo, 6-10 mm. crasso; sporis ovoidibus 9 μ longis.

(Spec. Spure secondo Bresadola (ms.) 9-10 = 5-7 • 10-12 = 6-8
basidiu 25-35 = 9

grammata 194

Solitaria, valde tenax, inodora); pileo submem-
branaceo, ex obtuse campanulato convexo, gla-
bro, rimuloso-squamoso, disco depresso, flavo,
2,5 - 4 cm. lato; lamellis late adnatis,
sistentibus, tenuibus, planis, albis; stipite
subtiliter fistuloso, aequali, tenaci, glabris-
culo, palliditate, 2,5 cm. longo, 4-5 mm.
crasso; sponis sphaericis, asperis, 8-9 y diam.

~~Ostrea~~. Affine a *Clit. packoffskyella*,
quasi una *Secunia*.

82 *Clitocybe grumata* (Scop.) Sau. *Symm. V* p. 196 (1887), *Agaricus grumatus*
Scop. *Carin.* p. 443 (1772)


Icon. Berol. Champ. Alp. Marit. t. 64 p. 80 f. 21-23.

Bull. 94, 95, 983. 67

Hab in tabulis: Si Nizzardo Alp. ~~Mantovano~~ (Bale). Dist. Aut.
Area d'Ar. Carnischi, Italia, Salvi, Lucra.

apula 1924

Pallide albaeae; pileo carnosulo, convexo, obtuso,
sericello, hygrophano, 2-5 cm. lato; lamellis
subdecurrentibus, distinctis, inaequalibus, ex
albido cinnamomeis; stipite farcto, lenaci,
aequali, apice albo-farinaceo, squamulisque
fulvis asperulato, 4-5 cm. longo; sporis
ellipsoideis, albis 7-8 = 4-5



81 Chytocbe apula (Comes) ^{Sacc. 19th. V. p. 194 (1897) [text err. opala] Agaricus apulus Comes} F. Rejol II p. 89 t. 14 f 1-3.

Ter. Comes p. c.

Herb. 634



Hab. in silvis collinis - Monopoli. ^{a Monopoli.} Rejolitarum (Barneba). Aeth. Aut.

Area Dishi Habit marid.

→ F Versiformes.

Siatruta 187


Trudora; pileo subcarnoso, e convexo plano depresso,
levi, glabro, hygrophanus, juniores rigidulo, ex incarnato
alutaceo, siccus albidus 2.5 cm. lato; lamellis ~~dentato acuto~~
fistricae acuminatis, dente acuto deaurantibus, confertis, an-
gustis, albis, interdum incarnatis, pallidioribus;
stipite e farcto cavo, elastico, levi, stricto, sericeo, gla-
bro apiceque nudo, non cartilagineo, 2-5 cm. longo,
2-4 mm. crasso; sporis 6 = 3-4

~~Nota~~: Il pileo è più carnoso che nelle altre specie.
Il *Passerina Trud.* in Aperta una forma con cognome
micelio esteso fra le foglie morte di pino.

80 *Chortoybe dactyla* (Fr.) Quel. Champ. Vosg. p. 236 (1872)

Sau. hyp. V p. 187; *Agaricus dactylus* Fr. S. M. I p. 83 (1821)

Terre. Cooke M. Br. F. t. 232, Gillet et Lucand, Champ. Sup. t. 1 f. 2.


Brit. 886. 

Hab in silvaticis, imprimis acerosis - Emilia: prov. d. Parma (Passerini) Herb. Bot.

Area distr Europa.

mortuosa 189


Gemma, irregularis, saepe excentrica, inodora;
pilo subcarnoso molli, plano depresso, levissimo,
glabro, hygrophano, 2-4 cm. lato, primo umbrino,
dein spandico, sicc. in alutaceam transiente;
lamellis adnatis, confertissimis, angustis, albidis;
stipite farcto, aequali, curto, glabro, albido, vix 2 cm.
longo, 2-3 mm. crasso, saepe curvato, adfendente,
demum compresso; sporis 4-5 = 2-3



79 Clitocybe mottosa (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 168 (1876)

Tacc. Syn. V p. 189, Agaricus mottosus Fr. Bot. II p. 210 (1818)

Icon. Fries Icon. Hymen. t. 59 f. 3.

Det. 866. 

Hab. in graminosis inter abietes - Russia: boschi d. Ferlato (Passetini). Aust. Aut.

Area dist. Europe, Siberia.

angustissima 188

Inodora; ea aquoso-albido alba; odor nullus,
pileo subcarnoso, plano depresso, levi, glabro, hygro-
phano, margine patente demum striatulo, 4-8
cm. lato; lamellis subdecurrentibus, angustis,
confertissimis, albis; stipite farcto, tenui, nudo,
flexuoso, 2-7 cm. longo, 3-5 mm. crasso;
sporis ~~4-5 = 4~~ ^{4 = 2-3} ~~4-5 = 4~~ ^{4-5 = 4}; basidiis 20-25 = 5 +

Observ.: Molto simile a Cl. fragrans, ma lo sti-
pite è più tenue, e l'odore nullo.

Spore 4-5 = 4 ^{ec} f. Bresad. (mf.), il
quale dice che lo Idermogonum ha a-
del tutto bianco.

78 *Chibouche angustissima* (Lasch) Gillet, Champ. Fr. p. 168 (1874)
Sacc. Syll. fung. V p. 188, *Agaricus angustissimus* Lasch, *Linnaea* IV (1829)
p. 528 p. 527.
Icon. Fr. Yem. Hymen. t. 59 p. 2, Cooke Det. Br. F. t. 125, Gillet Champ.
Fr. t. 97.

Bibl. ⁴¹⁸ Bresad. MS. ♂

Hab. ad margines sphaerum ^{inter muscos} Trentino: Tergolas, raro (Bres. MS.),
aree disti. Europe, Siberia

Valle Lagarina (Cobelli)

Cl. A. Aut.


Sec. Bresadole MS. le determinazione non è del tutto sicura.

Obsoleta 189

Obsoleta fragrans: odor gratus sed non fortis, aniseus;
pileo subcarnoso, e convexo plano depresso, levi, gla-
bro, hygrophorano, juniore subumbonato, sicco
lutescenti-albo, urto pallide livido vel argilla-
ceo-incarnato; lamellis obtuse (fere rotundato-)
adnatis, latis, infertis, albidis;
stipite e perico cavo, elastico, albido, recto
ipso apice tantum pruinato, basi saepe
villosa; sporis 7×3 — ?

Offens. Esattamente intermedia tra
Cl. fragrans e Cl. metachroa

77 *Citroybe obdeta* (Batsch) Quel. Champ. Voy. p. 237 (1872) (11786)
Sav. Syst. V p. 189, *Agaricus obdeta* Batsch, Slench. Cat. F. 129, fig. 103,
Fon. Batsch l. c., *Bata Champ. Alp. Marit.* t. 63 p. 21-28, *Rennet Champ.*
Rochele t. 11 f. 1.

Hott. 94, 95, 983. 

Hab. in hirsutis imprimis aceris: Nizzardo (Barla) ~~Alp. Maritime~~
Area dist. Europa (Trentino: bosco sotto al Merzot (Bres. Ms.))

Ant. Aut.

fragrans 188

(Odor fragrans, anisens; Unicolor nec disco obscurior, ex
aqueose albido albicans); pileo subcamoso, e convexo plano de-
presso, levi, glabro, unicolore, hygrophano, 2-6 cm. lato;
lamellis subdecurrentibus, confertis, distinctis, albidis;
stipite e fardo cavo, elastico, glabro, subflexuoso 6-8 cm. longo,
4-7 mm. lato crasso; sporis ellipsoideis 6-7 = 3-4

obolus 187

Trodora; pileo subcarioso ^{orbiculari} convexo-plano, obtuso,
glabro, hygrophano, ~~et~~ e livido cano-albicante,
variante repando et depresso, \pm cm. lato; lamellis
adnatis, ~~confertis~~ etiam subdecurrentibus, confertis,
lividis; stipite fistuloso, aequali, semi, striato, nudo,
polito, subflexuoso, elastico nec cartilagineo, livido,
5-7 ~~cm.~~ longis, \pm mm. crasso; sporis 7 μ diam.
aculeolatis.

75 *Clitocybe oboles* (Fr.) Gill. Champ. de France p. 166. (1874)
Sacc. ~~Syll. fung.~~ Syll. fung. V p. 187, *Agaricus oboles* Fr. d. M. I p. 89 (1821)
Icon. Botelm. Hymen. t. 80 p. 360

Th. B. 1863

Hab. in silvis acerosis: ^{Tirol aldp.} ~~Alto Adige~~: Varna (v. Höhn.) Aust. Aust.

Area distri. Europe.

metachroa 185


Minor, ~~in~~ inodora; pileo subcarneo, e convexo
plano, depresso, glabro, hygrophano, in Pri-
ma infantia fusco, adulto livido, sicco albescente,
2,5-4 cm. lato; margine demum striatulo;
lamellis adnatis, confertis, pallide cinerescentibus;
stipite e furore cavo, aequali, tenaci, sursum
pulveraceo-fornato, ^{demum,} ut in plerisque cavis,
compresso, 4 cm. vel ultra longo, 4-9 mm.
crasso; sporis 6-8 = 3-4; basidiis
25-30 = 6-8

Ha
Offeri ^{Ha} in molte varietà, quale col disco
più oscuro, fosco, quale di color incarnato
e quale ~~sordidi~~ d'un rufescente sordido.

94 Collybia metachroa (Fr.) Quel. Champ. Vb. p. 236 (1872)

Jour. Syst. V p. 185, Agaricus metachrous Fr. S. M. p. 172 (1821)

Jour. Bot. Champ. Alp. Marit. t. 63 f. 7-13, Vogelia in N. G. b. it. 1884 p. 4. 8 f. 17 (p.)

Bull. 94, 95, 585 (Omphalia), 886, 923, 983, 1277 

Hab. in herbatis, imprimis acerotis: Liguria, Piemonte, Emilia, Toscana.

Area ~~est~~ Europa

(Cent. Aut.)

(Bres. MS)

Trentino: boschi di Tergolas e Magras

Off. Sec. Bres. MS ^{questa specie sarebbe} da riferirsi piuttosto al gen Collybia.

detopoda 186

(Graecocior; Graecolens, odor fortis larinae recentis)
filico subcarneo, e ^{minorum convexo, majorum in-} ~~convexo~~ ^{verso et undula-} ~~plano~~, ^{to, levi,} ~~depresso~~;
glabro, hygrophano, 2-3 cm. lato, fusco-cinereo;
lamellis adnatis, confertis, tenuibus, obscure cinereis;
stipite cavo, aequali, subnudo, 3-5 cm. longo,
sporis sphaeroideis 3-4 μ diam. ↗

Ostia: Spore secondo Brix 5-6 = 3-4.

Questa specie ha la statura di C. metachroa, ma
ne differisce per l'odore. ~~Non si confonde colle~~

~~Cyathoporus fuchsii~~ ~~perchè~~ ~~glabro~~ ~~alcuni~~ ~~individui~~ ~~hanno~~ ~~il~~
~~filico~~ ~~convexo.~~

73 *Chitoybe* ditropoda ^{E. Orbiformes.} (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 166 (1874)

Sacc. Syll. V p. 186, *Agaricus ditropus* Fr. S. M. I p. 171 (1821)

Jen. Cooke Ill. Br. F. t. 116

Bull. 209, 1015, 1133, 631, 1652, 1920, 693 ♂ Trentino: Arona (Harmel)

Hab. in silvatis, imprimis acrotis: Veneto, Toscana, Corsica. ^{Vene.} ~~Rest. Barb.~~

Area distr. Europa.

expallens 177

Filo carnosissimo-membranaceo, plano-infundibuliformi,
levi, glabro, fusciscenti, sicco argillaceo-albicante, mar-
gine mox expanso ^{stralato} lamellis decurrentibus, linter
distantibus, albo-vinereis; stipite e fano cavo, aequa-
li, apice albo-sericeo; Sporis 10 = 5-7

Osserv: È minore e più pallida di Clit. cyathiformis.

Vibecina 179

Pileo submembranaceo, e plano infundi-
bubiformi, glabro, hygrophano (marginis
mox patente striato), griseo-livido, vix
albido, saepe facie sericea, zonataque,
2-6 cm. lato; lamellis primo adnatis,
dein longe decurrentibus, vix confertis,
griseo-albidis; stipite cavo, aequali
molli, glabro, subundulato, griseo-
albido, basi albo-villoso, non cartilagineo
neque pruinato, 5-8 cm. longo & 4-7
mm. crasso; sporis 5-7 = 3-4


~~Uster~~ Simile a Clit. metachroa
vechia; ~~vix~~ spore secundo Bresadolle
mf. 7-8 = 4; basidi: 30-35 = 6,

~~Re una varieta con 4~~

Q e sec. Quést. fl. mycol. p. 239, non e
distinta sufficientemente da Cl. explanans.

obbata 177

Fileo submembranaceo, ex umbilicato infundibuliformi,
glabro, hygrophano, fusco-nigricante, in disco tantum
sciffili, margine demum striato; lamellis decurrentibus
distantibus, primis obscuris caesio-cinereis, dein
albido-fumosis; stipite cavo, aequali, ^{omnino} glabro,
^{Sed molli} fusco cinereo, argenteo-striato, saepe flexuoso, 4 mm.
crasso, dein complanato latiore: sporig 8-11 = 6-7 vel
^{6-7 per diam.} intus minute granulosis; basidiis 30-35 = 8 ~~8~~



76 *Chitoybe obtata* (Fr.) Quélet. Champ. Vosg. p. 90 (1872)


Sau. Syst. V p. 177, *Agaricus obtatus* Fr. Epicr. p. 74 (1836)

Mon. Basia Champ. Alp. Marit. t. 62 p. 13-19, Frés. Icon. Hymen. t. 57 p. 1.

Litt. 94, 95, 983, 1663

Hab. in campestribus, imprimis sub Pinis: Nizzardo, ~~Alp. penninica~~
Area ^{det.} Europa, Japonia

(Trentino: presso Magras (Pres. M.S.), Karne (v. Höke)

(Det. Det. )

brumalis 180

Trodora; pileo caroso-membranaceo, ex umbilicato
impundibuliformi, glabro, flaccido, unicolori, sicco
albicante, variante lutescente, hygrophano, mar-
gine reflexo levi, 2,5 cm. lato;
lamellis latiusculis, decurrentibus, distinctis
pallidis; stipite firmulo, tenui, subcaavo, ae-
quali, subincurvo, glabro, albido, 2-6 cm longo
4 mm. vel ultra crasso; sporis subsphae-
roidis 3-3,5 μ diam. vel 4-5 = 3-4
basidiis 20-25 = 3-4.

69 *Chytomyce brumalis* (Fr) Guét. Champ. Votz. p. 91 (1872)

Jan. Hym. V p. 180, *Agaricus brumalis* Fr. Spor. p. 46 (1836)

Icon. Barla Champ. Alp. Marit. t. 63 p. 1-6, Guét. Champ. Fr. Hym. t. 529.

Dist. 94, 244, 95, 430 (*A. metachrous*), 886, 983, 693 ♂ (Det. Aut. Fr)

Hab. in strachis, imprimis aceris: Liguria, Piemonte, Emilia, Toscana, Corsica

Area Distr. Europa.

Trentino: Terzolas (Bres. Ms.), ♀

Quelctii 179

(Minor; odor farinae recentis); pileo subcarnoso
conocxo, umbilicato, fusco, neco albido,
squamis fuscis punctato, demum infun-
dituliformi 2,5 cm. lato,
lamellis longe decurrentibus, arcuatis,
substantibus albidis; stipite cavo,
aequali, flocculoso, albido 2,5 cm. longo,
5 mm. crasso; sporis 5 = 2 - ↗


68 *Chrysobothris Quéletii* (Fr.) Quét. Champ. Voy. p. 236 (1842)
Sav. Syst. V p. 179 *Agaricus Quéletii* Fr. Icon. Hymen. p. 56 f. 4 (1807)
Icon. Fries l.c. Quélet-Champ. Jura et Voy. I t. 23 p. 1.
~ (Hab. in silvatis collinis + Trentino. ^{dest. Aust} ♂
1 (Dist. 417, 418 → Valle Lagarina (Cobelli).
area sive. Galles, Italia.

concaua 178

Vix odora, obscure cinerea vel subfuliginea;
filiis submembranaceo, late et profunde umbilicato,
levi, flaccido, nudo, hygrophanis,
limbo convexo-plano undulato, 2-6 cm.
longo, sicco livido, vel argillaceo-cano;
lamellis recurventibus, confertis, angustis,
fuliginis, stipite farcto, unequali, glabro,
griseo, 2-6 cm. longo, 2-5 mm. crasso,
toto fibroso-molli; sporis ovoidis
chlorinis 8-12 = 6-8 vel 6-8 = 3,5-4

Spores. Sec. Boes. (Mj) 6 spore ^{mitisana} 6-8 =
3,5-4; basidii 20-25 = 4-5

87 *Clotrybe concava* (Scop.) Gill. Champ. Fr. p. 156 (1874)
Sav. Syst. V p. 178, Agaricus concavus Scop. Carn. II p. 449 (1772)
Icon. Fr. Icon. Hymen. t. 54 f. 2.

Abst. 90, 123, 245, 737, 886, 1031. 

Hab in horticis ^{et} campestribus: Liguria ^{et}, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Emilia, Trentino: Terzolas (Her. M.S.) Aest. Aut.

Area distr. Europa.

Cyatbiformis 176

Inodora →

Tulgo umbrino-nigrescens sed variat dilutior
fusco-cinerea; etiam ex incarnato alutacea,
dilute cinnamomea, e fuscescente argillacea vel
alutacea; pileo carnosissimo-membranaceo, e de-
presso infundibuliformi, levi, subglabro, ullo,
hygrophano (margine dum involuto levi, in
exoleto expanso vix striatulo), 4-8 cm.

lato, lamellis ex abnatis decurrentibus,
distantibus, postice junctis, sordidis, albidis,
fuscescentibus rufis; stipite farcto, elastico,
superum attenuato, fibrilloso-reticulato;

6-11 cm. longo; sporiis ellipticis 8-8.5:
4-5; lamellis clavatis 21-26 = 6-8; sterigmati-
formibus acicularibus 4 = 2 - ♀

~~Offic. Spore sec. Brit. no. 12 = 5~~

on. La sua grande variabilità ha portato alla
formazione di più ^{pseudo} species. Una forma

incarnato-alutacea a pileo rugginoso, lamelle e stipite rufi-
ci e indicato da Vogliano a Tempio in Sardegna e a
Mons-Cairon (n. 1253)

66 *Clitrybe cyathiformis* (Bull.) Quel. Champ. Vosg. p. 89 (1872)
Sav. Syst. V p. 176, *Agaricus cyathiformis* Bull. Champ. Fr. t. 575 f. M.
Non. Bull. P. C., Barla Champ. Alp. Mont. t. ~~5~~⁶² f. 6-10, Brigant. F. Neap.
t. 18 f. 3-6, Lenz. F. & Roma, t. 93 f. 3,
Nolt. 61, 94, 95, 209, 417, 418, 434, 585, 679, 653, 656, 662, 709, 866,
923, 983, 1236, 1245, 1250, 1253, 529. 1284, 693, 1423, 1920, 1656 →
Hab. in silvatis ^{et campeditibus} inter folia et muscos: Liguria, Piemonte, ^{Lombardia} Cant. Ticino, Veneto,
Trentino, Emilia, Toscana, Lazio, Neapolitanus, Sicilia, Sardinia, Corsica ♀
Area dist. Europa, Amer. bor.; Tunisia
Aust. Aust.

~~Nov. 1872~~
Var. *cinerescens* (Natsch) Karst. Syst. N. V. p. 177. *Agaricus cinerescens* Natsch. Sclerot. f. 101
Hab. in silvatis: Trentino

1255 fm.

pruinosa 178


~~Clit. Serotina~~ Serotina; tenuis rigidula; inodora;
pileo carnosso-membranaceo ex umbilicato
infundibuliformi, leviusculo, hygrophano,
pruina plumbea consperso, brunneo,
cinerecente, interdum squamuloso, 2-5
un. lato; lamellis ex adnatis decurrentibus,
subarcuatis, confertis, angustis, ex albo
sordidis; stipite farcto, subadscendente, fi-
brilloso, pallido, basi solidiore, incrassa-
to, flocculoso, 2-5 un. longo, 2-4 mm.
crasso.

Spec. Simile a Clit. cyathiformis
ma forse è più vicina alle
Hygrophanae.

65 Clitocybe pruinosa ^{Leach} (~~Fr.~~) Quél. Champ. Vosg. p. 236 (1872) (non Viv. (Mycena))

Sau. hyp. t. p. 178, Agaricus pruinosus Leach in Fr. Epicor. p. 75 (1836)

Icon. Fr. Icon Hymen. t. 54 f. 3, ~~Viviani F. Acta. p. 74~~, Cooke
M. Pr. F. + 231.

Bibl. 430 (A. cyathiformis Berk.?), 886, 836, 1232 

Hab in silvaticis, praecipue pinetis: Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia
~~Autumno~~

Area disti. Europe, Australia.

~~Le sp. Viv. non in Italia D. Fr. ... ff. Da verificare~~

suaveolens 179

Fragrans odore aniseo; ~~Clitraghis fragrantis~~ ~~prostrata~~
albida, siccā omnino alba; pileo subcarnoso
e convexo-umbilicato depresso, subinfundibuliformi;
glabro, discoides, hygrophano; ~~in~~
margine striatulo, demum reflexo;
lamellis decurrentibus, confertis, albis, de-
coloribus, demum sordidis; stipite subfarto
elastico, subrufescente, basi micranato,
4 cm. longo, 6 mm. vel ultra crasso;
sporis 6-8 = 3-4. — ↗

Ussero. L'odore è di Clit. fragrans ^{ed odora} _{ma è}
più carnosa della prima, più depresso e
col disco più oscuro.

Spore secondo Bresadore ms. 5-6 = 2,5-3
basidi 20 = 4-5; secondo Cobelli
Spore 4 = 3.

64. *Obryza nareolens* (Schum.) Guét. Champ. Vég. p. 90 (1872)
Sau. Jyfl V p. 119, *Agrostis nareolens* Schum. ^{(St. Gall. II p. 233 (1803) et}
non. Schum. l.c., *Bark Champ. alp. Mont. t. 62, 20-24.*

Trüb. 90, 94, 95, 983, 417, 418, 585, 866, 1133, 1920, 1663.

Herb. in muscosis silvaticis: Liguria, Trentino, Emilia, Toscana, Corsica,
area dist. Europa, Libania.

: Arago, Inzenga (Her. Nid.) Uarna
(V. Höhn.)

calathus 178

Gravedonensis


~~Odoe fardus~~; pileo subcarnoso, e plano infundibuliformi, levi, glabro, hygrophanis, margine mox patente levi; lamellis demum longe decurrentibus, subconfertis, flexuosis e violaceo rubellis; stipite solido, tenaci, striato-rugoso, deorsum attenuato, e violaceo rubello; sporis 6-7 = 4; basidiis 20-30 = 6-7

Odoe Statura di A. cyathiformis

(A. fardus Schaum. dalla descrizione sembra appartenere a questa specie) ma per natura e colore sembra Erich. sordidum.

D. Cyathiformes.

89 *Clitocybe calathus* (Fr.) Sau. Syph. Jung. V p. 178 (1887), *Agaricus calathus* Fr. Epicr. p. 75 (1836)

Icon. Sarber Fung. t. 11 p. 13 (Ag. nudus), Bresch. Cent. IV t. 12 p. 1
Ms. Bresch. Ms. 

Hab. in nemorosis — Trentino: boschetto di Valle Salvoth (Bres. Ms.)
Area dist. Europe, Amer. bor.

act. Anton

inversa 172

Minor, haud elastica vel flaccida; calat forma
primivul gibba rarior, alia umbone destituta frequen-
tior ~~et feriori formis~~; forma primaria regularis,
solitaria, stipite sursum attenuato, concolore, frequentior
subcaespitosa, stipitibus curvatis, compressis, pileo obtusis-
simo, inequali, subrepando; odor acidulus.


Pileo ^{testaceo} carnoso, fragili, e convexo infundibuliformi, glabro,
~~rufescente~~ ~~marginem involuto, tenui~~ dein alutaceo,
6, circ. lato, margine involuto, tenui; lamellis
decurrentibus, simplicibus, pallidis, dein rufescentibus;
stipite e spongioso farcto cavo, rigido,
glabro, carne pallida; sporis 3-5 ~~= 3, 5-4~~
diam. basidij 23-28 = 7-8 vel 20-25 = 5-6

~~Offens. Conisporis a Clit. infundibuliformis~~
~~Schaeff., sed da Clit. Zizyphina~~
Sembra una forma grassa di questa specie,
invece da Clit. givra differisce affatto
per l'indole.

62. *Chitrybe inversa* (Sop.) Quel. Champ. Vog. p. 235 (1872)

Jau. h. h. V p. 172, *Agaricus inversus* Sop. Carn. II p. 445 (1772)

Leon. Bark. Champ. alp. Merit. t. 60 f. 68, Lamy. F. d. Roma. t. 95 f. 3, Viviani
F. d. Italia, t. 5 (*A. infundibuliformis*)

Noll. 96, 95, 266, 12, 434, 653, 656, 704, 731, 836 (*A. infundibuliformis*), 866, 983
1031, 1292. 

Hab. in herbatis, imprimis comperis; Liguria, Piem. Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia,
Toscana, Lazio, Neapolitano

T: pr. Firenze (Martelli u. Bres. MS),

Area distr. Europe, Australia

det. Clut. Sp

Sp. in Ventur. Mic. Br. ¹⁸¹⁹ e quatuor repudat.

Dermicularius 174

Serotina, uida, subfragilis, ~~pileo~~
pileo carnosulo, ex umbilicato reflexo,
infundibuliformi, repando, levi, glabro,
udo, exspatiente e fuligine rubro
carneore alutaceo (sere hygrophanus)
saepissime undulato-lobato;
lamellis recurventibus, confertissimis,
seriatis, albis; stipite cavo, mox
compressa, glabro, intido, albo;
sporis subovatis $5 = 3$; basidis
clavatis $20 - 25 = 4$.

~~Oper.~~ Certis differebat da Cl. diatreta.

61 Chlorocybe vermicularis (Fr.) Grev. Champ. Votz. p. 235 (1872)


Sacr. Lym. V p. 174. Agaricus vermicularis Fr. Epicr. p. 72 (1836)

Zon. Baile Champ. Alp. Marit. t. 60 p. 13-18, Prusadola T. Tr. 2. t. 49
Bernard, Rochelle t. 16 p. 5.

Bull. 94, 95, 983, 234.

Hab. in silvaticis, imprimis acrotis, montosis: Liguria, Trentino: bosco di Targolay
(Bres. M.S.)

Area distri. Lucina, Gallia, Vicia, Helvetia +


Aest. Aut.

Flaccida 172

Saepe caespitosa, imo comata - ramosa (stipite luno, ut
inter folia solet, incurvo, basi attenuata repente), sed etiam
solitaria, regularis; pileo subcarinato, tenui, flacido, ex
umbilicato infundibuliformi, levi, flavo-ferrugineo, rufescente,
expallente, vetusto fragili, 5-8 cm. lato, margine late reflexo;
lamellis decurrentibus, confertis, arcuatis, lutescentibus, nunc totis
nunc ante tantum flavescentibus, non rufescentibus; stipite farcto,
inaequali, subflexuoso, basi villosa, 2-6 cm. longo, 4-5 mm.
crasso; sporis subsphaeroideis 4, 5-5 μ diam. vel 4.5 = 3-4
E

Observ: Spore secundo ^{(Bresadola (Ms.))} ~~bas.~~ 5-7 = 3-4, generalmente 5 x 3
basidii 20-25 = 5-6 oppure 28-32 = 7-8

60 *Clitocybe flaccida* (Low.) Quélet. Champ. Vosg. p. 361 (1873)
Jard. Sylv. V p. 172. *Agaricus flaccidus* Low. Col. fig. t. 185 (1799)
Icon. Low. l. c., Barla Champ. Alp. Marit. t. 60 f. 9-12, Lange F. d. Rom.
t. 95 f. 2, Cooke M. Br. F. t. 84 et 123. (1965, 1920)

B.H. 39, 61, 90, 94, 95, 209, 430, 434, 585, 653, 656, 886, 983, 1133, 1244

Hab. inter folia in hinc pratis: Ligura, Piemonte, ^{Lombardia} Veneto, Emilia, Toscana, ^(Siam)
Lazio, Neapolitano. Aust. Aust. + Trentino: Sopracoste, S. Anna, S. Biagio V. d. Sole

Are. rest. Europa, Libia, Tunisia, Australia (Pres. M.S.)


Ex. Lib. with. ital. II n. 35

~~Aust. Aust.~~

cacabus 174

Pileo subcarinoso, flaccido, infundibuliformi, obtuso,
glabro, margine late reflexo; lamellis longis-
sime securentibus, confertissimis, angustis, obscu-
re cinereis, stipite e farcto cavo, serati, e-
lastico, striato, basi incrassato villoso,

Offens. Aspetto ed odore quasi di Cl. infundi-
buliformis ed, eccettuato il colore diverso,
è poco distinta da questa.


59 *Clitocybe cacabus* (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 141 (1874)
Sacc. Sylt. Jung. V p. 174, *Agaricus cacabus* Fr. Epicr. p. 72 (1836)
Icon. (nulla) → Bibl. Bresad. Ms. 
> Hab. in silvis acerosis - Trentino: Tergolas (Bres. Ms.) Aust. Aut.
Area dist. Europe.

Geotropa 171

Forma, glabra, color mutabilis, var. maxima

pileo carnoso, e convexo plano-infundibuliformi, obtuse umbonato, compacto, leri, glabro, passim evanido-guttato, 11 cm. lato; lamellis decurrentibus, confertis, simplicibus, altis, seminum pileo concoloribus; stipite solido, compacto, fibrilloso, sursum attenuato, carne alba, 16 cm. long., 2 cm. crasso; sporis sphaeroideo-ellipsoideis 6-7 = 4-5

Usserò: Corrisponde a Clit. maxima, ma è più robusta, glabra e di color più mutabile. Da Clit. gilva e Clit. subinvoluta si distingue bene pel pileo più tenue, le lamelle meno strettamente appressate. — Calera ha lo stipite più corto. Quanto alle spore, Bresadola (M.) dà: Spore 5,5 - 6,5 = 5-6. basidii 35-50 = 6-7

58 Chitoybe gestrope (Ball.) Quét. Champ. Voy. p 89 (1872)
Jac. Suppl. V p. 171, Agaricus gestropus Bull. Champ. Fr. t. 573/2 (1791)
Icon. Bull. l.c., Barle Champ. Alp. Marit. t. 59, Presadola F-
manq. t. 39, Lang. F. 1 Roma t 96/3.
Bull. 94, 95, 123, 242, 244, 417, 418, 653, 656, 704, 836, 866, 983,
1133, 1253, 1258, 1920, 1965, 1514 
Hab. in silvis frondosis et aereis: Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia, Tole-
na, Lazio, Sardegna, Corsica. Aust. Aust. N.
Area dist. Europe, Tunisia : Goccardo, Soprano (Pr. M.)

var. subinvoluta (Natsch) Jac. Suppl. Fung. V p. 170 (1887), Agaricus subinvolutus
Natsch. Eleph. Cort II p. 57 t. 37/204 (1789)
Icon. Natsch l.c.
Hab. in gramineis apricis - Trentino: monte Brione pr. Riva (L. G. Baruffaldi in Pres. M.)

Clitocybe Fr. M. I p. 70 ⁽¹⁸²¹⁾ Hymen. p. 78

I

(Hym. clitos declivis et cybe pileus.)

P Velum universale pruinæ, rarisve inter sericis in pileo erropicium, vulgo obsoletum. S Lipes spongioso-facetus, facile cavus, subelasticus, extus compactior, fibrosus. Pilei margo involutus. Hymenophorum ex apice stipitibus dilatato proorsus contra quum; lamellis porrace attenuatis, acutis, adnatis, decurrentibusve, nunquam sinuatis. Fungi terrestres, lentius carnosus, ut plurimum plano-depressi vel in funis bulbiformes.

Obs. Tipo distinto ^{da Collybia} ~~degli altri~~; dai seguenti per rudimento del velo e per ~~il~~ il gambo non cartilagineo, da Enicholoma per la struttura più elastica ^{del gambo} ~~la sottile~~ e le lamelle non sinuate. ^{per} Viamo però delle ^{specie che formano} ~~partaggi~~ a quel'ultimo ^{generale} ma più o meno decurrenti.

Cerussata 154

(Alba, sapor inanis, odor vix ullus); pileo carnoso
conveco-plano, obtuso, levi, udo, glabrato, gibbo
non umbonato, nec reflexente, 6-8 un. lato,
lamellis adnatis, confertissimis, tenuibus, divi
decurrentibus, immutatis (haud hirsutibus);
stipite spongioso, solido, tenaci, elastico, udo
deorsum subincrassato, saepeque tomentoso, 6-8
un. longo; sporis subsphaericis 3 je diam.
vel 4-3 →

~~Schum. & Grev. Champ. Fr. p. 151. - Schum.
Symb. fung. p. 155. - Agar. affinis
Schum. & Grev. Fung. II p. 295 (1803)~~

Var. difformis caespitosa, saepe gigantea, pileo
undulato-lobato primo floccis adperso 5-10 un.
lato in eodem caespite; lamellis demum pallidis,
stipite curvo, longitudinaliter rugoso, 2.5 cm.
crasso et longo; sporis subsphaericis-ovatis
4-5 = 3-4; basidiis clavatis 20-5-7

~~Ved. ...~~

→ 7 con. Lang. F. d. Roma, t. 97 p. 2., Vignoni ^{l.c.} N. G. G. G.
Ital. 1884, t. 7 p. 16

A. Disciformes

1 Clitocybe cerussata (Fr.) Quet. Champ. Vosg. p. 86 (1872)

Sau. Syst. V p. 156, Agaricus cerussatus Fr. S. M. I p. 92 (1821)

Ycon. Barb. Champ. Alp. Marit. t. 51 f. 24-28, Gill. Champ. Fr. Hymen. t. 108.

Bibl. 61, 94, 95, 397, 398, 418, 653, 866, 923, 983, 1257. (693, 1965 ♂) Tengstr. (Pres. Ms.),

Hab. in silvis, imprimis aereis: Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia, Lazio, Toscana, Corsica. Aust. Aust. ≠

Area dist. Europa, ^{Tunisia} Australia,

(Schum.) Gill. Champ. Fr. p. 151 (1874) Sau. Syst. V p. 156 (at fr.)

var. difformis Vogelia in N. J. Bot. et 1887 p. 225 t. 7 f. 16 (n. 1237) ♀

Hab. in castaneis: Toscana: pro Massa, ^(Vogelia) Trentino: Trento (Pres. Ms.)

Toscana Lago (Lery.)

Area dist. Europa

♀ Agaricus difformis Schum. Fl. Saal. II p. 325 (1863)

unclear scribbles

Gallinacea 158

Pusilla, alba, acris; pileo carnosulo, e convexo depresso,
 levi, sicco, opaco, haud revoluta, planiusculo, semper obtu-
 sistimo ~~est~~, 2,5 cm. latus; lamellis subdecurrentibus, con-
 fertis, tenuibus, stipite solido, aequali, tenui, levi, 5 cm. longo,
 interdum subtiliter flocculoso-ferrugineo; sporis 4-6 = 4.

2 *Cladonia gallinacea* (Serp.) Gill. Champ. Fr. p. 150 (1874)
Sacc. Sylt. V p. 158, *Agaricus gallinaceus* Serp. Carn. # p. 433 (1772)
Zoon. Cooke M. Pr. Juny. t. 174

Bibl. 866

Hab. in humoribus, muscosis: Emilia (Pasteris). Aest. Aut.

Aree distri: Europa. / prov. d. Parma

Cryptarium 21-37

Dense caespitosa, 8 cm. alta; pileo conico, adpresse
floccos, fulvo, brunneo-punctato, 6 cm. lato et
2 cm. crasso; lamellis decurrentibus, angustis,
arcuatis albis; stipite albo, strabulo, virgato,
sursum tenuato, plus minus compresso, anguste
fistuloso; carne insipida, inodora (foetens sec.
Zynga)

22 *Clitocybe cryptarum* (Lebell.) ^{Massée Br. Fungus - Flor II (1893) p. 422, Sacc. Syl. f. XXI n. 37} Niel in Bull. Soc. Myc. Nat. Rome, 1896 (1826)
p. 4, t. 1 extra. *Agaricus cryptarum* Lebell ^{Fig.} Champ ⁽¹⁸²⁹⁾ p. 611 et Hist. Champ. p. 92 f. 88

Icon. Let. l. c., Niel l. c.

Bibl. 839.

Hab. in ^{caistate} ~~interiore~~ putrescente trunci *Enythinae* varum, in Horto bot. Palermo
Siciliae. Aest. Aut.

area distri Galliae, Nabe

Subalutacea 152

Odor debilis, aniseus vel obsolete; lutescente-fallescens;
pileo carnoso, molli, convexo-plano depresso-ve
obtus, inequali, glabro, 2,5 - 6 cm. lato, espal-
lente; lamellis adnato-decurrentibus, latis, subsi-
stantibus, albidioribus; stipite farcto, firmo, ela-
stico, nudo, 2,5 cm. vel ultra longo, 4-7 mm.
crasso; sporis 6-8 = 4 ↗

21 *Clitocybe subalutacea* (^{Fr.} ~~Batsch~~) Gillet, Champ. Fr. p. 157 (1874)
Sacc. Agaricus subalutaceus, ~~Fr.~~ ^{Fr.} S. M. F. 90 (1821), non Batsch
Sacc. Agaricus ~~Fr.~~ ^{Fr.} S. M. F. 90 (1821), non Batsch
~~non Batsch l.c. Barla Champ. Alp. Mont. t. 50 p. 10-15, Langr~~
F. A. Roma, t. 98 p. 3, Sacc. Spec. Myc. Ven. t. 4 p. 7-11 (var lateritio-rubig)
Pill. 94, 95, 983, 209, 653, 656, 1723
Hab in nemoribus: Liguria, Veneto, Lago, Sardegna ~~Fr.~~ Ard. Aut. ~~Fr.~~
Area distr. Europa

exempl. Sacc. l.c.

tuberaster 151

Odor gratus, caro candida, non succulenta,
sapidissima; filis carnosis, flavescens,
centro e depresso infundibuliformi 9-10 cm.
lato; lamellis albis, inequalibus, subsecur-
rentibus basi venis connatis; stipite brevi
incurvo, crasso, basi reflexo. — ↗

20 *Chitoclype* *Tuberaster* (Brig. jun. in Comas) Lac. Syst. V p. 151, Agan-
us *Tuberaster* Brig. jun. in Comas F. Neapol. p. 113, + 14 p. 6 (1878)

Icon. Brig. in Comas p. c.

Britt. 434, 435, 437.

Hab. in matrice Polypon Tuberaster in agn Neapolitane ^{varius} $\frac{P}{T}$ best Ant.
Area disti Italia merid.

Veneris 150

odor spermaticus, sapor fatuus

Species pulchra: fileo carnosos, mox explanatis,
githo, teri, glabro, luteo, disco obscuriore, & can-
lato; lamellis adnatis, dein subsecurrentibus
confertis, angustis, candidis; stipite solidis, firmis
aequali, glabro, elastico, albo, 6 cm. longo, 2 cm. crasso;
Spores 7-8 = 4-5 ->

12 *Clitocybe Veneris* (Fr.) Sau. *Lyc. V* p. 150 (1887), *Agaricus Veneris*
Fr. *Hymen. Eur.* p. 84 (1874), *Ag. Clitocybe insignis* Gill. *Champ. France*
p. 103 t. 114 (1874)

Icon. Gillet p. c.

B.H. 417

Hab. in silvis imprimis acerosis - Trentino: Valle Lagarina (Cobello). Aust. Aust.
Aree dist. Gallia, Italia

Oodora 153

→ vel sordide aeruginea

Sordide virens, tenuis, fragrans odore suavi aniseo et pileo carnosso, planiusculo, levi, subrepando, glabro; s. cm. lato; lamellis adnatis, haud confertis, latis, pallidioribus, nunc concoloribus, nunc albidis; stipite parvo, elastico, inaequali, glabro, basi incrassato, 6 cm. longo, 8-9 mm. crasso, inferne usque h. cm. metiente; sporis sphaeroideis-ellipsoideis

(6-8 raro 9) = 3,5-5

Asp. 28-30 = 7-9-11

Offens. Facillime si distingue per l'odore, il colore e le lamelle


18 *Clitocybe odor* (Bull.) Quel. Champ. Vogl. p. 86 (1892)

Sau. Lyp. V p. 153, *Agaricus odoratus* Bull. Champ. Fr. t. 556 f. 3 (1791)

Ann. Bull. l. c., Barla Champ. Alp. Marit. t. ~~51~~ 51 f. 10-15, Lamour. F. D.

Roma t. 98 f. 2, Rolland Att. Champ. t. 26 f. 50 Voglino in Att. Acad. Torino.

1896 t. 1 f. 6 (herat), ibid. 1895 t. 1 (fruct.), Att. Champ. Fr. t. 113.

Bot. 23, 90, 94, 95, 244, 417, 418, 430, 518, 585, 653, 656, 737, 866, 983,
1015, 1031, 1244, 1253, 1257, 1033, 1266, 631, 693, 1301 

Hab. in herbaticis, ericetis, pinetis. Liguria, Piemonte, Veneto, Trentino,
Emilia, Toscana, Lago, Sardegna, Corsica. Aust. Aust. ♀

Area distr. Europa Amer. bor.

Valle Leponina (Lob.) Tenzolas, Grucindoro
Varenna (Mast.) (Brog. Mst.)

St. Rimata del Quilal a *Cl. virens* fore non a torto

Var. subappennina Voglino in Bull. Soc. bot. it. 1896, p. 121

Bull. 1259

Pileo carneo planiusculo, toto viridi; 10 cm. lat.; lamellis adnatis a luteo pallide
caerulescentibus; sporis oblongatis, 10-6 vix aculeatis, viridibus sterilibus, cretaceis
4-sterigmatis 25-30-8; stipe glabro basi micropilato, 8-10 cm. long., 1 cm. cr.

Hab. in silvis - Liguria. par. Ronco (Voglino). Pel colore e per la grandezza un po' maggiore delle
spore e basidi si distingue dal tipo.

Va. 983 aff. 1259

Sec. Quel. & att. = *virens*

Conf. a Du. ff. & Barla per natura e odore = *indisputabile* = *virens*

Urens 152

Pileo carnosso, convexo-capanas, obtuso, glabro, viridi; lamellis 6-8 cm. lato; lamellis anisatis decurrentibus, confertis, tenuibus, candidis; stipite solido, aequali, glabro, candido, 6-8 cm. longo, 4-7 mm. crasso.

Urens

Pileo è più regolare e ^{meno} fessace di Clit.
odora } ~~assai simile?~~
, di cui ha lo stesso odore anisato.

17 Clitomyces virens (Lep.) Juss. lym. v p. 152

Clitomyces viridis (^{Hyd.} ~~Bull.~~) Gill. Champ. Fr. p. 158 (1874) ^{Hyd. Fr. Angl. II p. 614 (1778)}

Agaricus virens Lep. Carn. II p. 437 (1772), Ag. viridis ~~Wulfen~~ ~~et al.~~

Icon. Barla Champ. Alp. Mont. t. 51 f. 1-9, Bull. Champ. Fr. t. 176 / Agar.

odor)

Diff. 94, 95, 983, 209.

Hab. in hirs: ^{Nizoradio} Liguria, Veneto. Belluno pro gl. abn (Spagazzini). Ant. Ant.

Area dist. Europe.

viridis o virens? virens et odor

nimbata 144

(Odor farinae rancidus: caro sub cuticula grisea): pulco car-
noso, campanulato-convexo, obtuso, levi, glabro, margine tenui (haud
excedente), inflexo, albo-pruinoso; lamellis subdecurrentibus, con-
fertis, arcuatis, albis, stipite solido, firmo, unato-squamuloso,
squammis demum nigrescentibus, basi subincrassato, albo;
Sporis 6-8 = 3-4 - ↗

Ospero: ~~tra le specie di questo gruppo occupa una posizione~~
~~media tra le specie di questo gruppo più robuste e quella~~
~~più tenui. Di Cl. A. lusitana è maggiore, e più robusta~~
^{del gruppo}

Spora secondo Bresadola (mf) $d-5 = 3-3\frac{1}{4}$; basi-
dici $2.5-3.0 = 6-7$

16 *Clitocybe nimbata* (Batsch) Quel. Champ. Verg. p. 235 (1872) (1786)
Sau. Syst. V p. 164, *Agaricus nimbatus* Batsch, *Element. Bot. I* p. 49 t. 65 & 64
(v. alba: *Ag. nivosus*), Fries, *Icon. Hymen.* t. 48 f. 4.

Icon. Batsch C. c., Fr. l. c.

Noll. 244, 484

Hab. in ^{campestribus} graminosis: Toscana, Neapolitan, Trentino: Campo (Pres. Ms.) Aest. Aut.
Area dist.: Campo.


Gangraenosa 143

Coelus, major, carne nigrescente nigro-variegata,
filiis carnosus, convexo-plano, obtuso, primis albo-fulvoren-
lento, dein nudo, variegato, nigro-albido, hinc inde
virescente, livificante etc; lamellis subsecurrentibus, arcuatis,
confertis, albo-sordidis; stipite solido, spongioso, sub-
bulboso, molli, strato, curvato, internum excentrico.

— ↑

15 *Clitocybe gangraenosa* (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 153 (1874)
Sacc. Myc. V p. 143, *Agaricus gangraenosus* Fr. Epicr. p. 56 (1856)
Yen. Bettarra, F. Arsm. t. 20 f. M (*Monomyces pulvisnetus*), Britz.
Hymenom. t. 63 f. 433-435.

Detl. 103.




Smiki:

Hab in hibernia - ^{Art. Ant} ~~Rivinus~~ ~~Saccia~~ (Bettarra)

Area dist Europe.

dothiophora 146

Pusilla, nisi copiose lecta, pro forma monstruosa
habetur; pileo carnosulo, tuberculo mammaeformi
elato gibbato, glabro, canescente, obliquo, 2 cm. lato;
lamellis decurrentibus, confertis, albidis; stipite solido,
curto, excentrico, glabro, deorsum attenuato, 13 mm.
vel parum ultra longo, basi 2, apice 4 mm. crasso

4 *Clitocybe dothiophora* (Fr.) Karst. Hattsv. F. G. (1879)
Sav. Syst. V p. 146, *Agaricus dothiophorus* Fr. Monog. I p. 102 (1857)
Icon. Bata, Champ. Alp. Marit. t. 49 p. 12-15, Fr. Icon. Hym. t. 48 p. 2.
Pict. 95. 

Hab. in praeensis strabus - Nizzardo (Bata) ~~alp. praeensis~~.
Area distr. Europa

curtipes 145


Gilec carnosulo, convexo-plano, obtuso, obliquo,
glabrato, e fusco expallente, livido, immo
albicante et maculato, sed non hygrophanus,
lamellis adnatis, confertissimis, candidis;
stipite solido, brevi, rigido, inaequali,
~~fusco~~ normaliter eady intusque fusco,
sed etiam ^{ut pileus} e fusco expallente, livido, immo
albicante et maculato, sed non hygrophanus,
sursum incrassato, subfornicato.

13 *Chlorocbe curtipes* (Fr.) Gill. Champ. Vosg. p. 154 (1876)

Scu. lylh V p. 145 *Agaricus curtipes* Fr. S. M. I p. 88 (1821)

Ann. Barla Champ. Alp. marit. t. 49 p. 9-11, Fr. Non Hymen. t. 68 p. 5.

Bill. 95 (et 983?)



Hab. in gramineis: Alp. maritima: Nizzardo (Barla) arb. aut.

Area dist. Europa, Australia.

inornata 144

Fruticula, lobata sublivida, caro grisea, vel griseo-variegata, odor fere *Ag. campestris*, pileo carnosissimo, plano depresso, obtuso, levi, glabro, pellicula seceruibili, ~~da~~ 8 cm. lato; lamellis adnatis planis, demum decurrentibus, confertis, griseis; stipite solido, subaequali, glabro, firmo, griseo; 5 cm. longo, 12 mm. crasso; sporis ovideis ~~separatis~~. $8-10 = 3-3,5$; basidiis


$25-30 = 4-5$ vel $30-40 = 6-8$.

~~Fruticula~~

12 *Clitocybe inornata* (Sow.) Gill. Champ. Fr., p. 155 (1846).



Sau. Syst. V p. 144., *Agaricus inornatus* Sow. Col. fig. t. 342 (1802)


Tron. Sow. l. c., Bata Champ. Alp. Marit. t. 49 f. t. 6., Bres. Trid. t. 155.

Michx. 94, 95, 236, 283, 284. 

Sopramonte S. Anna,

Aest. Aust.



Hab in silvaticis ^{muscorum} Liguria, Veneto, Trentino:  S. Maria sub Abietibus (Pres. M.S.) 

Dree disti. Britannia, Gallic, Italia. 

polio 143

Caespitosa, minor; filis carnoso, convexo-plano, regulari,
glabro, griseo, non hygrophano; lamellis aequaliter
decurrentibus, confertissimis, albis; stipite solido,
aequali, glabro, albo; sporis 6-8 = 3-4

Offens. Si confonde communement avec Clit. fumosa
(var. d. cinerescens)
mais se distingue spécialement par la substance
carnosa, et non subcartilaginea, par la forme
régulière, par le color cinere sbladito, non
hygrofano.

11 *Clitocybe polia* (Fr.) Karst., Hattsv. I p. 58 (1879)
Sacc. Syll. V p. 143, *Agaricus polius* Fr. Epicr. p. 57 (1836)
^{Norda} Trin. Champ. Alp. Marit t. 48 p. 10-12, Fr. Tra. Hymen. t. 48 f. 1.
Bolt. 94, 95, 983.  Nizzardo (Barle). Herb. Ant. +
Herb. no blue frondosus  Alpe Maritime

lavipes 143

(Caro alba, odor. mitis, gratus; pileo carnoso,
mollis, convexo-applanato, ^{demum obconico} nudo, fusco- cinereo
albicante praecipue circa marginem, ~~demum~~
~~obconico~~, 4 cm. lato; lamellis decurrentibus,
descendentibus, subdistantibus, albis;
stipite parvo, spongioso-mollis, elastico,
subfibrilloso, 4-6 cm. longo, basi 1-1,5
cm. crasso, apice 6 mm.; sporis sphaeroidi-
deo-ellipsoideis 5-7 = 3-4 - ~~4~~

10 *Chitoybe clavipes* (Pers.) Quél. Champ. Vosg. p. 85 (1872)
Jou. Myc. V p. 143, *Agaricus clavipes* Pers. Syn. p. 353 (1801)
Fon. Fr. Fon. Hymen. t. 47, f. 1, Cooke M. Br. F. t. 80, Gillet
Champ. Fr. Hymen. t. 117

Dith. 12, 1032. ♂ : Ortisei, Val di Sole (Pres. M.I.) ⊙

Hab. in libanaj + Trentino, Veneto ♀

Area dist. Europa, Amer. bor. | aest. aut.



nebularis 142

Magna, valida, odor debilis | pileo carnoso,
compacto, convexo-explanato, obtuso, levi,
primitif nebula grisea consperso, sem nudo,
cinereo, pallente immo ut caro albo,
5-14 cm. lato; lamellis subcavrentibus,
arcuatis, confertis, albo-pallentescentibus;
Stipite farcto, firmo, spongioso-elastico,
fibrilloso-striato; 8 cm. vel ultra
longo, basi 1-2,5 cm. crasso,
Sporis ellipsoideis 4-5 = 2,5-3 -

Asper. Facile a scambianti per
un Trich. humile per le lamelle
spuriamente decurrenti (max^{parte} e piu
tenue e piu fragile); non poi con
Clitocybe geotropa se si tien conto
delle note specialia.

Spori, secondo Bresadola Sp., 6-7 = 3

9 *Clitrybe nebularis* (Batsch) Quét. Champ. Voy. P. 85 (1872)
 Sav. Syst. V p. 142, *Agaricus nebularis* Batsch Elench. Cort. II p. ²⁵ fig 193 (1789)
 Non. Batsch P. c., Basle Champ. Alp. Marit. t. 48 / 1-9, Bresidola
 F. mang. t. 33, Viviani F. d' Italia, t. 33, Lang. F. di Roma. 99 / 1.
 Biff. 39, 90, 94, ⁹⁵, ¹⁰¹, 207, 242, 244, 430, 585, 653, 656, 983, 1015, 1232,
 1244, 528, 529, 671, 693, 1663
 Hab. in hibernis: Liguria, Piemonte, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana,
 Lazio, Corsica. Berk. Ant. II : Fejzday (Bres. MS), Varna
area disti. Europa, Amer. bor., Amer. merid. (V. Höhn)



hircincola 145

Tenax, arida, e griseo albescens sed non hygrophanax,
carne alba; pileo carnosulo, convexo, plano, levi, glabro,
sericello-nitente, disco demum depresso, margine involuto
hemissimo, 6-11 mm. lato optime vigente quasi viscidulo, pel-
licula quasi e flocculis conglutinatis; lamellis subdecurrentibus,
confertis canescentibus; stipite farcto, tenaci, gracili,
subflexuoso, apice albr-pulverulento, 2-6 cm. longo, subfili-
formi; sporiis sordidis $5 \times 3 = 5 = 3$. - \rightarrow

Offens. loc. Bresad. (Dny); Spore 5,5 - 6,5 = 4,5 - 5,5

Basidia 25-28 = 7-8

8 *Clitocybe hirneola* (Fr.) Quel. Champ. Vosg. p. 85 (1872)

Jour. Myc. V p. 145, *Agaricus hirneolus* Fr. I p. 269 (1821)

Jour. Fr. Jour. Hyman. t. 48 f. 3, Quel. l.c. 4. III f. 2.

Bibl. 61, 434, 866, 983.

Hab. in muris, ad vias: Liguria, Emilia, Neapolitano. Aust. Aust. Fr.
Aree ^{inst.} Europe, Trentino: Terzolas, boscu sopra Malè (Bres. MS.)

Exs. Erb. vith. it. II n. 36

tornata 156

Parva, eximia regularis, inodora, alba; fides car-
noso, tenui, orbiculari, plano, subdepresso,
glabro, nitido; disco partim obscuriore, 2,5 cm.
vel ultra lato; lamellis decurrenti-adsatis,
subconfertis, planis; stipite farcto, aequali,
glabro, striatulo, tenui, firmo, basi pu-
rescente; Sporij 5-6 = 3-4

7 *Clitocybe fornata* (Fr.) Quel. Champ. Vosg. p. 86 (1872)
Lan. Syst. V p. 156, *agaricus fornatus* Fr. S. M. I p. 91 (1821)
Non. Barla Champ. Alp. Marit. t. 52 p. 11-15, Fr. Icon. Hym. t. 51 p. 1.
Bot. 94, 95, 418, 886, 983.

Hab. us. hinc: ^{Nizza} Liguria, Trentino, Emilia. Aest. Aust. +
Aree disti. Europa.

On Sec. Quel. Ft. Mycol. p. 246 non è distinta da *C. cerussata*.
Fragi. e Lacc. e Aust. F. Ital. ab. lectae? = *C. subulata*

Scabata 157

Tarva, mitis, alba; pileo carnosulo, & convexo
plano revolutoque, nunc orbiculari, ~~nunc~~ nunc
refo valde repando, levi, glabro, subrisente,
2 cm. vel ultra lato; lamellis adnatis
confertis, tenuibus, albis; stipite farcto,
toto fibroso, tenui, aequali, apice subseruinato,
2,5 cm. longo, 4 mm. crasso; sporis ellipso-
ideis $4 = 2 \text{ } \textcircled{\text{O}} \text{ } \textcircled{\text{O}}$ v. $5-6 = 3$ (Pres. ms.)

Osserv. Distribuzione da Clit. candidans
per ragione dello stipite.)

~~Riguardo alle spore Presabde (ms.)
de le seguenti dimensioni $5-6 = 3$~~

Presenta anche una varietà (var. minor
Sacc. Syll. Fung. V pp. 157) in Italia
boreale e Inghilterra

(colle spore ovate $5-7 = 2-3$; basidia
 $16-18 = 4-5$; sterigini $2 = 1$)

6 *Chlorocbe dealbata* (Sow.) G. B. Champ. Fr. p. 152 (1872)

Sacc. *lyll.* t. p. 154, *Agaricus dealbatus* Sow. Col. fig. t. 123 (1899)

Tron. Sow. l. c., *Nark Champ. Alp. Marit.* t. 512 p. 21-28,

Bibl. 245, 12, 639, 985, 95, 923, 1236, 244. 1605

Hab. in graminosis + Liguria, Piemonte, Veneto, Trentino, Toscana. *Ant. Ant. Sp.*

Area dist. Europa, Amer. bor., Tunisia.

: Arnejo (Pres. MS.) Karna
Serramonte (V. Boiss.)
arce (Dietrich)

Ext. Mex. *Stat. n.* 802.

Candicans 157

Parva, tenax, uida alba, sicca candicans;
pileo carnosulo, e convexo plano, depressove, levi,
e rore sericeo tenui candicante, nitente, 2,5 cm.
lato; lamellis adnatis, confertis, tenuibus, dein
decurrentibus; stipite subsistuloso, levi, ceraceo, ni-
tido, 2-5 cm. longo, 2-5 mm. crasso; sporis 4-5 =
3-4.

5 *Chlopybe candicans* (Pers.) Quét. Champ. Vosg., p. 87 (1872)

Sau. Lym. V p. 157, *Agaricus candicans* Pers. Syn. p. 456 (1801)

Icon. Bot. Champ. alp. Marit. t. 52 f. 16-20, Lang. F. d. Roma, t. 96 f. 2.

Th. 90, 94, 95, 397, 398, 430, 209, 585, 653, 656, 737, 983, 1133, 1663

Hab. in hibernis, humidis ^{muscatis} Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia 1920
Toscana. Aust. Aust. † (Trentino: Terzolas a Caldes (Pres. M.I.)
Narna

Area distr. Europe, Amer. bor., Ceylon.

phyllophila 135

alba;

Natura, ut proximae, mire variat, nunc minor soli-
taria, nunc magna caespitosa, pileo undulato lobato,
passim cum lamellis alutacea, non expallens, nullo
minus hygrophana; ~~alba~~;

pileo carnofo, convexo-
plano mox depresso umbilicatoque, levi, sicco, velo
sericeo circa margines argentato; 5-8 cm. lato;

lamellis adnato-decurrentibus, leviter distantibus,
ex albo sublutescens; stipite e farcto cavo,
spongioso fibrosoque, 5-8 cm. longo;

sporis ellipsoideis $5 = 3$ usque $8 = 5$;

basidiis $20-25 = 5-7$ - \nearrow

~~Oron.~~

4 *Clitocybe phyllophila* (Fr.) Goid. Champ. Vosg. p. 88 (1872)
Sav. Myc. V p. 155, Agaricus phyllophilus Fr. S. M. I p. 83 (1821)
Fon. Barla Champ. Alp. Mont. t. 52 f. 1-6, Goid. Champ. Fr.
Hymén. t. 527.

Botl. 94, 95, 12, 634, 725, 886, 983, 1015, 631, 1605, 1502, 1663 (93)

Hab. in foliis, imprimis ^{at castanea} fagineae, Liguria, Trentino, Veneto, Emilia,
Napolitens, Corsica. Aust. Aut.

Area distr. Europe, America bor.

(Tergolas, Trento (Pres. M.S.)
arco (Dettondi) Harne
(v. Höhn) Valle Isarco
(Cobelli) +

Ex. S. B. with ital. II n. 931

1583

pityophila 155

(Alba; odor gratus); filio caroso, tenui, glanisculo
umbilicato, glabro, espallente, colore furo, in
udis albo, siccio candicante, 6-8 cm. lato;
lamellis adnato-decurrentibus, confertis, planis,
semper albis; stipite subcavo, e tereti compresso,
glabro (basi albo-lomentoso), 6-8 cm. longo.

Sporis 6-7 = 4 →

(ms) il quale con Quellet (Fl. Myc. h 246)
la considera una varietà di
Clit. phyllophila.


Osserv: Secondo Bresadola spore 4-5 = 3 ;

basidii 18-22 = 4-5 . \bar{v} somiglian-

tissima a Clit. fulva ^{colla quale} ~~si~~ trova

~~per~~ insieme.

3 *Clitocybe phyllophila* (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 152 (1874)
 Sav. Syst. V p. 155, *Agaricus phyllophilus* Fr. S. M. I p. 83 (1821)
 Ann. Bot. Champ. Alp. Marit. t. 52 p. 7-10, Gillet Champ. Fr. Hym.
 t. 112.

Bibl. 94, 95, 246, 866, 983, 101, 693 
 Hab. in herbis, praecipue in pinetis: Liguria, Euboea, Toscana, Trentino;
 Mazoy, inter folia Compositarum (Pres. MS.), Corsica, +
 Area distri. Europa
 Exs. Myc. Nat. n. 1606. Ant. Ant.

(A) ~~Seward~~ ^{Quest. fr. mych 246} ~~Herodot. MS. tratta una varietate di~~ *Cl. phyllophila*

neapolitana 175

Alba caespitosa, raro gregaria; pileo carnoso
e plano depresso, infundibuliformi, limbo ~~laevato~~ ^{tumidulo}
et incurvo; lamellis albis, inaequalibus, decurrentibus;
stipite subcentrali, solido; basidiis cylindraco-clavatis
30 = 7-8, apice obtusis; sporis oblongis urvulif, 9-10 = 4
dentum brevissime apiculatis, nubilos, hyalinis.

C. Infundibuliformes

40 Clitocybe neapolitana (Pers.) Sacc. Syll. V p. 115 ⁽¹⁸⁸⁷⁾ Agaricus neapolitanus
Pers. Myc. Eur. III p. 73 (1828), Ag. Coffeae Brig. F. Neap. t. 23-26 ^{p. 51} (1848)

Leon. Brig. l.c.,

(non Viviani (= Volvania volvacea))

Bill. 209, 434, 433, 638, 437, 983. →

Hab in sedimento decort. coffeici: Veneto, Neapolitano, Sibiria. Aut. Aut. Fr.
Agaricus

Area distr. Italia.

Vedra to Ag. Coffeae Brig. ^{non} = Ag. Coffeae Viv. = Volvania volvacea

* *Trogoneospora* 204

Caro albido-grisea, facta in junioribus nigrescens, sicca nigra, inodora,
sapore abstramentario.

Pileo carnosissimo, et convexo campanulatove expanso, depresso,
umbrino-nigricante, haud expallente, aetate frasco-atro,
siccio, glabro vel in junioribus griseo-fruinato, margi-
ne saepe lobato primitusque involuto, pubescente,
3, 5-7 cm. lato; lamellis subconfertis, portice
subsecurantibus, vel inaequaliter sinuato-abnatis,
cinereo-fuliginosis, succosis, lactu e caeruleo-
nigricantibus, aetate venoso conjunctis,
stipite ex albido griseo-nigricante, fibrilloso,
apice fruinato, glabrescente, periti vel confertissimo
e facto subcavo, substantia spongioso-fibrosa
praedito, basi generatim attenuato, albo, tomen-
toso et fasciculatim conjuncto 2,5-5 cm.
longo, 5-15 mm. crasso; sporis hyalinis
triangularibus, granulosis vel 1-guttulatis 9-10-5-6,
sterilis clavatis 30-40-7-10 - 11

~~Observ. Certe lo stemm char. Bresadola e da
scrivarsi affatto alle Obsteiti difformis
come anche la forma Epica la Collybia
semistelis, A. an.~~

39*

CollybiaCollybia trigonospora. Bresad. F. Erid. p. 30 t. 34 f. 1V. Collybia
semitalisIcon. Bresad. loco cit.Bibl. 234, ~~1030~~, 737, 1031Hab. in silvis coniferis in series elongatas, caespitose crescens; Trentino: Ceresoles,
Val di Sole ^{Tenolias} Veneto; Veronese (Man.). ~~Sub Ant. Autumno~~ +Hab. aree disti. Italia, Helvetia

611. Gustamente il Bres. ^{II p. 51} l. c. ha riconosciuto che questa specie è una
Collybia, ben diversa da Collybia semitalis.

hortensis 161

Caespitosa, elastica; pileo e subhemisphaerico flammigulo
obsolete umbonato, ~~fuliginoso~~, ~~subnigrescente~~, ~~5-6 mm. lato~~,
nunc nigrescente, nunc fuliginoso-livido vel subrufescente,
5 mm. lato; lamellis inaequaliter decurrentibus, subcon-
~~fortis~~ ex albo incarnatis, 6 mm. latis, margine crenatis;
Stipite cavo, subundulato, dorsum incrassato, 6 cm. longo,
4-6 mm. crasso.

39 *Clitocybe hortensis* (Pers.) Gill. Champ. Fr. p. 161 (1874)
Sav. Syst. V p. 161, *Agaricus hortensis* Pers. Syn. p. 362 (1801)
Fon. Battarra, F. Arim. t. 21 f. D (*Hydrophorum sordidum Casuarianum*)
Pohl. 103. ♂
Hed. in hortis et cultis: *sp. Romsii (Emilia) (Battarra) Aest.*
Area disti. Europa australior., Tunisia

On. Sec. et Patouillard / ^{Pl. cell. Tunis. p. 21} *est une espèce de Tricholoma*

aggregata 160

Caespitosa, valde irregularis, saepe excentrica, lobata; subtenax;
~~Tuberosa~~; pileo carnosso, convexo-expanso, aequali
repando, ~~nitido~~ e griseo-livido rufescente, maculis obscuris
ribus notato, nitido, demum expallente, subsericeo-
virgato; lamellis inaequaliter decurrentibus, confertis,
flaventi-carnis; stipite farcto, inaequali, subfibrilloso,
deorsum attenuato, nunc longiore nunc brevioris, albo-rufe-
scente; sporis obovatis, granulosis, hyalinis 8-9 = 6,5-7
copiosis, lamellis demum confluentibus.

Offens. ~~Similis~~ ~~ha~~ quasi l'aspetto di Pl. ostreatus.

Talora ha l'aspetto di Pleurotus ostreatus.
P' ^{probabile} ~~dati~~ che alcune stazioni p. e. nel Veneto
d. infensum janthosco ~~et~~ a Clitocyb. tabescens.


38 *Clitocybe aggregata* (Schäff.) Gr. N. Champ Fr. p. 161 (1874)
Ann. Myc. V p. 160, *Agaricus aggregatus* Schäff. Icon fung. IV p. 126, t.
305-306. (1874)

Icon. Schäff. l.c., Cooke M. Br. F. t. 182 (fm. *brevipila*)

Bibl. 209, 245, 426, 704, 866, 983, 1193, 1257, 1284, 529, 1920, 1965 J

Hab. ad radices, imprimis quercinas: Liguria, ^{Piemonte} Venetia, ^{Lombardia} Emilia, Toscana, = *Heterocystis*

area distr. Europa.

Aest. Aut. 

Var. *caerulea* Voghin in Bull. Soc. bot. Ital. 1874. p. 121

Pileo convexo, carnoso, caeruleo; lamellis inaequalibus, decurrentibus, confertis,
caeruleo-carnosis; stipite inaequali, fere tuberculoso; sporiis obovatis, granulatis,
8-9 x 7, basidis 20 x 8, clavatis, 4-sterigmatis

Hab. ad truncos quercinos, ^{Piemonte} ^{Liguria} Busalle - Dal hys & distingue solo
per il colore.

Vae. 983, 1257,

Spec. in Herb. Mus.

castanicola 17-13

Caro primum albido-straminea, dein caerulescento-festacea
pileo ~~pileo~~ carnosio, conico-depresso, umbonato, margi-
ne involuto, primum fere circinato; ~~trama~~
stip. lamellis undulatis, renatis, sulphureis,
decurrentibus, inaequalibus, dein cum carne
concoloribus; trama stipitij cum trama
pili continua; stipite farcto; sporis... non
descriptis. —

37 *Chytogbe cartemista* Bau. in Scabi, f. Sicil. orient. ser I (1900) p. 19, Ann. Zool.
XVII p. 13

Gen. nuda

Nov. 1890

Hab. ad terram ad Castanega. ^{Sicilia:} Petara pr. Catania, ~~Sicilia~~ Ad. Ant.

Spina in Sicilia

coffcata 159

Minor, obscurior; pileo e conico-haemi-
sphaerico planiusculo, levi, sed virgato-subti-
grino, disco compacto, nigro-punctato, margine
penni subinvoluta, 6 cm. lato, udo fusco-cervino,
seu fuliginoso-griseo, sicco foliato, nitente, cervino
glabro, sed sub lente fibroso-reticulato et disco
punctato; lamellis decurrentibus, confertis,
angustis, arcuatis, integerrimis, sordide albican-
tibus; stipite farcto, elastico, glabro, ~~et~~
utrinque vel a basi attenuato 8 cm. longo,
8-9 mm. crasso, sordide albicante; spori
5-7 μ diam.; basidii 30-35 = 7-8

36 *Clitocybe coffeata* (Fr.) Quélet. Champ. Volg. p. 87 (1872)

Sax. Mycol. fung. V p. 159. *Agaricus coffeatus* Fr. S. M. I p. 85 (1821)

Icon. Barla Champ. Alp. Marit. t. 53 f. 1-8, Fr. Ic. Hymen. t. 56 f. 1.

Bibl. 61, 94, 95, 983.

Hab. in silvaticis: ~~Agaricus~~ *Alpi maritime*, Trentino-Terzolas (Pres. Ms.)

Area distr. Europa.

auth. aut.

(cinereus)

Subcartilagineus, rigidus, saepe caespitosus
ex albo cinereus; pileo carnoso,
convexo, vel convexo-plano, obtuso,
levi, glabro, expellente, pellicula adnata;
⁶⁻¹⁰ ~~2-3~~ ^{adnata v. spongiata;} ~~an. lato;~~ lamellis ~~robustate~~ ^{et albo gineo} ~~liberis~~
latis, fragilibus, ~~obtusis~~ ^{obtusis} (lividis
vel ~~rosidae~~ albicis), ab hymenophoro
facile recedentibus; stipite solido, parvo,
aequali, glabro, apice subferrugineo,
obeso, basi a mycelio floccoso,
compacto, albo peronato; ^{5-8 μ longo, 4-7 mm. diam.} ~~sporif~~
subphaerulis ~~stipitatis~~ ~~paucis~~ ~~soasis~~

oss. Natura multa varia, specie litigiosa di stature

~~multa varia.~~

~~TR Spore globose 5-7 μ diam. Pres. M.S.~~

Oss. Il Bresadola F. mang. p. 59, ritiene che
la specie di Bulliard ha coincidenza con quella om-
nima di Frig, la quale però probabilmente
ne è una forma minore. Quelle del Bres-
dola è più decisamente una *Clitocybe arvensis*
le lamelle hanno un più decorato. Le
queste le spore sono di 6-7 μ di diam. e
i bastoni di 30-35 = 7-9 μ . La *Clitocybe*
funosa (Fr.) Quel. - Synth. fung. V p. 161 - Fr. Icon. Fung.
t. 54 p. 2 ^{Lamp. Fr. Rom. 1921} ~~sec. Pres. M.S.~~ è la forma semplice e
si trova nei boschi aerei di Teydes, soprattutto a nel Lago

35 *Clitocybe cinereus* (Bull.) Pres. *F. mang.* p. 59 t. 35 (1899)
Tricholoma cinereus (Bull.) Gild. Champ. Fr. p. 121 (1874)
 Jan. *Sylt.* Ep. 131 *Agaricus cinereus* Bull. Champ. Fr. t. 628 f. 2 (1888)
Tr. Bull. l. c. ^{Bresl. l. g.} *Parla*, Champ. Alp. Marit. t. 45, f. 11-16, *Lange* p. 2
 Rome t. 100 f. 1, *Viviani*, F. d. *Thela* t. 20.
Bull. 93, 244, 23, 95, 418, 430, 525, 653, 656, 983, 1133, 1282
Hab. in *hirs. pradis* - Liguria, Piemonte, *Franko*, Toscana, Lazio. ^{Aut. Aut.}
Area detri: Europa, Sibira,

See *Bresadola* (ms.) et *Trich. cinereus* (Bull.) *non* *Fries*, *sanctae* *hirsutis* *D.*
Tr. fumosum e *Tr. globulatum*; *comune* *la* *spec.*
Fr. *Fries* *ne* *conferre* *una* *forma* *de* *pradis* *la* *Regio* *di* *fumosum* *t.*
 cf 480 et 585 sub *dicente* *quod* *Clitocybe*

~~Clitrybe cartilaginea (Bull.) Bresad. F. Trid. p. 110-111 et F. mang. t. 36~~

~~Tricholoma cartilagineum (Peck) Quel. Champ. Vosg. p. 339 (1873)
Sacc. Syll. V p. 107, ~~Agaricus cartilagineus Bull. Champ. Fruct. Hymen~~
peck etc 33 (1862)~~

~~Leon Faecke. Barle Champ. alp. marit. t. 39 p. 6-10, Bresad. F. Trid. t. 110 et 111
et F. mang. t. 36 (sub Clitrybea), Roll. Atl. Champ. t. 26 p. 46 (Clitrybe)~~

~~Atl. 90, 93, 95, 585, 983, 234, 262~~
~~Hab in graminis, uris, - Liguria, Trentino: Juvicadoro (Bres. Ms.)~~

~~Area distri. Suecia, Britannia, Gallia, Germania, Russia, Italia~~

~~*T. Bulliardii Sacc. Syll. V p. 107. cf. Quel. Quelg. sp. 1852 p. 2, Bull. Champ. Fr. t.
589 p. 2. Bull. 236, 262~~

~~Hab in graminis, Trentino (at in Gallia)~~

Sec. Quel. Fl. myc. Tr. loricatum & Tr. apocathellum sous l'espèce de Tr. present
dans le bois de l'abbaye de - De puis le digne de Bresadola non de F.

34 ^{quarta}

~~Castilaginea~~ ^{legumino} (187)

non Dalk.
 Sau. Syll. V p. 107,

Var. Friesii Sau. Agaricus castilagineus Fr. Hym. Eur. p. 60
Barla Chemb. alp. mont. p. 53 t. 36 p. 6-10

~~Species nobilis; odor nullus vel farinae recentis;~~
pileo carnosio, rigido, subfragili, e convexo expan-
so, gibbo, undulato, ^{e umbilico rimuloso} glabro, elegantissime et deu-
sissime granulato-punctato, granulis atris, 6-8 cm. lato et alto;
lamellis emarginatis, confertis, albis;
stipite subcavo, brevi, glabro, candido, ca. 2-6 cm. longo; sporis globosis,
sporis globosis 6-8 μ diam.; basidiis 30-35 = 6-8 μ

Icon. Fr. Ter. Hym. t. 33, Barla l. c.
Nobl. 95.

(- odor subfarinaceus, saepe funginus grates.)

spora v. para caespitosa
Hab in montanis et coltoribus, Nizzardo (Barla) Aust. Aut.

Att. Come il Presadola nota questa specie o varietà L. Nitzinger Dalk. Hym. l. c.
Cl. castilaginea per il pileo rimuloso-punctato

34 *Clitocybe cartilaginea* (Dull.) Bres. F. Nord. II p. 7 t. ^(e F. mang. t. 36) 110-111 (1892)
Agar. cartilagineus Dub. Champ. t. 589 p. 2 (1792), ^{non Fr. nec Bate.} *Agaricus conicatus*
 Fr. Icon. Hymen. t. 35 p. 2, *Agaricus effocellatus* Manni Dr. Die fung. h.
 meus. t. unca (1818), Viv. F. d' Ital. t. 18. *Tricholoma effocellatum*
 Lellum (Mann) Lenz. F. d. Rome t. 102 p. 2.
 Fr. l. c. Lenz. l. c. Bala M. t. 56 p. 1-4.
 Herb. 234, 1232, 242, 70, 94, 95, 420, 584, 700, 1232, 653, 656, 704, 706, 983.

*hab. in silvis campestribus mixtis, - Liguria, Piemonte, Trentino; Jocasador, Torcena, Lepo-Eduhi, sed ^{sabij} tenax.
 area disti. Holid, Gallia, Suisia.
 Pileo carno: e convexo expanso, depresso v. gibboso-umbonato, fuliginoso-ovato, v. castaneo-fuliginoso expallente, cute cartilaginea praedito, 4-6 cm. lat.; lamellis compactis, postica adnatis v. breviter adnatis tenacibus, subcartilagineis ex albo stramineis, stipite solido, raro basi ventricosulo-cavo, subradiato-connato, subfibrilloso sursum or. cute cartilaginea; carne alba, odore submusico, sapore dulci-amaro; sporis globosis 1-guttulatis 6-8 μ diam.; basidiis clavatis 30-35 = 6-8.
 Ital. Il ch. ad. Bresadola: identica quasi specie coll' *Ag. effocellatus* Manni, molto diffuso nel Lazio. Il Lenz. l. c. sostiene che ^{questo} è lo stesso, per un *Tricholoma*. Che è un *Tricholoma* che è tratto veramente di un'unica specie?
 dove può forse lo cartilagineo.*


conglobata (5-126)

odor farinae recentis

concreta-

Valde ~~caespitosa~~ ^{concreta-} sed ~~frumida~~; pileo carnos. compacto, inaequali, levi, fusco-nigricante, margine tenui, inflexo, subpruinoso, lamellis ~~liberis~~ ^{adnatis}, rotundatis, albidis, antice evanescentibus; stipitibus solidis, brevibus, ventricosis, subtomentosis, et e tubere communi creta orientibus et stipatis; basidiis clavato-stipitatis 40-50 = 8-9; sporis e globoso-angulatis 6-8 μ diam., hyalinis.

²³ *Clitocybe conglobata* (Vitt.) Bresad. F. Trid. I p. 27 t. 32 (1883) e F. mang. p. 59 t. 34
Tricholoma conglobatum (Vitt.) Lau. Sylt V p. 126 (1887), Agaricus
conglobatus Vitt F. mang. p. 349 (1835).

non. Barla Champ. alp. Marit. t. 42 f. 8-15 Bresadola F. Trid. t. 32 (l.c.)
et F. mang. ^{l.c.} t. 34 (Albitoreo), Sangu. t. D Roma t. 102 f. 1, Venturi Stud.
micol. t. 4 f. 28-29 Viviani F. d. Med. t. 16 (Ag. coalescens) ⁸⁴⁸
B. G. 93, 209, 25, 340, 418, 553, 656, 886, 983, 1228, 754, 234, 242. →
Hab in silvatis ambrosis - Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia,
Lazio, f.  Aut. Aut.

Area dist. Italia, Austria, Germanica, Gallica, Helvetia.

~~Osserv.~~ Bresadola (l.c.) considera questa specie come
una Clitocybe e inoltre ^{ribiana} ~~barba~~ ~~considera~~ come ~~non~~ ^{non} sufficientemente
diversi da ~~Clitocybe~~ ~~ad una~~ ; Agaricus multifarius
Schaeff., A. pes-caprae Fr., A. humosus
Fr., A. humulosus Radcl. & Br.)
(Spore anche di 5-6 μ diam. (Bresad. M. L.)

Secoster 160

Magnitudine maxime varians, luvio valde infesta
unde fragilis fit; pileo convexo-plano, undu-
lato, subumbonato levi, glabro, unicolori, ^{livido}
vel cano ^{per se albido},
expallente, stipite compacto, subumbonato;
lamellis rotundatis adnatisve, haud arcuatis,
5-8 mm. latis, ~~confertis~~ confertis, subundulatis, albis;
stipite solido, ~~glabro~~ glabro, apice pinnato,
aequali vel basi incrassato, albo, 8-10 cm.
longo, 2,5 mm. circa crasso; sporif
6-7 = 2-3; basidiis 30-40 = 7-8

32 *Chitoybe decastes* (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 162 (1874)

Sou. Jy. V p. 160, *Agaricus decastes* Fr. S. M. I p. 49 (1821)

Tron. Barla, Champ. Alp. Mont. t. 53 p. 9-12, Fr. Hon. Hymen t. 52.

Bibl. 95, 983.

Hab. in silvaticis: Alp. Maritimo, Trentino: sopra Arnago (Pres. Ms.) ^{arb. ait}

Area dist. Europa.

molybdocephala 159


Caespitosa

Angla, solida; pileo carnosso, campanulato-
expanso, late et obtuse umbonato, lev,
glabro, margine tenui, recto, 14-18 cm.
lato, fuligineo, subexpallente, glabrato, disco
praecipue livido-rufescente; lamellis
adnatis, latis, integerrimis, planis, e carne
neo pallentescentibus, non sinuatis, fissis,
dente decurrentibus; stipite solido,
valido, fibroso-striato, sursum farin-
aceo-squamuloso, pallente, sursum
incrassato, 11-16 cm. longo, 2,5 cm. crasso.

~~Offert le lamelle ~~sur~~ "d'un gris
blanchâtre formant avec le pédicule
un angle droit" Bull.~~

31 Clitocybe molybdcephala (Bull.) Sacc. ~~ex~~, Cl. molybdica (Fr.)
Gill. Champ. Fr. p. 163 (1874) Ann. Lych. V p. 159. Agaricus molybdcephalus
Bull. Champ. Fr. t. 523 (1790)

Icon. Bull. P. C., Pautet Traité Champ. t. 51 f. 1 (Hypophyllum caput-feronii)

Bot. 70, 585 (Tricholoma) 

Hab. in campetibus umbrosis - Liguria Nizzardo: juncus ^(Berke) maritimus Aest. Ant.

OK 21 Berke na na di figura nei suoi Champ. Alp. maritimus

area istri Europa

ampla 159

Gregaria, subcaespitosa, vulgo

~~*Naxos*~~ *ampeliossima*, sed etiam minor; odor nullus

pileo carnoso, convexo-plano, subgibbo, nunquam depres-

so, subrepando, ^{nunc glaberrimo, nunc virgato} fragili, levigato, subhygrophano, disco com-

pacto, ^{max} ~~margine~~ ~~lanceo~~, ~~rufo~~, margine tenui, nudo mox

fractis reflexoque, et fuliginoso livido, siccato cano, quasi

sericeo, 8-20 cm, vel ultra lato; lamellis decurrentibus,

uno latere saepe sinuatis, subconfertis, ^{2.5 cm. latis} ~~lanceis~~, crispulis,
serrulatis, et fuliginosis, sordide albidis;

stipite solido, valido, subcartilagineo, nudo, albo,

^{subincrassato et} apice ^{subvilloso}, 15 cm. longo, 2.5 cm. crasso;

sporis ellipsoideis 5-7 = 3, ~~5~~ - 4, gutturalis,

hyalinis.

30 *Clitocybe ampla* (Pers.) Fr. D. Champ. Fr. p. 164 (1874)
Sacc. *Syn. V* p. 159 *Agaricus amplus* Pers. *Syn.* p. 359 (1801)
Icon. Fries, *Icon. Hymenom.* t. 58; Cooke *Icon. Fung.* t. 646
Atl. 209, 246, ¹⁰⁴³ 1090, 1133, 1920 →
Has in Sibiria + Veneto; Toscana, Sicilia. det. det. ?
area dist. Europa.

Montello a Saba (Sacc.), Nervosa (Mont. sp. Pres. M.S.),

~~v. s. *Agaricus* *amplus* in *Icon.*~~
Om. See. *Quel. Ft. Myc.* p. 275, no. *Sivense* de *Cl. molybdocephala*.

Lumulosa 162

Caespitosa; pileo carnosio, e unico ex-
franso, umbonato, levi, glabro, umbrino
expallente; lamellis leviter emargi-
natis, Securrentibusque, confertis, ex
albo cinereferentibus; stipite solido,
floccoso-fruinoso, pallido; sporis $6\frac{1}{2} \times 4$

~~Obs.~~ Presenta il tipo delle diffusae

29 *Clitocybe tumulosa* (Kalchb.) Jku. *Syll.* V p. 162, *Agaricus tumulosus*
~~de~~ Kalchb. *Zon. Hymen. Hung.* p. 13, t. 5 (1873)

Zon. Kalchb. l.c., *Bata, Champ. Alp. Marit.* t. 43 p. 1-3

Bibl. 95, 983. 693

a *Furiani* (Romagnoli l.c.)

Hab in graniosis sylvaticis: Nizzardo (Bady) ~~Alpe maritima~~, (Cortica) (Maire)

Area distr. Hungaria, Germania, Britannia, Gallia, Italia.


act. aut.

511. Molto affine a *Clitocybe conglobata*, d'ora è probabilmente una varietà
come opina il ch. Bresadola.

Opaca 154

Nunc connato-caespitosa, nunc simplex;
alba; pileo carnoso, convexo, expanso, umbro-
nato, repando, levi, ore floccoso obducto,
4-5 cm. lato; lamellis adnato-
securrentibus, confertissimis, albis;
stipite parvo, subfibrilloso, inaequali,
flexuoso, 6-8 cm. longo, 6 mm. crasso;
sporis 5-6 = 3. →

~~Offens.~~ Molto affine a Chit. cernuata
~~o cui un tempo unita e da cui~~
~~solo ora si è separata~~

28 *Clitocybe opaca* (Low.) Gill. Champ. de France p. 164 (1874)
Sacc. Sylt. fung. V p. 164, *Agaricus opacus* Low. Col. Fig. t. 142 (1899)
Frans. Cooke M. Br. F. t. 176, Gilllet Champ. t. suppl. Low. l. c.
Nitt. 1583 

Hab. in silvis - Trentino: Valle Lagarina (Cobelli). Aust. Aut.
Area dist. Europa.



connata 163


Candida, ampla sed tenuis, non viscosa;
pileo carnosso, tenui, e. conico expanso, inae-
quali, nudo, udo, umbone obtuso, evanido, 8-10
cm. lato; lamellis inaequaliter decurrentibus,
angustis, confertis, subarcuatis, stipitibus
cavif, amplis, glabris, suberoso-cornatis,
8-13 cm. longis, 1-2 mm. crassis; sporif
⁸⁻³⁻⁴ ~~laxis~~; basidiis 25-30 = 4-5,

Connata caespitosa

Var. hebeodia Pileo carnosso demum plano
depresso, 5-10 cm. lato, inaequali, pinnato, gri-
seo-cinereo, ^{vel cinereo-pallente} lamellis decurrentibus, albis; sti-
pites farcto vel subcavo, candido, 8-10 cm.
longo, velido, lanuginoso; sporif hyalini
6-7 = 2-3; basidiis clavatis 25-30 = 4-5

27 Clitocybe connata ^{B Difformes} (Schum.) Gill. Champ Fr. p. 164 (1874)
Sacc. Syll. V p. 163, Agaricus connatus Schum. in Sacc. p. 299 (1803?)
Icon. Borla Champ. Alp. marit. t. 56 f. 5-9, Bresadola F. mang.
t. 37, aut. aut.

Bibl. 39, 94, 95¹⁰¹, 234, 262, 983, 693 
Hab. in humidis silvaticis: Liguria, Trentino: Adidale & Robb. (Bres. M!)
(Conica) 
~~var. Area distri. Europe~~
Toscana

var. hebeopoda (Fr.) Sacc. Syll. V p. 163, Cl. connata var. Michaliana
Bres. F. Syd p. 29 t. 33, Michal. N. pl. gen. p. 190, t. 29 f. 1 (Fungus
variosus maximus). Bibl. 430, 704, 234, 785 
Hab. in silvaticis: Trentino, Toscana.
: bosco di Dimaro (Bres. M!)

amara 149

Caro firma sed non crassa; sapor valde amarus;

pileo carinato, e convexo-plano, obtuso, tico, flocculoso - ru-
~~rufo-fusco~~ ^{atque lido-rufo, circa marginem pallidior}
veloso, rufoescens, 5-8 cm. lato, saepe inaequali et
repando, sub lente imposito; lamellis leviter decurren-
tibus, confertis, angustis, albis; stipite solido,
tenaci, e floccosonglabrescente, albo, circa 5 cm.
longo 1/4 cm. crasso;

sporis 5-6 = 4-5; basidiis 25-30 = 5-8

Diff. Specie ben distincta, ma facil ad ingenuos
per il colore variabile del pileo.

26 *Chitocrybe amara* (Fr.) Guéb. Champ. Vosg. p. 234 (1872)
Sau. Syst. V p. 149. *Agaricus amarus* Fr. S. M. F. p. 87 (1821)

2) ^{7 coll.} ~~1000~~ 93, 95, 656, 983. ♂

1) Icon. Barla. Champ. Alp. Marit. t. 50 p. 1-9, Lang. F. d. Roma, t. 131/1.

Hab in herbiculis ^{in primis pueris} ~~Liguria~~ ^{Nizardo} Lazze spr Rome (Lang.). Aeth. Ant.
Area disti. Europe, Afric. merid.

Socialis 149


Cavo alba, ~~inodora~~; Fileo carnoso, e convexo-expanso, umbonato, levi, gilvo; 2,5 cm. lato; carne alba, inodora; lamellis plano-decurrentibus, vix confertis, lubescentibus; stipite solido, subglabro, rubello, basi radicante hirta, ^{peronata} 2,5 cm. longo, 4 mm. vel ferunt ultra crasso.


Offerv: La base dello ~~stipite~~ ^{lame e cinta da un indumento irto} ~~stipite~~ ^{sta calcata a} guisa di Marasmius peronatus. Questa specie ~~che~~ si avvicina a Clit. riversa.

25 *Chloromyces socialis* (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 159 (1874) non DC (= *Fabreanus*)

Sac. Syst. V p. 169, *Agaricus socialis* Fr. ^{v. 47} Mon. Mycol. t. 49 p. 2 (1867)

Mon. Fr. P.c., Barla Champ. Alp. marit. t. 49 p. 7-8

Hab. in silvatis ^{montanis} imprimis pinetis ^{intra aemum Nizzardum} (Barla) ^{Arch. Ant.} ~~Alp. maritima~~ 

Bull. 94, 95, 983. 

Area distr. Europa.

rivulosa 153

Olor gratus, sapor nullus; autumnis seriore caespitosa maior; pileo e convexo plano, depresso, subcompacto, obliquo, expallente, glabro, ~~non albido~~ ^{hinc albido} ~~non albido~~ x
Stemum rivuloso; incarnato, rufescente, ~~et~~, sic albefcente, terigato; lamellis adnato-decurrentibus, latis, subconfertis, incarnato-albis; stipites farcti, tenaci, elastici, subfibrillosi, incarnato-albi: sporigi 4-4,5 = 2-2,5; basidii 20 = 3-4

Uffers. Si deve determinare a tempo piovo; a sardo autumnis il pileo e ondulato-lobato, e sicche facilmente si prende per una Clitocybe cernuata deformis.

24 *Chrysothrix mouleana* (Pers.) Gill. Champ. Fr. p. 160 (1874)

Sau. Syst. V p. 153, *Agaricus mouleana* Pers. Syn. p. 380 (1801)

Non Barle Champ. Alp. Marit. t. 51 p. 16-23, Bernard, Rochelle
t. 4 p. 5, Cooke M. Br. F. t. 200.

Bibl. 94, 95, 263, 983, 1663

hab. ad vias, versuras + Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino: ^{Tizenza} Tergolese, (Pres. MS.)

Area distr. Europa.

Uarna (v. Höhn)

dest. Ant. †

tabescens 206

Caespitosa, tenax; pileo carnoso, ~~plano~~
^{conico - convexo} planiusculo, ^{velles} sulco, disco setatione
3-7 cm. lato, ^{sape lobato} margini ~~irregolare~~; lamelli
decurrentibus, ^{carnos-} rufescentibus; stipite e
poreto ^{demum} cavo aequali, pallido, basi
~~rufa nigricante~~ ^{demum} rubro-fusco, 8-16
cm. longo, 4-7 mm. cr.; carne alba, subinsipida; sporis ob-
ovatis, hyalinis, 8-10 x 5-7; basidiis clavatis 40-45 x 8-10

~~Uvero. Pel colore delle lamelle
fa anche aperta tra le
flammarole; ma secondo Gelile
le spore son bianche e secondo
Seynes e molto affini a
Clit. contorta.~~

23 *Clitocybe tabescens* (Lep.) Bresad. F. Trid. II p. 84, t. 199 (1892)
Collybia tabescens (Lep.) Sacc. Syll. Fung. V p. 206, *Agaricus tabescens*
Lep. Fl. Carn. II p. 446 (1772), *Ag. gymnopodius* Bull. (1793), *Ag. socialis* DC. (1815)

Mon. Michx. N. P. G. t. 74 p. 2, Pollm. Fl. Veron. III, t. 2 p. 6 (*Ag. glo-*
moratus), Bresadola l.c. Bull. Champ. t. 601 ^{for 1}, Rolland atl. t. 25

Hab ad truncos imprimis quercus, Veneto, ^{Lombardia} Trentino, Toscana
Area distr. Europe, America bor. ♂ Ark. Ant.

Det. 785, 989, 234, 1965

Det. Quanto a numeroz. inanim. cfr. Bres. l.c. Anche l' ~~Agar.~~ *Agar. aggregatus*
da me pubblicato appartenente a questa specie.
Exs. Myc. Ven. n. 805 (sub *Ag. aggregatus*).


Spinulosa 171

Caro alba;

~~Pileo convexo dein plano vel depresso, gibboso,
vel umbonato suboriaceo, levi, carnosio,
ex alutaceo carneolo 4-7 cm. lato, mar-
gine recurvo; lamellis decurrentibus, sin-
gulis, subconfertis, albis dein flavis;
stipite sursum subattenuato, 5-7 cm.
alto, solido vel subfarcito, albo, fibrilloso,
alutaceo-lonato; spori globulosis,
spinulosis, 9 μ diam.~~

57 *Clitocybe squamulosa* (Steud. et Sm.) Lau. *Lyll. V* p. 191 (1887), *Agaricus squamulosus* Steud. et Sm. *Brit. Fung. I* p. 84 (1886)

*Gen. Cooke Ill. Pr. F. t. 177, Saunders et Sm. *Mycol. Ill.* t. 36 (Ag.*

subviolatus) - var. *Amelicae* Arcang. *Sopra due funghi. Pis. in*
Atte. N. G. Bot. Ital. 1889 p. 434, ^{Sacc. *Lyll. Ill.* p. 20} ~~et~~ *Def. (Mitt. 30, 32)* 

Hab. in collibus siccis in agro Pitena - Toscana: pr. Asciano, Siena (Arcang.)

Area det. Melia.

OT. Il tipo non è stato ancora indicato in Italia.

Det. Aut.

Pileo carneo e convexo excavato v. impunibuliformi, obtuse lateque
umbonato, compacto, pallide luteo-ochraceo, lavi, glabro, margine tenuim
atenuato, plus minus cavato explanato; stipite subcylindrico, solido,
compacto, inferne pileo subconcolore; carne alba, compacta: lamellis
crassiusculis, compactis, simplicibus albidis ab hymenophoro lat' facile
secedentibus adnatis v. perae decurrentibus, demum pileo subconco-
loribus; sporis subgloboso-piriformibus, asperulis, albidis, 5 = 4.

Vern. Sauro. in Cooke

subinvoluta 170

Pileo carnosio, e convexo plano depresso,
gibbo, glabro; stipite ~~solido, aequali~~
~~fibrilloso lamellis longe decurren-~~
~~tibus, simplicibus, confertis, ex albo~~
~~subscutibus; stipite solido, ae-~~
~~quali, fibrilloso, submaculato, lu-~~
~~escente, sporis globosis 5-7 μ diam.~~
vel 7 x 5-6; basidis 35-45 = 5-6
vel 39-35 = 6-7

~~Usser. Dalla figura di Batsch sarebbe
di statura minore che la Clit. geotropa
e lo stipite è leggermente flavido-
maculato.~~

~~Teste Berk. questa specie è
diversa dall'omonima di Savard.
e Sm. t. 36 che è la Cl. spinus
lossa Stev. et Sm. ~~etc.~~~~

5-6. *Clibrybe subinvoluta* (Batsch) ~~See~~

Sacr. Syll. fung. V. p. 170 (1887) *Agaricus subinvolutus* Batsch Element. fung.
Cont. II p. 57, t. 37 f. 204 (1789)

~~Bibl.~~ Bibl. Batsch l.c. Cooke M. Br. F t. 108. → Bibl. Bresad. MS. ♂

Hab. in silvis acrosis: Alp. Maritima: Nizza^{D°} (Barla u. Bres. MS.)
Area distr. Europa.

(Trentino: in grumulis apertis
M. Brone pressa Riva (L. G. Baruff.
faldi u. Bres. MS.)

+
rest. aut

(4) Asci aperti o fore varie n. Cl. gestrope - Sec. Berk la Cl. ~~gestrope~~ subinvoluta
u. Sand. u. Sm. Mycol. M. t. 36 è invece la Cl. spiculosa.

splendens 172

Solitaria, vulgo ^{caro alba} simplex, pileo subcamof,
plano-impundibuliformi, glabro, nitido,
gilvo-lutescente, non flaccido, tenui,
6-8 un. lato; lamellis longe decur-
rentibus, confertis, simplicibus, albis;
stipite solido, glabro, concolore; spori
subglobosis 4-5 μ diam. - 1


Osserv. Dalla vera Clit. gilva e certo
distinta; e piuttosto affine a
Clit. flaccida. Il cappello più
piano, non flaccido e molto
più tenace che in Clit. gilva;
Spore secondo Bresal (M) 7 \times 4
basidi 30-34 = 6-8

55 *Chrocybe splendens* (Pers.) Gill. Champ. Fr., p. 139 (1874)

Sau. Syst. II p. 192, *Agaricus splendens* Pers. Syn. p. 452 (1801)

non Barle Champ. alp. Marit. ^{p. 76} t. 60 f 1-5, Frés. Icon. Hymen. t. 55 f. 1.

Bibl. 94, 95, 983, 1031.



Nizzardo

(Marangoni)

Hab in silvis praevalis et aereis: ~~Alpe maritima~~, Veneto: jussu. Vicenza

Area diste Europa, Sibiria, Africa austr.

(Barle & Bres. M.S.)

cert. +.

candida 171


Gigantea caro alba, compacta, grata; odor fortis, subfarinaceus;
pileo carnoso, e plano-convexo infundi-
buliformi, margine involuto pubescente, vix in
exolehis expanso, nec unquam striato vel sulcato,
jam primitus lacteo, persistente, centro aetate tantum
subalutaceo, glabro, vico, 1-2 dm. lato; lamellis
confertissimis, strictis, attenuato-decurrentibus,
ex albo-pallescentibus, saepe furcatis, acie tantum
in vetustis acuta, haud anastomosantibus;
stipite solido, valido, aequali vel subventricoso,
lacteo, glabro, apice subtruncato 4-7 cm. longo,
2-3, 5 cm. crasso; sporis hyalinis, ovato-elon-
gatis, interdum virguliiformibus $6-7 = 3$; basi-
diis clavatis $30-35 = 6$, vel $28-30 = 6$ →

"Pubherrima haec

Offero. ~~Quae~~ ~~blissima~~ ~~species~~ ~~ardid~~ ~~super~~ ~~affinis~~
~~Clit. geotropa~~ Bull. et ~~Cl. gigantea~~
~~iste~~ ~~etiam~~ ~~quibet~~, ~~quibus~~ ~~simillima~~ ~~pro~~
~~son~~, ~~cui~~ ~~del~~ ~~resto~~ ~~et~~ ~~con~~ ~~signant~~ ~~fama~~, ~~per~~
~~distincta~~, ~~aff~~
~~et~~ ~~colore~~ ~~et~~ ~~per~~ ~~se~~ ~~spores~~, ~~certa~~ ~~poi~~ ~~et~~ ~~affinis~~
vero certe ~~Clit. connatae~~ Lebn. et ~~etiam~~ videtur
Cl. coffeae Brig. mihi ignotae, cum qua in vivo
comparanda foret" (Presadola M.S.)


54 Clitocybe candida Bresad., F. Tridant. p. 16^{et 98}, t. 18 (1882), Jan. Syll. V p. 171.

Icon. Bresadola l.c. et F. meng. t. 40, Barla, Champ. alp. Marit. t. 58/10-16.

Bibl. 94, 95, 234, 242, 982. 

Hab. in graminosis sibiriana aeternarum: Liguria, Trentino: Valle di Rabbè sopra Ortisei
(Bres. M.I.)

Area distr. Italia, Gallia, Amer. bor.

Aeth. aut. 

gilva 170

(cavo e pallido ochraceo)

Forma primaria curta, robusta, pileo carnosso, compacto, e convexo depresso, obtuso, glabro, udo, vix infula tubiformi saepe guttato marmorato, 8-11 cm. lato, lamellis decurrentibus, confertissimis, tenuibus, ramosis, ~~saepe~~ e pallido ochraceis, non rufescentibus; stipite carnosso, solido, valido, glabro, subaequali, haud elastico, semund stiam cavo, 6-10 cm. long., 0.5-2 cm. crasso; sporis sphaericis vel subpsaeroidis 4-5 μ diam. vel 5-6 = 4 - 1

Cassio. *Sporobolus*

Secundo Bresad. Ms. ^{le cono} sp. 4-5, 5 = 3-4 a i
(basidii 24-28 = 5-6)

(Secundo Britz: sp. 8-10 = 3-4, ma forse si tratta di altra specie).

53 *Clitocybe gilva* (Pers.) Quét. Champ. Voy. p. 89 (1872)

Sac. Syst. V p. 170, *Agaricus gilvus* Pers. Syn. p. 448 p. p. (1801)

Icon. Barla Champ. Alp. Merit. t. 58 f. 7-9, Lang. F. d. Roma t. 95 f. 4.

Bull. 90, 94, 95, 209, 418, 430, 585, 653, 656, 866, 985, 1284, 1301, 1965 ♂

Hab. in strabus, imprimis acrotis: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Trentino, Emilia, Lazio, Toscana: M. Senario pr. Firenze (Pres. Ms.) +

Area dist. Europa, Australia

Det. Aut.


membranacea 166

Stipes exumbonato, dens. lato; stipes aequali
tenuore; 10 cm. longo, 12 mm. crasso; sporis
subfusoides 7 μ longis; cetera Cl. infundibuli
liformis.

Usseri. E quasi media tra Cl. infundibuli
formis e Cl. squamulosa

52 *Clitocybe membranacea* (Fr.) Lau. *Syll. V* p. 166 (1887) *Agaricus membra-*
naceus Fr. *Elench. I* p. 13 (1828)

Ter. *Parla Champ. Alp. Mant. t. 59* p. 6-8, Saunders & Sm. *Myc. 211*
t. 63.

Herb. 94, 95, 866, 983. 

Herb. in *Silvaticis, imprimis aceris*. Liguria, Emilia, Trentino: Goriciano (Bresad)
Area distri. Europa

(Ant. aut.
M.S.)

infundibuliformis 165

(odor gratif, statura media, 6-8 cm. color variif
ex rufescente in alutaceum et album transiens, sed
non primif albf); pileo caroso, e compacto molli,
primo convexo, umbonato, innato-sericello dein infundi-
buliformi, flacido, expallente, disco carosifore, mar-
gine tenui, nunquam ndo, (sed sub lente sericello), 6-8
cm. lato; lamellis longe decurrentibus, vix confertis,
candidis; stipite spongioso-farcto, molli, elastico,
deorsum incrassato, 4-10 mm. crasso; sporif 5-6-3-4,

Osserv: 1) Clit. catinus differice sul pileo glabro;
2) Spore Bresadola (Mf) ammette una gran
varietà nelle dimensioni delle spore; cioè

$$5-8 = 3,5-4;$$

$$6-8 = 3\frac{1}{4}-4,5;$$

$$7-9 = 4-5;$$

$$6-11 = 4-5,5;$$

$$\text{in generale } 6-9 = 4-4,5; \text{ e i}$$

$$\text{basidii } 28-35 = 5-6$$

$$\text{spore } 23-25 = 6$$

51 *Chlorocbe infundibuliformis* (Schäff.) Guét. Champ. Voy. p. 88 (1872)

Sac. Syst. V p. 165, *Agaricus infundibuliformis* Schäff. Icon. fung. t. 212

Icon. Schäff. l.c., Barla Champ. Alp. Marit. t. 57 f. 1-5, Bresadola F. mang.
t. 38, Lanza F. d. Roma, t. 96 f. 1, Venturi Mic. Bres. t. 29 f. 1-2,
Vivian. F. & Théri t. 5.

Abst. 61⁹⁰, 94, 95, 127, 209, 242, 244, 245, 12, 362, 417, 418, ⁵⁸⁵638, 653, 656
693, 737, 866, 923, 263, 315, 405, 570. 1597. ♂

Hab in muscivis silvaticis et campetricis: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Trentino & Emilia, Toscana, Lazio, Neapolitanum, Sicilia, Corsica ♀

Aree distr. Europa, Amer. bor., Australia, Tunisia.

Arab. Ant.

q: Gocciadoro, Val d'Isle, Dismaro, Rabb. (Bres. Mt.), Narone (V. Hökn.)

Exs. Myc. Ital. n. 1604 et 1605 (fm. obscurata)

squamulosa 166

Praecos

Minor, flaccida, subinodora); pileo carnoso,

semis, obtuso, squamuloso, squamulis evi-
dentibus, obscurioribus, fere secedentibus,
primis obtuso, profunde infundibulifor-
mi, fusciscenti-alutaceo, 2-4 cm.

lato; lamellis decurrentibus, distantibus,
albis; stipite spongioso-farcto, sur-
sum attenuato, elastico, 4 cm. longo;

sporis 6-8 = 3,5-4; basidiis


25-32 = 6-8 - ↗

50 *Clitocybe squamulosa* (Pers.) Quel. Champ. Vol. p. 88 (1872)
Lan. Lpt. v p. 166, *Agaricus squamulosus* Pers. Syn. p. 449 (1801)
Bon. Barta, Champ. Alp. Mant. t 57 p. 9-12, Bresdale, F. Trid. t. 112
Britt. 94, 95, 983, 234

Hab in hircanicis, imprimis acerosis: ^{Nizzardo} ~~Alp. Mantuae~~, ^{Sopracoste} Trentino: Val d.
Area distr. Europa. Sole (Bres. MS)

Ext. Myc. Nat. n. 1689

(Barta e Bres. Mt.), Veneto: Tregnago
(Mass. e Bres. MS)

Dist. Aut. 

maxima 165

Glaba, olida, alutaceo-pallescente, albidave,
pileo carnosio, firmi, subflaccido, vico sericeo-levigato
squamulose, late infundibuliformi, disco compacto
subumbonato, 10-35 cm. lato, margine lvi;
lamellis longe decurrentibus, subconfertis, albidis (vix
lutescentibus); stipite spongioso-farcto, compacto,
elastico, attenuato, fibrilloso-striato, 11 cm. longo,
5 cm. crasso; sporis sphaeroidis-ellipsoidis
 $4-5 = 3-4$ vel $8 = 4$ →

~~Offens:~~

6 tanto vicina a ~~Clit~~ infundibuliformis da
aper ritenuta una sua forma lussureggiante.

Bretadela My. spore: $5-9 = 4, 5-6$
basidi $27-30 = 7-8$.

49 *Clitocybe macrura* (Gärtn.) ^{et Meyer} Guél. Champ. Voy. p. 88 (1876).

Jour. Linn. V. p. 165. *Agaricus macrurus* Gärtn. et Meyer Fl. Wett. ^{III} p.

329 (1802) *Ag. pygmaeus* Seys. et pl. and.

Linn. Barla Champ. Alp. Marit. t. 55, Guél. Champ. Franc. Hymén. t. 106.

Bibl. 61, 90, 94, 95, 244, 417, 418, ⁶⁹³ 737, 983, 1031, 1062, 585, 1456 ♂

Hab. in silvis umbrosis: Liguria, Veneto, Trentino, Toscana, Neapolitano, Corsica
Area distr. Europe, Amer. bor. (Red. Aut. ~~FR~~)

Off. Sec. Guél. Fl. Mycol. 242 è una var. di *Cl. geotropica* e può parere
una fm. lustureggiante di *Cl. - imputabiliformis*. Sec. Mus. (M.S.) la forma 6-9 = 4,5-6
i basidi 22-30 = 7-8.

Frulliformis 167

Carnosa, non hygrophana; pileo carnoso, obtuso, semum infundibuliformi, floccoso-villoso, margine explanato, ^{cinereo} 6 un. lato lamellis decurrentibus, subdistantibus, venoso-connatis, candidis; stipite farcto, elastico, aequali, striato; sporis 6. ~~pe~~ longis.

Classer. # Ha l'aspetto di Clit. cyathiformis pel cappello cinereo ma è carnosa e non igrofana.

48 *Chitoybe tralliformis* (Fr.) Karst. Vallsv. F p. 72 (1879)

Sacc. Syll. V p. 167, *Agaricus tralliformis* Fr. S. M. I p. 176 (1821)

Icon. Basle, Champ. Alp. Marit. t. 57, p. 13-15 (Kellchb. Hymen.)

Hungar. 4. 6 f 1 (*Ag. modestus*) est forte varietas)

Herb. 96, 95, 983, 1663

Hab in Dumetis rhodod. - Alpi Nizzardo (Basle), Turkino: Uarna (V. Höhn.)

Area dist. Europe, Africa austr.

Rest. aut.

pauhis 168

Maior aestate, minor autumnis seriore; forma uniu-
lata maior, pileo sericeo-nitente tenuiore;


pileo carnosulo, convexo-plano, atomato-
floculoso, disco depresso, marginis deflexo,
involuto, fusco vel griseo subespalente,
non albescente, opaco, vulgo 2 cm. lato,
sed statura multo lucente, lamellis
longe recurvatis, confertis, angustis,
griseo-albicantibus; stipite farcto,
fibroso, tenaci, firmulo, nudo, fuliginoso
6 cm. longo, 4 mm. crasso; sporis
ovoidis ~~6-7 = 3 μ~~ longis.

ovoidis 7 μ longis vel elliptico-oblongis
6 = 3; basidiis clavatis 20-25 = 4-5 ^{spis}

47 *Clitrybe parvif* (Fr.) Gilb. Champ. Fr. p. 166 (1874)

Jour. Linn. V p. 168 *Agaricus parvif* Fr. S. M. I p. 168 (1821)

Jour. Bot. Champ. Alp. Marit. t. 58 f. 1-6, Fr. Jour. Hymen. t. 48/6.

Bull. 81, 94, 95, ¹⁰¹ 397, 398, 886, 983, 754, 693,  Trentino: bosco di Tergolas (Dr. M.S.)

Hab. in herbacis: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Corsica
(Toscana)

Area dist. Europa.

Det. Klotz. Herb. mycol. n. 1508 (Vercelli, Cesati) [sub ag. obliquus], Erb. crist. it. II n. 37

det. det.

Det. Gli esempl. del Trentino sec. Quat. spettano piuttosto a Cl. Frulliformis.

sinopica 157

Vernalis vel aestivalis odore farinae recentif,
leviter vel profunde umbilicata; versipellis
primo vere rubra, levif et glabra apparet,
dein (eadem individua) evidenter floccu-
losa, expallens; pileo carnoso, tenui, plano-
depresso, umbilicato, ricco, demum flocculoso-
revuloso, 2-4 cm. lato; lamellis recur-
rentibus, confertissimis, latiusculis e can-
didis + lutescentibus; stipite farcto aequali,
subfibrilloso, 2,5 cm. longo, 2-5 mm. crass.
sporis 8-10 = 5-6; sporidiis 30-35 = 6-7'

~~Essere facilmente distinguibile per l'odore.~~

46 *Clitocybe sinopica* (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 142 (1876)

Sau. Syst. V p. 169, *Agaricus sinopicus* Fr. S. M. I p. 83 (1821)

Yun Barla Champ. Alp. Marit. t. 59 f. 16-19, Fr. Icon Hymenon.
t. 55 f. 2.

983? ♂
Brit. 94, 95, 244, 1585, 1652 (Trentino: ~~Dimaro~~, ^{Magras}, ^{Tergolas} (Bres. Ms.).
Karua (Heimerl), Valle Lagarina. Aust. Aust.

Hab. in hilib. montosis: Alp. Maritima, Toscana,
area riv. Europa, Amer. bor., Africa austr.

Var. torosa Bres. Ms. - Robustior, major, pileo 5-8 cm. lat. ^{magis involuto} auroreo-virescente
centro elevato, nigro-punctato; lamellis ^{lunide} conflatis auroreis; ^{lunide} ~~stipite~~ basi tuberoso, pileo
concolorato sed pall. prore, 3, 5-5 cm. longo, 1-2 cm. cr.; carne ^{lunide} ~~lunide~~ alba, odore fari-
naceo, lentis amara; sporis ovato-oblongatis 8-11 = 4-5.

Hab. in hilib. = Trentino: bosco di Dimaro (Bres. Ms.)

^{orbiculari}
 Pileo ^{ost} carnosio, plano, umbonato, lev. opaco, ^{lenticulis - rubro} ~~margini sericello~~
~~inflexo, crenato~~, non udo, multo minus hygrophanus, 5 cren-
 lato, margine sericello, inflexo, crenato; lamellis adnato-
 decurrentibus, subdistantibus, venoso-reticulatis, albo-fal-
 lescentibus; stipite cavo, curvo, sericello, deorsum attenuato,
 demum compresso, dilute testaceo, micore sericeo debersili lecto,
 13 mm. longo et ultra, 4-6 mm. et compresso 8-10 mm.
 crasso; sporis 8-10 = 5; basidiis 35-40 = 8

~~Afferre.~~ Sarebbe fuor di luogo in questa serie, ma è
 affine alle specie seguenti sinopica, parvif an.

45 *Clitocybe inalis* (Fr.) Gill. Champ. Fr. p. 142 (1874)

Sam. Syst. Fung. V p. 169 *Agaricus inalis* Fr. Epic. p. 69 (1836)

Tron. Cooke M. Br. F. t. 281, Quél. n. Assoc. Fr. av. Sc. 26 (1897) t. 4/2

Bibl. Bresad. M. l. Trento,

Hab. in herbidijs ⁿ secus ~~sub~~ aquaeductum, supra Malis (Bres. Ms.) α

Area dist. Europa

Aut.

Cotinus 174

Alba, decolorans; caro tenuis, flaccida, alba;
odor sat gratus; color huius primo albus
nec ut in similibus per aetatem pallescens, sed
sub pluvio incarnatus quoque, demum aetaceus;
pileo carnoso, tenui e plano infundibuliformi,
flaccido, sicco, glabro, umbone non distincto,
lamellis decurrentibus, subconfertis, albis;
stipite farcto, elastico, sereti, sursum subat-
tenuato. — ↑


Offens. Affinis a Cl. flaccida e Cl. infun-
diuliformis; ^{si dicitur} cautamente ~~da~~ sepa
distingueri da Cl. phyllophila

64 *Chitomybe cahirus* (Fr.) Quél. Champ. Voy. p. 235 (1872)

Sau. Lym. V p. 174. *Agonius cahirus* Fr. Epic. p. 72 (1836)

Jun. Barla, Champ. Alp. Marit. t. 81 p. 3-5, Lamj. F. d. Roma t. 94 p. 2.

Bibl. 96, 95, 209, 417, 418, 853, 656, 866, 983.



Cont. Aut.

Hab. inter folia faginea etc. ... Liguria, Veneto, Trentino, Emilia, Lago, ♀

Area Distr. Europa, Tunisie

tuba 175

Gerotina, gregaria; uola alba, sica
caudicans; pileo carnosso, levis, convexo-
plano, umbilicato, sico ^{*} minore sericello
caudicante; margine levi, 5-8 cm. lato;
lamellis longe attenuato-decurrentibus,
latis, confertissimis, albis, pallescentibus;
stipite aequali, mox cavo
compressoque, sursum ^{bas. vix ~~se~~ villosa} nudo, 5 cm. longo;
sporis ~~8~~ μ longis;

Ussero. Simile a Clit. pitagophylla
pitagophila, tanto che ne differisce solo pel
pileo ^{piu} evidentemente umbilicato e
le lamelle ^{piu} lungamente decurrenti.
Spore secondo Bresadola (Mf):
Spore 5 = 3,5-4;
trifidi 28-25 = 4

43 Chytomyce tuba (Fr.) Gitt. Champ. Fr. p. 139 (1874)

Sacc. Syst. V p. 195, Agaricus tuba Fr. Ep. p. 72 (1838)

Mon. Fr., Gen. Hymen. t. 51 f. 2.

Bibl. 96, 983.



Hab inter folia, praesertim in pinetis + Nizzardo (Bade) ; Trento : bosca di Tergolas (Her. MS.),

Area sive Europa, Australia

~~Alp. maritima.~~ ♀

Aest. Aut.


Panicum 21-36

(Caespitosa barbae comata, 16-20 cm. alta); fides
convexo usaequaliter rotundato, dein umbilicato,
depresso et infundibuliformi, plus minus excentrico,
7-10 cm. lato, albedo-plumbeo, centro flouillis
cotoneis albis confesso, tenuiter radiato et jove
udo aspectu striato, margine tenui, levi, lobato-
undulato, reflexo dein apice; lamellis inaequali-
bus, tenuibus, antice angustioribus, longe striato-
decurrentibus, ea albedo pallido-subroseis; stipite
5-9 cm. longo, 5-10 mm. crasso, farcto, subgy-
nidrico, tenaci, flexuoso, albo, basi tenuiter villosa;
carne tenui, elastica, alba, inodora, fere in-
frida; spicis albis.

42 *Chitoybe Parizzii* (~~Costa~~) ~~Ag.~~ Barla Champ. alp. mar. p. 75 t. 61 f. 1-2 (1892)

Sacc. Syll. XXI p. 36. *Agaricus Parizzii* Berk
non. ~~Recht. *Chitoybe* ~~Costa~~ ~~Ag.~~ ~~Ag.~~ ~~Ag.~~~~

Agar. polymorphus
Parizzii in litt.

Britt. 95  immixtam ♂ ~~Nigredo~~ Liguria:
Hab. ad terram substantiis conariis Alp. ~~Maritima~~ S. Remo (F. Parizzii)
Area distr. Gallie, Italia. x

Januario

ericetorum 175

(Odor gratus; alba, Seta tenax, elastica, arida, flaccida)
pileo caroso, e globo plano concavo, subumbonato,
non ~~hygrophanus~~ glabro, sicco, nitido, 2,5 cm. lato; lamellis brevibus de-
currentibus, distantibus, latis, venoso-connatis; stipite
sarcato, brevi, tenaci, glabro, dorsum attenuato, 2,5
cm. longior. miciali, 4-7 mm. crasso, interdum
compresso; sporis ovoidibus ~~4-5~~ 4-5 = 2-3 ;
basidiis 20-25 - 6-7 →

Offero: Satura delle più piccole forme di Hygrophanus
pratensis o di Hygroph. niveus (sec. Bresad. My)

41 *Chrysomela ericatorum* (Bull.) Gail. Champ. Voss. p. 89 (1872)
Sav. Lyll. V p. 195, *Aganox ericatorum* Bull. Champ. Fr. t. 351 p. 1 D-F (17.)
Journ. Bot. Champ. Alp. Marit. t. 62 p. 1-5, Bresadola F. Trid. t. 113.
Bibl. 81, 94, 95, 209, 234, 244, 704, 983, 1663 →
Hab. in graminis apricis: Liguria, Veneto, Trentino, Toscana, Aust. Aust. Φ (in Höhen)
Area distri. Europe, Transilvania
(: Tergolay (Bres. MS), Marne &