

Roswell
13

40/0008 -1

Herr Professor
G. N. Saccardo

G. Padova

Abs.: Association Internationale
des Botanistes

Gustav Fischer, Verlagsbuchhandlung, Jen.

Rousseola

Compositus synanthicus speciem

- I: Pilus ubique carnosus, margine inflexus, extensus, atque pellicula viscosa discreta; lamellae inaequales; caro compacta, firma. (I Compactae)
- 1) Caro fracta rubescens vel nigricans R. albo-nigra
 - A = Caro alba, fracta nigricans
 - B = Caro fracta rubens, denum nigricans
 - a = Stipes obscurus; pilos umbilicatae - depressus
 - b = Stipes cylindricus; pilos non umbilicatus
 - 2 = Caro immundabilis
 - A = Pilus albus vel pallidus { pilos ex albo ad albescens
 - 1 = R. delica
 - 2 = R. nigricans
 - 3 = R. densifolia
 - B = Pilus coloratus
 - a = Lamellae rotundatae adnexae; pilos lutescens fuscus
 - b = Lamellae adnatae vel ex ducto decurrentes
 - a = Pilus et stipes cinereo-fuliginei
 - b = Pilus albus fuscescens; stipes albos
- II = Pilus aliquo ex his nolis carens
- 1) Pilus pellicula viscosa carens, siccus, rigidus, cuticula in floccos vel granula fatiscens; lamellae rigidae furcataeque. (II. Granulato-rimosa)
 - A = Lamellae semper albas vel albidas
 - a = Pilus primus albus
 - a = Pilus dein albuscens - albus
 - b = Pilus dein virginea -
 - B = Pilus primus coloratus
 - a = Pilus viridis (undernum lutescens)
 - b = Pilus sanguineo-rosso, disco albicans
 - B = Lamellae flavidae vel albidissime incrustatae
 - a = Pilus albus, rosso & cinchonae demum albuscens-expallens
 - b = Pilus purpurascens, sanguineus vel olivaceus
 - a = Caro alba; pilos obscure purpureus vel sanguineus; lamellae atavatae
 - b = Caro subfuscatae; lamellae adnexae
 - A = Pilus rosea-purpurea, disco albo-lutescens; stipes clavatus
 - B = Pilus et solida purpurea olivacea vel omnius fuso olivaceus; stipes ventrosus
 - 2) Pilus pellicula tenui seleni jove udo viscosa rimuenda diffusa
 - separata petita. (III. Indigentes)
 - A = Lamellae decolorantes
 - a = Lamellae adnatae
 - a = Lamellae simplices { flavo albuscens-olivaceae, caro mollius
 - b = Lamellae furcatae { flavidae, caro compacta
 - B = Lamellae liberae vel adnexae
 - A = Pilus albidus, stramineo-virens
 - B = Pilus albus coloratus
 - a = Caro alba piperata, rosam redolens
 - b = Caro sub pellicula violacea, nitida
 - C = Pilus umbilicatus, olivaceus
 - D = Pilus non umbilicatus
 - A = Caro dis color vel saltu in coloribus colorata
 - a = Caro acris

← = Caro lutea, lamellae ex alto pellicula
R. pulvillaris var. lepraria (Pan.)

B = Caro rubra vel rubens

1 = Caro alba in velutinis obtracca; pilos

2 = Caro rosea carnea, ambina obtracca

3 = Caro alba, sub pellicula rubra v. rosea

4 = Pilus violaceo-niger v. fulvo

5 = Pilus rubro v. rubromaculatus

6 = Caro multe cinereosens vel flavescens

7 = Stipes pruina rosea conspicuus

8 = Stipes ex albo cinereosens

9 = Caro semper albita vel crema.

10 = Lamellae e flavo erido obtraccae

11 = Lamellae ex albo flavae, luteolae, vel ochraceae

12 = R. lactea

13 = R. galactochaeta

14 = R. virginea

15 = R. lutea

16 = R. aurora

17 = R. incarnata

18 = R. albuscens

19 = R. exculta

20 = R. mollis

21 = R. maculata

22 = R. grisea

23 = R. olivacea

24 = R. elegans

25 = R. quinella

26 = R. substra

27 = R. roseopilea

28 = R. decolorans

29 = R. naucorella

α_1 = Nauseosa, subfasciata; lamellae n.
tidae, ex albo flavore - - - - - 30 *Russ. nitida*

β_1 = Odor nullus vel gratus

α_2 = Stipes striatus vel crassus,
pruinosis - - - - - (R. mollis)

β_2 = Stipes non pruinosis

α_2 = Stipes mox lacunoso, caving 31 *R. Tureci*

β_2 = Stipes spongiosus-farcitus

α_2 = Pileus brunneus, ochraceus 32 *R. fuscipes*

β_2 = Pileus albus coloratus
+ Lamellae ex albo
folidae, flavo-pulveraceus 33 *R. integra*

++ Lamellae ex albo ochraceae var. Adelphiana

$\Sigma \alpha - \beta =$ Lamellae non decolorantes

α = Lamellae coloratae

α = Margo pili semper levis

α_1 = Lamellae adnatae

α_1 = Lamellae lutescentes

α_1 = Sapor acris

β_1 = Sapor nitidus

β_1 = Lamellae sulphureae vel pallide flaventes

α_2 = Pileus badium, purpurascens, caro sub
ute violacea

β_1 = Lamellae liberae vel adnatae { caro alba seu grisea
alba, levior

α_1 = Caro alba; pileus e luteo expallens

β_1 = Caro grisea, vel sub utte violacea

α_1 = Caro valde piperita; pileus badium

β_1 = Caro nitida; pileus e fuso lutescens

74 *R. sardouina*

25 *R. cærulea*

56 *R. badia*

37 *R. Clusii*

38 *R. atropurpurea*

39 *R. lutea*

(*R. badia*)

40 *R. ravidula*

β = Margo pili demum striatus vel substriatus

α_1 = Lamellae albitantes, arie tantum flavo-citrinæ

β_1 = Lamellæ unicolor coloratae

α_1 = Pileus tuberculatus dissoloribus compressus { lamellæ forcatae 42 *R. punctata*

β_1 = Pileus unicolor { lamellæ integræ 43 *R. purpureo-bicolor*

α_1 = Pileus e flavescentibus pallidus - - - - 44 *R. virginalis*

β_1 = Pileus lutescens, rosaceus, vel purpurascens

α_2 = Stipes albus - - - - - 45 *R. chamaeleonitis*

β_2 = Stipes pileo concolor - - - - - 46 *R. ochracea*

b = Lamellæ albæ vel albidæ

α = Lamellæ adnatae vel decurrentes

α_1 = Pileus marginatus levius

α_1 = Pileus infundibuliformis

α_1 = Lamellæ tenues, subfurcatae, confertissimæ,
pileus velutina sangvinineus - - - - - 47 *R. sanguinea*

β_1 = Lamellæ crassisculæ, furcatae, subdistantes,
pileus murexianus rubens - - - - - 48 *R. bifida*

β_1 = Pileus vix depresso

α_1 = Pileus umbonatus, olivaceus, vel griseus - - - - - 49 *R. lutescens*

β_1 = Pileus e roseo vel carneo expallens

α_2 = Pileus compactus, guttato-variegatus - - - - - 50 *R. rosacea*

β_2 = Pileus respirabilis, carnosus, non guttatus - - - - - 51 *R. veterina*

β_1 = Pileus lobos vel ad marginem demum striatus, rugulosus,
vel subrugulosus

α_1 = Pileus violaceus albo-marginatus - - - - - 52 *R. violaceus*

β_1 = Pileus alibi coloratus

α_1 = Caro adha hyalina; pileus fere membranaceus,
purpuraceus vel lutescens - - - - - 53 *R. pullaris*

β_1 = Caro alba, cinerea, vel ex albo straminea

- β_2 = Pilus umbonius, olivaceus, vel griseus
 stipes albus - - - - - 54 R. sororia
 β_2 = Pilus albus coloratus
 α_1 = Leccinum, tota sanguinea 55 R. fellea
 α_2 = Mitis vel leviter acris
 α_2 = Pilus carneus ruber 56 R. versa
 β_2 = Pilus luteo-citrinus 57 R. citrina

I. 2-B-6 -

β = Lamellae liberae vel adnexae

A_1 = Sapor acris

a_1 = Odor nauseosus

α_1 = Margin tuberoso, ciliatus; odor empymumaticus

gravidus - - - - - 58 R. foetens

β_1 = Margin pectinata - ciliatus, odor debilis - - - 59 R. pectinata

b_1 = Odor nullus vel gratus

α_1 = Lamellae liberae

A_2 = Pilus e luteo expallens numquam rubens 60 R. ochroleuca

B_2 = Pilus primo roseus, post sanguineus deinde ful-

vis, ochroleucus, aut albus - - - - - 61 R. emetica

β_1 = Lamellae adnexae

A_2 = Lamellae candidae

B_2 = Lamellae albidae vel aquose pallentes

62 R. fragilis

63 R. fallax

β_1 = Sapor nitidus vel dulcis

a_1 = Stipes ex alto inveniens

64 R. depallens

b_1 = Stipes albus vel basi tantum coloratus

α_1 = Pilus plus minusve viridis, levis

A_2 = Caro sub pellicula rubella

65 R. cyanoxantha

B_2 = Caro alba

α_2 = Pilus aerugineo viridis, lamellae con-

ficiorimae - - - - - 66 R. aeruginea

B_2 = Pilus griseo-olivaceus - vel

lilacina - viridis - - - - - 67 R. lioidea

β_1 = Pilus coeruleus, violaceus, vel purpureus, num-

quam viridis

A_2 = Stipes basi roseus, pilus violaceus

vel purpureus - - - - - 68 R. lilaeca

B_2 = Stipes albus; pilus coeruleus - - - - - 69 R. azurea.

+ Pilus carneus - - - - -

var. carniolica

Russula - Pers. Jr. Epic. Hym. p. 349 (1836)
(*Ctym. russulus rubescens*)

Velum nullum. Hymenoflororum in frannam vesiculosam immuta-
tum dependens. Lamellae rigidae, fragiles non lactescentes, aie auctare.
Sporae ^{globosae s. subglobosae} rotundatae, ~~zecfoc~~ crenulatae, albae vel lutescentes.
Fungi terrestres, carnosi, pubescentes, stipite folio, pileo primis vel
deum depresso.

Osserv. Le Russule aderentes formano un gruppo naturale affine al genere *Lactarius*
ma distinto per la mancanza del latice. Però le varie specie generano delle gocce
acquose, specialmente col tempo piuvoso. Le lamelle di moltissime specie
sono ugualmente lunghe e forcate, ma in alcune sono affatto diseguali.
Le specie ^{sono} per lo più grandi ^{di alcune specie}, spesso ^{grande} perciò ^{piuttosto} ^{difficile} ⁱⁿ ^{determinare} ^{cause della} ^{specie} ^{varia} ^{dei} ^{cappelli} ^{e dei} ^{colori} ^{del} ^{cappelli} ^{non} ^{si} ^{determinano} se un così grande cappello è nero o nero. Dobbiamo comunque che
quei presentiamoci i centromerk delle specie italiane come ci viene affidato da micologi nostri.
E' pur troppo presumibile che alcune di queste specie non siano esatte. Finché non si avrà
una perfetta monografia di tutto il genere su solide basi anatomiche, biologiche e morfologiche, la determina-
zione si stabilita.

zioni d' molte specie riuniranno sempre insieme. Dall' ultimo foglio Dato
dal prof. R. Maistre / h - comprend quanto è intralciata la nomina !

(in Bull. Soc. Fr. 1910)

Le fallacie

Per le numerose specie altre 1000 N. (apron) acre di pepero
a tagore nile o dolce. Quest' ultime sono tutte inoffensive o mangerecce,
però però le ultime, le più niente d. Pepero sono e regido.

I Russula albo-nigra ^{I Compactae} (Krombh.) Fr. Hymen. Corp. p. 140 (1875)

Sac. Syll. fung. IV p. 454, Agaricus albo-niger Krombh. Abb. IX p. 27

t. 70 f. 16-17 (1845)

Zurn. Krombh. I. c., Cooke M. Br. F. t. 1016

Brot. 1301

Hab. in granulosi, muscosi - Piemonte: Valli. Val d'A. a S. Lorenzo, rara.

(Fagod). Adete - aut. +.

Aree siccis Boemia, Italia.

Opp. Sac. Gal. II. mycol. p. 351 non è diversa da Russ. adusta

3 albo-nigra 454

(caro alba, fracta nigricans;
Statura abnormis; f^{usco} sapor suba-
crio, non gratus); fileo carnoso, con-
vexo-plano, medio depresso, demum
infundibuliformis, viscoso, albido,
circa marginem ^{exostis ypsorum} fuscum, pro ratio-
ne stylitis tenuis, subrepando; lamellis
decurrentibus, confertis, maequalibus, fusco-al-
bidis; stipite solidi, ^{oransissimo} obeso, fusco-^{nigri-}
cante, brevi. — ↗

(Bally)


2 Rustula nigricans Fr. Epocr. p. 350 (1838) 212 st
Sau. Linn. Journ. V p 453 Agaricus nigricans Bull. Champ. t 5. 79 f. 2.
Journ. Bull. l. c., Boek Champ. Ric. t. 14, Krombh. Abb. t 70 f 14-15,
Langu. F. d' Rome t 51 f 2
Bull. 39, 61, 209^{2nd}, 90, 103, 417, 418, 434, 639, 656, 856, 866, 923,
983, 1219, 1284, 754, 693, 1965, 1502, 101, 868, 1301, 1052 ~~O~~ →
Hab. in silvis & Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino,
Darsia, Toscana, Lazio, Napoletana, Calabria, Sicilia → Tergolas e Logne male'
Area Nth. Europe

(Pres. M.S.)
Carolese (Mass. of Br.)
Tirolo Gralp. Graue (Heimdal)
Aerata = 

(Succus rubens, sed non lactescens, unde varo)
fracta et lamellae jam tactu rubentes;
pileo aequaliter carnosso, compacto, umbili-
cato-depresso, olivaceo-feligneo, saepe
rimoso-squamuloso, juniore uido, viscidulo,
12 cm. lato, margine inflexo exstro^z,
adusto-nigricante; lamellis rotundatis,
crassis, distantibus, inaequalibus; stipite
solido, obeso, demum adusto-nigricante, 8 cm.,
longo, 2,5 cm. crasso; sporis sphæ-
roideis, papillatis, 6-7 μ diam. vel
8-9 = 6-7 vel 9-10 = 8-9, levibus, subglo-
bovis, 1-guttulatis, crassis; basidiis 40-45 = 8-10



3 *Russula denudipes* (Soc. cr.) Gill. Champ. p. 231 (1876) (1833)
Jac. Syb. fung. V p. 454, *Agaricus denudipes* Soc. Myc. Suiss. p. 476
Jou. Gillot, Champ. t. ~~102~~ 113, Cooke M. Br. F. t. 1017, Patouillard.
Tab. anal. p. 119.



Hab. in humidijs - Piemonte sec. torrentem nr Valle Antrona, Vall. Valdah (Fayet)
Area distr. Europe, Amer. bor. Aest. +

Densifolia 454

Claro alba, rufa rosea, demum nigra;
Pileo carnoso, compacto, convexo, dein depresso,
margine inflato, levi, exstrio, albido, demum
fusigineo, griseo vel brunneo centroque ni-
griante; lamellae adnato-decurrentibus, inae-
qualibus, albis vel subroseis; stipite
brevis, cylindricus, levis, hinc pruinosa, albi-
do dein griseo, demum griseo nigriante;
sporis 7-8 μ diam. muriculatis. — ▾


Diff. Affine a Russ. nigricans. e R. adusta

4 Russula delica Fr Ep. p. 350 (1838) *Colombina bianca*

Soc. Lyt. fung. V p. 155,

Nom. Vent. Mic. Bresc. t. 68 f. 3-4, Battarre J. Arim. t. 17f A.

Bresc. Z. Tis. t. 207 et F. mag. t. 68

Plat. 39, 103, 234, 242, 407, 618, 585, 639, 641, 731, 866, 1015, 1031,
1091, 1219, 1289, 631, 693, 1965, 101, 1345, 1663 

Hab. in pratiq. ^{Piemonte}: Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia, Toscana, Liguria,
Cortina, Napoletano. & Aest.-Aut. R.
Area dist. Europe, Turchia

C. Gorgadore (Bresc. MS.) Cavalese (Mass. et Br.)
Tivoli et alp. Uarna (v. Höhn.)

~~assimilata~~ ~~reichenbachii~~ ~~decolorata~~

011. Una var. a carne d'cipolla molto sana, a lamelle alle fine sciolte, spesso forate, a spore
in massa sciolte e indicate dal Bres. MS., come raccolte ^{gire} a Gorgadore -

Lo Schrot. Ichb. T. 549 citò R. delicia (Vail. 1729); ma in Vail. non si trova un tel
nome.

Delica 455

Caro exsucce et totus fungus immutato
albus; pileo aequaliter carnose, firmo
umbilicato, levi, nitido, 8-14 cm. lato, albo
regulari, polito, glabro, cum minore albulo;
margin'e involuto, glabro, estio ^{et} albo;
lamellis decurrentibus, tenuibus, distantibus,
albus, prorsus exsuccis, junioribus tantum
aqua florantibus; stipite solido, compacto,
albo 2-6 cm. longo; 1,5 cm. crasso;

Sporis in cumulo albis, sub microscopic hyleinis,
subglobosis, 1-guttulatis, subulosis 8-10=6-8
vel 9-11=8-10; basidiis 41-48=8-11

cystodis rariss subfusoidis 50-70 = Ø ad apicem
acum lamellarum tantum - ↗

Osserv. Somigliantissima a Lactarius velleucus con
ui spesso e confusa; ma se ne distingue
per caratteri del cappello e per le lamelle,
~~non emanante il suo~~ (non tolligineose)

5 Russula chloroides (Krombh.) Bres. T. Trid. II p. 89, t. 202 (1900)

Agaricus chloroides Krombh. Abb. Heft. VIII p. 7 t. 56 f. 8-9 (1843)

Lactarius extrucus Sm. et Cooke sec. Bres. l.c. nuc Otto

non Bresad. l.c., Krombh. l.c. Cooke III Br. F. L. 98, #Bibli: 234

Hab. in aliis aceris et fonsos frequentibus: Trentino, ad arbores alib.

Area distributionis: Europa, Amer. bor.

Pileo carnoso e convexo-plano depresso-

gibus from California, marginie revoluti, pubescens, mox glabro
e pallido luteo avellaneo, tempore siccis areolato-rimos. 6-14 cm lat.; lamellis
latis subcoerolis, subdecurrentibus v. levitudo adnexis, dimidiatis commissis
fundo denum venoso-conjunctis ex alto glauco-aerugineis, senio laevi
griseo-maculatis; stipe solido, ruguloso, aequali. v. decolor subtemnato, 3-6
cm. long., 2-3,5 cm cr., albo tenui pileo concolor, quandoque apice glauco-
zonato; carne alba graminea, foecunda, sapore subpiperata; spori subglobosis,
hyalinis ochraceis, 8-11 μ. diam. 55-65 = 12-16; hymen oleiferis
cystidicibus 80-90 = 8-10 ad superficiem lamellarum guttulas aquae extundentibus.

Diff. dall' affne R. delicia, ^{diff. per la guttula aquae extundentibus.} ~~in capite~~ ^{in capite} ~~diff.~~ ^{diff.} Natura maggiore, per il pileo mens
somentoso e più colorito e per le lamelle spesse da giorno macchiate di verde glauco.

Peck 43 Rep. p. 20 t. II f. 5-8 (R. brevipes).

J. Antonio (Bres. M.S.)
Tegole, Tzenga, Tirolo Walp.
Narne (v. Höhne) 

chloroides

Manc. no. 1 hill

loc. in XX reg. 700' above R. parvulus

1157

Xg

6 *Russula mustelina* Fr. Sp. p. 151 (1838)

Sauvage Fung. IV p. 155

Icon. Krombh. Abb. t. 61 fig. 8-9, Cooke M. Br. F. L. 1018, J. S. Champ.

t. 535

Bitt. 886.

Hab. in silvis - Trentino: bosco di Calabro & Ortole (Pres. Ms.), Cavalese (Mest. of Br.)

area sicc. - Europa

Durhaj, Piemonte - Valle Valder (Fayod)

ipav. & Parma (Pass)

Autunno =

PL

Non nigrescit), piko aequaliter carnosò
firme, e convexo. Depresso ^{luteo-fusco} ~~copaco~~, ^{ad vario} marginè
primo infleso, etiam repando levi.
~~reflexo, levè;~~ lamellis rotundato-adnatis,
confertis, connexis, albis, paucis dimidiatis;
spite solido, firme, pallido; sporis
albis, echinulatis $8-11 = 8-9$ - ↗

Omnis. ~~Casta~~ al tipo comune delle Runate
mod. raffello.

7 *Russula adusta* (Pers.) Fr. Epicr. p. 350 (1838)

Sauv. Syst. Fung. IV p. 454 *Agaricus adustus* Pers. Syn. p. 459 (1801)

Non. Knobell. Abb. t. 70 f. 7-11, Battarra f. Arim. t. 13 f. C, Bern. Ch. Roch.
t. 46 f. 1 et 47 f. 2, Rolland Att. t. 61 f. 89.

Bull. 61, 90, 103, 430, 434, 585^a, 704, 737, 866, 983, 1015, 1031, 1091, 1133,
631, 1965, 693, 848, 1

Hab. in nemoriaz: Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia,
Tans, Sicilia, Corfù, Corfu, Estate, f. Emilia, Toscana, Repub.
Area desti. Europa, Amer. bor. Trentino: Zugenz (Buz. ms.) Carabro (Matt. Pres.),
Trento: Gatzl.. Narne (U. Höhn.)

variolosa

adusta 454

^{Ex success}, carne immutabili, denum
adusta, non vero tota nigricans;
pileo aequaliter carnosus, compactus, e
depresso subinfundibuliformi, margine
primo inflexo, glabro, dein erecto,
extrio, cinereo-fuligineo, 8-16 cm. lato;
lamellis ex adnato decurrentibus, tenui-
bus, confertis, inaequalibus, ex alto +
sordidis; spipite solido, obeso, cinereo-
fuligineo, 2-3 cm. longo; sporis
Aphaeroideis, echinulatis, asperulis,
vitreis 7-9 # dram. vel 10 = 7-8;
basidris 35-40 = 9-10

~~Ottewi:~~ La Russula adusta Krombh. ~~# 70 f. 12-13~~
~~sembra specie distinta, molto simile a~~
~~Russ. delica quanto a struttura, ma diversa~~
~~per cappello "pallide fuscus, (cerino della~~
~~seconda la figura), e per la carne cinereo-grigia~~

8 *Rustula elephantina* (Bolt.²) Fr. Sp. v. p. 350 (1838)

Sau Sy M. ^{M. 1854} p. 455. [?]*Agaricus elephantinus* Bolt. Hik. Fung. p. et tab. 28 (1788)
Tern., Bolton L.C. Britzelm. Hymen. t 490 p. 36

Bol. 51, 983, 866

Hab. in silvis regnorum campastris

Agaric), Emilia pro. n Parma
(Pasteria?)

presso Voltri (Baglietto) rest. aut.

455 *Elephantina*

Carnosa, firma; periferia flessuosa latoe filosa
hanc admodum compactus; filo flessibile
non discuta, ~~marginello~~ filo aequaliter
carnoso, firmo, umbilicato-convexo, glabro,
elutaceo - fuscescere, marginello excedente,
infacto, undulato, pallidior, castaneo;
lamellis ^{marginatis,} obtuse ^{autem attenuatis,} arcuatis, subcon-
fertis, ferrugineis, albis (gibbo - maculatis);
stipe ibus, obeso, alto si sporis 14 = 10

Ha l'aspetto
Osserv. ~~glietto~~ di R. foekens me sarebbe
separante diversa in differire nei caratteri
della carne e del cappello. Sec. Quel.
Fl. mycol. p. 351 sarebbe una forma
adulta alterata di R. debida, ma probabilmente
l'è un agnovo.

9 *Russula lactea* (Pers.) Fr. ^{II Granulato-rimosae.} Epis. 355 (1838)
Sau syst. fung. IV p. 459, *Agaricus lacerus* Pers. Syst. p. 439 (1801)
Icon. Kromb. Abb. T. 61 f 1-2 Cooke M. Br. F. t. 1070
Bibl. ¹⁹⁰ 209, 417, 418, 434, 737, ⁹⁸³ 1133, 1253, 1920 
Hab. ad serram nudam in silvis: Veneto, Trentino, Toscana, Sardegna.
Napoletano. Lg. Nizza (Barla ex Pers. Ms.). Ad lat. 
area nata. Europa, Amer. bor.

lactea

459

Ritellus, lactea; pileo carnoso, compacto &
& ex unicolori rivulato, primitus albo,
campanulato, sicca, dein subtaceo-albo,
rivuloso, convexo-depresso et saepe exca-
trico, & curv. lato, marginis recto, tenui,
obtuso, levii; lamellis liberis demum adnatis,
latis primis, crassis, distantibus, rigidis, tan-
genteque furcatis; stipe solido, centro gran-
uloso licet valde duro, compacto, obeso, 4-5
curv. longo, 4 cm. usque ~~cratto~~ crasso; sporid
hyalinis subglobosis, laxe echinulatis,
8-6 µ diam., basidiis 45-50 = 8-10
cystodigi 50-50 = 10-12

Cult. Molto affine a *R. lepida* di-
ci sembra una varietà bianca
(Bres. Ms.)

10 *Russula galochroa* Fr. Obs. I p. 65 (1815)

Sauv. Syst. fung. IV p. 466,

Icon. Battarra F. Ariv. t. 12 f E, Bull. Champ. t. 509 f G.M.

Cooke Ill Br. F. t. 1089.

Bitt. 103. 693

Hab. in Slovakia agr. Arimicensis (Lombie), Alpinum maritimum (Gmelin)

Flor. myc. p. 349 /, ^{Cossice Resolute} ↗ ↘

galo phaea 466

Pileo primis lactes, dein vircente,
rarus maculis floccosis albis ~~et~~
marginis ~~flaccidis~~ disco ~~variolosus~~
et in disco verrucis floccosis
spongia ¹⁰⁻¹⁵ lato ¹⁰⁻⁸ cm adnotata
adperso. Caetera ~~R. heterophylla~~
R. livida, qua minor.

Operc. I fiuchi maculiformi o verrucosi
nel disco per misura e già ful colore
differiscono da quelli di R. viridescens
e sono rari. H. Quel. Fl. myc. p. 369
la pone come ~~paragone~~ R. R. hetero-
phylla

11 Russula vesca (Schäff.) Fr. Ep. or p. 355 (1838) ^{Verdone, Verdone}
colombina verde manivata
Sacc. Syll. fung. IV p. 160, Agaricus vesca Schäff. Tc. fung IV p. 40
t. 94 excl. f. 1 (1774)

Icon. Schäff. t. c., Vitt. F. mang. t. 31, Park Chany. Rice t. 16 f. 10-12,
Venturi Nic. Bresc. t. 17 f. 1-2, Long. F. & Roma t. 50 f. 1,
Bollettino Accad. Bresc. F. mang. t. 69

Bitt. 34, 39, 61, 90, 209, 242, ²⁶³ 304, 369, 357, 417, 418, 434, 564, 1965, 848
653, 656, 662, 690, 704, 699, ⁷⁰⁰ ⁷⁴⁰ 836, 886, 923, 983, 1219, 1228, 1284, ¹³⁰¹ 756, 1502

Hab. ^{Chondr. v. mixta} in litoria et in litoria : dalmatia, Piemonte, Lombardia, Trentino, Canton

Trau, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Neapolitano. ^{Aust. Aut.} A

Area distr. Europe, Amer. bor., Japonia.

Ingenza sopra il Padajo
Gocciadore, (Rho. M.), Valle
d'agarrica (Cob.) Tirolo
italy. Karne (v. Höhn.)

Portaria

Exs. Cav. Long. n. 104

Virescens 460

~~Non semper viret sed etiam lateat; nitid;~~
~~Mitox~~^{Mitis}; pileo carnosus, firmus, & globosus
expansus, ^{virescente, raro latente} unatibiculatus, innato-floccu-
loso areolatus ^{punctis in areolat secedente} verrucosus, margine
recto, obtuso, levius, 8-12 cm. lato, saepe
inaequali, semper nictus; ~~cute in areolat~~
~~lamellis liberis, subconfertis,~~
maequalibus furcatisque, albidis;
stipe spongioso-solido, valido, subri-
vuloso, albido, 6-8 cm. longo; sporis
sphaeroides ^{minutis}, echinulatis, aculeolatis,
1-gustulatis; hyalinis
6-7 μ diam. vel 8-9 = 8.
radius 30-40 = 7-10; cystidius
65-75 = 9-10 (Bres. ms)

12 *Ruthika lepida* Fr. Sp. p. 355 (1858) sopra dolce

Sau. Syl. Jang. II p. 661

Icon. Fr. Iver. Champ. t. 59, Krombh. Abb. t. 62 f. 19, 20, Bresad. F.

mang. t. ~~205~~⁷⁶, F. Ind. t. 204, Vitt. J. mang. t. 38 f. 2 f. R. ~~sanguinea~~ sanguinea)

B. 61. 234, 242, 733, 886, 1031, 1133, 631, 1228, 1920, 693, 1301, 1683, 754

Hab. in nemorum ^{Piemonte} Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Corsica

Area distr. Europa, ^{Tunisia} Amer. bor.

Cavalese (M. at Br.), Tirolo (Salp. Narva (v. Holm))

Ingenza, Gocciadore (Br. M.)

Aestata



Var. palcherrima Gill. Champ. Fr. p. 275. f.

magine lenticulari rubra.

B. 754 Veneb. ^{herbosam} in hirs. vallis ~~Fregona~~ ad terram - Veneto: Balicatena (Manc.)

764 ~~Manzoni~~

Lepida

461

Caro fumosa sed caseosa, non grumosa; mitis;
pileo subaequaliter carnoso, compacto, e convexo
depresso, impolito, sericello rimisso - leua-
mico, sanguineo-rosso, expallente, disco
sempre alborente, margine patente, obtuso,
~~lato~~ exstio, & un. lato; lamellis
rotundatis, crassiusculis, subconfertis,
multif furcatis, altif; stipite solidi,
compacto, levi, albo-rossiccio, & un.
longo, 2,5 cm. crasso; sporis globosis
8-10 = 8-8, in cumulo albo-stra-
mineis, sub microscopio hyalinis, glabrae
eclivulatis; basides 35-40 = 9-11, cysti-
dies 60-70 = 8-9 vel 70-80 = 9-11

Obser. Un esemplare raccolto da Pretadola (Ms.) ha avuto
il cappello "ad marginem retro-fusco-velutino-purpureo,
e le lamelle coll'apice rosso.

Questa specie è molto simile a R. rubra, ma è
certi diversa. A. rosacea Pers. obs. certi appa-
riene alle specie più robuste e ~~con~~ con striate, perché
è anch'esso mitis.

13 Russula aurora Krombh. Abb. et Descr. IV p. 11, t. 66, t. 4-7 (1845)

Sau. Syb. Frang. V p. 470.

Hom. Krombh. l.c., Bresadola F. Trid. II p. 205
Pl. 274.

Hab. in nemorum prandis, Gocciadoro pr. Tridentum. det. aut.
Area distributionis Europea. ♂

Mes conico e convexo - depresso, margine extro, nro, pruinoso inchoeato ochroleuco, dein iabellino - incarnato s. aureo, centro persistenter ochroleuco, 6-12 cm. lato; lamellis compactis, non nullis foratis, postea levigatis v. rotundata adnexis alibi, aestate stramineis interdum acie minute denticulatis et crenatis. marginem iabellinam; spiculae fuscatae, semiv. subfuscatae, rugosae, subapicali, albo, raro lateribus carnos - iabellino tenui, 5-6 cm. long. 1,5-2 cm. cr.; carne alba, caseosa, compacta, nutr. ad post mordacitionem subpiperata, odore grato, vis sensibilis; sporis hyalinae coacevatis stramineis globulis, echinulatis testu hymenii ut in Russ. epid..

Diff. dall' appur. Russ. epid. da diffusse pel colorito costantemente diverso e per le stipe un po' maggiore.

Aurora 470

14 Russula incarnata Quel. n. nom. Fr. avanc. Sc. 1882 p. 10

Sauv. Syll. fung. V p. 660

Icon. Barla Champ. Ric. t. 15 f 11-13 (R. lactea).

Bi-bl. 90, 1133, 983, 1920 (Carabro (Mall. et Br.) sub alpis supra is Pondicella Major

Hab. sub Pinij: Liguria, Trentino (Bresadola), Toscana. = festiva /
Rree distr. Gallia, Ital. bor.

-P-

Ott. Soc. Quel. Fl. Mycol. p. 349 molto affine a R. lactea

incolumata

460

(Carne granosa, alba, dulcis, sapida);
pileo convexo - depresso, 5-9 cm. lato,
farinoso, dein areolato, albo } roseo - tincto,
densum glutaceo - expallente; lamellae
adnatis, latis, bifurcatis, rigidae, albo-
flavidae; stipite faret, firme,
fruinoso, niveo; sporis elliptico - sphaericis
grossa. aculeolatis ^{vel minute echinulatis} & hyalino citrinis
1- guttulatis, ~~hyalino~~, nucleo hyalino
et episporio flavidio, in cuncto albis;
~~8-9~~ ⁶⁻⁷ μ diam; basidiis
 $25-30 = 6-7$; cystidios $50-60$ ⁻⁷⁰
(Bres. MS)

Oss. Spore 6-7 μ diam.

15 *Russula Linnæi* Fr. Epior. p. 356 (1838)

Sav. Syst. Fung. V p. 402. , Agaricus integer B. Linn. Sp. pl. I ed. p. 117 (1753)
Gen. Fr. Tern. Hymen. t. 172 f 3, Battarra F. Arim. t 15 f E.

Brotl. 103, 434 868.

Hab. in Libia: in agro Armeniensi et Pateruni, ~~Emilia~~ et in Regoltono
Area disti Europa, Australia
(Battarra) (Pateruni)
R

: Pateruni (Comes)

On. Songha a R. emetica ^{ma}; sec. Quel., Fl. myc. p. 363, è una sottospecie di R. lutescens.
Una var. xanthostoma Bres., a carne giallognola e dorso di Bres. M. S. d. Rab.
ti e Terzolay: spore 9-7-8, aculeate, ^{sporangio}, biancastre in cumulo, già in al misurazione,
benuti 20-30-8

Linnæi 462

Mitis; caro ^{floccosa sed} spongiosa - compacta, alba, firma,
crassa; pileo subigne carnosus, planus
depresso, foliato, raro, glabro, spiculatus
unicolor, obscure purpureo, sanguineo
etc., opaco, nec expallente 8-12 cm. lat.,
margini patente, obtuso, cattivo;
lamellis adnatis, subdecurrentibus, crassius
ciliis, via confertis, raro venoso - connexis
panuis dimidiatis, postea vero divisis
ex alto lutescentibus; stipite spin
gio so solido, ^{medio subventris} obeso, rivuloso + rubro,
3-4 cm. longo, ^{2,5 cm.} crasso, intense
sanguineo (sed variat forsan alterius),
obsoletè fibrilloso - reticulato: sporif
albidis, subsaevitico-ellipticis 8-11=8

~~Operc. ^{In cattamento} ~~lattante~~ ~~lattuoso~~~~

~~l'aspetto di R- emetica~~

16 Rustula xerampelina (Schäff.) Fr. Spp. p. 356 (1838)
Sauv. Syb. fung. V p. 463, Agaricus xerampelinus Schäff. Sc. IV p. 49 t.
214, 215 (1774)

Icon Schäff. l.c., Cooke M. Br. F. L. 1057, 1074.

Bil. 1015, 631, 693, 1663

Hab. in Libatia acerosis: Tirolo, a salp. Narne (v. Höhn),

Area distri Europa, Tunisia

aut.

dist. PL

Corsica (Rottan)

Xerampelina s.

Mitis (earo compacta albo-lutescens),
substantia firma; ^{*Mitis*} pileo carnojo, compacto
 convexo-explanato depressoque, ob-pelliculam
 non distinctam ~~quae~~ per semper siccus, vulgo
 rimulojo-punctato ^{levi} opaco, ^{levi} ~~area~~
 roseo-purpureo, disco ex-pallente, albo-
 lutescente; ^{levi} margin'e recto, levi; lamellis
 adnexis, subconfercis, postice furcatis, ex
 albo aliutaceis; stipe valido, firmo,
 clavato, levi, albo rubellove, ^(udo magis rubente) ~~deum~~
 spongioso-molli; ^(ad squame) sporis sordide aliutaceis

$$8-9 = 8-7 - \Delta$$

Obsr. ~~area~~ Prossima a R. integra ne differisce
 per la sostanza rigida; per la pellicole del
 cappello non distinta.

17 Rustule olivacea (Schäff.) Fr. Sp. p. 356 (1838)

Sac-fyll. fung. IV p. 464 Agaricus olivaceus Schäff. II p. 45 f. 204
(1794)

Var. Schäff. l.c., Krombh. Abb. t. 68 f 12-13, Gr. U. Cheng f. 539.

Bibl. 702, 1284.


Hab. in silvatis acerisij Lombardia, Toscana, R
Area dicitur Europa / rest. Aut.

olivacea

464

Mitis; carne alba sublucens; pileo carnoso, convexo-explanato depressoque, sericello & squamuosoque, e sordide purpures olivaceo vel omnino fuso-olivaceo, 10 - 12 cm. lato, margine patente, levi, lamellis adnexis, amplis, luteis, immixtis brevioribus furcatisque; stipe firmo ventricoso, roseo-pallido, intus spongioso, sporis flavis aculeolatis 10 μ diam.

Observ. S'icina a R. rubra ma distinta
per ragion della stipe ^{deistamente} ~~definitamente~~
spongioso, per quel carpello "improntato",
per le lamelle molli e ~~color~~
di color chiaro. Corrisponde a R. alutacea



⑩ 18 Russula alutacea (Pers.) Fr. Epsor. p. 362 (1838) (Ruy. esculenta Balatacea Pers.
Colombina rotula & Giulia
 Russula alutacea Pers. Syn. p. 441 (1801)
 Ida. Syll. Fung. V p. 479, & Agaricus alutaceus Pers. Syn. p. 441 (1801)
Non Vitt. F. mang. t. 34, Krombh. Abb. t. 64 f 1-3, Bader Champ. Piem.
 t. 16 f 1-3, Bréviat. F. mang. t. 76¹ Voglino 1863. anal. T. 84/31.
Bibl. 23, 34³⁹, 61, 90, 209²³⁴, 242, 244, 315, 349, 417, 418, 430, 434^{44b}, 564, 1920
 585, 653, 656, 661, 671, 725, 853, 866, 923, 983, 1015, 1137, 1228, 1238, 631,
 693, 1965, 848, 1339, 101, 1507, 1683
Hab. in blosj. + riguria, Piemonte, Lombardie, Veneto, Trentino, Emilia
 Marche, Forlana, Lazio, Napolitano, Corsica. ^{dest. aut. R}
Area dist. Europe, Amer. bor., Asia, Australia.

Dimaro, Matera;
 sopra il Ponte di Val Roseda
 del Merlo; a Caldey; Gocciato
 ro (Pres. M.S.) Cavallera
 (Mass. Pres.)
 Tir. Citalp. Urna (v. Höhn)

fm. purpureata ^{g. et} ter. Fung. Trid. t. 96 (1889) [fm. purpureata]

⑩

III Integricutes.
 A Decolorantes

4 = Alutacea 479

(Est e massis et fuligineis, dessus
mobili et fragiles) Mitig; pileo carnoso
expanso depresso, viscoso-pelliculoso, decolorante,
vnguentoso vulgo laete sanguineo,
rubro vino atro-purpureo, centro obscurior, s. etiam
pallido v. variegato olivaceo,
in fragedis umbrosis saepe iridi, olivaceo,

8-12 cm usque lato; margini tenui demum
striato-puberuloso carne alba, sub articula cremaea.
Stipite larnellis primi liberis crassis, lati,
aequalibus, subdistans, e flavo alutaceo-ochraceo,
nudis (carne et larnella appressa apparet adhaerens),
sed in forma specie e erythrophloio firmata
stipite lato obtuso sanguineo, liberae persistentes
et ex stipite remotae, postice subundatae); stipite

hongioso, solido, valido, alto rubro, lev.

12 cm. usque longo, 2,5 cm. crass; sporis
10-14 = 9-10, globosis, ciliulatis ~~secalobates~~, ^{clavatis},
osco scando floridis; basidiis ^{v. variegato} 40-45=10-12;
cystidii 65-80=9-12 - X

Alutacea fuliginea Mal ^{lax} ^{matucana} flore 8-10 = X -

7-9 ge diam o finalmente 7-9 = 6-8
" " microscopio dorino jalone, in accanto trans-
curre "

9 l'are anche col cappello da campanulato espanso,
più deformato d'un bel rosso, e le lamelle griglie.


(9) *Rostularia esculenta* (Secr.) Desm. Fagod Cens. Fungh. Vald. p. 85 (1893)
Agaricus esculentus Scov. Myc. Suiss. I p. 678, n. 684 (1833), an. Port. Sav. Syll. X 4779.
 Leon. Vivianum F. d' Heb. t. 60 f. 1^o (*Ag. forcatus* var. *leptophyllus*)
 Bifl. 1301 
Hab. in herbis sylvaticis - Piemonte, Liguria, sp. nei boschi di Castagno (Fagod) ^{aristata} / R.
Area Helvetia, Italia

Filo pulvinato, margine lento striato dove ad subiscido 5-10 cm. lato,
 particulae separabili, pure languida v. subhepatica; carne alba compacta;
 lamellae compactae, integrae, flavidae, ruficreas ochraceae, adnexae, antice
 rotundatae; stipite albo, opaco, subfasciculato, solido, durum attenuato
 4-6 cm longo, 2 cm or.; sporis sphaciac, insulae tuberculatae, 9-11 mm;
 basidiis meiosporae, 5-6 = 10, tetrasporae; cystidie nullae

Ott. affine alle *Ross. alutacea* e spesso confusa con questa, distinguendosi per la carne dello
 stipite. Del filo compete a non molle, per le lamelle non ocreacee, i basidi molto minori
 H. Taylor l.c. cita per questa specie il Vivian. l.c. senza indicare la Sav., ora, l'unica
 fig, che forse corrispondente, è quella sopravvista.

es culenta


20 *Russula mollis* Quel. n. nom. prov. Aranc. sc. XI (1882) p. 11, ex 12
Tall. ligg. fung. V p. 476
Non. Quel. I. c., L'viant Champ. Fr. t 373.
18. II. 1883

Hab. in nemoria: Tirolo (italp.: Uarna (v. Höhn.) ^{Aestata} Best. ?
Area dist. Gallie, Tirola.

mollis

Li 76

(Caro tenera, alba, dulcis, acidula;)
Pileo convexo-plano, tenue, extenso, viscoso
(pellicula separabili) albido, stramineo-virente,
lamellis latis, bifurcatis, molibus, crassiusculis,
ex albo luteolis; stipite molli, inflato,
longitudinaliter striato vel criso, pruinoso,
albo; sporis ellipsoideo-sphaericis 11 μ diam.
aculeolatis, subcitrinis — →

21 *Russula maculata* Quel. in Bull. Soc. bot. Fr. 1873 p. 323, + 5 p.
Sca. hym. fung. IV p. 458
Non. Quel. l. c., Cooke Ill. Br. F. t. 1069. 
Hab. in sbris, impennig. sub Quercu - Trenbo - Gorgadore (Thes. M.S.) ~~estestate~~
F.

Ofl. che varia a fileo ~~intorno~~ pallido col ¹⁰⁰ margine leggermente rosino e a
macchie grigie, è iudete dal Meradole M.S. come raccolto a Mangiass,
Val A - Sole.

maculata

458

Caro alba, piperata et rosam fere redolens;
pileo solidi, convexo-plano, viscido, rubro-carneo
pallido, dein decolorato, purpureo vel brunneo-
maculato, margine undulato et plerunque
saturatione 5-9 cm. d.; stipite lamellis atte-
nuato-adnatis, bifurcato-ramosis, sulphureo-
pallidis dein subarmeniacis; stipite
brevi, solidi, striato-reticulato, albo vel
subrosso, dein obovato-maculato; spissis
extimulatis, globosis;
 $9 - II = 9 - 10$; basidiis $40 - 45 = 12 - 14$; cysto-
diis $56 - 70 = 8 - 12$ — \nearrow
(Bra. 61.)

Bres. F. mang. p. 79 tab. 77 non
 22 *Rustula grisea* / Pers. / Fr. Ep. or. p. 301 (1838) *Colombina grisea*
 Saec. XVII Fenz. V p. 626, *Agaricus griseus* Pers. Syn. p. 645 (1801)
Icon. Krombh. Abb. t. 68 f. 15 ^{L.C.} 17, Bresadole F. ~~syn.~~ t. 72, Gott. Denks.
 t. 196, Schäff. N. Fenz. t. 93 (*A. cyanosanthus* in Ind.)
 Btl. 209, 242, 417, 418, 704, 866, 1133, 756, 1920, 1301
Hab. in ^{Piemonte} *hirs* *frondosis*: Trenino, Veneto, Lombar., Toscana
Area distr. Europa. ^{: Tergola, Inzenga (Bres. M.S.) Cavalese (Man. et Br.)} } *terrate-autunnali*

Ott. Sec. il parere di Maire, Bull. Soc. myc. Fr. 1910, p. 171, qual'è la
 specie d. Persoon e non d'ogni che deve distinguersi per la carné del pileo bluastro
 sotto la cute, le spore cristallate ecc. Avverstiamo però che la *Rustula grisea*
 (tale dai vari autori, ^{italiani} escluso il Bres.) potrebbe riferirsi alla vera specie triestiana.
 Ott. ^{II} Di Tergola è indicata dal Bres. M.S. una var. minor, col pileo rosso-celestino

grisea

476

(Caro sub fellucula tenui violacea), Mitis;
~~attenuata~~; filo carnosoz firmo, e spumaico
divaricato, vel griseo, disco purpureo vel interius
expanso depresso, polito, & expallente
8-11 cm. lato, marginibus levibus; lamellis
densatis, compactis, crassiusculis, subfurcatis,
ea albo flavis; stipite spongioso - solido,
elongato, ca 10-14 cm. longo, cylindrico, levis,
nitidus, candidus; sporis subflavidis, albo-
griseis, subglobosis, aculeolatis vel punctatis;
etiam flavo-aureis, subglobosis vel
pallide flavatis, echinulatis 6-8 µ diam. vel
7-8 = 6-7; basidiis 30-35 = 7-8 vel
35-40 = 10; cystodis 50-60 = 10-12 - ^(Bres MS.)

Diff. Spec. Simile Saccardo Syl. 10-11 = 6-7,
distinguens da R. decolorans per colore
da R. integra Specie comunitare per la texture
per margine latitudine levigato, e per
le altre notae.

✓

23 *Rustula obscurans* Fr. Mongr. Hymen. t. 187 (1863), non Pers.

Sauv. Syst. Fung. IV p 456

Icon. pro Ton. Hymen. t. 172 f 2, Cooke Ill. Br. F. t. 1035.

Hab. in nemoria - Trenholme Sopramonte (Bar^a Turco-Lazzari ^{in Bres. MS.})

Bibl. Bresad. MS., 693

Area distribution. Europe.

2361.



Cortile (Ligure) Alstata = Anthomyz



olivaceus 456

Pileo ubique carnoso, explanato,
umbilicato, ex olivaceo disco lutescente,
margine levi; lamellis postice atten-
tuatis, compactis, subaequalibus ex
albo lutescentibus; stipite firme,
levi, candido: sporif subglobosis,
1-guttulatis, echinulatis, flavisis,
 $8-10 = 6-8$; basidiis $35-40 = 14$;
cystidios $50-60 = 12$ (Bres. MS.)

~~Ottens~~


~~Questo specie volatile viene per alibi-~~
~~dine collocata tra le farcate~~
~~gusciose~~ ~~quantounque le lamelle~~
~~raramente siano forcate e la~~
~~loro forma~~ ~~si avvista alle fragili~~:
~~Dil resto molti caratteri corrispon-~~
~~dono alle compattate~~.

24 *Russula elegans* Bres. F. Tid. I p. 21, t. 25 (1882)

Sau. Syl. Fung. IV p. 468

Icon. Bresad. L. c. Cooke M. Br. F. t. 1027.

Blot. 236.



- Trentino: loc. sopra Mele, Magra ecc. (Bres.
ms.) aut. +

Hab. in siccis umbrosis Coniferarum
Area distr. Britannia, Italia, Jap.

in agro Tardibio (Trentino)

O.H. D affinis ~~Rust~~ ~~frustulig~~ ac. Des. Ad.

R. elegans (Caro alta, in vegetis ochracea, acris;).

pileo carnoso tenue e convexo subpresso, marginis cætate subcuboso striato, viscido, lacte roseo carneo, mox ambitus ochraceo suffuso, lato dense granulato, Ø 3-5 cm. lato, lamellis postice attenuato - adnatis vel leviter rotundatis, confertissimis, aequalibus raro subfurcatis, albidis, cætate ex integris aut tantum hinc inde viride ochraceo - cæranticis; stipite e spongioso-punctato-leu-
cinofo, cavo, basi subincurvato, alto, deorsum ochraceo subruguloso, 3-5 cm. longo, 1 cm. circ.
crasso; sporis sphærisideis, eximie echinula-
tis, 1-guttulatis, in cumulo albidis, sub micro-
scopio chlorino-hyalinis vel subflavidis,
8-10 μ diam; basidiis clavatis 20-25 = 8
cellulis hymenophorii, ut in aliis Russulidj
sphæriis 40-60 \times 8 μ diam -

(Operari) -

811. Sebbene per le note principali sembra accostarsi a R. sciamphinea, tuttavia è tutto affine a R. fellea che, se non forse costante si mantengono costante, sarebbe da credere una sua varietà. Sembra anche affine a R. guerricci.

25 Russula queletii Fr. in Quel. Champ. Vosg. I p. 185, t. 24 f. 6 et 6^{bi} (1872)
Sacc. Syll. Fung. IV p. 468, Cook M. Br. F. t. 1028, Rolland A.H. t. 41 p. 88
Pastorelli. Tab. anat. f. 515, Lucard Suite à Bull. t. 44, ^{Quel. loc. cit.} ~~Loc. cit.~~

Icon. ✓

Bull. 12, 437, 1015, 1031, 631, 1715, 693.

Hab. in spong aerotig. Veneto, Trentino, Corsica
area dolce. Gallia, Italia, Britannia } intorno a Tivoli, comune (Bres.)
= autunno - (Bres.)
Tegole, Vappad. C. Anna e Sopramonte (non)
Cerstaf, Verzana, Sopramonte a So Anna. +

Var. atropurpurea Bres. Ms. R. mbr. Fries Swedg. ätl. Swedg. t. 49
non Borch. Sacc. Syll. Fung. I 462

Icon. Fr. l.c.,

Hab. in herb. spong. - Trentino: Tegole, Lago di Orta, Sopramonte, Povo,
Montevaccino, Margone! e non tanto nelle montagne, ma
sotto i boschi di Rug. mbr. = estate - autunno -

Vezzena, Ingagna, Gavialdo. male



Quietii

468

Scripsit; caro firma, alba, sub pellucida rubro-purpurea. Et
guttis lamellarum evanescit orientis maculae caeruleo-vine-
reae vel pallide olivaceae) pileo compacto, e campanulato
convexo plano, tenui, viscoso, violaceo-nigro fuscove,
margini leviter striato, purpureo-lacino, $\approx 2,5-8$
cm. lato; lamellis attenuatis, inaequabilis fur-
catis, plurimi breves, altissimis; stipite spongioso, farin-
oso, violaceo-purpureo, 5 cm. circiter longo, 12
mm. crasso; sporis sphæricis, ~~20~~ 25, ochraceis,
episporio granulato, 1-guttulatis, in cumulo altissimis vel
microscopicis flavidis, straminis 8-10 μ diam. vel
 $8-10 = 7-8$; bandis 45-50 = 8-10; cystodis 60-70 = 8-12.



var. atropurpurea Bres.

[R. rubra Fr.]

Valde dura, rigida, carne subgrinosa, distinctissima (acris,
fileo carnosus, rigido, e convexo n explanato depresso sicco,
polito - levigato, max 9-11 cm. lato ob colorem intense
cinabarino - miniatum fere intente (nec occurrit etiam
espallens, subalbus et rufous), disco nigris obscuriore,
margini rotundato, obtuso, exstrio; lamellis obtuse adnatis
subconfertis, altissimis, inmixtis furcatis, dimidiatisque
crassis, altidif, exolepis lutescentibus, acie saepe subris; stipite
solido, duro, valido, alto rubroque variante; sporis
ochraceis in cumulo, vel microscopicis episporio granulato, vel subechinato,
hyalinis stramineis in
hypoderis vel subsphaeroides) 8-10 μ diam. vel 8-9 = 7-8

varidis 30-35 = 9-11), cystodis 56-70 = 7-9

vel 60-45 = 8-10

vel 60-70 = 13-16

26 *Russula rubra* Krombh. abb. IX p. 9 t. 65 (1845), Bresad. Fungi Trd. II
p. 91^{t. 203}, non Lam. et DC. (Lerche Bres.)

Tun. Bresad. et Krombh. H. c.c.

Bibl. 234, 1715, 456, 693, 101, 1683

→ Tiroli, cisalp. Marca (V. Höhen)
Verona (May)

Hab. in nemoribus frondosis - Trentino: Sociadoro pr. Trento (Bresad.), Vereto, ec;
Alpe di Sota. Europa, Austria, Toscana, Corsica e verosimilmente in molte altre province.
aestate. *

pileo carnoso e convexo expanso-depresso, secco, liso, margine unito, denso lanuginoso
et roris substriato, rubro, margine roseo v. albidio, roris toto albidio roseo-variegato,
subvelutino v. glabro, 5-10 cm lati; lamellae compacte v. subcompacte hinc inde
furcate, sinuato v. rotundato-adnexis, albi, serice ochroleucis; stipite farcto, aete
te subblacunoso, subaequali, albo, numerosam subrotundata, sicciando saepè escre-
nente, rugoso, 3,5-5 cm longo, 1-2 cm. cr. carne alba habente roses, acerrime,
odore grato; spores subglobosici, in cumulo ochroleucis, e granuloso subcinditib; 8-9 = 7-8; bandis clavatis, 30-35 = 9-11; cystidie fusoides apice restricto-
cuspidata 56-70 = 7-9.

Oper. Le citazioni bibliogr. n. 34, 41, 61, 205, 263, 340, 417, 418, 430
646, 585-653, 656, 704, 886, 923, 1258, 1152 per Russ.
rubra restano dubbie potendo riferirsi a Russ. Quelétii var. atropurpurea
o Russ. sanguinea. Opero all'intell. monum. cpr. Bres. t.c.


1658 1920, 1965, 848

rubra

27 *Russula vesipes* (Scor.) Bres. F. Trid. I p. 37, t. 40 (1893)

Ica. Syll fung. V p. 474, *Agaricus alutaceus* *vesipes* Scov. Sust. I p. 578)

Iron., Bres. l.c. Cooke M. Br F. t. 1081, Pack Edible Fungi t. 56, f. 1-7.

Bitt. 236, 244, 1860  *sopra Malè*, Selva d'Amaro (Bres. ms) 9

Hab. in Alpinis sub Pinj. & Valt. & Ile (Trentino), Vallonibus Toscanae
Area Riki. Europa, Amer. bor.

~~at least~~ 

& Troodos. Marone (v. Holm)



roseipes 474

Caro albida, subflavescens, odor et sepor
levis, gratus; ~~per~~ pilei carnosus, mar-
gine tenui, e convexo explanato depressoque,
viscidus, mox sicco, roseo-carnosus, roseo-auran-
tiacus, vel roseo-subochraceus, maculis albidis
vel pallidis iam primo notatis, aetate toto
expallente, margine e brevi subsuberculoso-striato,
2-7 cm. lato; lamellae subconfertis, aequalibus, una alterave
divaricata aut forcata, postice bifidis, rotundato-lobatis;
subremotis, interdum etiam uncino adnexis ventricosis,
ex albido viscidino-ochraceis, in piceo roseis, veno-
carnesis; stipite e medullato-faretto lacunoso, albo,
fruina rosea hinc illinc vel ex integro conosfero,
3-6 cm. longo, 8-15 mm. & crasso; sporif.
ochraceus globosus, echinulatus, 8-10 μ diam.
capitulis elevatis 20-50 = 10-18; cystodriji
fusoides 60 = 8 - (Bres. ms.)

28 *Russula decolorans* Fr. Epicr. p. 361 (1838)

Iau. Syb. fung. IV p. 476, *Agaricus decolorans* Fr. S. M. I p. 58.

Iron. Cooke M. Br. F. t. 1079, Brzalm. Hym. t. 497 f. 53.

Bitt. 1032, Mass. in Bull. S. B. It. 1912 (1652)

Hab. in silvis ^{muscicæ-Veneto} Val Visende, Belluno & ~~Trento~~, Trentino: Campiglio,
Mugres (Prov. Pas.) Cavalese
(Mass. et Br.)

Area distribution Europe.

Tirol (Ital. Maria (Heimel))

(Aosta) — ♀

476 Decolorans

Cop.

Procula, 10 cm. alta, regularis, nitens denum
^{coro ex albo-cinerescente;} nigro-variegata, nitens; pileo carnosus, firmo e
sphaericus expanso depresso, rotundato, tenuiter
pellucido, expallente, ^{9 cm. lato} marginu ^{tempore} tenui levigata,
unicolor ex aurantio-rubro flavo et capal-
lente, ^{9 cm. lato} marginu tenui levigata, ~~ex albo~~ striato;
lamellis furcato adnatis, tenuibus, confertis,
ex albo lutescentibus; stipite spongioso-solido,
longato, cylindrico, rugoso-striato ex albo
cinerescente; sporis subglobosis, cibinulatis,
1 guttulatis, sub microscopio flavidis, in
cunulo ~~atque~~ alto-hirudis $10 - 13 = 10$;
basidiis $40 - 45 = 8 - 10$ — ↑

Acatale

29 Russula naucina (Pers.) Fr.

Sau. Syst. Fung. V p. 481. Agaricus naucinus Pers. Syst. p. 446

Gen. Bréviat. F. Th. t. 129, Schäff. N. Fung. t. 16 f. 4

Cooke Ill. Br. F. t. 1144, ~~Edged~~ ^{fringed} Ross. Champ. Fr. t. 196

BfI. 234, 7025, 637. 693, 1965, 1663

Hab. in sylvaticis aceris: Trentino, Lombardei, Corsica. Aest. Aut. +

Bosco d'Urgia; Rabbi, lega d'Bellentuna ecc (Bres. M.S.)

Carabozza (Mass. et Br.), Tirolo (ital. Uarna
(v. Höhn) = Berlata = Achiamino -

Submissis, oidea, fragilis; carne alba; filo carnoso,
femini, e gatto piano depresso infundibuliformis,
viscido, disco obscurior, 3-4 cm. lato, margine
sulcato submentranaceo; lamellis abnexis, ventri
cotis, subdistantibus, flavo sordide ochraceis;
stipe farcto, striatulo, alto, 2,5 cm. cinctus
lungo; sporis pallidis leviter dilute flavidis sub mic.
ochraceis, subglobosis, apiculatis, atferis, 7-10 μ diam.;
basidiis 40 = 8-10; cystodias 50 \times 10.

~~D'accor. L'aspetto di R. nitida darrebbe diversifissimo per colore del cappello ma delle lamelle che sono meno nitide in ambedue ma in quella d'ordinario nonostante legermente proporzionate, volgente al giallo.~~

~~Diff. Molto affine a R. nitida da cui si distingue principalmente per colore delle lamelle che sono in questa non giallastre, ma quasi aranciacche -~~

30 Rustula nitida (Pers.) Fr., Epion. p. 361

Sac. Syll. fung. IV p. 477. Agaricus nitidus Pers. Syll. p. 444 (1801)
Den Schäff. Ver. fung. t. 256, Krombh. Abb. t. 66 f. 1-3, Berl. Anth. t. 13 f. 3.
Btt. 39, 585, 704, 1284, 1965

Hab. in selig. Liguria, Lombardia, Toscana, Aest. Aut. +
Area distri. Europa, Amer. bor. /

Trentino: Piaggia lunga (Bres. M.S.), Cavolere
(Mass. et Bres) +

Nauseosa praesertim bene evoluta, subfoetens; caro alba; minor, rigido-fragilis, saepe inaequalis, colore lamellarum non facile distincta; pileo carnosulo, rigente, e convexo-plano depresso, nitido, discoideo, varicolore vulgo e dilute vel sordide purpurascente lutescente, ad medium saepe plicato-striato et dilutiore, margine levini, primitus striato tuberosoque, 2,5-5 cm. lato; lamellis adnatis secundentibusque, tenuibus, confertis, nudis, ex albo ^{et} ^{deinde armeniacij} flavis, nitidis; stipite farcto, mollo, albo-pallidente, 2,5-5 cm. longo, 1 $\frac{1}{4}$ cm. crasso; sporis 8-10=6,8 in cumulo flavis, sub microscopicis flavis, ~~areae~~ ~~subglobosae~~, echinulatis ♂ - ♀

Oppr. A questa specie sembra prossima la R. punctata Krombs. T. 66 f. 20-23 ma le lamelle sono sicuramente oracell.

31 *Russula Turci* Bres. F. Trd. I p. 22st 99 t. 26 (1882)

Sau. Lyl. Flav. F p. 578.


Ton. Bresad. l.c.

B.M. 234.

Hab. in sibi copioso umbrosi - ~~in agro Tridentino~~ Tirolo: book. d'Aringo,
Pree Nts. Stat. sup.

Maggio ec. (Bres. M.S.)

Autunno



On. sec. Quel. H. mycol. p. 139 sarebbe sinonimo di *R. nitida*, ma il
Proc. l.c. p. 99 replica le differenze per le quale giustifico oracee e non nitida
per la carne nita e non haesosa ec. Sei lo stesso Bresadole ^{non} sarebbe vivere
diversa da *R. lateritia* Quel. Ann. Fr. 1885 p. 6 t. XII f. 11. e sec. il
Meise corrisponde con *R. amethystina* Quel. Ann. Fr. XXVI⁽¹⁸⁹⁷⁾ p. 450 t. 6, f. 13. Co-
munque la ² specie di Quel. sono posteriori a ~~una~~ ¹ specie Bresadoleana.
Sei Quel = *R. nitida*.

Turci

478

Caro albida, mitis, inodora; pileo carnoso,
 fenni, e convexo depresso, viscido, margine e
 levi striato, carneo-violaceo vel purpureo-lilacino
 centro obscuriori, interdum aetate lusente,
 in exoletis minutissimis areolato, 2-8 cm. lato;
 carne ~~albida~~, miti, inodora;
 lamellae aequalibus, subconfertis, e pallido
 mox ochraceis, postice rotundato-liberis, veno-
 commissis; stipite albo, subruguloso, sursum
 attenuato mox lacunoso-cavo, fragili 3-5 cm.
 longo, 1 cm. circiter crasso; sporis globosis
 ochraceis echinulatis 8-9 μ diam.; basidiis
 clavatis $35 - 40 = 10$; cystidios fusoideis
 $60 - 70 = 10$:

Osserv. Molto vicina a R. nitida o a R. chamaeleonina, da cui s'ha via tende-
 stuta ned' e' da confondersi colla tila
 var. tila cipo-purpurea di quest'ul-
 tima

32 *Russula fusca* Quél. in Ann. Mus. franç. avanc. Sc. XV (1888) p. 4, t. 9 p 5 (text.)

Sauv. Syl. fung. IX p. 59

Icon. Quél. l.c.

Bull. 693



Hab. in nemoribus — Corsica foresta ~~Corsica~~ ^{testacea} d. Ajaccio (Maire) n. sp.
Area Nte. Galté, Corsica.

fusca

9-59

Pileo convexo dein depresso cupulato, 6-8 cm. lato, brunneo-ochraceo, centro obscuriore, maculato, pellicula viscida, margine levigato, dein breve striato; lamellae immobiles, furcate, basi venosae, lacteae, dein cremeo-ochraceae; spores ellipsoides sphaericas 9 μ diam. aculeolatus, albo-cremeus.

Dess. Affine a R. olivaceus e a R. glutaceus

33 *Russula integra* (Linn.) Fr. Ep. or. p. 360 (1838) Colombeia lutea & bruna

Sac. Lyl. fung. II p. 675,


Agaricus integrus Linn. Sp. pl. ed I 1753, p. 1171

Trem. Vitt. Fung. t. 21, Vent. Mus. Bruc. t. 62 f. 5-6, Hager Obj. t.
59, Lang. F. d' Roma t 49 f 1, Schäff. t. 92, ^{scam.} Bead. Tsch. p. 78.

B.H. 209, 242, 103, 349, 417, 418, 434, 653, 656, 704, 836, 853, 866,
923, 1015, 1049, 1133, 858, 631, 1920, 693, 1965, 1617, 1502, 1926, 1663

Hab. in nemorum ^{Piemonte} Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia, Marche, ^{Toscana} Lazio,
Neapolitano, Corsica. ^{et Aestatis} ^{: magica, Gocciolosa (Bres. MS.) Tiv.} cisalp.: Uarna (V. Höhne)

Are dish. Europe, Africa.



Ep. or. p. 360 (1838)

var. adulterina Fr. ~~Agaricus integrus (1838)~~

Sac. Lyl. II p. 676. B.H. 868.

Hab. in pineti: Emilia, Ital. br. (Cfr. Vitt. Monog. p. 270 in osserv.)
Forte ha spectat, teste trist, ^{Agaricus} Russula pseudo-emetica Sac. Phys. Luigi
^{t. n. 495} ^{t. 1. 490 (1831) non ibi} dicta Ag. adulterinus ut habet Stevng.

Br. Soc. Mus. to R. Romelii Marte e libro d. R. integrus Fr.

integra

475

Mitis; pileo ^{carte alba} discoido, e convexo vel campanulato
cavoso, ^{discoidei} rugoso depresso, viscoso-pelli-
coloso, d'ascosta rugoso-firme, dein fragili, omnico-
lori, ~~varia~~ varia siccio decolorante, margine
ferui, serum subito tuberosoque; lamellis postice
nudo paucim bifidis, subtilibus, latissimis, aequalibus,
(adultis) distantibus, ex alto pallidis, flavo-pulve-
races; stipe spongioso-faruto, leri, ~~testaceo~~,
albo, primis brevi, clavato, vel ventricoso, vel
enico; sporis ~~standif~~ sol. ^{standif} ~~outro~~ ^{Alaudis} globosis
~~echinulata~~, apiculatis et aculeolatis, subvittatis

$$8-10 = 8 - \textcircled{Q}; \text{ basides } \# \text{ do } 45-50 = 9-12$$

cystodis raris 60-9; paraphysibus 35-45=9-12 clavatis.
Oss. [Spore secondo Bresad. ^(MS) 7-9 = 7-8 \textcircled{Q} ~~testaceo~~]
Specie notissima, coll'età variabile onde è confusa talora

con R. eretica e R. alutacea.

var. Adulterina = tarda acri, minor, fragilior;
pileo difformi, rordide pallido, atroques, margine
errucoso; lamellis ex alto obovatis; caro alba,
margine ~~luteo~~;

Bull. Soc. myc. Fr. 1910, p. 105

Q. ma see. Maire la specie di Bresadola
è molti anni incognita e da disingegnare. Dal
Lotto friulano per le spore instillata vaticata, taba
grande ~~caeruleo~~ ~~luteo~~ e non subovata ex. A questa
forma peciale di Maire dà il nome d. R. Romellii.

34 Russula sardouma ^{B. gminutatae} v. sparsa p. 353 (1838)
Tacc. Syst. Fung. IV. p. 458
Icon. Knobth. Abb. t. 68 f. 1-6, Bresadole F. Trid. t. 94, Schäff. 7c.
Fug. t. 16 f. 5-6, Bolleratello. Cooke M. Br. F. t. 1037.

Brit. 234, 737, 886, 1031, 1109, 1345, 1663

Hab. in silvaz acerisig: Trentino & Veneto, Emilia, Toscana, Napoletano,
Area dist. Europa, Tunisia

{ Tegola, Vezzena & Meli (Bres. Ms.) - Tirolo
civale: Narne (v. Höhn.).

(Turkato. f.

B. Immutatae

a. Lamellae coloratae

Sardonia 458

{ firma, irregularis ; sapor acer ; caro sub
cute rubore } pileo carnoso, firmo, e con-
vexo-plano depresso, glabro, pellicula tenui,
adnata, rugosa, decolorante, margine levi,
5-8 cm. lato ; lamellis adnatis, confor-
tissimis, subfurcatis, albo-lutescentibus,
jore pluvio plorantibus inde in secco orientur
maculae lutescentes ; stipite spongioso-solido,
curto, 3-6 cm. longo, 2.5 cm. crass., albo-
rubellove ; sporis globosis ~~7-8 μ diam.~~.

~~lajos~~ 1-guttulatis, aculeatis, non nullis
spiculatis, in annulo luride albidis ~~7-9~~
 μ diam. ; basidiis $40-45 = 9$; cystidios ~~70 = 10-14~~



Cessoo. Distinguesi da R. rosacea nel
colore del gambo nonché delle lamelle.

35 *Russula caerulea* (Pers.) Fr. Ep. or p. 353 (1878)

Ian. Syl. Jung. V p. 459, Agaricus caeruleus Pers. Syn. p. 145,

2) Boll. 1214, Mass. u. Bull. J. B. J. 1912, 1965-1901

1) Tern. Veneris St. micol. t. 7 f. 61-62, Krombh. Abb. tab. 64 f. 10, 11 et
tab. 68 f. 5-8, Cooke M. Br. F. t. 1052.

Hab. in Silvaticis ["]agro Biscientis & (Lombardia), Trentino: Cavalese (Mess.)
area dist. Europa

Remarks: Valt. Valdes. (Fayod) et Bres.)

(act. A)

Oggi la entita' trovata nelle Valt. Valdes. è una varietà a spile bianco, che loc. Fayod
non ha più dubbi, potendo essere anche una fm. di *R. pugnacea* Gill.
R. lutea Quel. Manca d. coda? vero è che sono obsoleta, vernacolare, 947

Cerulea 459

(, caeruleo, blacio, griseo centro
rosso-, flavo-virens brusto

Mitis; pileo carnoso, convexo, explanato
depresso, polito, margine levigato, ^{6-7 cm. lato},
mellis adnatis, subaqueabilis, lutescenti-
bus, apice acutis; stipite spongioso,
solido, firme, albo; sporis 8-10 = 8 ^{cm.}
- Paro elastiche alba, sub cuticula blacea, sapida.

Osserv. Il cappello è ceruleo, secondo
pers. nel centro subrufescente ~~o~~ o fuscocerulo.

36 *Russula fadini* Quél. in Ann. Soc. franc. Sc. 1886 p. 8, t 8 f. 9.

Ica. Syll. fung. V p. 679.

Icon. Quél. l. c.

Publ. Bresci. Ms., Mass. Batt. 1. B. 7 1912

Hab. in muscosis sub abietibus - Trentino: bosco di Magreg (Bres. Ms.)

Area sicc. Gallia, Nels. (Cavalese (Mass. et Bres) ≠

badia 479

(Caro elastica dein molles alba, sub cuticula violacea
valde piperita, odor dulcis;
Pileo convexo-plano, & curvato, dein centro
depresso, margine levi, subviscido, badio levi
terque purpurascente; lamellis sinuatis, saepe
furcatis, tenuibus, non festis, sulphureis; stipite
spongioso, fragili, longitudinaliter subsulcato,
glabro, albo saepe basi roseo; sporis sphæ-
ricis, aculeolatis, ^{ve} muricellatis, mediis nucleo
leoso, utrinus vel subobtusis 8-10 μ diam.

-9

37 Rumbel Chiric Fr. Hym. Europ. p. 449 (1876)

Sac. Linn. Jang. IV f. 470

Icon. Viad. F. mang. t. 38 f 1 (R. emetica), Lanz. F. di Roma t. 48 f. 3,
Cooke Ill. Br. F. t. 1031.

Bbl. 1228, 658, 1965

Hab. in Istralia. | Trentino: Tergola (Prov. Ms.) (+)
Area distr. Europa.

Ottobre tenuta una var. d' R. emetica e somiglia a R. pecknoldi.

Clusii 470

Pileo convexo-expanso, sanguineo, carne
alba ^{diam marginis leviuscula} flavente, lamellis unco obsoleti
adnexis denuncque adnatis, pallide
flaventibus; sporis 7-10 = 8-8 globosis vel
subglobose, sub microscopicis flavis, ambatis, 1 ^{gutt.}
latis; basidiis 30-35 = 5-8 cystidios ^{60=8.}
Officinali. E' ritenuta una varietà di

R. emetica, somiglia a
R. pectinata me è rossa.

38 *Russula atro-purpurea* (Krombh.) Schaeff. Abb. IX p. 6 t. 6 fig. 56 (1845) ♀
Beck New York J. Mus. Bull. n. 116 (1907); Agar. atro-purpureus Krombh.
Sacc. Syll. fung. II p. 94, *Russula umbra* et var. *rapida* Cooke Hand. B. F. 208 p. 326
Icon. Krombh. f.c., Cooke '01. Br. F. t. ^{102d} 1087. *R. purpurea* Gill. R. atro-purp.
Brit. 1301.

Hab. seus usq; umbrosa - Piemonte: Valli Valsesia, proprie Goria) (Fayod)
area disti Europa, ~~Asia, Sc.~~ Japan, Australia

Art. ant.
♀ non Russ. atropur-
puree Beck olim = R.
qualida Beck.

5 Atro-purpurea 21-95

Rubro-sanguinea, fragilis, acris; pileo
plans, disco depresso, margine levigato 8-9 cm.
lato; lamellis liberis subdistans, levissime flaveolis; stipe cylindraceo
albo, farcto, levi, 5-7 cm. longo

2-2,3 cm. crasso; sporis albidif.
globosis 10 μ diam. Caro alba seu
grisea

Ouvr. Secondo il ~~s~~ b. Maire
Bull. Soc. mycol. France (1910) p. 70 et 167
a questa specie appartenente:

(*R. Clusi*). Bataille et forte Friesii,

(*R. rubra* Cooke, non Fr.)

(*R. depellens* Cooke (et Fr.?)

(*R. purpurea* Gilb. Champ. t. 187,

(*R. atromarginatus* Quél. Ann. Fr. XXVI t. 4 f. n.

Rossola granulosa decolorans
Jost. Jaff.

39 Russula lutea (Huds.) Fr. Epicr. p. 363 (1838)

Sau Lst. fung. T p 480, Agaricus luteus Huds. Fr. Engl. II p. 611 (1778)
^{ed. vol. 2}

Icon. Bresad. f. mang. t. 79, Gillet, Champ. t. 534, Pat. Tab. an. f. 321.

Bibl. 81, 242, 411, 418, 430, 585-661, 704, 866, 983, 1133, ¹⁸⁶³ 1284, 1920, 1965

Hab. in nemoribus: Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Canti. Ticino,

Emilie, Toscana. Rostate. \oplus .

^{Agaricus luteus} (L.) Pers. (Tiburo d'Inzenga (Pers. MS.), Valle
degli Alpi (ob.) Tir. Valg. Marne

~~Area dist.~~ Europa, Amer. bor. ^(v. Höh.)

lutea 480

Mitis, degradat^(carno alba); paleo firmulo, piano-depresso,
pellucido-viscoso ^{e pulchore luteo}, esposto, 2-6 cm.
lato; margine levi; lamellis angustis,
liberis, confertis, venoso-connessis, vitelli-
nis; stipite e fusto cavo, molle, albo;
3-4 cm. longo; sporis sphaeroideis
vel subglobosis, echinulatis, 1-guttulatis,
ochraceis vel luteis, 8-10 = 7-9; basidiis 30-40 = 12-15
cystidios 60-70 = 6-7; cellulis hymeniorum
20-25 μ diam.

Osserv. Ha l'aspetto di R. ochroleuca per il colore
del cappello, e per lo stipite corto, ma è minore.

40 *Rusula rufa* Fr. Ep. or. p. 363 (1838)

Tauylt. fung. V. p. 681

Zur. Bull. Champ. t. 509 f. 2

Bibl. 983

Hab. in Lituania acerisij - Nizzardo (Rizzo) ~~Liguria~~

area di Europa

ravida 481

Urida, proximus maior sed admodum mollis,
caro, grisea (nutris); pileo carnofo, molli, piano depresso,
repando, sublobatoque, ^{3-4 cm. lato} semiter pelliculoso e fusco
griseo- lutescente, opaco, margine levi, lamellis
adfixis, conseratis, latis, ochraceis; stipite spongioso,
mollis, fusco-striato, albo-pallidente.

~~R. var. Varia non est obtusata Pers. et Bull.~~
~~; Roxburgh ex Sevr. nr 500 leg.~~

41 *Rustula aurata* (With.) Fr. Ep. v. p. 361 (1858) *Rossola dorata*
Sau. Lyt. Jung. IV p. 677, *Agaricus auratus* With. Ann. IV p. 184 (1796?)
Zem. Bres. F. mang. t. 78, Cooke Ill. Br. F. t. 1080, Patouill. Tab. an. fig. 3.
Bfst. 61, 209, 262, 417, 418, 725, 852, 1015, 1153, 671, 693, 1920, 1663 →
Hab. in silvis regionis campestri: Liguria, Veneto, Trentino, Marche,
Toscana, Costiera - Aretate. sp.
Area Distr. Europa, Japonia

Gociadoro, Tergolagace.
(Bres. ms.)
(Tiro. Italy.: Hanne (V. Höhne))

R. aurata : 477

Carde avis; polvorosa admodum speciosa,
firma, rigida, fragilis tamen, odore grato, licet
sapor suadens ^{caro sub pellicula viscosa citrina}; pungens; pileo carnoso, rigido,
convexo - plano, nitido, discoideo, non umbili-
cato, colore citrino, aurantio, rubro etc. vario,
5-8 cm. lato; margine demum striato; lamel-
lis rotundato-liberis, latis, aequalibus, nitidis,
acie flavo - citrinis, ad latera fere albicans; basi
stipe & spongioso-compacto, striatulo, alto &
citrinove, 5-8 cm. longo; sporis 10 μ diam.;
basidiis vel $10 = 8-9$; basidiis $45-50 = 13-15$
cystidis $55-60 = 9-12$; paraphysib; $30-35 = 10-13$, $\text{dm} = \text{f}$
subglobosis, in cumulo albido - luridis, intercalatis, vel aculeatis.

Osserv. Non si può confondere ~~con R. aurea~~ con Russula
la alutacea. La R. aurea Pers. per la lamella a -
lataceo e da ~~risentire~~ risentire la per la R. subalutacea per
non dire senz'altro per la R. alutacea

42 *Russula punctata* G. A. Champ. - De France p. 245 (1876)
Sau. Journ. Fung. IV p. 673, *Russ. amoena* Grél. Journ. mycol. p. 341.
Tron. Grillet Champ. t. 190, Massue Soc. Mycol. XXVI (1910) p. 118 f. 6, Part.
Bibl. 893  Tab. anal. fig. 621
Hab. in nemorum bos - Corseia - Forêt d'Urtone ~~Capra~~ (Maire), +
Rest.

punctata 473

Caro alba, net uicula filei rubens, dulcis,
odore ~~malo~~^{grato}, fileo carnoso, 5-6 cm. lato, mar-
ginis ~~zona~~^{parte} attenuato, convexo dein explanato,
viscido, roseo, centro saturatione, tuberculis punctis
formatis rufo-nigricantibus confusso, semis expallente,
stipe ~~farato~~^{spinoso} pedicea lamellis subadhaerentibus,
in partis, alto-flavidis, aie saepe rubella;
stipite farato, fileo cuneobore, basi attenuata,
albida, 3-4 cm. longo terreno; sporif ecomes
~~subglobo~~^{globo}-~~ellipso~~^{ellipso}-modis
~~alti~~^{flavida} cristulato-tuberculatis, 7,5-9x7,8

O.H. Ben risolte pr il fileo farinoso-granu-
loso, punctata, le pose subretticolate ecc..

13 *Rustula purpureo-lilacina* Fayod, Cens. fung. Val. Valais. p. 87 (1893)
var. lyl. fung. XVII p. 33.

Icon. (nudus)

Abb. H. c.c.



Hab. catenaria v. solitaria ad terram in castanetis et pinethys - ^{alpinis} Vals. Valais.
^{orient. Nev.} *guinea* ^{f.} *Fayod* - Sept. Oct.

purpureo-lilacina 17-33

Pileo denso subtenaci, obscure purpureo
subvelutinos, primo haemisphaericō, mar-
gine rinnata, deinde fulvinate, 4,3 = 6 cm.
lato, centro tenuiter depresso, minute granu-
lato-diffusco, margine levī; lamellis inter-
gris, postice attenuatis, antice rotundatis
semper flavidis; stipite aequali, faretos,
rosso-lilacino, praeceps primo lilacino-pur-
pureo; sporis sphæricis, verucosis, 6 μ diam.
basidios 36 = 6 emergentibus.

Osserv. - La specie si riconosce specialmente
alla gamba colla base color di pesce.
È affine alla R. sardoniae e Drapetonyx
e soprattutto alla R. punctata

(*Russula vitellina* (Pers.) Fr. sp. p. 363 (1828)

2 *Iaa lyra* fung. IV p. 481 *Agaricus vitellinus* Pers. Syn. p. 442 (1801)

44 (*Russula visigallina* (Batsch) ^{soil. agaricus visigallinae Batsch} fung. Coll I p. 69, t 15 f. 72 (1808)

Icon. Batsch. t.c., Cooke M. Br. F. t. 1102 f. B.

Bibl. 12, 1715

Hab. in alvaras scorosis

Area sibi Europe

Trentino. Valle d' Ledro

pr. Borgo (Ambrone)

- Berolina - R

vitellina

481

Pulchella, admodum fragilis, oidea, nutris;
pileo submembranaceo, demum subcavoso -
striato, unicolore, e flavo fuso pallido, subsiccо,
~~205~~ 2.5 cm. largo; disco ruinato, carnosulo;
lamellis secedente libeis, aequalibus croceis,
distantibus, crassiusculis, venoso connexis;
stipite tenui, aequali, 4 mm. crasso, 2.5 cm.
vix superante; sporis globose - ellipsoidalibus, 10-12
= 8-10 (Bottelm.)

Opp. Ricorda molto la R. lutea.

65 Rusula chamaeleonina Fr. Epicr. p. 363 (1838)

Tan. Syl. Fung. IV / 481

von Cooke M. Br. F. t. 1098, Brzefl. Hym. t. 507 f. 81 et 511 f. 95

Pl. 61. 737, 1015, 1031, 631. 1301, Mast. in Bull. Soc. bot. It. 1912, 693, 1663.

2) Area dist. Europa. Piemonte: valle Valdés (Fayot), Trentino: Cavalese (Mast. at Br.)

1) Hab. in silvis mixtis: Veneto, Cortice-Arest. - P. Tirolo (Valp. Narne (v. Hohen))

Olla forma a filetti viscid, ottanio-aranciato, con lamelle bianco-ottanine, fitte a
spese bianco-argento-reticolata 4-5 cm. lungo, 10-12 mm. gr., a spese granulosa 8-10
mm. basidi 30-40 = 10-12, cristalli farinosi 40-50 = 8, è dubbiosamente ripartita
dal Brodo dolce ma a questo spezie, ma se si stacca sotto per la carne bianca &
sapore acre. Venne raccolta nella selva Corniglio a Segolay, Trentino

Tota tenuis et fragilis, vulgo minor; mitis;
pileo carnosato, explanato & presto, pelli-
cula tenui decolorante viscidulo, roseo-san-
guineo, purpurascens - lata tunc etc. mox dis-
co
vel tota (etiam primitus) lutescente, margine
levi dein striatula; lamellis adnexis vel
liberis, angustis, tenuibus, imperfectissimis,
planis, subfurcatis, luteis; stipite subcavo,
tenui, striatula, albo.

46 *Russula ochracea* (Aubl. et Schw.) Fr. Epicr. p. 362 (1838)
Sau. Syll. fung. IV p. 180, Agaricus Russula adusta ^{ochracea} Alb. Schw. Lvs.
p. 215 (1805)
Icon. Krombh. Alb. t. 68 f 9-10, Cooke M. Br. F. L. 105 o, Haag. Belg.
~~Peltier~~ G. U. Champ. t. 196.
B. 61. 1132, 647? 1301, 1920,
Hab. in hibernia acerig-^{et frondosis})

Piemonte : Valli Valdarni (Fayod)

Lombardia ✓ Toscana ✓

Trentino, Zugna, Terzola, Serravalle (Pres. Ms.) } dentata - #

ochracea

480

Mitis; var. ochracea; fileo carnoso,
molli, piano-depresso, pellicula tenui
viscida, nitido, ochraceo-luteo, Sein disco
praecepsne obscurato, margine levii, sulcato,
5-8 cm. lato; lamellis attingentibus, latis,
via confertis, concoloribus; stipite spon-
guoso-fasciato, molli, striato, concolore,
3-4 cm. longo, 1 $\frac{1}{4}$ cm. crasso;
sporis flavidis, subglobosis, aculeatis,
 $\frac{1}{8}-\frac{1}{11} = \frac{7}{8}$ guttulatis, & lateraliter apiculatis,
vel globosis vel ellipticis ~~vel~~ ^{seu} sphaeroideis
ochraceis, aculeatis, ~~800 + 70~~ ⁸⁰⁰ ~~8~~ ⁷ ~~11~~ 8;
basidiis 45-50 = 10-13 vel 45-60 = 8
cystidiis 50-70 = 9-10 vel 30-40 = 10-14

Osserv. Molto bene distinta; minore di P. glutaceo
varia col gambo bianco e, come tutte, col
appello secco.

49 Russula sanguinea (Bull.) Fr. Epicr. p. 351 (1838)
Succ. syn. Fung. V p. 457, Agaricus Sanguineus Bull. Champ. t. 42 (1780)
Ic. Lary. F. & Rome, t. 50 f. 2, Gillet Champ. t. 180, Cooke Ill. N. F. t. 109
> Bull. L. c. Voglino Obs. anal. Agar. t. 8 f. 30. Champ. Pla t. 15 f. 1-10
Ribl. 23, 51, 209, 407, 418, 656, 886, 923, 983 (1237), 101, 1965, 693, 1920, 1052 (R. mbr.)
Hab. in graminis humidis florarum: Liguria, ^{Promont.} Lombardia, Trentino, Veneto,
Toscana, Toscana, Lazio, Corsica. Rest. +
area dict. Europa, Australia.
Guccadore (Aco. M. S.) Valle Lagarina
Tirlo Italy. Carna (Cob.)
Karna (Hermert)

♀ b. Lemellae albæ v. albidæ.

♂ Lemellæ adnatae v. Decurrentes

Sanguinea 457

Care solida, firma; pileo carnoso, firmo
e convexo-gibbo depresso in fundibuli formaque,
levigato, nudo, vulgo sanguines vel, praecipue
circa marginem levem, acutum, levem, ^{carne folida firma} alveante,
^{6-9 cm. lato;} ^(ex auctato longe) lamellis decurrentibus, tenuibus, confortissimis,
subfurcatis, connexis, albis, perangustis, antice
acuminatis; sigmo spongioso-solido, striatulo,
albo rubellovio, primo apice subcoarctato,
3-5 cm. longo; sporis echinulatis, hyalinis,
globosis - ellipsoidicis, 1-quadratis

$8 \cdot 10 = 8 \mu$ vel $7-10 \mu$ diam.; basidiis
 $25-30 = 7-8$ (Bres. M.)

Dosso. Affatto diversa da R. rubra per
la carne, per le lamelle cu.

48 *Rystula bifida* (Bull.) Schröt. *Oly. Schles.* I p. 569 (1889) *Agar. bifida* Bull. Champ. t. 26 (1780)
Rustula furcata (Pers.) Fr. *Epicr.* p. 352 (1838)

Sauv. Syb. fung. IV p. 656 *Rystula furcata* Pers. *Obl. myc.* I p. 102 (1796)
Krombh. *Agric.* p. 62 f. 12 ^{Rystula} ^{Rolland} *atl. t. 36 f. 82*

Den. Bull. l. c. ^{1/2} ~~dark~~ Champ. *Nic.* t. 16 f. 1-9 ^{Rolland atl. t. 36 f. 82} Lanz. F. d' Roma t. 51 f. 1.

Bull. 90, 630, 634, 585, 656, 706, 923, 983, 1015, 1133, 631, 754, 101, 1663
848, 693, 1920

Hab. in silvis umbrosis: Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Corteia.

Napolitania.

Brentino: sopra Arnago, Campiglio (Pres. M.S.)

Area dist. Europa, Amer. bor., Siberia



Tirolo Valp.: Aarna (v. Höh.)

Bifida = furcata 456

Mitis deus amaricans; filo camoso, rigido,
e gibbo - piano depresso infundi, bulbiformique,
levi, misere sericello adsperso glabrataque,
nunc unctino, nunc ^{margine levi, acuto} lacte vidente sed etiam
fusco, albido, 5-7 cm lato; lamellis adna
to decurrentibus crassiusculis, subdistanti ^{bifurcatis}
furcatis, candidis; stipe valido, firmo,
levi, dorsum attenuato, candido, ~~ex parte~~
lato 3-4 cm. longo; sporis globubsis, ^{albis, hyalinis}
^{minute echinulatis} solatrix 7-8 μ diam; bandis 40-50 = 7-8

Osserv. È affine a R. rubra e non a
R. virescens da cui differisce per la forme
del cappello, pel margine acuto, dappresso
inflesso; per la pellicola separabile e non ~~stesa~~
formante verruche e per tutto; caratteri del-
le lamelle.

49 Rustula liversiana (Batsch) Quél. Fl. mycol. p. 365 (1888) Ag. liversiana Batsch St. Cont I p. 53
Rustula consobrina Fr. Epicr. p. 359 (1838) Fig. 67 (1786)
Tav. Syb. Jung. IV p. 166, Agaricus consobrinus Fr. S. M. I p. 60 (1821)
Icon. Fr. Icon. Hyman t. 176 f. 1, Gills Champ. t. suppl., Patouillard
Tab. anal. fig 4, Rich. et Roj. att. Champ. t. 41 f 16-18, Batsch I.c.
Bitt. 39, 737, 1031, 1309 → Trentino: Tegolos, Val di Sole e S. Antonio presso
Hab. in boschi, impadroniti abegnini - Veneto) Toscana, → Trento (Bres. M.S.)
area ritr. Europa, Amer. bor. → estate - autunno →
+ (f)

466 *livesclay* = consobrina

coro alba sub-pellucida (uda) crassa
testa cinerea; colore umbrino, olivaceo-
fusco ~~ferrugineo~~ griseo-virens facile distingue;

Vulgo ampla hand foekens, Accerina; pileo car-
noso, subfragili primus campanulato, dein
expanso depresso, subfragili 8 cm. lato; margi-
ne membranaceo, recto, levigato; lamellis ~~ad fissis~~
confertis, candidis, dionidiatis, furcatisque fili-
rimis, primum pro more liberis, pileo vetero
expanso adnatis, vix venis connexis frat-
haec nota est fallax; Stipe spongioso-farcto,
firme, ex albo cinerescente; Sporis hyalinis,
^{in vitro} ~~albitis~~ subglobosis ^{Ellipticis} 1-guttulatis, leviter echinulatis,

$$8 - 9 = 0 - 8 ; \text{ basidius } 30 - 35 = 7 - 8 \text{ vel}$$

$$45 - 50 = 9 - 11 ; \text{ cystidius } 70 - 75 = 6 - 8 \text{ vel}$$

$$50 - 60 = 10 - 12 - \nearrow$$

Oppos. Per l'isole s'avvicina alle frequenti
per le lamele alte e aggrappate.

50 *Rustula rosacea* (Pers.) Fr. Evar. p. 351 (1838)

Jaa-syll. fung. IV p. 454, *Agaricus rosaceus* Pers. ~~Decolore~~^{em} Syn. p. 439 (1801)
Kon. Bull. Champ. t. 509 f 2, Cooke Ill. Br. F. t. 1020, New Syst. t. 23
f 184.

Brit. 413, 418, 434, 886, 983, 1284. 1965


Hab. in sylvetris acerisij : Liguria, Trentino, Lombardia, Dalmatia,
Napoletano, Rest. Aut. & ~~T~~ Casabero (Mall. & Br.), Valle d'Agriache (Cob.), Varese etc. (Bresad.
ms.)
Area distributionis Europe, ^{Tunisia} Amer. bor.

Rosacea 457

Irregularis, saepe eccentrica; repando ^{via} ~~depresso~~
Carde aerei; pileo compacto, convexo-plano,
in aequalis, viscido, deinde sicco guttato-variegato,
ob coloris intensitate, variante subcarneo, pellicula vi-
scida disparente, esprallente, maculis obscurioribus
guttato, ^{6-11 cm. lato} margin'e acuto, levi; lamellis
adnatis, subconfertis, planis, inaequalibus,
albit, postice divisis, ~~viscis lateribus~~;
stipite spongioso-solido, levi, albo, rubellove,
6 cm. longo; sporis sphaeroideis, papillatis,
6-7 μ diam. vel 8-9 = 6-7 sub micro-
scopio chlorino-hyalinis ~~et~~ ^{et} calicis.

Osserv. - Affine a R. sanguinea, ma irregolare,
spesso eccentrica; ha le lamelle meno appre-
sate, più larghe, meno divise, appena congiunte.



51 *Rustula velenovii* Fr. Sp. or. p. 354 (1858) monsula laevigata
Sauv. Syb. fung. t. 474.
Icon. Krombh. Abb. t. 66 f. 18-19, Bresad. Fungi t. 75, Cook M.
Br.-F. t. 1037 et 1092, Grifl. Champ. t. suppl.
Plft. 242, 737, 1031, 1301  bosco d. Negra (Bergamo)
Hab. in albatris acerisij: (Trentino) Veneto, Premon: Valli Valdast.
Area distr. Europa. Trentino: Castanea (Fagod). +

Veternosa

474

Cavo albo; ~~longissima~~; ~~long.~~

Reticolata; pileo vesiculoso-carnoso, piano-depresso,
polito, pellicula tenui adnata expallente,
margini submembranaceo, levi, 5-8 cm. lato,
e roseo vel incarnato more expallente;
disco albicans vel lutescente, ^{carne alba, spongiosa},
adnatis, angustis, antice latioribus,
inæqualibus, albo-stramineis; stipe
e spongioso cavo, multi, aequali, levi,
fragili, albo; spori ~~squamulosi~~.
globosæ ^{8-9 µ diam} echinulatus, flavifusca.

basidiis 35-40 = 10-12; cystidios 60-80 = 7-10
(Pres. M.)

Obsrv: Per la carne bianca fragilis
e asciutta alle Russule fragili.

52 Rugula violacea (Wor.) Pacc. Agaricus violaceus Scop. Myc. vniⁱⁱ. Ep. 514 (1839)
Rutula violacea (Wor.) m. Adol., Fr. avanc. IC. II (1882) p. 11, t. 11f 13.

Tan. Syst. Fung. V p. 463,

(Bibl. 24 h, 1663)

Yun. Guél. L. c. Pat. Tab. anal. f. 619.

Hab. in latis umbrosis

Toscana, Tirolo orap. Narne (v. Höhn.)

Area astr. Helvetia, Gallo, Italia.

Aest. ≠

Exs. Tan. D. Myc. Ital. n. 1612.

Violascens
violacea

463

(Caro molle, alba, valde piperita);
pipo pilo orbiculari-depresso, 3-5 cm.
lato, tenui, viscoso, striato, amoene
violaceo, anguste albo-marginato,
saepē flavo iridi vel olivaceo ma-
culato; lamellis adnatis, confertis,
semibus, albis, stipite spargiaco,
dein cavernoso, fragili, gracili, striato,
pruinoso, albo; sporis sphacelis,
8-9 μ diam. aculeolatis, hyalinis.

Osserv. Affine a R. serotina.

53 *Rubus pumilans* Bres. F. Tr. I p. 58, t. 64
F. Epov. p. 362 (1888)

Sac. Syll. Jung. II p. 478.

Icon. Bresad. l.c. Cooke M. Br. F. t. 1065, 1066.

Bibl. 234 1663

Hab. in herbis tam confinis quam prados ~~in agro~~ Tridentino; frequens;
area dist. Val. typ. et Montanæ.

: Tzenga, Mol; Brago

Tirolo (Valp. Marna p. H.)

Settembre - autunno. +

Var. *Cepaea* Bres. P. Tr. I. F. p. 58 t. 65 (1884) Sac. Syll. ^{Jung} II p. 478
(Bibl. 234)

Icon. Bresad. l.c.

Hab. in herbis alpinis ^{Tzenga} sub Alpis, Valle d'Isle (Trentino). settembre - autunno. +

pallaris 478

Carcinata, hyalina; pileo, disco excepto, per me-
branaceo, e convexo-convesso explanato depresso, ad me-
dium striato, tuberculo soque, e livido purpureo
lucenscente, disco brunneo, carne ^{hialina} _{nitida}, lamellis attenuato-acute,
tenuibus, compactis, nudis, ex albo pallescens tuf; st-

ipe mox caro albo-lucenscente; sporis ^{hialino} _{gumulo}
~~lucide albidi in cumulo~~ ^{vel hialino} _{submicroscopicis} ~~flavidi~~ ^{vel microscopis} ~~flavidi~~
fere levibus, subglobosis, apiculatis, ^{vel hialinis} _{submicroscopicis} 1-
~~spatulatis~~, ^{vel} ~~subcylindricis~~, ^{vel} ~~echinulatis~~, ^{vel} ~~subcylindricis~~, ^{vel} ~~echinulatis~~, ^{vel} ~~subcylindricis~~
apiculatis ^{vel} ~~per~~ fere levibus aut via punctatis:

~~8x6~~ ⁶⁻⁸ ~~8x6~~ ^{vel} 7-9 ^{per diam:} basidiis
30-32 ~~x 10~~ ~~per~~ ^{varia} ~~varia~~; cystidios 50 = 6-7; ~~paraphysis~~

~~affinis~~ ^{0.5}. Affine a R. nitida ma distinta per la tenuità e i
colori pallidi e non nitidi.

(Caro lutea, modora, acingula)

var. leprosa; pileo carnosò-tenui, e convexo mox
plano-subdepresso, rubro, centro brunneo,
flocis albidi varividis primo keto, glabrescenti, villosulo, mar-
gine striato, 2-3,5 cm. lato; lamellis subdistanti tuf, ~~vel~~ subolu-
tricofis, aequalibus, fundo venoso-conjunctis, postice rotundato-
liberis, ex albo pallide ~~flavidi~~ ^{flavidi}; sporis ^{hialino} _{gumulo} e
spugnoso-farcto cavo, luce-flavido, primis fibrillis albidi
keto, mox glabrescenti, subaequali, vel basi subclavato,
3-5 cm. longo, 5-8 mm. crasso; sporis subglobosis,
echinulatis, subflavidi, sublateritie apiculatis 10 = 8
vel 8x6; basidiis clavatis 35-40 = 10; cysti-
diis fusoidis 60 = 8; paraphysis tuf 20-25 = 6-7

54 *Rustula sororia* Fr. Hymen. Eur. p. 667 et subsp. (1874)

Sauv. Syst. Fung. II. p. 666

Trem. Fr. Trem. Hymen. t. 173, Larber Funghi, t. 19 & 7.

Bol. 693

Hab. nichil nisi Pini halapensis - Corse. Ajaccio (Masre) ^{Aerata} +

Area circ. Europe.

Sororia

466

Pileo e convexo piano depresso, mar-
gine strato, lamellis subdistans, veno-
so connexis, multis dimidiatis sed via
funatio; stipe alto; habitus, color
et caetra R. livefcentis.

55 *Russula felleri* Fr. Epocr. p. 354 (1836)

Sauv. Syb. fung. IV p. 468

Zon. Fr. Zon. Hymen. t. 173 f. 2, Rolland Att. t. 40 f. 88, Cooke III.

B.H. 101

Hab. in Slovakijs - Toscana pr. Pisa (Bassano), Val di Sole, Gouiasdon (Bres. Ms.) = Aestiva. ≠

Br. F. t 173 f. 2


468 *fellea*

Cota straminea, acerina

laxa; caro firma, ex albo-straminea;

pilos carnos ferui, convexo-plano, folito ^{viscido,} opaco
non expallente; ^{5-7 cm. lato;} saepe ~~attra~~ stramineo sed
saepe obscuriore, in gibbum ^{centro et line inde ochraceo-maculato} transiente,
marginem levem, ^{deum} striato.
pellicula hanc separabili; lamellis adnatis
confertis, subaequalibus posticeve bifidis
ex albo stramineis, valde angustis,
jore uno florantibus; ~~stipe~~ stipe duro,
spongioso-farcto ~~caro~~, levi, ex alba
ex albo stramineo, bari ochraceo, $3,5 = 5$ cm. longo,
 $1 - 1,5$ cm. crasso; sporis globosis vel subglobosis
sub microscopio luteis, aculeatis 1-guttulatis $10 - 11 = 9 - 10$
basidiis clavatis $30 = 10 - 12$ cystidios elevata - subfin.
zordeis $55 - 70 = 12 - 14$ (^{Bra. M.})

Osserv: 8 tra le specie distintissime.

56 Rustula vesca Fr. Epicr. p 352 (1838) Rossola edule
Sau. Syl. fung. II p. 165
Zem. Presad. F. Trid t. 95 et F. myc. t. 72, Cooke M Br. F. L. 1075
Bott. 209, 234, 242, 434, 983, 868, 868, 1683. ¹⁸¹⁹ 
Hab. in lichen, imprimis fondosis: Liguria, Veneto, Trentino, Emilia,
Napoliens. Aertate. sp.
Areæ sive Europe. megas, arnago, Paudo del Merlo etc.
(Pres M.R.) Cavaloze
Tirlo cratzy Karne (v. Hohen.)
Aeratae

Vesca 465

~~Mitripiles~~

Laro alba; sapor nitidus, gratus.
Mitripiles firmulo, plano-depresso, venoso,
ruguloso, viscidus, carnosus-rubro,
disco obscuriore; lamellis adnatis,
confertis, tenuibus, albidiis; stipite
solido, extus rigido, reticulato-rugoso,
alto; sporis albis, globosis,
vix aculeolatis (la teraliter),
centro levibus, 7-8 μ diam.
basidiis 40-50 = 7-8
cystidiis 05 = 8
cellulis hymenophori 20-30

in Rev. Mycol. III p. 5 (1881) et

57 Russula citrina G. Kell (Champ de France) p. Suppl. p. 17
Tall. Lyc. fung. I p. 171
Icon. Gll. Champ. t. 187, Cooke 211 Br. F. t. 1078
Bitt. Bresad. Ms., 1301 →

Hab. in pratis et aliorū - Trentin. sopra Malè (Bres. Ms.), Piemonte: Vall.
Area Pistoia, Toscana, Italia, Bavaria. Vall. Valderi (Fago)

citrina sp. f.

(Caro alba admodum firma, odor feru nullus)
Pileo carnoso, convexo, dein plus minus centro
depresso, udo potiusquam viscoso, glabro, rugo-
loso, margine in senectute tantum interculato,
lacte luteo citrino, vulgo concolor, interdum ta-
men margine aliquantulum intidore atque
interdum etiam virescenti tincto, diam.
5-10 cm. (deum pilei centro decolor-
atque obrisces palescente), cuticula praeser-
tim versus marginem facile securibili;
lamellis caudatis, leviter decurrentibus, basi
atque interdum ad medium bifurcatis, an-
tice latioribus, postea sensim attenuatis;
spite pareto, albo, striato rugoso, aequali vel
deorsum leviter attenuato, recto vel leviter in-
fleso: sporis globosis, hyalinis, echinulatis
8 μ diam.; basidiis 32-40 = 8. —

Osserv. Bellissima specie vicina a R. ochroleuca
e a R. pectinata. Differisce si da
queste per il carattere delle
lamelle che distinguono dalle prime, in cui
sono bianco - fosche o bianco - virescenti;
dall'altra s'allontana per margine glabro
e subglabro.

58 *Russula foetens* (Pers.) Fr. Opion p. 359
B Lamellae subliberæ
Saa. Linn. Fung. IV p. 667, *Agaricus foetens* Pers. Obs. mycol. I p. 101 (1796)
Icon. Batt. Champ. t. 292, Vankin. Mic. Bresc. t. 33 f. 1-3, Fras. Sv. Svamp.
t. 40, Lazi. F. d' Roma t. 69 f. 2
Abt. 23, 34, 61, 123, 209, 12, 417, 618, 630, 634, 585, 653, 656, 671, 706,
737, 836, 860, 983, 1015, 1133, 1219, 13, 1232¹⁶⁶³, 631, 1920, 1931, 1965, 1502, 101
Hab. in ~~luridis~~^{prosso et acutis} regn. : Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino,
Emilia, Toscana, Lazio, Napoletano, Coccia. = *Aestata* ^{Bast.} ≠
Area dist. Europa, Amer. bor.

B Lamellae subliberæ
A. acutæ

Avis, foetida; maxima, admodum rigida, odor
foetida odore empyreumatico ^{v. amygdalae amarae} gravissimo mox
distincta; pileo e bullato expanso depressoque,
rigido, pellicula abnata viscido, disco carioso,
margine lato membranaceo, primitus infacto,
tuberculoso-sulcato, denum reflexo repandoque,
10.-13 cm. lato; lamellis ^(primitus liberis) adnexis, valde iriac
qualibus furcatisque, venoso-anastomosantibus,
albidis, primitus florantibus, tenuibus, obso-
letis flaventibus, tritis soridis; stipite valido
e farcto cavo, albidio ~~per~~, 8-10 cm longo,
2,5 cm. circiter crasso; sporis minute echin-
ulatis, subglobosis 8 μ diam vel 9-10 = 78,
obsolete muricellatis.

59 *Rustula pectinata* (Bull.) Fr. Sp. v. p. 358 (1858)
Sacc. Syll. Fung. IV p. 180, *Agaricus pectinatus* Bull. ex p. Champ. t. 509
fig. N (1790)
Icon. Bull. l. c., Lanz. F. N Rome t. 47 f. 3, Cooke M. Br F. t. ~~1101~~ 1101,
Patouillard Tab. anal. f. 620, Rolland Att. t. 36 f. 175
Bull. 209, 103, 656, 923, 983, 1015, 1133, 671, 1920, 693, 1965, 1683 
Hab. in nemoria: Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, +
Area dist. Europe, Tunisia { Tyrol (Aust.), Carnia (V. Hohen.) / Aest. Aut.

pectinata 470

(Peris, odor debilis sed nauseans; adorsum
caro, sub pellicula adnata viscosa, flava),
pileo carnoso, rigido, explanato, depressoque,
opaco, discoides, ~~magis~~ primo erestebulino,
dehinc sicco, difformi, 8 cm. lato, disco
obscure fuscescens, margine pectinato-
sulcato; lamellis attenuato-liberis, conperatis,
unequalibus, simplicibus, aliis, subdistin-
ctis, angustioribus, sed a stipite ad marginem
~~distantibus~~, non plorantibus, nec tactu mu-
tabilibus; stipite spongioso-fascato, rigi-
do, striato, candido, 3 cm. longo, deorsum
manifeste attenuato; sporis 8-10 = 0-8

Osserv. Si avvicina al tipo di R. foetens



60 *Russula ochroleuca* (Pers.) Fr. Epov. p. 358 (1838)
Sam. Syst. Fung. V p. 471, Agaricus Russ. ochroleuca Pers. Obs. myc. I p. 102
(1799)
Icon. Krombh. Abb. t. 64 f 7-9, Bernard Champ. Rock t. 11f 1, Cooke
M. Br. F. t. 1049.

B.H. 661.

Hab. in siliq. montanis. ✓ M. Genova pr. Cascina (Carta Toscana) +
area siti Europe, Amer. bor.
(Centrafrica)

obsoleta

471

Acris; odor obsoletus sed gratus, pilei pellicula tenuis, arête adnata, color e luto expallens nec unquam rubens; pileo carnoto, expal- nato, depresso, folito, adnato-pelliculoso, expal- lente, 5-7 cm. lato, margine patente levigato, tantum exoleta remote striato nec tuberculoso, 5-7 cm. lato, lamellis postie rotundatis, conjunctis, latis, subaequalibus, albo-falle- scutibus, liberis persistentibus, non florantibus, stipite spongioso, faretto, primo, reticulato- ruguloso, ex albo-cinerecente, 2-3 cm longo; sporis ovatis, papillatis $\frac{7}{4}$ in diam - \nearrow

61 *Russula emetica* Fr. Epicr. p. 357 (1838) Rosetta, colombina rossa
(Schäff. P.-L.)

Sau. Syll. fung. I p. 669.

Icon. Fr. ~~deux chapeaux~~ Sver. Skand. t. 21, Harz. t. 63 Barla Champ.

Nic. t. 14 f. 4, Lang. Fr. & Roma, t. 48 f. 1. Bresad.-F. mang. t. 73

Pelt. 61, 90, 123, 209, 242²⁴⁵, 12, 41, 342, 418, 430, 434, 585, 638, 653, 656,
661, 704, 725, 853, 866, 923, 983, 1015, 1133, 1228, 669, 1284
851, 1920, 693, 1965, 1663 : arco (Dist. ^{part.} Valtellina (Antro.), 10pm

Hab. in Alpi: Liguria, Piemonte, Lombardia, Cant. Ticino, Trentino ^(Brennero), Veneto, Emilia, Marche, Toscana, Neapolitano, Sicilia, Corsica, ^(Borsig) (det. aut. #).
Area distr. Europa, ^{Tunisie} Africa, Australia, Japonia

Fir. cisl. Verna (v. Höh.)

Ott. Sec. Quel. qui spetta Ag. emeticus Schäff. t. 15 f. 1-6, da altri riferito a R. subrosea

caro alba, sub pellicula separabilis
Ampla, speciosa, regularis, firma, dein fragilis;
rubella,
 ceris; pileo carnoso, explanato depresso, prolixi,
 nitido, 5-10 cm. lato; ^{pumiceo, mox sanguinante, dein fulvo vel interdum ochraceo et tenui uidebitur} ~~corolla~~ marginem patente demum sulcato · lamellis liberis, aequalibus
 lati, sub distans candidis, numeram pulve
 raceis; stipite spongioso - solido, primo, elasticio,
 levii, albo rubellave, 6-8 cm. longo; sporis
 gbaeroideis, satirabatis ~~gatris~~ vel sub glo
 bosis, sat in cumulo albo - luridis, ~~sat exera~~
~~expansoria~~, 1 - guttulatis, ~~ad~~ ~~luteis~~
~~et~~ echinulatis, hyalini 8-10 μ diam.
 vel 8-10 = ~~8~~ 8; basidius 35-40 = 8-10;
 cystidiis 50 = 60 = 8-10 - 1

Osserv: c'è un'altra forma più sviluppata col cappello
 da campanulato espanso, colle lamelle sempre
 libere; un'altra col cappello da convesso espanso
 colle lamelle che sembrano attaccate.

L' A. atro-purpureus Krombh. t. 64 f. 5,6 viscosa
 pel sapore nita; L' A. aurora Krombh. t. 66 f. 4-7
 pel colore pallido.

62 *Rustula fragilis* (Pers.) Fr. Sp. p. 359 (1838)

Ian. Vitt. Journ. V p. 142. Agaricus fragilis Pers. Syst. p. 440 (1801)

Icon. Krombh. Abb. t. 64 f. 12-18. Bull. Champ. t. 509 f. T, U, Bale
Champ. Rice t. 14 f. 10-12, Lang. F. d Roma, t. 47 f. 2.

Bibl. 61, ⁹⁰, 244, 357, 417, 418, 424, 585, 656, 671, 777, 866, 923,
983, 1015, 1031, 1133, 1283, 631, 1920, 1301, 693, 1965, 1502,

Hab. in silvaz, ^{et præc.} Liguria, Piemonte, ^{(magros, sopra Ormeo (Bren. ms.)} Lombardia, Trentino, Veneto, ^{Toscana} Lazio,
Napolitano, Corsica Aut. Aut. +
Area di tr. Europe, ^{sibim}, Amer. bor., Australia, Tunisia, Japonia.

Var. cerasicolor: pileo colore cerasino, centro nigrante. Cf. v. Höhn. n. 1663

Hab. in Silvaz - Tirolo Cisalp. Narva (v. Höhn.)

II
Ott. N. Fayod, Ann. Journ. Vald. p. 87, uta come raccolte ad Angrogne, le
Rust. Shorea Fr. che è intitolata una fm. della presente.

Aeriforme; pilo laxe carnoso, tenue, piano, depresso inaequali, pubito, pellicula tenue expallente, viscidulo, 5-6 cm. lato, margine tuberculoso-striato; lamellis adnexis, tenueibus, confertis, ventricosis, candidis; stipite e fusto cavo, nitido, 2-4 cm. longo; spori globosis, echinulatis, hyalini 6-8 μ diam.; basidiis 30-35 = 80 μ ; cellulis hymenophori 30-50 μ diam., cystidiis 40-45 = 7


Osserv. Sufficientemente si separa dalle forme fragili di

R. emetica; ma le lamelle sono molto più appressate, più tenue e all'apice spesso corose, e ventricose; il cappello è più tenue, più largo & rotto la pellicola più tenue, sotto scolorante la carne a' affatto bianca; il margine tuberculoso e tutto il fungo in genere è minore e più fragile.

È di color vario, ma sempre più pallide di R. emetica; la forma tipica ~~aranciata~~ leggermente sanguinea, nei luoghi aquosi inabituata è l'A. niveus Pers. Syn. p. 138 ~~Abd et Schr.~~

~~Schr. p. 311, Schr. n. 536.~~ ~~Tutte forme più tenue e lamelle più meno appressate. Una sua varietà colla gomma e le lamelle all'apice rotolate è l'A. Linnæi bottissimum Fr. 68.~~

N. presat. (mf.) ~~posta d'una varietà carnea-blanc~~



63 *Russula fallax* ~~(Schäff.)~~ Fr. Hymen. Europ. p. 669 (1874) T 16 & 1-3
Sam. Lytt. fung. IV p. 470, *Agaricus* ^{emeticus} ~~gallinaceus~~ Schäff. T. fung. IV p. 9 (1774)
Icon. Schäff. 1.c.
Bibl. Manalongo in Bull. Soc. bot. ital. 1912 
Hab. in humids - Trentino: Cavalese (Messal. & Bres.), +
Area distr. Europa, Australia. / Rest. Aut.

170

fallax

Tenuior, fragilior; pileo sordide rubente
~~vetti~~ colore, opaco, discoides, lamellisque
adnexis, distantibus, albidis aquoseve
pallentibus; sporis 8-10

Oppos. Comunemente confusa con P. fragilis,
se ne distingue per cappello regolare, per
le lamele distanti, non candido, ammesso
solo per un uncino.

64 Russula depallens (Pers.) Fr. | Epicor p. 353 (1838)
Pan. Syst. Fung. V p. 458, Agaricus depallens Pers. Syn. p. 440 (1801)
Icon. Krombh. Abb. t. 66 / 12-13, Gillet Champ. L. 182, Cooke M.
Br. F. t. 1021.
N. 12, 704, 866, 693, 1663. 
Hab. in graminotis, ^{muscig.} ericetis + Sarda, Toscana, Corsica
Area ritr. Europe. 
Carabba (Matt. et
Pres.)
Tolto cicalp.: Narne (v. Holm)


Q.M. Dalla sspine R. grisee si distingue sotto per le lamelle a 6 grose bianche (Pres. M.S.)

Mitis; pileo carnoso, firme, undulato^x difformi,
levi, opaco, pellicula tenue, viscida, atnata,
illuc exhalante, 8 cm. arciter lato, primo
rubescente vel fuscescente, mox, praeipue deko,
albicante, flavescente etc.; marginis extre^mo,
semum striatulo; lamellis adnatis, confertis,
fragilibus, postice furcatis, albidos; stipite
firme, seorsum attenuato, ex alto emerescente
3-4 cm. longo: sporis in cumulo albis
vel albidos, subglobosis, echinulatis, sub
~~obsoletis~~ microscopio hyalini
ad aculeolatis 6,5 - 8,5 = 6-7
vel 8 - 9 = 7 - 8; basidiis 40 - 45 = 10;
cystidis 55 - 65 = 9-11 (Pres. MS.)

65 Russula cyanoxantha (Schäff.) Fr. Monogr. II p. 194 (1853) *columbinae magiore, inedente*

Soc. myc. fogg. V p. 465, Agaricus cyanoxanthus Fr. Km. IV p. 40, t. 97 (1774)

Zem., Schäff. l.c., Bresad. F. mang. t. 71, Krombh. Abb. t. 67 f. 16-19

Rolland Att. t. 37 f. 29, Pat. Tab anal. t. 320, Vert. Mic. 163 f. 1-4 (*R. versa*)
B. B. 262, 266, ^{t. 63} 357, 617, 618, 634, 681, 704, 836, 1015, 1133, 1284,
631, 754. 1920, 693, 1965, 1502, 1663.

Hab. in sibi proutis. Lombardia, Veneto, Trentino, Toscana, Napoletano,

Corsica, Aest. ant. Sp.

area dist. Europa, ^{Tunisia} Amer. bor.

: male, Injenga, Magras, Tergolas etc.
(Bres M.R.)

Calabria (Mass. et Br.)
Tirolo ^{Maria} (v. Höhn.)

67. Soc. Maine Bull. Soc. mycol. Fr. 1910, p. 171 & specie d. Schäffer, t. 93
— sarebbe eguale a Russ. grisea (Pers.) Bres. — sarebbe quindi diversa da R. cyanoxantha Fr. et Mitt.

465 cyanoScantha

caro firma cæcosa, sua pellucida secernibili vulgo
umbella color at modum pectinatis e blacio vel
purpureo olivaceo-virens, disco vulgo expalente, superintegescere
Mitis; ; piteo compacto, e convexo - plano depresso;
vel infundibuliformi, viscoso, variegato, 6-8
in lato; margine subcaeruleo, denuo striatuto;
lamellis rotundatis latis immixtis brevioribus fur-
catisque, candidis, ^{attenuato-concreta} stipe spongioso - farcto,
leni, glabro, candido, 6-8 in. longo;
sporis 8-10 = 6-8 subglobosis, 1-guttulatis
minute muricellatis vel via hyalino-chlorinio.

- 5

66 *Russula aerugininea* Fr. Monogr. Hymen II p. 198 (1863) Myc. Smith.
Sau. Lbh. Fung. IV p. 472 ~~*Ross. graminicola* Socz.~~ ^{329.} I p. 508 (1873)
Den. Fr. Non. Hymen t. 173 f? ~~*Ross. graminicola* Quel. Fr. I p. 362~~ ^{Myc. p. 362} (*R. vesca*),
M. Br. F. t. 1090.
B.H. 209, 733, 1015, 631, 1965, 693, 1663 →
Hab. in silvis
Area dist. Europa
Veneto, Lombardia - Corsica. Aert. aut. $\frac{SR}{}$
, Tirolo, Italiæ. Harne (V. Höhn)

Ott. L'unica fig. documentaria
verdognant / rappresentante
per questa specie:
stata dal Socz., e Paul. 74f 1 / le prevat
invece *Russ. foecula*.

2 aeruginea 472

caro alba

(Mitis; sapore mitis, gratus;) fileo e con-
vexo explanato, disco obscuriore depresso,
levi, subtilis, aeruginoso-irradii, margine
strato; lamellae postice attenuatis, leviter
adnexis, subdistans candidis; stipe
fermo, levi, glabro, candido; sporis 8-10^μ
diam. — ↗

Osserv. È delle specie più ~~grande~~ insigni,
e in questo gruppo facilmente si riconosce
per sapore mito e grato.

67 *Rugula lindneri* (Pers.) Schröt. *Pl. Schles.* p. 546 (1889), *Agaricus lindneri* Pers. *Syn.* p. 446 (1801)
Russula heterophylla Fr. *Epicr.* p. 352 (1838)

Sacc. Syllo. Fung. I p. 465 *Agaricus heterophyllus* Fr. *S. M. T.* p. 59 (1821)

Gen. Berk. Outl. t. 13 f. 5, Cooke *M. Br. I* t. 1044-1045 *Vittad.*
F. menz t. 27, *Vivianii* F. 2 *Nat.* t. 60.

Bibl. 209, ³⁴⁰ 240, ³⁴² 434, 639, 886, 1015, 1133, 1228, 1252, 1284, ~~631~~, ^{693, 1301} 1920
¹⁹⁶⁵

Hab. in *graminotis mucosis*: ^{Riemann} Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana,

Napoleotano, Cortece. Restate - Aut. P.

(Trotto cratyp. Narne (v. Höhn.)

Area distri: Europe ^{Tunisia}, Amer. bore



livida = heteropshylla 465

Miki, ^{carnes albae} ~~carnes~~
Miki, ~~carnes~~ pelle carnosa, fissa, e convexo - piano

depresso, levi, polito; pelle ^{ob} viticidulo nel omnino
secco, nunguan subescante nec rugoso - virgato; pelle ^{ob} dispergata &
margine ^{primo inflesso} ~~carnes~~ ^{viticidulo nel omnino} ^{5-8 mm. tato}
attenuato - attingentibus ^{ob opere subtiles subinde in acetabulum di-}
^{latatum remotis apparentibus;}, angustissimis, confertissimis,
furcatis dimidiatisque, candidis, stipite solido,
fermo, subaequali, levi, candido, & un. longo;
sporis exiliis 6-7 = 5-6

Osserv. Si distingue dalle precedenti per i capelli visciduli,
~~non esplosi, né rugosi rugoso,~~ per le lamelle opposte
e per la statuta comunemente più piccola da
R. virideus per il margine dappresso ^{inflesso},
per le lamelle strettissime Non fu mai vista rossa.
Nella Determinazione di queste specie ai colori sono
ricorrere ^{ai colori} con cautela,

68 *Russula lecea* Quélt. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876 p. 330 f. 2 f. 8
Succ. Syst. Fung. IV f. 465.
Icon. Quélt. l. c. Lary.-F. & Roma L 48 f. 2, Cooke Ill. Br. F. C. 1054.
Bots 234 656. 1683
Hab. on ~~black~~ ²³⁴ ~~black~~ Tirdi ^{gralf.} Karne (V. Höhne) Aest. Aut.
Lagro - 

var. carnicolor Bres. F. Tr. I. p. 23 f. 128 (1892)
Succ. Syst. Fung. ~~IV~~ XI 30 (Bres. M.S.)
Hab. n. ambrone, Val d' Sole (Trentino) 
Trentino: Tzengia 

*C*aro sub uterula violacea, pileo convexo
dein depresso, subcarnoso, viscoso, violaceo vel
purpureo, margine ^{obverso} ex parte strato, 5-8 cm.
lati; lamellis distantibus, ventricosis, albis, re-
nifo-connexis, stipe spomziose corticato,
fragili, sursus pruinoso, albo basi roseo,
non glabris, asperulis, 8 in diam.

var: carnicolor a typo differt tantum
colore pilei, qui nunquam lilaceo
~~est~~ sed carnicolore, centro primis
fusco livido, dein cruce colore.

69 *Russula agrestis* Bres. F. Th-d. I p. 20, t. 24 (1882)


Sau. Syst. Fung. II p. 480,

Icon. Bresadole l.c. Cooke Th. Br. F. t., Sittel Champ. t. suppl.

Bill. 234, 244.

spp. il Pandarico *spp. Moti* (Bres. ms.)

Hab. in aliis coniferis: Trentino Toscana,
area dist. Italia, Galles, Bretannia



Rest. Aut.

Ott. Moro. b*r* *R. cyanoxantha* & *R. heterophylla* (Bres. ms.)

Azurrea 470

P. (Caro alter, mutis, grata)

Pileo carnoso e convexo explanato depresso,
mod succo et leviter constanter minute granuloso,
margine vix in exoletis substrato, amoenae cocculeo,
margini interdum liliaceo subexpallente, epidermis
separabilis, 4-5 cm. lato; lamellis compactis, aequalibus,
raro nonnullis dimidiatis immixtis, postice atte-
nuato - adnexitis bifidisque candidis, immutabilibus;
stipe constanter albo, ventricoso vel basi clavato,
glabro, subruguloso, firmo, spongioso solido,
aestu subcavo, 4-5 cm. lato, 10-15 mm. crasso;
sporis hyalinis, subglobosis, echinulatis $8\frac{9}{10}-8$;
in cumulo candidis, 1-guttulatis; basidiis
clavato - subcapitatis, $45-56 = 12$; cystidios
 $65-75 = 10-14 - \varnothing$

Obsrv. Per il colore si avosta a R. cyano-
xantha, da cui però ottimamente si distingue;
piuttosto è prossima a R. ceratia