

Bozza di Stampa.

Raccomandate



All' Illustrissimo Signore

Prof. P. A. Saccardo

R. Istituto Botanico

Padova

(Spedire Prof. L. Gaia  
Via Crosetta 3  
Genova)



ver

14 *Cantharellus*



F. A. SACCARDO  
R. Otto Tschul  
1890

PIRELLA  
MADDA  
EXCELVIA  
1

13 *Cantharellus*

SACCARDO  
1890  
PIRELLA  
MADDA  
EXCELVIA

22 *Cantharellus*

40/0009-1

Cantharellus Adams. in Juss. Gen. p. 6, Fr. Cym. p. 255-

(Ethm. a ~~Crabellus~~ Cantharos Anthony, poculum)

Hymenophorum cum stipite continguum, in tramae immutatae descendens.

Lamellae crassae, carnosæ, carno-ceraceæ, pliiformes, subramosæ, arcu oblique. Sporae albae. Fungi carnosæ, membranaceæ, putrescentes, velo nullo.

Obs. Genere analogo e appena a Crabellus, fra le Telephorace, dal quale si distingue esclusivamente per la presenza di vere lamelle, che nel Crabellus sono ridotte a semplici plechi o rugature, ta conspectus synopticus ~~sectionum et specierum~~ struttura e la fisionomia però sono simili.

(Leptotus Karst.)

I) Pilus subsettis; integer, primus capularis, vertice adsparsus, dein reflexus. Sect. I. Resupinatae

A = Candidus, lamellæ dichotomæ

1. C. cryophilus

2. = Albidus cinereus, lamellæ reticulatae

2. C. reticulatus

II) Pilus stipitatus

1) Stipes numerosissimus, in columnam elongatam coadunabile vel ramosa (Meristma)

Sect. II Meristma

a) Specie alba

3. C. polycephalus

2) Stipes simplex

A = Dimidiata, stipes exarata lateralis (Leptoglossus Karst.)

Sect. III Pleuropus

a = Pilus horizontalis, lamellæ stipes basi villosæ

4. C. muscigenus

b = Pilus erectus; arachnoides, stipes pruinatus

5. C. glaucus

B = Pilus australis; pilus integer (Eucrentherellus)

Sect. IV Mesoporus

a = Stipes caeruleus, vel fuligineus vel farinosus, pilus submembranaceus

b = Stipes et pilus non lutescentes

1. = Lamellæ albae

6. C. leucophyllus

B. = Lamellæ griseæ vel cinereæ

7. C. helvelloides

a. = Pilus fusco-pallidus, vel rufescens, stipes pileo dilatior

8. C. hydrophilus

b. = Pilus et stipes fuligineus inorescentes

B. = Stipes lutescens

A. = Pilus subfuscus capillaris; lamellæ multifido-ramosæ

9. C. subformis

a. = Pilus flavescens, infundibuliformis, lobatus

10. C. lutescens

b. = Pilus leonisculus, orbes umbilicatus, subregularis

B. = Pilus fuligineo-flavidus; capillaris; lamellæ dichotomæ;

11. C. infundibuliformis

a. = Stipes simplex

var. subramosus

b. = Stipes subramosus, basi cornutus

b. = Pilus et stipes plerunque solidus, carnosus.

c. = Lamellæ albae vel candidæ

A. = Pilus non nigricans

12. C. Euriusii

a. = Stipes fistulosus

13. C. albides

b. = Stipes solidus

B. = Pilus niger vel cinereo-nigricans.

14. C. muscoides

a. = Pilus ex umbonato-depressus, cinereo-nigricans; utrinque magis

15. C. carbonarius

b. = Pilus umbilicatus, ex spadiceo niger; in aere carbonarius

B. = Lamellæ coloratae

A. = Lamellæ pallens primo carneæ

16. C. olidus

a. = Pilus albus, olidus

b. = Pilus carnosus vel miniatus

a. = Pilus compactatus, margine undulatus

17. C. subcarneus

b. = Pilus centro depresso, margine lobatus

18. C. miniatus

B. = Lamellæ lutescentes

a. = Pilus lomentosus vel villosus, aurantius

19. C. aurantiacus

a. = Lamellæ rameæ

20. C. friesianus

b. = Pilus glaber vel paucimaculatus, villosus vel albus

a. = Pilus pruinosa lilacina obductus

21. C. amethysteus

b. = Pilus glaber

A. = Pilus rotellinus

22. C. edulis

B. = Pilus albus

var. albus

1 *Cantharellus bryophilus* ♀ (Pers.) Fr. <sup>S.M.I.</sup> ~~Epic.~~ p. 325 (1821)  
Jac. Syd. fung. IV p. 696, *Rganicus bryophilus* Pers. Obs. myc. I p. 8, t. 3 f. 1 (1796)  
Tun. Pers. l.c., Nees Syd. t. 31 f. 237.  
Bull. 630, 639, 1284, 1965 ~~in Croatia~~  
Hab. ad Musco <sup>in Croatia</sup> Piemonte, Lombardia; Serbia: Kukumovo.  
Area distribution Europe

♀ I *Leptotus* Karst. (1879) (= *Dichotoma* Gréz. e.p. 1886)

bryophily 496

S  
Submembranaceus, cupularis, can-  
didus, vertice punctato striatus, extus villosus;  
& fissilis, 5 - 8 mm. latus, lamellis  
latius, dichasoming, strictis e centro radiantibus,  
autiusculis; sporis (ad huc ~~integris~~ inobservatis).

Observ. Valde Agaricoides

2 *Cantharellus retrorsus* (Bull.) Fr. Ep. v. p. 368 (1838)

Soc. Lyt. Zool. Fung. I. p. 497, *Helvella retrorsa* Bull. Champ. t. 498 f. 1.

Icon. Bull. l.c., Cooke M. Br. F. t. 1112, J. H. Champ. t. 146.

Bull. 183, 430, 585. — ~~X~~

2 Area dist. Europa

(Hab. ad cultos et inter muscos — Piemonte (Cotta) Veneto; Friuli (Berl.)

Trentino: Magra, Mengra (Pres. Ms.) — Asolane - Adria

Vetriggy 197

Membrañaceus, expansus, repando  
lobatus, albido - cinereus, postice fi-  
<sub>subcissulis</sub>, raro in stipitem productus; pileo 6-10 mm. lato;  
brills adspersus; lamellis e centro rug-  
d'antibus, tenuerrimis, reticulatis;

Sporis 6-8 - 3-5

3 *Cantharellus polycephalus* <sup>#</sup> Bus. F. Tr. p. 59, t. 57 f. 1 (1884)

Jan. ly M fung. V p 294

Gen. Pres. l.c.

Hab. ad Muscos nr. Rhone Tridentina: Sopramonte (Bar. Turco - Lazzari)

tree dist. Nat. bor.

Bott. 274



= Autunno =

\* II Meristema Fr.

# *Polycephalus leggei*

Ramosi, carno-piacevoli, incolori, inospitati;  
convessi - umbilicati, subinfundibuliformibus,  
albis, margini lobato, con colore, demum stra-  
minei, pubescentibus, 6-8 mm. lati;  
lamellae crassi, venoso-ramosi, albi, decurren-  
tibus; stipite faro, subaequali, albi, tomen-  
toso, villosi, apice ramoso, 2-3 cm. longo;  
2-3 mm. crasso; sporis ovato-ellipticis,  
hyalini, 1-guttulatis 6=3,5

Osserv. Questo fungo non sembra immediatamente  
prossimo a nessun altro del genere;  
per il colore e le dimensioni concorda  
con Cryphalia scyphiformis con cui vive.

L'autore da prima ha creduto anzi una  
progenie mostruosa di quella specie, ma  
le lamelle grosse, ottuse all'apice; il germen  
intensamente fiocoso - lomato so, la carne fra-  
gile e la vegetazione paramitica sopra  
i muschi se lo rendono affatto distinto.

4 *Cantharellus muscigenus* (Bull.) Fr. S. M. I p. 723 (1821)  
Sau. Syst. fung. IV p. 695, *Agaricus muscigenus* Bull. Champ. t. 288 (1785) et 498  
f 2 (1790)

Ter. Bull. l.c., Bern. Champ. Rch. t. 43 f 9, Cooke M. Br. F. t. 1115, Pl.  
Tab. anal. f. 12.

Bull. 61, 245, 430, 434, 585, 638, 725, 983, 1081, 1173, 1920 →

Hab ad Muscos majorum in Allobraja: Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana,  
Napoletano, Sicilia. Rest. Aut.

Area distri. Europa, Groenlandia, Amer bor. Australia.

→ III *Leptoglossum* Kartt. (1879) (= *Dichotomus* Quel. s. p. 1886).

*muscigenus* H. G. S.

Serotinus;

pilco submembranaceo, spathulato,  
horizontali, glabro, tonato, e fuso  
cineroso - albidente, 1-2,5 cm lato;  
~~stipe~~ lamellae tumidis, distantibus, ramosiss, concoloribus,  
stipite lateral, levavi, basi villosa; basidiis clavatis  
sporis 10-12 : 6-8 (<sup>(Birn)</sup> vel 9-11 = 3-5 (Pres. sec.  
exempl. berol.)  
~~Als in ecamplari a Berolina~~)

5 *Cantharellus glaucus* (Batsch) Fr. Hym. Eur. p. 460 (1874)  
Sacc. Sylt. fung. V p. 495, Agaricus glaucus Batsch Elench. fung. Cont. I  
p. 169, f. 123 (1786)  
Icon. Batsch l.c. Holmst. of. Fung. Dan., t. 23, Cock M. Br. F. t. 1115.  
Bibl. 263, 1965   
Hab. in Sabotogy - } Lombardia; prov. di Parma (Carara). Aut.  
Area dist. Europa. } Piemonte: pr. Vercelli (Cavalese)  
Exsic. Carara F. Long. n. 157, Klotzsch I n. 1605, II n. 110

# glacancy of 95

Serotinus, terestris, grisens; pileo membranaceo, ligulato, adscendente, sericeo, acorno; puro erecto, subclavato; lamellis phisformibus, tumidis, distantibus, dictionis; stipe laterali, levavi, pruinato; basidi clavata;  $25-35 = 6-7$ ; i spore globuloso-ellipticas 5-6=4.

Dess. Simile a Pleurotus tremulus per il  
qual questa specie mi avvicina <sup>ai</sup> ~~agli~~ Pleurot.

6 *Cantharellus leucophaeus* <sup>(Pers.)</sup> <sub>Monel</sub>, in Mem. Soc. Lille <sup>1829-30</sup>  
Tav. Lyt. fung. I p. 490, *Merulius cinereus* var. *leucophaeus* Pers. Myc.  
var. II p. 15 (1825)  
Nom. Monel l.c., Cooke Ill. Br. F. t. 1111, Brit. Hymen. t. 529 f. 11.

Bitt. 61.

Hab. ad terram in ~~foliis~~ Liguria: galli (Dufour, Bagletto)  
Area dist. Gallia, Italia - Australia

Octobri

IV Eucantharellus

# *Lerophorus* 490

Pilei submembranacei, lento, infun-  
dibuliformi, glabri, fuso-umbonati, arconi, haud perio-  
lariellis distantibus, simplicibus, immixtis di-  
chotomis dimidiatisque, albis,  
stipite farcto, tenui, levi, concolore, basi  
subincrassato 1-2 mm crasso; sporis subglobosis  
majusculis, 10-12 = 8-11 (Britz.)

Innes. Specie esimia appena affine a *G. hydrolyta*,  
e minore.

2) *Cantharellus cibarius* Fr. Epicr. p. 367 (1838)  
Sac - tyk Zing V p. 491

7) *Cantharellus helvellodes* (Bull.) Quél. Pl. mycol. p. 38 (1888), Agaricus hel-  
vellodes Bull. Champ. t. 601 f. 3 (1793) Merulius elegans Pers. Syn. p. 492 (1800)  
Icon. Bull. l. c. Pers. l. c. t. 5 f. 2, Pat. Tab. anal. f. 262.

Bibl. 737, 1031. ~~X~~

Hab. inter muscos in silvaticis - Veneto: Tregnago (Mass. et ap. Pers. ms.),  
Area dicit Europa, Toscana

(Autunno)

# *cupulata* Degl

fileo submembranaceo, plans - infundibuli -  
formi, repando, hygrophano, udo glabro,  
marginisque striato, niceo flocculoso exstro ;  
cupulari, tenaci 1,2 cm. lato, haut conato, fuscopallido  
vel rufescente ;  
lamellis valde distantibus, fasciculato - ramosis,  
dimidiatisque, latos, griseis ;  
stipe farcto, aequali, polito, glabro, dit. 2,5 cm.  
longo, 1mm. crano, tenaci, fileo dilatatione,  
sporis 6 - 8 = 3 - 3,5 ; bandis 25 = 6 - 7

Observ. Non si confronta con Aerotus degener. (Fr. l.c.)

Cantharellus hypoleucus (Bull.) Schröter Schles. I p. 509 (1858), Helvetica Hydrolog. Bull. Champf. t. #65/2 (1787)  
Cantharellus cibarius (Pers.) Fr. M. I p. 320  
Saa. Syl. Fung. IV p. 190. Merulius cibarius Pers. Sc. et descr. I p. 10 t. 3 f. 3 (1798)  
Icon. Bull. l.c. Pers. l.c., Krombh. Abb. t. 65 f. 12, Cook Ill. Br. F. t. 1110.  
Art. 23, 61, 90<sup>101</sup>, 123, 209, 66, 418, 430, 518, 585, 985, 1965, 693 1/33   
Hab. in silvis: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Toscana, Corsica  
Area circ. Europa, Amer. bor., Australia. (Valle d'Aosta (Gob.), Inzenga  
(Pres. Ms.)  
(Restato - Autunno -)

Sixt. Myc. Ven. n. 1304

# Hydrocolipf L = cinereus Jgo

pileo submembranaceo, infundibuli -  
formi, ad basim perire, villoso - aqua -  
nuboso, fuligineo - nigrescente;  
lamellis crassis, distantibus, cinereis;  
stipe cavo, fuligineo - nigrescente; 6 cm. longo,  
deorsum ~~att~~ subattenuato; spore 15 = 8  
(Berk.) vel 9 = 5 (Cobelli)

Osserv. Per l'abito è molto simile a Craterellus  
cornucopioides, ma fin da principio  
diff fin da principio ha le lamelle  
abbastanza larghe e la struttura  
dell'interio diverse.

Lat 34 di Bott ~~si rappresenta~~ farse  
questa specie, me, come il salito,  
men bene delineata.

9 *Cantharellus tubaeformis* (Bull.) Fr. S. M. I p. 319 (1821)  
Sau. Syst. fung. IV p. 689 *Helvella tubaeformis* Bull. Champ. t. 461 (1789)  
Trem. Bull. l. c., Pars. II. et Descript. I t. 6 & 1, Battarra Arim. t. 23 f. 1.  
Cooke W. Br. F. L. 1108, Gill. Champ. t. 146  
Bol. 23, 61, 90<sup>101</sup>, 244, 245, 103, 430, 545, 602, 923, 983, 1133, 848  
— 1282, 1965, 1652, 1920, ~~1920~~  
Hab ad terrain adum. detriticam in silvis. Lombardia  
Liguria, Premonte, Liguria,  
Tirol, Toscana, etc.  
area di str. Europa, Amer. bor.

Lombardia  
Trentino: nei prati e Monti -  
vaccino presso Trento (Pres. M.S.)  
Autunno = Autunno +.

vedere C. iugularis

# tubiformis + 89

Carpitus; inferior superficie modo  
stipe made filo carnosus.

(filo carnosus - membranaceus), in -  
fundibulariforme, repando lobatoque,  
fasciculoso, subfuscus, expallente, 1,2 - 5 cm. lato;

lamellis crassis, distantibus, multilobis - ramosis,  
lutescens, fuliginosus, nudis;  
stipe cavo, glabro, aurantis - ful -  
vente, densum compresum, lacunoso, 5-6 cm. longo,

1 mm. crano<sup>3</sup>  
~~7-8 = 4,5 (Woolf)~~, 8-10-7-8 (Porter)  
9-11 = 7-8, banduis 60-90-8-10 (Pres. M.)

Ovovo, 6 medias las Ganth. lutescens curvo  
modificata per l' inservio

10 Cantharellus lutescens Fr. Spec. Pl. 366 (1838) Cantharellus giubilo  
Jan. Syst. Fung. V p. 490, Helvella cantharellus Desm. Bull. Champ. t. 473 (1789)  
Merulius lutescens Hl. and non Pers.

Type Bull. C. c., Presid. F. mang. t. 81,

Bull. 90<sup>101</sup>, 242, 585, 662, 868, 983, 1133, 1920, 1652, 1301, 1284

Hab. at lower elevations in Swiz.: Liguria, Piemonte, Trentino, Emilia,

Toscana, ~~etc.~~ Rest. Aut. It.

Area dist. Europe

# Grotescus Lgo

(Caespitosus;

Piles convexo - umbiliato, leviusculo  
subregulari; lamellis <sup>amoene aurantijs & aureoij</sup> <sub>minus div.</sub>  
ris: stipite magis aequali, sursum  
attenuata. Coetera C. tubiformis.

Ciporis ovoides - ellipsoides 10-13 x 7-9.

Onore Unisce C. tubiformis con  
C. infundibuliformis

11 *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fr. Epicr. p. 368 (1838)  
See. L. J. Fung. IV p. 190, *Merulius infundibuliformis* Scop. Fl. Carn. II p. 462  
(1772)  
<sup>2<sup>nd</sup></sup> Nyc. Nat. p. 806  
Icon. Fournth. Abb. t. 46 f. 4-9, Bernard Chapt. Rodo t. 43 f. 1, Lary.  
F. d' Roma t. 45 f. 6.  
Bitt. 61, 244<sup>2<sup>nd</sup></sup> 653, 656, 983, 1133, 154, 1920   
+ Hab. ad terram et ligna putida in silvis: Liguria, Veneto, Trentino,  
Lazio, Toscana, Rest. Aut.,  
Area distri. Europa  
X

~~Lombardia~~  
(bosco di Magra (Berg. Ms.)  
~~Aestato = aut.~~

Var. subramosus Bres. F. Td. p. 87, t. 97 (1887), Sacc. Syll. XXI p. 105  
+ Hab. in silvis prondosi - ~~in agro Tridentino Trentino~~: ~~bosco~~ ~~di~~ ~~Liguria~~ (Berg. Ms.)  
Aestato autumnum

# infundibuliformis

(Color minus intenso, evasione rara)  
persistente:

Pleos submembranaceo, ex umbilicato infundibuli

formi, flosco ~~rugoso~~, fuligineo-flavido,  
espallente; lamellis crassis, distanti, dichotomis,  
flavif unicolori, densum pruinatis;  
sporis stipite fistuloso, leri, glabro,  
flavo, 5-8 cm. longo, circ. 4 mm. crasso;

sporis orbicularibus - ovoideis, dilatissime

flangentibus vel subincoloribus ~~9-10~~  
~~H = 9-10~~; basidiis 70-90=6-8 (Pores. Ms.)

Osserv. Per i caratteri vaghi indicati e i sinonimi  
affini che non mi possono determinare; spesso  
non senza difficoltà si distingue da C. tubiformis.  
Non si avvicina però a Craterellus lutescens.

Nar. D. vibrans = Pleo ~~submembranaceo~~, e con  
verso umbilicato subinfundibuliforme;  
luride flavo espallente, 1-5 cm. lato. Stipite irregulari, glabri, flavi,  
basi conato, fusto, actate tantum ~~et~~ subcarvo, saepe subramoso,

2,5 cm. longo, 3-20 mm. crasso; Caro albida, fracta subcarnea  
dein cinerea - subviolacea

Spori ellisoides sub intus atro-  
nig, intus granulosi 9-10=5-6;  
basidiis subclavatis 60-70=5-8.

Osserv. Il Cainth. ramosus Schulz. è prossimo  
a Cainth. cibarius ma differente da questo  
varietà.

12 Cantharellus Turrifluus Fung. Sc. Cest. II p. 30 t. 7 f. 3. (1819)

See. syst. fung. V p. 687.

Icon. Inzenga l.c.

1861. 579. ~~7~~

Hab. ad terram in silvaticis <sup>Sicilia:</sup> pr. Palermo <sup>(Inzenga)</sup> ~~Palermo~~ & Hieme.

Aree dshi trache

Turritii 487

Solitarius, saepe caespitosus, stramineus;  
filo carnoso-crenatus, hygrophano, ex  
convexo digitaliformi, saepe umbilicato,  
lanceolat decurrentibus, albis, crassis, pli-  
formibus, simplicibus, raro ramosis la-  
mellulisque alternatis; stipite fistuloso.  
albo, ex cylindrico ventricoso, fusiformi,  
deorsum attenuato, quandoque utrinque  
longitudinaliter striato; sporis ovatis,  
minutissimis, albidis.

13 *Cantharellus albidus* Fr. Sc. M. I p. 319 (1821)

Sau. Syll. Fung. IV p. 686

Icon. Quel. Anec. frans. Ar. Sc. XXVI (1897) t. A, fig 14, Cooke

M. Br. Fung. f. 1107.

B.H. Bres. MS. 1920

Heb. int. museo parastre - Trenino: Gocciadon (Bres. MS.), Toscana: (Prov. di Firenze)  
area delle Alpi Europee (Tassi)

Restate -

albidus L. 86

*Cerax*, sed non coriacaeus, albus in luteo-  
scutentem vel rufescientem vergens;  
Piles carnogulo, infundi buliformi,  
repando, glabro, nitido, subezonato 2-6 cm. lato  
~~stipite~~ <sup>lamellis</sup> dichotomis, divergentibus, albis;  
stipite solidi, subaequali, glabro, albo, 5-6  
cm. longo, 2 mm. crasso; sporis 5-6 = 3

Opposito

14 *Cantharellus muscorum* (Wulf.) Schröh. Pilz. Schles. I p. 511 (1888)

p. 109 + 167, 1 (1791)

*Cantharellus umbonatus* Fr. S. M. I p. 317 (1821) (*Agaricus muscorum* Wulf in Jang. Misc. II)

Ian. Hyg. Fung. V p. 685

Nom. Wulf. l. c. Hoffm. Tr. anal. t. 22 f. 2, Cook 211 Br. F. t. 1166

Bittl. 430, 518, 1133, 1920

Hab. inter Musos, praeferitum Polysticha; Piemonte (Colla) Toscana: prov. di Lucca (Talpi)  
Area dist. Europa, Amer. bore

autunno

*muscoides*  
= *umbonatus* 485

Vulnera saepe rubent;  
Pileo carnoso; levis ex umbo nato  
Depresso, flocculoso, cinereo-nigrin  
ante; long 2,5-5 cm. lato;  
lamellis strictis, confertis, candidis;  
stipe parvo, aequali dilatato, 8-9  
cm. longo, 8 mm. circ. crano,  
elastico, basi villosa; bandis clarabis,  
40-45 = 6-7; sporis oblongis, 1-2-guttatis,  
6-9 = 2-3 (Karst.) v. 9-11 = 3-3,5 (Schrot.)

15 *Cantharellus carbonarius* (Alb. et Schw.) Fr. Hymen. Eur. p. 456 (1874)  
See Syst. fung. IV p. 185, *Merulius carbonarius* Alb. et Schw. Lss. p 345 (1805)  
Icon. Cooke 24. Pl. F. t. 1105, Lucard Champ. Fr. t. 45, Vauv. et Son  
Myc. Ital. t. 1.

Bibl. 418, 1133, 1920 →

hab. in area carbonaria <sup>Lombardia</sup> in Trentino, Toscana. ♂ sterile.

Area distri. Europe

011. Soc. Ital. fil. mycol. p. 39 to Xerotus degener Fr. sarebbe lo stato arido o  
secco delle stesse specie; me  
var. m. volg. - non d. contrario aviso.

Var. - - -

al vers.

011.

# *Carbonarius* 485

*Radicatus, fasciculatus, pileo, sub-*  
*carnoso, striato-squamuloso, umbi-*  
*licato, e sporadiceo nigrō, 1-2,5 cm. lato;*

*lamellis strictis, albis; sp. <sup>ramosa</sup> <sup>stipe</sup> <sup>debetio</sup> c. 1,5 cm. longo; sp. ellipsoïdes-alongatis 10 µ*

*Var. <sup>anthracophilus</sup> ~~anthracophilus~~ <sup>longis, guttulatis, hyalinis</sup> Canthar. anthracophilus Leveill.*

*Ann. Sc. nat. 1821 pg. 236 t. 14 f. 2.*

*Solitarius niger, tenax, pileo carnoso -*  
*membranaceo, nudo, depresso; lamellif di-*  
*stantibus, dichotomis; stipe faro, gracili,*  
*glabro, radiculato.*

*Var. <sup>radicosus</sup> ~~radicosus~~ Canthar. radicosus Berk et Bro. n. 1734  
 (1860), Saund. et Sm. t. 1.*

*Gracilis, pileo profunde umbilicato, floccos-*  
*nigro; lamelli angusti, hymenio albo;*  
*stipe radicante, pallido; sporis g=5*

*Oppos.* Queste <sup>due</sup> <sup>var.</sup> forme, di cui riportiamo la descrizione fatta dagli autori e per la ~~la~~ habitat e per altre note sembrano costituire una medesima specie.  
 stadi o forme <sup>N.</sup>

16 *Cantharellus olidus* Quél. & Champ. Voss. III p. 661, f. 1 f 2., non Fr.  
Sacc. Syst. Fung. V p. 685  
Icon. Quél. l. c.

Bres. MS. Massol. in Bull. Soc. bot. it. 1912.   
Hab. <sup>imprimita, queretaria</sup> ~~in nemoria~~ Trentino: Teysalas, sopra Malé (Bres MS.), Cavalese (Mass. e Bres)  
Area rotunda Gallia, Nat. sup.

Aestate frequent.  
autumnus

Exs. Romagn. n. 2501 (Trentino: Bres.)

*olidus* 485

~~L~~ Caro alba densi vicinata dulcidula  
saccharum usum redolens; odore essicca-  
tione evolvitur; pileo carnosu, margine villosu, albo,  
convexo - cylind. formi, 2-3 cm. lato;  
lamellae decurrentibus, lacteo - carneis;  
stipite roseo - vicinato;  
sporis ovoides - sphaericis 3-4  $\mu$  longis.

17 *Cantharellus subcarnosus* Fayod Pers. Fung. Valli. Vald. p. 81 (1893) in  
Ann. R. Acad. Agr. Torino, 1893, Vol. LVI. Fung. XVII p. 35.  
Icon (nulla) Bitt. 1301 7  
Hab. in graminis, vix ceteratione - Piemonte: Valli. Vald. e S. Lorenzo  
Pettica. ♀  
Area disto Ital. bor.

Pluteata

# Subcarneus 17-35

Piles campanulati, respando, 2-4 cm. lato, margine undulata, tenue; plies lamelliformibus, fimbriis parum reticulatis, primo pure subcarneis, pruinosis deinceps in aurantiacum vergentibus; stipite subexcentrico deorsum leviter attenuato, circa 6-10 mm. crasso; subhymenio denso miserrimo; sporis ellipsoideis, dorsum alter parum depresso, 15=5; basidiis claviformibus, longissimis 55=11 tetra- vel digeruntur.

Osserv. Prossimo a Canty. cibarius.

ma minore, più robusto, col  
margine più tenue.

18 *Cantharellus miniatus* Fagod, Cons. fungis Ital. Val d'Isère (1893) p. 82V, *Cantharellus ignescens* Fagod in Ann. Sc. nat. Bot. VII ser. vol. 9 (1889) p. 304 (nomes nudum)

Iron. (nulle)

Pltt. 1301



Hab. ad terram nudam justa rix, calecatione - Piemonte: Angrogna  
Petrice e S. Germano. Q  
area d'Isère. Malia bor.

Q austato e

*miniatus* 17-35

Minor; filo 1,5 - 3,5 cm. lato, 1 mm. crasso,  
excentrico, centro depresso, lenui, plus minus  
lobato et sinuoso, primo minato deinde suban-  
nulariaco stipiteque subtiliter velutino;  
lamellae carnis, pliciformibus vel typis,  
interstitiis venosis; stipe farcto, vulgo curvo  
minato; spory ellipsoideis, aequilateris

8-10-5-6

Osserv. Affine a Candy. subcarneus ma  
diverso per colore, statura minore e  
spore maggiori.

19 *Cantharellus aurantiacus* (Wulf.) Fr. S. M.-P. 318 (1821)  
Lau. Lyk. Fenzl p. 483, *Agaricus aurantiacus* Wulf. in <sup>Yag.</sup> Miscell. arch. II  
p. 101 t 14 f 3 (1781)

Icon. Wulf. t.c., Fr. Ver. Kampf. t. 79, Lapp. F. & Roma t 45 f 5, Reichenb.  
A.H. t. 53 f 117, Fayod in Ann. S. N. Bot. 1889 t. 6 f. 6e (848, 1965, 1920)

Bott. 90, 209, <sup>249</sup> 430, 518, 525, 653, 656, 662, 704, 983, 1015, 1133, 529, 631) <sup>1663</sup>

Hab. in nemoria: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Cant. Ticino,  
Trentino, Toscana, Lazio, Corsica.

Area distr. Europe, Amer. bor. Australia

: Anco A. Meyen (Arch. MS.), Tirol alp.: Karlsruhe v. Höhn.

(estate - Autunno +

Exs. Erb. entit. id. I n. 330, Roma n. 2216 (Pisa. Savi)

*miniatus* 17-35

Minor; fileo 1,5 - 3,5 cm. lato, 1 mm. crasso,  
excentrico, centro depresso, lenui, plus minus  
lobato et sinuoso, primo miniatu deinde suban-  
nulariaco stipiteque subtiliter velutino;  
lamellae carnei, pliciformibus vel typicis,  
intersticiis venosis; stipite farcto, vulgo curvo  
miniatu; spora ellipsoideis, aequilateris

8-10 = 5-6

Obsrv. Affine a Candy. subcarneus ma

Diverso per colore, statuta minore e  
spore maggiori.

19 *Cantharellus aurantiacus* (Wulf.) Fr. S. M.-P. 318 (1821)  
Lau. Lyk. Fung. V. p. 483, *Agaricus aurantiacus* Wulf. in <sup>Yag.</sup> Miscell. austri II  
p. 101 t 14 f 3 (1781)

Don. Wulf. l.c., Fr. Ver. Napoli t. 79, Lapp. F. & Roma t 45/5, Rollan<sup>t</sup>  
A.H. t. 57 f 117, Fayod in Ann. S. N. Bot. 1857 t. 6 f. 6e (848, 1965, 1920)

B.H. 90, 209, 241, 430, 518, 525, 653, 656, 662, 704, 983, 1015, 1133, 529 (6.31) 1663

Hab. in nemoria: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Cant. Ticino,  
Trentino, Toscana, Lazio, Corsica.

Area distr. Europe, Amer. bor. Australasia

: Anno A. Meyen (Aces. Ms.), Tirol cisl. Karnia (v. Höhn.)

Exs. Etat. ent. ital. I n. 330, Roma n. 2216 (Pisa. Savi)

(estate - Autunno +

# Aurantiaceae 483

Subaurantus,  $\uparrow$  saepe albidus, ~~estatique~~ <sup>rarus</sup> var. *lacteus*,  
piles carnosos, molli, depresso,  
so, subtomentoso, inaequali, 5-8 cm. lato;  
lamellis compactis, striatis, dichotomis, subsatura-  
turibus;  
stipite farcto viaequali 5 cm. longo, in serio-  
ribus, praecipue *Licis* *albinois* nigrescente;  
*Yoris* *ellipticoideis* vel *sphaeroideo-elliptico-*  
*deis*, hyalini, equitulatis 5-7 = 3-4;  
bandis 35-40 = 8

Osserv. Bresadola (Ms.) raccolse una  
forma obscurus sull'isola  
delle cipri in questo distretto Trentino.

(foot)

28 *Cartharellus Friesii* Quel. Champ. Vog. p. 191, t. 23 f. 2 (1872)  
Sau. Syll. fung. II p. 482, Magaz. der Öst. Tier. d. p. 212 (1905)  
Trem. Quel. l.c., Patouill. Tab. anal. t. 324, Cooke M. Br. F. & 1131.  
Bull. 1090, 1715, Bres. Ms.

Hab. in solistis umbrosi ~~Catania~~ <sup>Treviso</sup> ~~Catania & Sicilia~~: prov. di Catania <sup>(Sicilia)</sup>  
area dits. Giarre, Bitanno, Noto.

tem aevum quam fundit - Trentino: Magaz  
d' Inzenga (Bres. Ms.)  
Bestate 

# Friesii & 82

Plo carnosus, tenuis, e concreto depresso,  
villoso, subaurantio; lamellis angustis,  
pliiformibus, carnosis, lateris;  
stipe solidi, grauli, villoso, basi  
alto attenuato;

sporis 5-7 = 2-3 secundum Bresad. (Bres. Ms.)  
~~Amid~~ 8-10 = 2-5 ; baridis 60-80 = 7-8

Oncio. E s'attacca medio tra C. edulis

e C. aurantiacus ma d'ambi mi-  
nore. Ricordano il primo le lamelle,  
il secondo il colore. Lo Scalia cita  
la specie in Sicilia, dubitativamente.

C. aurantiacus Krombh. t. 46 f. 3-6

forse appartiene a questa specie  
forse anche quello di Paulet t. 51 f. 3-3

21 *Cantharellus amethysteus* Quél. Ann. franc. Sc. 1882 p. 11 (exh.)

See. Linn. Gang. II p. 482

Icon. (nulla) Bol. 693

confers

Hab. in siliqu submontane: Nizza / Barle n. Brug. Msl., Corse: forez d'Anto-

Ree distri: Italiæ, Gallia, Toscana. Verde = autumn no = re (Maire)

Ametyst eug 482

Pileo compacto, conchoides, 10 cm. lato,  
undulato, pallide vitellino, fruina blacino-  
incarnata velutina obducto, carne alba,  
sefida; lamelleis crassis, ramoso-reti-  
culatis, sulphureis; sp. stipite obscuro,  
firme, vitellino; sporis ovoides ~~dia~~ 8-12=4-6  
~~long.~~, guttulatis, hyalini. ~~exodites~~



edulis ~~318.682~~  
= abeuy var.

Vellinus; pileo carnoso, firme, primo separ.  
do, glabro, demum turbinato, 3-5 cm. lato.  
lamellis crassis, distantibus, concoloribus;  
spite solidus, deorsum attenuato,  
sporis sphaeroideo - ellipsoideis, micoloribus hyalini  
 $\frac{8-10}{8-10} = \frac{4-6}{5-7}$ ; bandis 60- $\frac{70}{10}$  = 7-10

voo. abeuy (v. v.)