



ISTITUTO ITALIANO PER L'ESPANSIONE COMMERCIALE E COLONIALE

E

R. MUSEO COMMERCIALE DI VENEZIA

5198. SUPPICO U. BORTALI - TEL. 65-60 - VENEZIA



Onorevole

SIGNOR

PROF. P. A. SACCARDO


R. ORTO BOTANICO

Socio dell'Istituto Italiano per l'espansione Commerciale e Coloniale

PADOVA

19 Lentini

40/0014-1





Conto corrente con la Banca

Finzioni

ESERCIZIO 1914 - 15 - RIVIERA  
Società Anonima di Assicurazione  
di Vita e di Risparmio  
di Assicurazione  
di Vita e di Risparmio  
di Assicurazione  
di Vita e di Risparmio

19 Lentinus



(1836) et

(Elym. a lentus ob consistentiam)

F. lous carnosus - coriaceus, lentus vel in carosis adultibus induratus, persistens. Hy-  
menophorum cum stipite vel basi pilei sessilibus contiguum. Lamellae cum hymenophoro  
concretae, tenues, inaequales, membranaceae, gaei separata vel lacero - dentata  
vel in lignosis, integerrima. Sporae subrotundae, ~~ovales~~ <sup>ovales</sup> albidae - fungi lignati les, rarius  
bracteati, polytrichi, rostro subregulari, in terris calidioribus numerosissimi, pedes  
Sporae vix numero decrescenti, minimeque indurati.

Comen. ~~Spore~~ Spore molto naturali, vasterima, nelle regioni calde molto più diffuse.  
Molti specie tipiche sopra affatto legumi, colle lamelle sottili, equali, integerrime  
o dovremmo presto inguere col nome di *Scleroma* sp. Ma ciò sembra impossibile  
finché non si possono osservare a dovere e confrontare quasi tutti gli esemplari.  
I ~~spore~~ sono lena funghi epistidi, <sup>nei diversi paesi</sup> ~~sono più~~ <sup>non sono</sup> vari in i terrestri.

18 Lentium

18) - Dalla ~~spore~~ <sup>spore</sup> nella cavità <sup>prima di luce</sup> si notano due deformazioni, ~~viz.~~ <sup>viz.</sup> quasi tutte le specie  
due deformazioni non attene nei vasi Agarici, ma più frequenti nelle ~~ze~~  
in legnose use:

I = Il gambo allungato, curvato (per arrivare alla luce), il cappello diminuito,  
che comunemente a tuba, (es. *A. tubaeformis*) -

B = Il gambo cornuto, spesso ramoso, quasi senza cappello, ciò che  
avviene nei luoghi del tutto oscuri come negli <sup>acqua, otti ligna,</sup> ~~canali~~ <sup>nei</sup>  
tronchi cavi ecc. Tali pec. *Clavaria thomalis* DC. *Ramaria*  
*ceratodes* Holmsk. &c.

Cap. ~~Lentium~~ Fr. S. M. I p. 176 in *A. Lepideus* se un monstrum  
sono molto comuni fra noi ma difficilmente riferibili a una specie  
definita. Era, ~~vedi~~ <sup>vedi</sup> vecchi autori l'ingegnoso Battana e

lo Lepidi. ~~disegnat~~ <sup>non molte</sup> ~~queste forme~~

Conspectus synopticus sectionum et  
specierum italicarum

(vedi retro)

Lentibus / Compositus agnoscitur sectionem et specierum ita. carum

I = Laminata, sessile vel stipite laterali instructo - - - - - I<sup>a</sup> Sect. - Pleurorae

- 1) Margo filii cernui, ornato - fimbriatus - - - - - 1 L. flabelliformis
- 2) Margo filii integer - - - - - 2 L. vulpinus
- A = Fili conchati, alutacei, cordato - corrugati - - - - - 3 L. urdinus
- B = Fili uniformes, brunneo - rufi, laeves - - - - - 4 L. conaceus

II = Obscurus C. Piles infundibuliformes, rufis - granosis - - - - - II<sup>a</sup> Sect. Mesopodes

- 1) Pileus glaber, inaequalis et lobatus - - - - - Subsect. A Cochleatae
- A = Exterius fungus croceus - - - - - 5 L. auricolor
- B = Pileus et lamellae discolores, non crocei
- a = Lamellae carnaeae
- a = Cenaeae, imbricatae, conrescentes, stipites solidius - - - - - 6 L. cochleatus
- β = Fragilis, ramosus, stipites subcaeni - - - - - 7 L. friabilis
- b = Lamellae albae, griseae vel albis - blavisciae
- a = Stipites laevius elongatis subreticulatis; pileus livido stramineus - - - - - 8 L. omphalodes
- β = Stipites sulcatis vel rugulosis
- A = Pileus griseo - lividus - - - - - 9 L. bisius
- B = Pileus haud rufus vel isabellinus - - - - - 10 L. tridentatus

2 = Pileus fulvovirentis vel squamosus - - - - - Subsect. B. Pulverulentae

- A = Pileus fulvovirentis vel villosulus - - - - - 11 L. leontopodium
- a = Pileus tomentosus, alutaceo - argillaceus - - - - - 12 L. adhaerens
- b = Pileus squamosus glutinoso - laccatus, rufide pallidus - - - - - Subsect. C. Lepidicae

- B = Pileus squamosus; velum plus minusve manifestum - - - - - Subsect. C. Lepidicae
- a = Lamellae demum flaviscentes
- a = Stipites costatiis
- A<sub>1</sub> = Pileus albus, nigro - squamosus - - - - - 13 L. tigrinus
- B<sub>1</sub> = Pileus testaceus - - - - - 14 L. cyathiformis
- β = Stipites sulcatis - - - - - 15 L. contortus
- b = Lamellae albidiae vel pallidae
- a = Stipites brevis subsericeus - - - - - 17 L. Dumalis
- β = Stipites radians, pubescens vel tomentosus - squamosus
- A = Pileus regularis, albus dein vis - lacco - fulvus - - - - - 18 L. gallicus
- B = Pileus valde difformis, inaequalis, straceo - pallidus - - - - - 19 L. squamosus

C. Pileus ochraceus, fulvo - granosus - - - - - 15 L. Segeneri



I. Plauratae

1 Lentinus flabelliformis (Bolt.) Fr. Epicr. p. 395 (1838)

Sau. Syst. Fung. V p. 510, Agaricus flabelliformis Bolt. Fung. <sup>IV</sup> p. att. 157 (1796)

Tun. Bolton l.c., Micheli N.P.G. t. 65 f. 1, Cooke M. Br. F. t. 1148 f. b.

Bull. 785

Herb. ad Franco

Toscana pr. Firenze (Micheli) Autumno

flabelliformis 610

Subserilis; pileo tenui, lento, reniformi,  
plano, glabro, cervino, margine crenato -  
fimbriato; <sup>5-8 cm lato, 4-6 cm longo</sup> lamellis latis, lacris, pallidis.  
Sporis elliptico-orbatis, 7  $\mu$  long. hemiterm aculeolatis.

~~Spores~~ Multa similitudine di L. navigissimus  
in ultima in crepato.



2 *Lentium vulpinus* Fr. Syn. Lenth. p. 12 (1836)

Sac. Syll. fung. V p. 609

Tran. Fr. Tron. Hymen. t. 176 p. 1, Cooke M. Br. F. t. 1162

Hab. ad truncos *Conopsea* s.g. Pini, abietis pro Pizze (Barla in  
Bresc. ms.), Cassia: Vizzavona (Maire)

Area sibi Europa, Amer. bor., Australia) Aestate - Autumnum

Bst. 699, Bres. ms.

Sec. Bres. & Guil. c. sin. *L. castoreus* Fr.

vulpinus 609

Terminis, unibrachiato-multiplex; filis car-  
nosis - lentis, conchatis, postice connatis,  
longitudinaliter costato-corrugatis, floccoso-  
seroposisque, alutaceis, margine incurvo,  
↳ 2,5 - 5 cm. longis;  
integro; lamellis latis, laevibus, albis;  
sporiis subglobularibus) At. & p. C. B. M.  
4 - 4,5 = 2,5 - 3 (Pers. Ms.)



3 *Lentinas rossicus* Fr. *Epur.* p. 395 (1838)

*Icon. hyl. fung. V* p. 608, *Agaricus usturus* Fr. *S. M. I* p. 185 (1821)

*Icon. Herod. F. Ind. t. 65*

*Bibl.* 234.

Hab ad truncos <sup>Siberiae</sup> ~~abiegnos~~ ~~pedunculatos~~, <sup>Val de Sole, Zugana</sup> ~~in alpidis tridentini~~ <sup>rarity</sup> ~~in alpidis tridentini~~  
area distr. Europe, Amer. bor. — estete = autumnus

W. J. 608

*S*  
emilis, imbricatus; → inodorus, auriformis;  
Aurito - adpendentibus, herbis, brunneo-rupeis,  
adultis postice fusco-tomentosis, margine  
glabra, integro; 7 cm. longis, sat crassis, firmis  
& glabris, expallentibus;  
lemellis latis, lacinis, albidis;  
Sporis sphaeroidibus, asperulis, guttulatibus,  
hyalinis, 3-4  $\mu$  diam.



4 *Lenthus coriaceus* (Scop.) Sam., *Agaricus coriaceus* Scop. Fl. Carn II p.  
446 <sup>1872</sup>, *Lenthus hispida* Fr. Epicr. p. 389 (1836) Sam. Syst. Fung. V p.  
606

Bot. 182

Caespitosus; pileis tenuibus, demum coriaceis, subdividatis, lobis circumscriptis,  
late infundibuliformibus, squamis hispidis e carneo-rufescente ferrugineis  
tectis, margine lacero proliferoque; stipitis convergentibus, glabris, saepe  
lacunosis canaliculatisque pallidioribus; lamellis decurrentibus, serrulatis,  
concoloribus

Hab. ad ligna et trabes - Carniolia verisimiliter circa Idria (Scopoli). Vere.  
Area distr. Carniolia, Hungaria

5 *Lentrus auricolor* ♀ (Brig) Fr. Monogr. II p. 331 (1863)

Sau. byll. fung. V p. 593, *Agaricus auricolor* Brig. F. Raaf. p. 23, t. 13 (1-3) (1848)

— Bot. 434, 435, 437.

1. Icon. Brugate l. c. a 7 fung. litogr. t. 2.

Hab ad truncos Almorani et Populorum pro Neapolim (Neapolitanum)

Area distri Italia merid.

♀ II Mesopodes  
A. Cochleatae



auricolor 593

*Subcaespitosus*, croceus; pileo carnoso-lento  
primitus convexo-deflexo dein planiusculo et tandem infundibuliformi  
obliquus, glabro, sericeo-intente; <sup>(saturatione)</sup>

lamellis decurrentibus, latiusculis, denticulatis, u-  
trinq[ue] aequaliter attenuatis;

*Stipite* fibroso-liquoso, subcentrico,  
undulato, distorto,

Oron. Sembra affine a *L. vulgare*

e per come questo pulverulento per le spore;  
secondo Comes è <sup>una</sup> forma di *Pleurotus olearius*.

6 *Lentruus cochleatus* (Pers.) Fr. Syn. Lentin. p. 11. (1836)

Sacr. Myc. Jung. V p. 594, *Agaricus cochleatus* Pers. Hyp. meth. p. 22 (1797)

Icon. Berk. Outl. t. 19 p. 4, Cooke M. Br. F. t. 1142, Souv. Col. fig. 168

Patonill. Tab. anal. t. 126, Gill. Champ. t. 169.

Bibl. 90, 245, 539, 585, 1253

Trentino (Bres. M.S.): Sopramonte (Bar. Turco)  
(Lagan. in Bres. M.S.)

Herb. ad truncos arborum: Liguria, Piemonte, Sardegna, Sicilia. aristata ♂

Area distr. Europa, Amer. bor.

Toscana: isola Pianosa (Sommer)



# corbleatus 594

Maxime versiformis; caespitosus, imbricatus, conerescens; odor amygdali debilis vel nullus;

Stipes, tenax, flaccidus; filis carnosulo, irregulari, sublobato intortove, rufescente, glabro 2,5-6 cm. lato, expallente, non porris, licet saepe infundibuliformi.

Lamellis confertis, serratis, carneo-albis

sursum carneo, deorsum fusco-rufescente;  
stipite solido, firmiter, sulcato, glabro, rufescente,  
2-8 cm. longo, centrali, excentrico, vel laterali,

sporibus sphaeroidis vel ellipsoideis-sphaeroidis,  
1-guttulatis, hyalinis 4-6 per sporam.

basidii 24-28 = 6-1

7 *Lentinus friabilis* Fr. Syn. Lentin. p. 12 (1836)

Sau. Syst. Fung. V p. 595,

Icon. Battarra F. Anim. t. 21 f B (simplex)

Plat. 103.

Hab ad truncos arborum - Umbrae pro Rimini. (Battarra) ~~Sants~~

Area distr. Sandness, Idaho, Amer. bor.



Fruticulus 595

Involans, mollis, ramosus, usque carneo -  
alutaceus, minus alutaceo - lutescens

Caespitosus, carnosus - fibrosus, fragilis,  
lutescens; filis tenuibus, subdivi-  
satis, umbilicatis - peris, in stipitem  
subcauum, contortum, compressum  
porrectis, lamellis confertis, angustis,  
sericatis, fusciculis - carneis acie albicantibus -

8 *Lentulus omphalodes* Fr. Monogr. Hymen. II p. 235 (1863)

Sav. Hym. Jung. V p. 595

Yvon Fr. Hymen. 7. 175 f 1

Bitt. Bresicola Ms.

Hab. ad ~~base~~ ~~Coniferarum~~ ad terram u. solum laticum supra A. Pondatio  
agr. Tridentina. (Bres. Ms.) ~~Autumn~~

Area distr. Europa.



*Omphalodes* 595

Solitarius, <sup>semper simplex;</sup> pileo submembranaceo,

lento, primitus profunde umbilicato, e livido-stramineo pallescente, limbo convexo explanato, repando, fere peris et saepe lobato;

Stamellij decurrentibus, arcuatis, albo-pallescens, crenulatis;

Stipite centrali, tenui, tenaci, glabro, laciniis elongatis serobiculato, 2-3 mm. modo

crasso; sporis ovideo-phacodis, 5  $\mu$  diam.,  
semitriloculatis (Guil.), v. 6=3-4 (Bntz.)

9 *Lentiginus bisus* Quét. in Bres. F. Tid. I p. <sup>at p. 26</sup> 12<sub>1</sub> t. 12 (1881)  
Sav. Syst. Zool. V p. 596.  
Icon. Bresad. l. c.

Bibl. 234.

Hab. inter muscos et ~~fruticula lignea~~ <sup>ad ramulos Fagi et alni.</sup> in agro Terdentino: bosco di forte a

Area dist. Nat. sup. Tirobia.

Boggione e di Tergole, Campighe  
Dinero (Bres. Ms.). Antonino.



Boisuy 596

Caro lenta, fusca, odor et sapor nulli:  
ileo carnosus - lento, e convexo explanato,  
profunde umbilicato, irregulari, excentrico, mar-  
gine lobato, in adultis substriato, udo, griseo-livido,  
umbilico fusco, 2-4 cm. lato; lamellis subdistantibus,  
postice variantibus, emarginatis, aut rimato-decurrentibus,  
ex albis subgriseis, aene dentata;  
stipite tenui, e ferebo subcavo, fusco, aut fusco-  
ferrugineo, longitudinaliter sulcato, torto, 3-4 cm.  
longo, 3-4 mm. crasso, <sup>interdum brevissima lacunoso</sup> excentrico; sporis sub-  
globosis, aequaliter, 4-5 u. d., hyalinis.

Oront. Psari affine a L. omphalodes, ma-  
ben distincta

10 Lenticularis Tridontomy Lau. et Syd. Syn. gen. XVI p. 65 (1902)  
Lenticularis bading Pres. F. Trid. II p. 56 t. 166 f. 1, <sup>(1898)</sup> no. Burk. (1862)

Trid. Pres. ~~1862~~ l. c.

Art. 234 

Herb. ad truncos Sorb. aucupariae Panzeggio in alpe Tridontomy. Aestate.

Area distri Nat. bor.



Tridentinus  
= badius 16-65

Piles carnosae-lento, tenui, regulari vel excentricae, aut subindiviso, et convexo explanato, depresso, longitudinaliter venis elatis, marginibus cristatis percurso, setate sublevi, et badiis <sup>2-3</sup> pallide cinnamomeis vel luride isabellino, 5-10 mm. lato; lamellis valde distantibus, <sup>albido-liliginosis</sup> atratis, vel decurrentibus, acie late et <sup>1/2</sup> ege, laute renata; ~~basis~~ stipite brevi, fereato, et basi attenuato, pinnato, griseo-blacino, subruguloso, 3-5 mm. longo, 2 mm. circiter crasso; ~~et~~ sporiis hyalinis; subglobosis, 1-guttulatis, laee et tenuiter asperulis 5-6 = 4-4.5; badiis clavatis 22-25 = 5-7.

Onesif. Proximo a L. bisus Quel.

B. Pulverulenta

11 *Leptinus leontopodius* Schulz. et Kalchb. in litt ap. Fr. Dymen. Europ. p. 482 (1876)  
Satt. Syll. fung. II p. 588.

Icon. (nulla)  
Herb. 1301.

Hab. ad truncos Populi (at videtur) - Piemonte: Pinerolo (Fayod).  
Area disti Slavonia, Britannia, Italia



# Leontopodium 588

(Amplius, speciosus, sapore gratior);

Stipes carnosus - coriaceus, lenaxi, irregulari,  
subtiliter tomentosus, alutaceo - argillaceo,  
passim tomentosus - cinnamomeus;  
Discus depresso, margine reflexo lobulato;  
Lamellis decurrentibus, venoso - connatis,  
ad latera rugosis, acie serratis;  
Stipite crasso, lignoso, impolito, pulverulento,  
dilute castaneo, deorsum nigricante, sporis  
cylindricis, oblique apiculatis, levibus, hyalinis,  
12-15  $\mu$  longis —

12 *Leridinus adhaerens* (Alb. et Schw.) Fr. Epicr. p. 391

Sacr. Syst. Fung. V p. 589, *Agericus adhaerens* Alb. et Schw. Lus. p. 186 (1801).

Icon. Presad. F. F. t. 131, Katchbr. Ic. Fung. Hung. t. 21 p. 3.

Phil. 234, 244

Hab. in fibris acerosis ad truncos fr. Trentino ✓

Toscana: Vallombrosa

Area distr. Europa

Ab autumnis in ver persistens

(Larva)



Adhaerens 589

*Mirra, inaequalis, sapor demum adstringens.*

*Stipite subcarnoso, lento, irregulari,  
e convexo subumbonato depresso et infundibuliformi,  
lacunoso, subpulverulento, sordide pallido,*

*Stipite glutinoso-laccato, 2-4 an. lato*

*lamellis lineatis decurrentibus, tenuissimis,  
laceris, albis;*

*Stipite subcavo, radicato, ~~coro~~ pileo concolore,  
glutinoso-laccato; sporis 5-10 = 2,5-3*

*baridiis 30 = 10 - k*

C Lepideae

18 *Lenthus ligninus* (Bull.) Fr. *Epicerp.* p. 389 (1838)

*Sau. Syst. Fung.* V p. 580, *Agaricus ligninus* Bull. *Champ.* t. 70 (1781)

*Flon. Bull. C. C.*, Battara *F. Arim.* t. 12 f. B-D Lang. *F. d. Rome* t. 45 f. 2

*Venturi Msc. Brex.* t. 45 f. 6-7, *Paboult. 'Teb. anal.* f. 406.

*Bull.* <sup>35</sup>36, 61, <sup>101</sup>123, 209, 103, 315, 318, 362, 397, 417, 418, 430, 653, 656,  
737, 802, 836, 923, 983, 1069, 1219, 1253, 1617.

Valle Lagarina (Lob.), *Campo Trentino*,  
*Segromate (Br. etc.)*

*Hab.* ad truncos <sup>praesertim frondosa</sup> vetustos: Liguriae, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, *Swabia*,  
Toscana, Lazio, Neapolitano, Sardegna.

*Aerea dist.* Europa, Amer. Bor., Australia

Perse - in autumnum  
perpetua

*Exs.* *Myc. Ven.* n. 3, *Cavare F. Longob.* n. 71, *Rabenk. F. Sur.* n. 2002 (Pado  
vs. Sacc.)



# Tigrinus 580

*Handwritten signature or name*

(*Caepitomy* Vulgo adest cortina fusca;)

pileo carnosso - coriaceo, denso, orbiculari,  
umbilicato, albido, squamis imatis, pileo-  
sis, ~~pa~~ nigricantibus, 4-6 cm. lato;

lamellis attenuato-decurrentibus; perangustis,  
albo-hirsutibus; ~~q~~

stipite tenui, exstrio, squamuloso, apice  
subvelato, 2-6 cm. longo;

sporiis <sup>ovato-oblongis</sup> subphaenoides 7-8 = 3; vari-

dis 20-25 = 5-7; hyphis contextis bas-

illarum 2-3,5  $\mu$ . w. —  $\nearrow$

16. *Lentium cyathiformis* (Schäff.) Bresad. F. Trid. II p. 93 t. 206 (1900)  
*Panus cyathiformis* (Schäff.) Fr. Epur. p. ~~66~~<sup>397</sup>, Sac. Syst. Fung. V p. 614  
*Agaricus cyathiformis* Schäff. Icon Fung. IV p. 66, t. 252 (1874)

Icon. Schäff. l.c. Bresadola l.c., Nees Syst. ed. t. 52. →  
2 Hab. ad truncos ~~Piceae~~ abignos <sup>in alpinis</sup> Trentino, rarissime et ad  
1 Botl. 234. truncos abietis et Jugulis pro Pizzo (Bartol. u. Bres. ms.)

area ristè

(≠ (ex Schäff.))  
Vere = Aestale ✓

071. Sec. Bresad. qui spectant pure Lentium Degeneri Kalchb. Ic. t. 29 f. 2 = Dendrostarcus  
trigulatus Paul. t. 21 f. 2-3



# cyathiformis 514

(Vix caespitosa, reperit aëre, stypticum)  
ileo subcoriaceo, <sup>fenui</sup> oblique cyathiformi,  
haud condensato (marginis involuto)  
repando, squamuloso, testaceo, expellente;  
lamellis ex adnato decurrentibus, confertis, costae  
conjunctis, e pallido lutescentibus;  
stipite brevissimo, firmo, levi, exces-  
sivo & spinis 10-13 = 4-5  
basidis 35-38 = 6-8  
paraphysibus 20-30 = 6 ✓

15 Lenthus DeGENER Kalchbr. in Fr. Hym. Eur. p. 682, Sacc. Selt  
Jung V p. 582, Cartharellus DeGENER Kalchbr. Jc. Hym. Hung. t. 29/3  
(1874) Lenthus variabilis Schultj. in Quat. Ft. mycol. p. 329

Exs. Roumeg. F. Gall. n. 3702 (Bark)

Tron. Kalchbr. l.c.

Ides compacto ex hemisphaerico expanso, ochraceo-cremeo, <sup>carne alba</sup> lypam;  
fulvo-rufescentibus variegato stipite obeso, lypamato, subpurpureo  
base rogicante; lamellis decurrentibus, perangustis, anastomosantibus  
poll. de ochraceis; <sup>ad stipitem</sup> ~~various~~ subreticulatis, crenulatis, acii, <sup>obtusis</sup> farinosa,  
alba i sporiis ellipso-subfusoidis 10  $\mu$  longis -  $\phi$

Hab. ad truncos populeo, <sup>Nitzlaro</sup> J. Madou ad Varo (Bark) Aestate.

Area disti. Hungaria, Gatka, Itaha, Sibria

$\phi$  Odor grubis; lamellae  
practae umbrino-uranomoeae.  
Lenthus litaneos affinis.



16 *Lentinus contortus* Fr. Syn. Lent. p. 7 (1836)

Sac. Syst. fung. V p. 582, ~~Sabau~~

von Battarra F. Arim. t. 11 f. A.

Britt. 903.

Hab ad truncos <sup>similē</sup> in agro Ariminese (Battarra).

Area distr. Europa austr.

Amburmo

contortus 583

Piles carnosos - coriaceos, orbiculares, umbilicatos, fulvo-rufescentes, floccis obscurioribus squamoso;

lamellis attenuato-decurrentibus, confertis, densatis, flavescentibus;

Stipite torto, subfulcato, furfuraceo-squamuloso, flavo-rufescente.

Crusca. Varia per l'indumento del gambo, come L. tigrinus.



17 *Lentinus Lunatii* (DC.) Fr. Ep. m. p. 390 (1838)

Sau. Syst. Fung. V p. 581, *Agaricus Lunatii* DC. Fr. Fr. V p. 47 (1805)

Icon. Barb. F. Arim. t. 12 f. A, Berk. Outl. t. 15 f. 2, Cooke M. Pr. Ft. 1139

Bibl. 103, 866, 397.

Herb. ad truncos imprimis Sabuj et Popul. — Piemonte, Lombardia

Emilia.

Area disto. Europa, Australis

# Dunalii 581

Idem est manifestum;

files carnosio - coriaceo, tenui, un-  
bilicato, difformi, pallido, squamis adpressis,  
(unde demum ~~perlevis~~)  
scedentibus, maculiformibus; 5 cm. lato;  
lamellis decurrentibus, impertis, pallidis;  
stipite brevi, subsericeo, 2,5 cm. longo,  
6 mm. crasso

Osseus. Malto affinis a L. tigrinus, a quo  
ang. <sup>reperito</sup> dat Quét, H. mycol. p. 328.



18 *Senecio goticus* Quel. in *Ann. fr. Av. Sc.* <sup>XIII</sup> (1884) p. 4 t. 8 / 10 (extr.)  
Soc. Sc. Jurg. V p. 581.

Trin. Quel. l. c.

Art. 1301

Herb. ad Francum vetustum Castaneae - Piemonte: Valli Valdes. (Fayod)

Area distri Gallia, Italia.

(vere - aestate)

# Gallium 581

Caro elastica, alba, demum lutea, dulcis, odor

melleus. Folia convexa, regulari, 5-8 cm. lato,  
marginis incurvato tenui, pruina fugaci secto,  
albo, dein nitido violaceo-fulvo, punctulato vel  
maculato;

lamellis decurrentibus, subtiliter denticulatis, albis;

stipite subsuberoso, radicante, sursum sul-  
cato, pubescenti, albo-flavido squarulosco,  
dein excorata,

sporis ellipsoideo-cylindraceis 10-12  $\mu$  longis,  
hyalinis ←

Oront. Affine a ~~L. <sup>repens</sup> <sub>sp. 1</sub>~~ L. degener.



19 *Lentinus squamosus* (Schäff.) <sup>(1838)</sup> Quél. *J. myc.* p. 328, Schröt. *Lib. I*, 556 (1889)

*Lentinus byssides* Fr. *Épim.* p. 390 (1838)

Sau *Lyt. fung.* V p. 581, *Agaricus squamosus* Schäff. *J. fung.* IV p. 15  
t. 29-30 (1974)

Icon. Schäff. l. c. Cooke *M. Pr. F.* t. 116, Gill. *Champ.* t. 148.

Bibl. 8, 161, 245, 417, 418, 430, 983, 1031, 1061, 693

Hab. ad ligna, imprimis pinea: Liguria, Piemonte, Trentino, Veneto, Corsica  
Area Distr. Europa, Sibira, Amer. bor. Austriaca. (frequens in Val d'Isère (Prat. ms))

Vue = Aestate.

(= *L. jugis* Fr.)

La forma minor aurisata è indicata da v. Höhnelt nel Tirolo orientale a Narana  
(*Lent. jugis* è identico da Fris ad *Agaricus compressus* Scop. *F. Carr.* II p. 458, trovato  
sulle conifere in Caride pub. per Idria, da Scopoli. (*Bibl.* n. 182) (n. 1653)

Squamopus  
= Lepidium 581

Speciosus, amplius, odor sat gratus, velum mox evanescens,  
(firmus)  
Filiis carnosis - compactis, luteo & convexo  
(valde difformi, subcentrico, ochraceo-fal-  
lo) Depressis, inaequali, ochraceo-fal-  
do saepe decalbato in squamas  
maxe obscuriores, maniformes diffractis, 5-10 un. long.  
lamellis sinuato-decurrentibus, latis, lacinis,  
transverse striatis, albidis; stipite valido,  
radicato, tomentoso-squamoso; s  
sporis ovoides 10-14 = 4-6; basidiis  
45-55 = 6-8 -