


84

*Crepidotus*



(Crepidotus)

## Conspectus synopticus Specierum

A<sub>1</sub> - Pileus farinosus, villosus vel squamuosus  
B<sub>1</sub> - Lamellae ex olivaceo fuscō fulvantes  
B<sub>2</sub> - Lamellae non olivaceentes  
C<sub>1</sub> - Pileus albus rufescens - variegatus  
C<sub>2</sub> - Pileus nec albus, nec variegatus  
D<sub>1</sub> - Pileus alutaceus vel spadiceus  
D<sub>2</sub> - Pileus lividus aut livido-griseus

1 Cr. perixoides  
2 Cr. calolepis  
3 Cr. fluvstdentatus  
4 Cr. Rubi

A<sub>2</sub> - Pileus glaber vel ad striatum lantum fomentosus  
B<sub>1</sub> - Pileus ferrugineus - - -  
B<sub>2</sub> - Pileus non ferrugineus  
C<sub>1</sub> - Lamellae pallidae  
C<sub>2</sub> - Lamellae argillaceo-fuscae vel  
deinum cinnamomeae.

5 Cr. palmatus  
6 Cr. Cesatii

E<sub>1</sub> - Pileus ochraceo-fuscescens  
E<sub>2</sub> - Pileus albidus vel pallidus  
E<sub>3</sub> - Pileus gelatinosus  
E<sub>4</sub> - Pileus aquosus  
non gelatinosus

7 Cr. bubalinus  
8 Cr. mollis  
9 Cr. appianatus

~~Cr. calolepis~~

*Crepidotus* Fr. Syst. Myc. I fig. 272

Sau. Syl. Fung. V fig. 876

(Btym. - ~~κρηπτίς κρηπίδος~~ <sup>Crepis</sup> ~~κρηπίδης~~  
~~et~~ ous otos ~~αὐτούς~~ ~~αὐτοῖς~~ ~~αὐτοῖς~~; pileus enim  
saepe *crepidiformis* vel *auriformis*.)

Statura varia, irregularis sine velo mani-  
festo. Pilus excentricus, lateralis vel resu-  
pinatus. Sporae ferrugineae.

Oss. Dalle specie genuine di *Crepidotus* si differenziano  
quelle di *Claudopus*, per le spore rubiginose  
(genere) le *Rodospore* e  
(intermedio fra gli *Sporodictic*  
e *Dermatopore* le *Oxospore*)

*Crepidotus pezzoldes* (Nees) Gill. Champ. Fr. p 558 (1874)  
Sau. Syst. Fung. V p. 882, *Agaricus pezzoldes* Nees in Act. Nat. Cur.  
IX (1818) p. 249 t. IV f. 18

Den. Nees l.c. Pers. Myc. Dan. t. 26 f. 9, Cooke W. Br. F. t. 516  
Mich. N. Pl. gen. t. 65 f. 3 (*Agaricum squamofum* ...)?


BB1. 785? 1583

Hab. ad ligna velutina — Toscana Trentino: Valle Lazearina (Cobelli), Toscana? (Micheli)  
area dott. Europe.

Obs. Chiamiamo la specie come probabile *Agaricus* <sup>D. Toscana</sup> ~~Lazearina~~, ma il dottor  
d. Micheli è molto dubbio.

panizwidey 882

Pileo sessili, tenui, e cupulari reflexo,  
farnoso, subtomentoso, 2-3 cm. alto et lato,  
lamellis centro concurrentibus, subdistan-  
tibus, ex olivaceo-fusco fulvobus,   
circa 12, crassis, ventricosis;  
Sporis ignotis.

2 Crepidotus calolepis (Fr.) Karst. Hattsv. I p. 414 (1879)  
Sau. Syh. fung. IV p. 885, Agaricus calolepis Fr. in Vet. Ak. Törhundl.  
1893 et Gym. Eur. p. 276 (1876)  
Icon. Flieg. Icon. Hymen. t. 129 f. 4, Cooke M. Br. F. t. 499 f. 6  
Bth. Bresad. Ms.   
Hab. ad fruncas arborum fondonarum - Trentino: Gocciadino (Bres. Ms.)  
aeratae

# Calolepis 885

Imbricata;

(spite in tuberculum  
sessile reducto)

fileo carnoso, dividito,  
in nodulo villosi sessili, albo, postice  
marginato, squamis minutis,  
confertis, rufescensibus eleganter  
variegato, vis 1,25 cm. lato; carne <sup>firme</sup> <sub>gelatinosa</sub>,  
lamellis basi concurrentibus,  
semrum fusco-ferrugineis;  
sporis fusco-ferrugineis, 7-10 =  
5,5; basidiis 20-25 = 7-8  
(Bresad. M. L.)

2 ~~Oestate~~

3 *Crepidotus flürsdelensis* (Bab.) Vau.

(*Agaricus flürsdelensis* Bab.) Benth. Cont. I p. 181 t. 24 p. 124, Agar. hauskella-  
nis Fr. S. A. I p. 294 (1821), *Crepidotus hauskellanus* (Bab.) Krest. Hattsv.

5 p. 615 <sup>(1879)</sup>, <sup>✓</sup> Vau. Syst. Myc. IV p. 881

Gen. Bab. l.c., Cooke M. Kr. F. t. 515/ A.

Brot. 437, 1031.

~~0~~

Hab. ad ramos doictos - Veneto. prov. di Verona (Mestalongo). aerata  
area disti. Europa, Australia.

Putillus, regularis, haud caespitosus;

pileo carnoso, flaccido, exakte laterali, reniformi, plano, levii, subtiliter villosi, subtacere, 1-1,5 cm. lato, e sporis pulvrescenti, et spadiceo

lamellis determinatis, rotundatis, e pallido fuscocinnamomeis, per libeis

spite discrete, sorsum attenuato, villosi, alto, 5-9 mm. longo, 2 mm. vel ~~ultra~~ ultra crasso; sporis ellipsoideis, obscuris

subcomico

Dr. Ha molti caratteri comuni con Cr.

calolepis ma molti di più diversi.

See Quillet T. 1940, p. 76 / Coprinus  
per. Calolepis ne è un sinonimo

4 Crepidius Rubi (Berk.) Sau. Syst. Fung. IV p. 881, Agaricus  
Rubi Berk. Bull. p. 164 t. 9 f. 7.  
Tun. Berk. l. c., Cooke in Br. F. t. 515 f. 8  
Bull. 634 ~~8~~  
Hab. in sermentis amoris Ruborum - Napoletano.  
Area distri. Europa.

# Rubi 881

Pileo carnoso, convexo, atomis crystal-  
linis farinoso, lutescente aut livido-griseo,  
sentim escentiis resupinatoque, 1,25 cm. usque lato;  
lamellis adnato-decurrentibus, subventricosis,  
e griseo umbrinis;

Stipite solido, brevi, inanovo, farinoso,  
basi strioso;  
sporis ovoidis, levibus, 5-7 p. longis.

Ass. ~~do~~ L'abito è precisamente delle forme  
di Cladopus depauperatus ma forse ne è  
distinto per le spore umbrine.

5 *Crepidotus palmatus* (Bull.) Grif. Champ. Fr. p 558 (1874)  
Pall. Syst. Fung. IV p. 876, *Agaricus palmatus* Bull. Champ. T. 216 (1784)  
Icon. Bull. l.c., Veneris Mic. Bres. t. 48 f. 1-2 et Illus. mic. t 8/70-71.  
Bull. 430, <sup>585</sup> 1219, 1257, 983, 1965 ~~1965~~  
Hab. ad hunc arborum fondosarum - Liguria, Piemonte, Lombardia;  
area risi Europa, Tasmania. *astate*

Vito & Ugo D- for Spieke

palmatus 876

Pileo carnoso, compacto, e convexo espanso, irregolare, glabro, pellicoloso, ferrugineo, 6-8 cm. lato; carne firma sed non spugnosa, bibula; odore leu; <sup>odore leu; in raphanoides, sapore mit;</sup> lamellae collinato-affixi, ventricosae, subdistantibus, concoloribus;

Stipe <sup>farcto</sup> excentrico laterali que, incurvo, <sup>[fibroso apice frumentato (Bres. MS)]</sup> firme, glabro, albido, 3-5 cm. longo.

Spore subglobosae, ochracee 10  $\mu$  diam.; ex truci MS. ovato-oblongis, ampi 13-15=7 vel 10-13=6, extre minute granulosae, ~~ex~~ ut in Hebeloma subglobose, basidiis clavatis subcapitatis 30-40=12. (Bres. MS.)

DS. Confuso in Flavotus subpalmatus ma

non è distante per le spore ferruginee.

Secondo Zilletti ad altr. le spore dovrebbero essere pubblosae di 7-9  $\mu$  di diam.; è persuas de sofferir che vi sia unione di due specie.

Hebeloma

, che riferisce la specie al gen. Flavotus,

6 Crepidotus Cesatii (Rabenh.)

Ann. Syst. Fung. II p 859

Icon. n. 111

Blfl. 61, 209, 399, 598, 634, 725, 886, 983.

(borco dei Cappuccini (Pres. ms))

Hab. ad corticis ramisque putres - Liguria, Piemonte, Veneto, Trentino;

areae disti Imbe, Napoletano. Ascoli.

area denti. Ileba.

Exs. P. Klot. Herb. Mycol. n. 1506 (cort. Platani, Vercelli: Cesati)

Cesatii 879

gleo sessili, resupinato, porrecto,  
anacello, molli, albido vel  
pallide gialvo, 1-2 cm. lato;  
lamellis latis, pallidis;

sporif pallide gialvi, 6-7 = 4,5-5,5  
vel  $\frac{7}{10} = 5$ ; basidi 25-30 = 7-8  
(Pres. M. S.)

D.S. Abito di Cladopeltis variabilis  
ma ne differisce pel cappello  
non tomentoso, le lamelle  
non rubiginei, le spore  
pallide.

7) *Crepidotus bubalinus* (Port.) Sau. *Agaricus bubalinus* Port. Myc. Eur. IV p. 26, t 46 f 3 (1828)  
*Crepidotus alveolus* (Lach.) Karst. Habsr. I p. 413 (1879)  
Sau. Syll. Fung. V p. 877, *Agaricus alveolus* Lach. in Linnæa, IV (1829) p. 567  
n. 582

Gen. Cooke, M. Br. F. t. 499, f 4, Pers. f. c.

Brit. 1885

Hab. ad frans <sup>in silva</sup> fagineo, -Napoletan: Santa Cristina d' Calabria. (Piccoli),  
Nizza (Port. in Pres. MS.) dest. Aut. Pl.  
area dist. Europe, Australia

Off. fusc varia - Crep. mollis.

Bubalinus | 877  
= alveolus

Pileo carnoso, molli, laterali, obovato

ad  
rependo que, piano, ~~glabro~~ glabro, ochraceo-  
fusco, <sup>2-8 cm. lato</sup> nunc sessili, nunc postice in  
fasim brevem stipitiformem, tomento-  
so-villosam producta, <sup>2nd marginam subinde</sup> <sup>olivascente</sup>,  
lamellis determinatis, latis, argit-  
laceo-fusca;

sporis 7-8  $\mu$  longis, vel 8-10 = 4-6

Coprinidates Pat.

Obs. Affine a Crep. mollis


ma più carnoso, più scuro,  
e bianchiccio  
espallente col secco.

Coprinidates

8 *Crepidotus mollis* (Schäff.) Quel. Champ. Jura p. 138 (1872)  
Sax. Syst. fung. II p. 877, Agaricus mollis Schäff. Icon. IV p. 49, t. 213 (1874)  
Zon. Schäff. l.c., Brigitte F. Neop. t. 41 f. 6-8, Grub. Champ. Fr. t. 318.  
Tabonell. Tab. anal. p. 227.

Brbl. 38, 39, 67<sup>101</sup>, 209, 393, 418, 450, 454, 585, 638, 725, 806, 923, 1301, 1965  
1289, 1617

Hab. ad tronco <sup>variolos</sup> putres - Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, <sup>2</sup>  
Emilia, Toscana, Napoletana, Sicilia. Valle d'Agri (Cob.), Tergola (Bres. ms.)  
Area dist. Europa, America bor., Asia, Australia.

dentate.  see Bigeard

mollis 877

Pileo gelatinoso - carnoso, molli, obovato  
et reniformi, flaccido, subsessili, glabro,  
e pallido canescente, 2-8 cm. lato, in magiore  
forma undulato-lobato,  
lamellis ad basim decurrentibus, confortis,  
linearibus, ex albidio agnose cinnamomeis,  
2-5 mm. lati;  
sporis brunneo-fusco, 8-9 = 5-6, pruifor-  
mitos.

← Dentate rami

1 Crepidotus appplanatus (Pers.) Karst. Hatt. I p. 414 (1879)  
Sacc. Syl. fung. V p. 878, Agaricus appplanatus Pers. Obs. myc. I p. 8 +  
5 f 3 (ex err. in explic. tab. sub nom. Ag. mitis).

Icon. Pers. l. c. Brzelm. Thymen. t. 296, f. 661.

Bol. Bered. Ml.

Hab. ad trunco et ramos vetustos Trentino: Goriadore (Ber Ml.)  
e S. Antonio pr. Trento

Area dist. Europa, Apice.

Autunno

04 Sec. Bros. Ml. per le spore globose gr. pette id Crep. globiger (Berk.)

# Applanatus 878

(aguato, nec gelatinoso, maxime hygrophano,  
udo & margine striato,  
pileo carnosulo, molli, fragili, piano,  
deinceps postice depresso, 2-5 cm. lato  
reniformi vel cuneato, albido), in stipitem  
brevissimum, albo-tomentosum, postice  
porrecta; ~~at~~;

lamellis determinatis, confertis, linearibus,  
ex albido dilute cinnamomeis;  
sporis sphaeroideis, 1-guttulatis, flave-  
scentibus, 5-6  $\mu$  diam. (Karst.), ovo-  
deis 8-9  $\mu$  longis (Quélet)  
 $8-9 = 5,5-6$ ; basidiis 25-30=78  
(Bref. M. S.)

Oss. Le spore differiscono secondo Bref.  
(M. S.) da quelle di Crep. mollis  
perché qui sono globose.