

Fungi selecti exsiccati

a

Joanne Kunze

collecti.

Islebiae 1876.

Sumptibus collectoris.

Unter obigem Titel beabsichtigt der Unterzeichnete ein neues Exsiccaten-Werk zu publiciren, welches in Fascikeln von je 50 Species erscheinen und nur seltenere, kritische oder neue Pilze enthalten soll. Der Hauptzweck den der Herausgeber bei Edition dieser Sammlung im Auge hat, ist der, eine Exsiccaten-Sammlung zu schaffen, die geeignet ist, authentisches Material, das allein zur Lösung systematischer Fragen benutzt werden kann, allgemein zu verbreiten. Um diesen Zweck zu erreichen, werden erstens die allgemein verbreiteten und Jedermann bekannten Formen ausgeschlossen; zweitens hat es sich der Herausgeber zum Princip gemacht, nur gut entwickelte, völlig reife und **in allen Exemplaren der Sammlung identische Arten** auszugeben; drittens sollen in einer besondern Schrift, oder bei einigermassen befriedigender Abnahme zugleich mit den Exsiccaten, die Beschreibungen und wo nöthig Zeichnungen der neuen, sowie Notizen zu kritischen und zweifelhaften Arten und Formen gegeben werden. Der Herausgeber bittet alle Mycologen um ihre Unterstützung bei diesem Unternehmen, die sich theils durch Einsendung brauchbaren Materials, theils durch Mittheilung von Bemerkungen, Correcturen etc. zu den bereits ausgegebenen Formen, bethätigen kann.

Ueber die Erscheinungsweise der Sammlung ist Folgendes zu bemerken. Es werden im Laufe eines Jahres nicht mehr als 6 Fascikel erscheinen, von denen die ersten vier (No. 1—200) im Januar 1876 ausgegeben werden. Der Preis eines Fascikels beträgt **7 R.-Mark 50 Pfennige**. Durch den Buchhandel bezogen entsprechend mehr.

Da die Höhe der Auflage zur Zeit noch nicht definitiv festgestellt werden kann, so dürfte es sich empfehlen, Bestellungen auf die Exsiccaten möglichst rechtzeitig an die untenstehende Adresse aufzugeben, wenn anders mit Sicherheit auf Zusendung gerechnet werden soll.

Johannes Kunze,

Dr. Lutherstrasse No. 10 in Eisleben, Prov. Sachsen. (Deutschland.)

Index

in

Kunzei Fungorum selectorum exsiccatorum.

Fascik: I—IV.

No. 1—200.

- Aecidium Glaucis, Doz. et Molk. Forma: Glaucis maritimae, L.
Apiosporium Plantaginis, Fekl. Fg. conid: Torula Plantaginis Cda F: Plantaginis lanceolatae, L.
Ascobolus Leporum, Fekl. In fimo Leporis cuniculi, L.
— polysporus, Awd. Forma nova: **In fimo Perdicis cinereae, Biss.**
Calloria tithymalina, Johs. Kze. nov. spec. F: Tithymali Gerardiani, (Jacq.) Kl. et Grcke.
Calocera viscosa, Fr. Ad Piceae excelsae, (Poir.) Lk. truncos putridos.
Cenangium Frangulae, (Pers.) Tul. F: Frangulae Alni, Mill.
— fuliginosum, Fr. F: Salicis viminalis, L.
Cercidospora Uhlothii, Krb. In thallo Placodii saxicoli, (Ach.) Mass.
Chaetomium elatum, Kze. et Schm. F: Secalis cerealis, L.
Chrysomyxa Abietis, (Wll.) Ung. F: Piceae excelsae, (Poir.) Lk.
Clavaria abietina, Schum. In pinetis umbrosis.
— fastigiata, Linné. In locis graminosis, humidis, muscosis.
Coryne purpurea, Fekl. In truncis putridis Fagi, L. et Carpini, L.
Cryptosphaeria eunomia, (Fr. Nke.) Fekl. F: Fraxini excelsioris, L.
Cryptospora corylina, (Tul.) Fekl. F: Coryli Avellanae, L.
— hypodermia, (Fr.) Fekl. F: Ulmi campestris, L.
Cryptospora limitata, Johs. Kze. nov. spec. F: Tiliae platyphylli, Scop.
Cucurbitaria Berberidis, (Pers.) Tul. F: Berberidis vulgaris, L.
— Laburni, (Pers.) Fr. F: Cytisi Laburni, L.
— Spartii, (Nees.) Fekl. F: Sarothamni scoparii, (L.) Kch.
Cyathus striatus, Hffm. In truncis putridis Quercus, L.
— vernicosus, Tul. (C. Olla, Pers.) In agrorum terra nuda.
Cystopus candidus, (Pers.) Lévy. F: Coronopodis Ruelli, (Poir.) All.
— cubicus, (Str.) Lévy. F: Tragopogonis majoris, Jacq.
Dasyscypha bicolor, (Bull.) Fekl. F: Quercus Roboris, L.
Diaporthe adunca, (Rob.) de Niessl. F: Plantaginis lanceolatae, L.
— Aretii, (Lsch.) Nke. **Forma nova: Cirsii eriophori, (L.) Scop.**
— Carpini, (Pers.) Fekl. F: Carpini Betuli, L.
— decipiens, Saccardo F: Carpini Betuli, L.
— fallaciosa, Nke. F: Aceris campestris, L.
Diaporthe Fuckelii, Johs. Kze. nov. spec. F: Spiraeae ulmifoliae, Scop.
— insularis, Nke. F: Quercus Roboris, L.

- Diaporthe Niesslii, Joh. Kze. nov. spec.** F: *Aceris Pseudoplatani*, L.
 — *nigrella*, (Awd.) de Niessl. F: *Eryngii campestris*, L.
 — **Nitschkei, Johs. Kze. nov. spec.** F: *Hederae Helicis*, L.
 — *nodosa*, Fckl. F: *Syringae vulgaris*, L.
 — *orthoceras*, (Fr.) Nke. F: *Achilleae Millefolii*, L.
 — — (Fr.) Nke. F: *Anthemidis tinktoriae*, L.
 — — (Fr.) Nke. F: *Tragopogonis majoris*, Jacq.
 — *platanoides*, (Berk.) Johs. Kze. F: *Aceris Pseudoplatani*, L.
 — *putator*, Nke. F: *Populi Tremulae*, L.
 — **Saccardiana, Johs. Kze. nov. spec.** F: *Ulmii campestris*, L.
 — *Salicis*, (Fr.) Nke. F: *Salicis Capreae*, L.
 — *Sarothamni*, (Awd.) Nke. F: *Sarothamni scoparii*, (L.) Kch.
 — *Spina*, Fckl. F: *Salicis triandrae*, L.
 — *syngenesia*, (Fr.) Nke. F: *Frangulae Alni*, Mill.
 — *tessera*, (Fr.) Fckl. F: *Coryli Avellanae*, L.
 — *velata*, (Pers.) Nke. F: *Tiliae platyphylli*, Scop.
 — *vepris*, (de Laer.) Fckl. F: *Rubi caesii*, L.

- Didymosphaeria albescens, de Niessl. n. spec.** F: *Lonicerae Hylostei*, L.
 — **brunneola, de Niessl. nov. spec.** F: *Anthemidis tinktoriae*, L.
 — — — — — F: *Artemisiae campestris*, L.
 — — — — — F: *Origani vulgaris*, L.
 — *epidermidis*, (Fr.) Fckl. F: *Berberidis vulgaris*, L.
 — **Kunzei, de Niessl. nov. spec.** F: *Caricis acutae*, L.
 — **limitata, Johs. Kze. nov. spec.** F: *Meliloti albi*, Desr.
 — **Rehmii, Johs. Kze. nov. spec.** F: *Verbenae officinalis*, L.
 — *Rubi*, Fckl. F: *Rubi fruticosi*, L.
 — *sarmentorum*, de Niessl. F: *Humuli Lupuli*, L.

Dothidea Berberidis, (Whlbg.) Fr. F: *Berberidis vulgaris*, L.

— *ribesia*, (Pers.) Fr. F: *Ribis rubri*, L.

— *Sambuci*, (Pers.) Fr. F: *Sambuci nigrae*, L.

Epicymatia Winteri, Johs. Kze. nov. spec. In *Cenangii fuliginosi*, Fr. cupulis.

Erysiphe Martii, Lév. F: *Trifolii medii*, L.

— *tortilis*, (Lk.) Lév. F: *Corni sanguineae*, L.

Eutypa ambigua, Johs. Kze. nov. spec. F: *Spiraeae ulmifoliae*, Scop.

— *scabrosa*, (Bull. Nke.) Fckl. F: *Aceris campestris*, L.

Exoascus deformans, (Berk.) Fckl. **Forma nova: Pruni Cerasi**, L.

— *Pruni*, Fckl. F: *Pruni domesticae*, L.

Gautieria graveolens, Vitt. In pinetis umbrosis.

Geaster fimbriatus, Fr. In foliis acerosis putrescentibus *Piceae excelsae*, (Poir.) Lk.

Geaster fornicatus, (Huds.) Fr. In foliis acerosis putrescentibus Piceae excelsae, (Poir.) Lk.

— **Rabenhorstii, Johs. Kze. nov. spec.** In foliis acerosis putrescentibus Piceae excelsae, (Poir.) Lk.

— *striatus*, D. C. In foliis acerosis putrescentibus Piceae excelsae, (Poir.) Lk.

Geoglossum carneum, Schultz. In locis graminosis, humidis, muscosis.

Gnomonia devexa, (Desm.) Awd. F: *Tiliae platyphylli*, Scop.

— *errabunda*, (Rob. et Desm.) Awd. F: *Carpini Betuli*, L.

— *erythrostoma*, (Pers.) Awd. F: *Pruni Cerasi*, L.

— *leptostyla*, (Fr.) Ces. et de Not. F: *Juglandis regia*, L.

— *melanostyla*, (DC. Fr.) Awd. F: *Tiliae platyphylli*, Scop.

— *pleurostyla*, Awd. F: *Salicis amygdalinae*, L.

— *Pruni*, Fekl. F: *Pruni domesticae*, L.

— *Pustula*, (Pers.) Awd. F: *Quercus Roboris*, L.

— *setosa*, (Pers.) Ces. et de Not. F: *Rubi fruticosi*, L.

— *tetraspora*, Winter. F: *Tithymali Cyparissiae*, (L.) Scop.

Habrostictis ocellata, (Fr. Tul.) Fekl. F: *Salicis triandrae*, L.

Helminthosporium Tiliae, Fr. F: *Tiliae platyphylli*, Scop.

— *velutinum*, Lk. F: *Tiliae platyphylli*, Scop.

Helotium Amenti, (Batsch) Fekl. F: *Salicis Capreae*, L.

— *herbarum*, (Pers.) Fr. F: *Urticae dioicae*, L.

— *salicellum*, Fr. F: *Salicis Capreae*, L.

Hercospora Tiliae, (Fr.) Tul. F: *Tiliae platyphylli*, Scop.

Humaria gregaria, Rehm. In callium terra humida et arenosa.

Hydnum Schiedermayeri, Heufl. F: *Piri Mali*, L.

Hypoderma virgultorum, D. C. F: *Rubi fruticosi*, L.

Hysteropeziza erumpens, (Grev.) Rbh. F: *Aceris Pseudoplatani*, L.

Leotia viridis, (Pers.) Fekl. In locis graminosis, humidis, muscosis.

***Leptosphaeria caespitosa*, de Niessl. nov. spec.** F: *Artemisiae campestris*, L.

— *derasa*, (Berk.) de Niessl. F: *Senecionis Jacobaeae*, L.

— *Doliolum*, (Pers.) Ces. et de Not. **Forma nova: *Dipsaci pilosi*, L.**

— *Doliolum*, (Pers.) Ces. et de Not. F: *Urticae dioicae*, L.

— *Libanotis*, (Fekl.) de Niessl. **Forma nova: *Dauci Carotae*, L.**

— *modesta*, (Desm.) Awd. F: *Dauci Carotae*, L.

— *Niessleana*, Rbh. **Forma nova: *Lathyri heterophylli*, L.**

— *suffulta*, (Nees) de Niessl. F: *Melampyri nemorosi*, L.

Lophiostoma caulium, (Desm.) de Niessl. F: *Epilobii hirsuti*, L.

— *Hederae*, Fekl. F: *Hederae Helicis*, L.

— *insidiosum*, (Desm.) Ces. et de Not. **Forma nova: *Thesii montani*, Ehrh.**

Lophiostoma Origani, Johs. Kze. nov. spec. F: *Origani vulgaris*, L.

Lophodermium arundinaceum, Chev. F: *Moliniae coeruleae*, (L.) Mneh.

Lycogala epidendrum, L. In truncis putridis Fagi, L. et Carpini, L.

Massaria Baggei, (Awd.) de Niessl. F: *Salicis amygdalinae*, L.

— **micacea, Johs. Kze. nov. spec.** F: *Tiliae platyphylli*, Scop.

— *Pupula*, (Fr.) Tul. F: *Aceris Pseudoplatani*, L.

Massariopsis subsecta, (Fr.? Awd.) de Niessl. F: *Aceris campestris*, L.

Melogramma spiniferum, (Willr.) Nke. F: *Fagi silvaticae*, L.

Microthyrium Cytisi, Fekl. **Forma nova: Genistae tinktoriae**, L.

Naevia Adonis, Fekl. F: *Adonidis vernalis*, L.

Nectria Cucurbitula, (Tode) Fr. F: *Piceae excelsae*, (Poir.) Lk.

Niptera cinerea, (Btsch.) Fekl. F: *Epilobii hirsuti*, L.

— **denigrata, Johs. Kze. nov. spec.** F: *Antherici ramosi*, L.

— *Euphrasiae*, Fekl. F: *Euphrasiae officinalis*, L.

— *Mercurialis*, Fekl. F: *Mercurialis perennis*, L.

Ortidea leporina, (Btsch.) Fekl. In pinetis umbrosis.

Peronospora Dipsaci, (Tul.) de Bary. F: *Dipsaci silvestris*, Huds.

Peziza Solani, Pers. F: *Solani tuberosae*, L.

Phacidium autumnale, Fr. F: *Galii borealis*, L.

Phragmidium granulatum, Fekl. F: *Potentillae albae*, L.

Phyllactinia guttata, Lév. F: *Coryli Avellanae*, L.

Plectania melastoma, (Sow.) Fekl. F: *Rubi fruticosi*, L.

Pleospora Armeria, (Cda.) Johs. Kze. F: *Armeriae vulgaris*, (L.) Willd.

— *herbarum*, (Pers.) Rbh. F: *Allii Cepae*, L.

— **Niessleana, Johs. Kze.** F: *Meliloti albi*, Desr.

Protomyces gibbosus, (Wallr.) Schröt. F: *Aegopodii Podagrariae*, L.

Pseudopeziza Ranunculi, (Wallr.) Fekl. F: *Ranunculi repentis*, L.

Pseudoplectania nigrella, (Pers.) Fekl. In foliis acerosis putrescentibus *Piceae excelsae*, (Poir.) Lk.

Puccinia (Microp.) *Adoxae*, DC. (Pucc.) F: *Adoxae Moschatellinae*, L.

— (Microp.) *asarina*, Schm. et Kze. (Pucc.) F: *Asari europaei*, L.

— (Hemip.) *Balsamitae*, (Str.) Rbh. (Ur. et Pucc.) F: *Tanacetii Balsamitae*, L.

— (Hemip.) *Behenis*, Opitz. (Ur. et Pucc.) F: *Silenes vulgaris*, (Mneh.) Greke.

— (Eupucc.) *Bupleuri*, Rud. (Aecidium.) F: *Bupleuri falcati*, L.

— (Heterop.) *caricina*, DC. (Aecidium *Urticae* Schum.) F: *Urticae dioicae*, L.

— (Eupucc.) *Circaeae*, Pers. (Pucc.) F: *Circaeae lutetianae*, L.

— (Eupucc.) *Compositarum*, Schlecht. (Ur. et Pucc.) F: *Crepidis foetidae*, L.

— (Eupucc.) *Galiorum*, Lk. (Aecidium.) F: *Galii veri*, L.

— (Eupucc.) *Polygoni amphibii*, Pers. (Ur. et Pucc.) F: *Polygoni amphibii*, L.

Puccinia (Leptop.) *Spergulae*, D. C. (Pucc.) **Forma nova: *Alsines verna*, (L.) Bartl.**

— (Leptop.) *Stachydis*, D. C. (Pucc.) F: *Stachydis rectae*, L.

— (Eupucc.) *Thesii*, Chaill. (Aecid. Ur. et Pucc.) **Forma nova: *Thesii intermedii*, Schrad.**

— (Leptop.) *Valantiae*, Pers. (Pucc.) **Forma nova: *Galii Molluginis*, L.**

***Pyrenopeziza islebiensis*, Johs. Kze. nov. spec.** F: *Helianthemii Chamaecisti*, Mill.

Rhaphidophora Echii, Rehm. F: *Echii vulgaris*, L.

— *fruticum*, (Rob.) Fekl. F: *Ononidis spinosae*, L.

— *rubella*, (Pers.) Ces. et de Not. F: *Plantaginis lanceolatae*, L.

— *rubella*, (Pers.) Ces. et de Not. F: *Solani tuberosi*, L.

Rhytisma punctatum, Pers. F: *Aceris Pseudoplatani*, L.

Solenia poriaeformis, (D. C.) Fekl. F: *Salicis triandrae*, L.

Sordaria curvula, de Bary. In fimo Bovis Tauri, L.

— *fimeti*, (Pers.) Wint. In fimo Equi caballi, L.

— *macrospora*, Awd. In fimo Leporis timidi, L.

Sorisorium Junci, Schröt. F: *Junci bufonii*, L.

— *Saponariae*, Rud. F: *Silenes vulgaris*, (Mnch.) Grcke.

Sphaerella subradicans, (Fr.) Awd. F: *Convallariae majalis*, L.

— ***Winteri*, Johs. Kze. nov. spec.** F: *Melampyri nemorosae*, L.

Sporormia intermedia, Awd. In fimo Ovis arietis, L.

Spumaria alba, D. C. In graminibus adhuc vivis.

Stannaria Perssoonii, (Moug.) Fekl. F: *Equiseti arvensis*, L.

Synchytrium aureum, Schröt. F: *Lysimachiae Nummulariae*, L.

— *Mercurialis*, (Lib.) Fekl. F: *Mercurialis perennis*, L.

Taphrina aurea, (Pers.) Fr. Tul. F: *Populi nigrae*, L.

***Tilletia separata*, Johs. Kze. nov. spec.** F: *Aperae Spicae venti*, (L.) P. B.

Trametes piniperda, R. Hartig. F: *Piceae excelsae*, (Poir.) Lk.

— *Ribis*, Fr. F: *Ribis rubri*, L.

Trochila Craterium, (D. C.) Fr. F: *Hederae Helicis*, L.

Urocystis Colchici, (Schlecht.) Rbh. F: *Colchici autumnalis*, L.

— *pompholygodes*, (Schlecht.) Rbh. F: *Anemones nemorosae*, L.

Uromyces (Eurom.) *Armeriae*, (Duby.) Lévy. (Aec. et Uredo) F: *Armeriae vulgaris*, (L.) Willd.

— (Eurom.) *Aviculariae*, (Pers.) Schröt. (Aec.) F: *Polygoni avicularis*, L.

— (Uromycopsis) *Behenis*, de Niessl. (Aec. et Urom.) F: *Silenes vulgaris*, (Mnch.) Grcke.

— (Uromycopsis) *Lilii*, (Willr.) Johs. Kze. (Aec. et Urom.) F: *Lilii candidi*, L.

— (Micrurom.) *Muscari*, (Duby) Lévy, (Urom.) F: *Muscari racemosi*, L.

— (Micrurom.) *Ornithogalli*, (Schm. et Kze.) Jul. Kühn. (Urom.) F: *Gageae luteae*, (L.) Schult.

Ustilago anomala, Johs. Kze. nov. spec. F: Polygoni dumetorum, L.

— bromivora, Fsch. v. Wald. **Forma nova: Bromi macrostachyos**, Desv.

— Cardui, Fsch. v. Waldh. F: Cardui acanthoidis, L.

— Holostei, de Bary. F: Holostei umbellati, L.

— hypodites, (Schlecht.) Fr. F: Tritici repentis, L.

— Ischaemi, Fekl. F: Andropogonis Ischaemi, L.

— longissima, (Sow.) Lév. F: Glyceriae fluitantis, (L.) R. Br.

— neglecta, de Niessl. F: Setariae glaucae, (L.) P. B.

— utriculosa, Tul. F: Polygoni lapathifolii, L.

Ustilina vulgaris, Tul. In truncis putridis Fagi, L. et Carpini, L.

Valsa ambiens, (Pers.) Fr. F: Aceris campestris, L.

— ambiens, (Pers.) Fr. F: Piri communis, L.

— salicina, (Pers.) Fr. F: Salicis triandrae, L.

— sepincola, Fekl. F: Rosae caninae, L.

— stellulata, Fr. F: Ulmi campestris, L.

Hylaria carpophyla, (Pers.) Fr. F: Fagi silvaticae, L.

— Hypoxylon, (L.) Grev. In truncis putridis Fagi, L. et Carpini, L.


Appendix:

Erineum populinum, Pers. F: Populi Tremulae, L.

— purpurascens, Gärtn. F: Aceris Pseudoplatani, L.

Phyllerium acerinum, Fr. F: Aceris platanoidis, L.

— Vitis, Fr. F: Vitis viniferae, L.



Druck von Fr. Klöppel in Eisleben.