

Rouen 8 mai 1883

Cher Monsieur

Je vous remercie du nom que vous
voulez bien me donner et de la nouvelle
Dédicace que vous m'attribuez. Je publie
habituellement les diagnostics que je recue dans
le *Michelia*, après qu'on me les a vérifiés et
complétés. Je ne me suis pas encore attelé à
mon examen.

Boudier

Quant à des Dédicaces, j'en vois dans ma
correspondance que M. Boudier⁺, membre de la
Société Botanique, qui s'occupe avec beaucoup de soin
et de patience, avec une complaisance rare de l'étude
des cryptogames qui nous occupent. J'aimerais
à voir son nom attaché à un champignon
théogoniste. — Vous avez bien fait de donner
le nom de Brionnensis à un dicus de cette
localité qui m'a fourni tant de charmantes

Je vous envoie quelques diagnostics qui je
trouve dans mon journal de Botanique. Ces
actes sont éparpillés sur des feuilles libres qui
m'ont échappé en ce moment.

C'est 10 fr. pour le *Michelia*

Bien sincèrement tout à vous

C. Malbranche

E. J. V. D.

Notes pour les Diagnoses Des espèces ou variétés
nouvelles

§27. Lophiost. knucleatum. var. *Thecae clavato-cylindraceae*.
paraphysatis; sporis fusiculis oblongo-ovatis
utroque apice rotundatis, $22-24 \times 7-8$, 3septatis,
demum septis constrictis loculisque guttulis,
rectis v. leviter curvatis. ad muspilorum
Corticis. Priconia. - (Intus & extus corticis.)

§40 Hendersonia. Spora brunnea 2-4 septata.

§33 Claspora vulgaris var. Spora muralis $26-28 \times 10-11$.

§13 Eutypa leprosa v. eutypelloides: - Spheria composita
rustulosa; tuberculis rotundis ellipticisve,
fusco-nigris (passim albo variegatis stromate penetrantibus)
planis rugosis propter ostiolum prominentia,
corticis epidermide arcte cinctis, compositis.
Stromate nivea, peritheciis oblongis submonostichis;
ostioli brevibus sphaericis papillatis (?) $10-20$
in singula pustula coadunatis. Thecis clavatis
longe pedicellatis, 8 sporis, 100×8 ; sporis
botuliformibus distichis hyalinis, 12×3 .
(Dans le Sylloge, à g^a Stromate effuso")

§12. Calopharia anceps. S. M. Peritheciis in soris orbiculatis
dense stipatis, (non epidermide vel vix marginatis)
globosis $0^m 25-0,35$ diamet. nigris, levibus, ostioli
vix perspicuis papilloformibus, dein depresso
cupulatis, contextu parenchymatico nigricante;
 $10-12$ perith. in singula soru. Thecis clavatis
deorsum attenuatis, $60-65 \times 8-10$; paraphysibus?
Crassis septulatis, octosporis; sporis distichis
botuliformibus, rectis v. curvatis, $11-14 \times 3$.

2-4 guttulates, hyaline. — Super pilis
fusi articulis commixti. (nonnullis)

§38. Lestadia Malbrassicana. D. Peritheciis minutis in
maculis griseis exaridis. Sporae sparsae,
amphigenae, epidermide vestitae; theciis clavatis,
sessilibus, apophysatis, 48×7 ; sporis ellipticis
hyalinis, granulatis guttatis, continuis, 13×4 .
(a Sphaeria Syrata Ehrh. differt.)