

Amsterdam 16 Mars 1823

Mon cher Compère !

Je vous remercie beaucoup pour votre
réponse. Permettez-moi néanmoins de re-
venir encore une fois sur mon Stemphyliæ.
Lorsque j'ai trouvé cette plante, je la comparai
au Populasporea Lepae, figuré et décrit
chez Berk. et Coke. Pourtant la descrip-
tion de ces deux espèces ne s'appliquait au-
cunement ~~à~~ mes objets, since que je ne trou-
vai point les spores bi- ou pluriloculaires
à la surface d'une columelle celluleuse, dont
ces auteurs font mention. - Après avoir reçu
votre réponse, je me suis encore une fois
dirigé vers Cooke, et Berkeley et Pearse
(Skerm. VI, t. 45) sans beaucoup de succès,
jusqu'à ce que j'eusse l'idée me survint de m'a-
dresser au texte original des Annals of Natural
History n^o 16^o. Là j'ai trouvé cette ob-
servation, que ni Berkeley dans les Callings,
ni Cooke dans son British Fungi ont répétée.
" This very beautiful mould consists of decumbent,
articulate, colourless threads, which produce
short, erect branches, each surmounted by
a large red cellular body about 0.000 inches,

in diameter. This is all that is figured
by Presf, as quoted above, but we have
seen the ~~head~~ studded with oblong
erect spines, "etc.

et j'ai pu se douter nullement que
le Popul. lepid. de Presf et de Berk.
sont deux plantes tout à fait différen-
tes, en ce que mes objets ont beaucoup
de ressemblance avec les descriptions de
Presf, mais sont totalement dépourvus
de spores. - Les 2 capitules, cellulau-
les, qui se ressemblent en fait à de
surgonérations de coralliens, ont un
diamètre de 45 μ . -

Si ma conjecture se prouve bonne, je
crois qu'il n'y a pas de différence entre
Stemphylium et Populasporea, de sorte
que le dernier genre, qui est le plus
jeune des deux, devra être supprimé.

Ces derniers jours j'ai trouvé une
espèce de Umbellinum, que je ne trouve
d'ici nulle part, sur des aiguilles de
Pinus sylvestris. Elle avait l'aspect à fait
le port d'un exemplaire noir de l'Stictis
eximia. Une première vers le sommet

divisée en trois ou quatre échelons de verticilles de branches, longues d'environ 1 m., et divisées à leur tour en verticilles secondaires. Spores aérospores, très-petites, ovales, incolores. Une primaire noire, rameaux presque noirs; rameaux secondaires brun-foncé ou et etot pâles; bruns. -



Je ne comprends pas comment on a pu réunir en un seul genre, des espèces hyalines ou incolores et colorés, et pourquoi les espèces dematiées n'ont pas reçu en outre le nom que les espèces mucédiniées. -

Le genre *Myriococcum* ne s'applique pas à mon champignon (Sheep). -

Acceptez mes salutations amicales

Votre tout dévoué.

Ch. Saccardo