

Leipzig, 29/2 1884.

Hochgeachteter Herr!

Obgleich ich weiß, daß Sie sehr viel zu
thun haben, erlaube ich mir doch — im Voraus
Ihre Verzeihung erbittend — Sie mit einigen
Fragen zu belästigen.

So lange der III. Band Ihres Sylloge nicht
erschienen ist, ist es sehr schwierig, je irgend,
litt, mit Sicherheit einen *Pyrgos imperfectus*
et cetera et cetera zu präbieren. Da Sie jeden,
falls schon jetzt einen Überblick über die
beschriebene Spezies haben, wird es Ihnen nicht
schwer sein, mir über die folgenden
Cercospora - Formen Aufschluß zu geben,
das heißt, mir zu sagen, ob auf den betreffenden
Körpferpflanzen bereits Cercospora - Arten beschrieben
sind? — Ferner erlaube ich mir, einige

9
Tunagi imperfect. beiznfügen und bitte Sie
ganz erghaut um Ihre Ansicht über
Diyaly. Sie wissen Dürften nur Arten
sein und werde ich die in der bald
erscheinenden 31. Antivie meiner jüngi
europäi. publieig, von Allen habe ich
bereits die Diagnosen verfasst!

Ihre Bearbeitung der Pile von Schöniger,
für die ich bestens danke, werde ich in die
Königia aufheben. Meine 14. Hg., die
Pyrenusungen beginnt, muß Sie in ten
nächste Tagen erhalt.

Wochenstingsvoll

erghaut

Schöniger.

I. Sind auf folgenden Nährpflanzen schon
Cercospora - Spez. beobachtet?

- a. / auf *Catalpa bignonioides*.
b. / , *Ptelea trifoliata*.
c. / , *Crotalaria*
d. / , *Cercis canadensis*.
e. / , *Polygonum aviculare* (Lehr verhofft
von Cercospora. Polygonum Offen!)
f. / , *Lolidaea canadensis*.
g. / , *Ambrosia*
h. / , *Gymnocladia canadensis*.
Lantidenus Nordamerikas.

Für zeitigen Bestimmung:

1. *Gloeosporium* ? auf *Viburnum* gentian.
Liride. 6. 83. f. West.
2. *Gloeosporium* ? auf *Lilium*
Mortagon. Liride. 5. 83. Wig.
3. *Oleandra* auf *Cissinum spinosiss.*
sinnig. Lit. Liride. f. Arnold.
4. - 10. aus *Mipouia*, Nord America.
4. auf *Carya ~~alba~~*.
5. , *Fraxinus americana*. (*Septoria* mit
folkenium (gallische fidei Adris) Perithez.
(Die schwarzen Perithez sind *Piggotia*
Fraxini!)

6. Auf Anercis imbricata, wohl eine Gloss-
porium. Acanthis plumigie in
macularum centro solitaria, pellis.
7. Auf Anercis
Lythra oder Cylichosporium. Spindig
in folium pagine inferiore expositis.
8. Auf doms rubra. Sicher nicht die Lythra
Acanthis; ganz Cercospora-artig; Hyphae
fasciculatum erumpentes; Conidia acrogen,
circula, glauca.
9. Auf Conis, unterseits rostrotte (ferrugine).
Flecken bilden. ? o.
10. Auf Lythra, Cladosporium, große
schwarze Massen bilden?
-
11. In folio Pracis stellatifolia L. Caput
homo sp.
-