

Vienna li 27. XII. 1909.

Dilettissimo Signore,
 Io comprendo bene che prima
 vi sia l'identificazione: Atichia
 = Actinomma = Heterobolus è curiosa
 ma io ho paragonato esempli tipici
 di Atichia, Actinomma, Atichia sparsa
 e Scutellaria, e visto che sono
 frango (Genere). Se la paragonerò
 Actinomma con Atichia la vedrò
 la identità. - Le specie (5? 6?) tra
 questo Genere (Atichia) sono di
 diversa consistenza, alcuni sono

ÖSTERR. POSTVERWALTUNG
ADMINISTRATION
DES POSTES D'AUTRICHE

KORRESPONDENZ
KARTE
CARTE POSTALE





Illustr. Signature  48

G. F. A. Saccardo

a

Padova, Italia

Reale Orto botan. dell' Università
Italia

abbastanza duri, altri (A. Treubii Vth.) sono molliissimi, e
 facilmente diffluenti; schiacciati mostrano ifi uguali al
 quelli di *Heterobotrys*, cioè cellule rotonde congiunte con
 piccoli interstizi: , giusto come *Heterobotrys*. Questo genere
 non è che lo stato infantile o immaturo di un *Alischia* molliissimo.
 La descrizione del *Tenzip* nella *Michelia* è quella di un *Alischia*.
 Lei stesso dice nelle *Sollege*. XVIII. 558 che *Heterobotrys* è lo stato infantile
 di *Succotia*, e *Succotia* caffèicola è completamente identica con
Alischia Milleretii Rac. = *Alischia aspersa* Solmsii R. Wagn. Lemie identici,
 ficazioni intorno *Alischia* sono completi e diretti, non meno
Uredo = Tricinia. - In quanto a la posizione sistematica dell'*Alischia*, finora
 nessuno aveva un'idea forse molto alta. Io l'ho trovata. Il fungo giovanile
 di *Alischia glaucovillosa* (v. la le figure del *Milleret*) è un mucchio di cellule
 sferiche , e se non ha mai, le ife neonate che poi si trova
 si formano per la concrescenza delle cellule rotonde. ; un grappolo
 di queste cellule rot. ^{si trasforma} in asci ; per me un tal fungo è un
Saccaromyces.
 Je. S. div. Vth.