

Roder
11 29. 9 1919

Cassiniensis,

L'altro giorno
si parlava di
dubbi, ora,

eccomi promesso in un dubbio

lieto che sottopongo al tuo

giudizio, ben inteso che, a lei

ora sarà quale io spero, dove
portare il suo nome in qualsiasi
modo tu voglia cucinarlo.

52.3138

Sare a Roderis piperis, sin al 10 ottobre.

di Tunisi,

Pochi giorni in un esemplare
unico, splendido, (che conservo
parte in alcool e parte ho
fatto essicare) un fungo molto
curioso di cui ti ho riprodotto
il tipo generale nello schizzo.
È lungo 10 cent. largo 4 e
1/2 il cappello spesso 2 cent.
È tutto nero-bleu lucido, ^{come verniciato} porta
verso il bordo del cappello un
cerchio anulare castaneo - ma
presenta, questo carattere che per
me è importantissimo. e lo
avvicina agli Elasmomyces
all' Arcangelium Podaxon cc...
Ha i tubuli chiusi da una
membrana ^{rimosa} di colore ferrugineo
quindi l'imenio chiuso! L'imenio
si presenta come nell' Sauteria
graveoleus o nella Saut. Mordueformis
giovane. Insomma è un Botetus

in tutto - anche nel tipo delle spore;
ma ^{si fatto} è una specie di Lecotiacea,
che starebbe vicina a *Gyrophragmium*
o ad *Elasmomyces* - Io non ho
qui libri, tranne i *Fungi Hymeniales*
e il libro di *Bolland* e quello di *Kunze*
e mi accontento di disegnare e
descrivere e studiare - Nota che
quest'anno ^{per ripassare l'istita} non ho nemmeno voluto
portarmi il microscopio - di ^{ho} veduto
le spore con un piccolo Zeiss di
vecchio modello (in preparazione).
Il disegno mi pare risponde
bene in complesso al tipo - certo
ne può dare un'idea buona; (lo dico
senza immodestia).

La descrizione si potrebbe riassumere
così: (ma non è la descrizione, è la
discussione della mia posizione internazionale
che mi interessa - E' qualche cosa di
bello e (non vedendo nelle *Hymeniales*)
spererei di nuovo! La bellezza sua
e il suo interesse sarebbe degno di portare
il tuo nome. Da tre giorni vivo e ritorno

a investigare la località, ma senza rinviare
a trovare nuovi esemplari! ^{1° continuerò a constatare.} Ecco ora
la frase quale ho men già e che
publirò se sarà il caso di pubblicarla

Pileo carnosulo-compacto, firmiter
forniciforme - simuliter nigro-glauciscente,
loeve, quasi notente, marginis recessus
cercine anulo colore castaneo cincto, iterum
cercine anulo nigro circumdato. (?)

Hymenio pilei marginem protegentem (?)
Tabulis minutis flavo-fuscis (?) ectus
membrana fusca, rimosa, evidenter
obtectis et clausis. (?)

Piles solido, cylindrico, minute nigro-punctato
bari bulbro (?) - apice nigrescente (?). bari
albo - flavo - fusca.

Spuris ochraceis laevibus ovato-lanceolatis
(sarano misurate prio tardi - ad qui modo pride,
mi parubus 6.8 x 4.6. ?)

Caro laeviter grisea superne,

In prato humido - prope fontem glauco Elwh.

Ora. in manibus tuis commendo Secotiaceam
meam, avideque expecto Sententiam
Mycetorum Regis - Vale Am affert
O. matte