

Q 3

Cf. ———— 40

X

VENETIA  
1847

VENETO

1.8.47.

K  
Di Sop  
Sc. IV.

ATENE  
VENETIA

APR 18 1864

1

1

THEORICAE  
MEDICEORVM  
PLANETARVM

EX CAUSIS PHYSICIS DEDUCTAE

à

IO: ALPHONSO BORELLIO

In Messanensi pridem, nunc verò in Pisana Academia  
Mathematicarum scientiarum Professore.

*AD SERENISSIMUM*

FERDINANDVM II.

MAGNUM HETRVRIAE DVCEM.



FLORENTIAE, Ex Typographia S.M.D. MDCLXVI

*SVPERIORVM PERMISSV.*

THEORICAE  
MEDICINARUM  
PLANTARUM  
EX CAUSIS PHYSICIS DEDUCTAE


IO: ALPHONSO BORELLO

In Aulicis medicis, hunc vero in Pavia Academia  
Machanicorum scientiarum Professor.

MD. CXXV. II. M.

FERDINANDVM II.

MAGNUM HETRVRIAE DUCEM.



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

STANLEY AND JEAN STANLEY

SERENISSIMO

FERDINANDO II.

MAGNO HETR. DVCI

F.



Reclarè magnus ille vates, ac philoso-  
phus mihi espressisse videtur præcipu-  
am, præstantioremque humanarum  
felicitatum hisce carminibus.

*Sed nil suavius est, benè quàm munita tenere*

*Edita doctrina sapientum templa serena.*

Sacrum nempe ac diuinum templum sapientum  
doctrina diuinitati, ac æternitati erigitur, dicatur-  
que, in quo absque vlla procellarum, ac tempesta-  
tum perturbatione immotum suauissima serenitate,  
nec interrupta felicitate perseuerat. Non dissimile  
templum magnus ille Galileus preclara sua, & ad-  
mirabili doctrina edidit, & regali, ac glorioso no-  
mini Mediceo, non in hisce infimis, ac terrenis re-  
gionibus, sed in supremo ipso Cælo, ac Iouiali solio  
è fundamentis erexit, atque tuæ gloriosissimæ pro-  
sapie dicauit, gloriamque, & nomen amplissi-  
mum in illa serena, ac beata regione perpetuò du-  
raturum facnauit. Nec immeritò gloriaris sapien-

iv  
tissime Princeps, cum tantam felicitatem maiorum  
tuorum meritis adeptus fueris; At sicuti exiguam  
saltem aliquam gratiam merentur, qui egregia edi-  
ficia, ac templa iam fabrefacta quomodolibet ex-  
ornant, expoliunt, atque picturis externisque ali-  
quibus ornamentis complent; sic ego, qui huic Me-  
diceo templo ornatum aliquem, qualemcumque  
asserere conatus sum, non videor otio, qua tua be-  
nignitate fruor, abusus fuisse, nec malè de te meri-  
tus, quandoquidem, si mei conatus irriti non fue-  
runt, atque spes minime decepit, tabulam huic tem-  
plo non contemnendam delineasse mihi videor,  
non quidem in ipso templi vestibulo (absit iactan-  
tia) sed in intimo recessu, ac huiusmodi templi sa-  
crario: nosse enim, ac contemplari externam fa-  
ciem huius mundani theatri, nempe diuini artifi-  
cis fabricam in propatulo positam omnibus datum  
est, & nemo ab admirabili hoc spectaculo arcetur,  
ac remouetur; at nosse causas, ac rationes, quibus  
diuina opificia efformata sunt, ac exercentur, hoc  
inquam, Naturæ sacrarium est; Quod si mihi for-  
tuna arrisit, ut nimirum rationes, & causas phy-  
sicas motuum Mediceorum percepisse, & declarasse  
contigerit, non inani iactantia proferre poterò, me  
in templo sereno, in Iouiali sede à Galileo edito ta-  
bulam, & ornatum aliqualem contulisse; si verò  
spe



spe frustratus fuero, vt ad scopum defignatum non  
 peruenerim, scio magna quidem potius exoptari,  
 quam consequi ab humana imbecillitate posse.  
 Teque, Princeps optime, atque inclite, qualemcum-  
 que meum conatum æqui bonique consulturum  
 non dubito, qui optimè nosti, quam profundè la-  
 teat ipsa veritas, quam Dijs tantum Plato concessit,  
 nobis autem vmbra contrectare permisit; at qua-  
 lescumque illæ sint, non despero, quin clementissi-  
 mus, atque humanissimus Princeps in perpetuum  
 gratitudinis, & obsequij monumentum recipere  
 non dedignetur, cui perpetuam gloriam, ac felici-  
 tatem exopto, & voueo. Florentiæ 20. Octobris.

1665.

Sereniss. tuæ Celsitudinis

*Obsequentiss., & obstrictiss. Seruus*  
*Io: Alphonsus Borellus.*

AD




































**N**ON me latet amice Lector, editionem huius meae dissertationis de theoricis Medicearum ex causis physicis deductis suscipiendi ansam tibi allaturam, me aut ob maximas difficultates deterritum, laboriosum opus de motu animalium quod diu medior, & de quo spem fieri prope diem editurum intermisisse, aut omnino reliquisse; cum igitur videas promissa minime praestitisse, operae praetium duxi paucis mei instituti rationem reddere. Scito igitur aestate huius anni telescopium ingens, ac mirae perfectionis industrij, ac solertissimi Iosephi Capani Serenissimo Magno Duci Haetruriae missum fuisse, hoc admirabili instrumento primo Saturnum, postea Iouem obseruare cepimus, tunc iussu sua Celsitudinis ex tabulis Galilaei apherides Mediceorum calculis deduxi, ut quotidie vespertinis horis praedicto telescopio situs eorundem precogniti obseruarentur, interim quamplurima de motibus, positionibusque Mediceorum differebantur, unde accidit, ut me non aduertentem, & reluctantem, in eiusmodi speculationibus implicuerim, ac paulatim, ut fit, una speculatione reliquam sibi connexam trahente, factum est, ut hoc opusculum e manibus exciderit, quod cum ostendissem Serenissimo, Sapientissimoque Principi Leopoldo, eiusque acerrimo iudicio sub-


mississem, censuit ipse, pariterque alij amici, ut quam  
primum ederetur, indeque post meum à Florentia disces-  
sum amici excudendum curarunt. Erit igitur huiusmo-  
di opusculum non interruptio mei prioris instituti, sed  
veluti parenthesis quaedam meorum studiorum, nam de-  
nuò ad intermissum opus de motu animalium redij, ut  
aliquando finem attingat, non tamen hoc fiet ea celeri-  
tate, qua vellem, sed ea, quæ à gracili, & infirma cor-  
poris habitudine sperari potest, interim hoc opusculo frue-  
re, & boni consule, si quid dignum tua perspicacitate in  
eo inueneris, sin minus, humanae imbecillitatis memor esto.  
Tu interim valè.

17  
[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



























































A D B X  
C A  
M J N














## PROEMIUM.




Primus omnium in suo nuncio sydereo doctissimus Galileus divulgavit, quatuor planetas circa Iovem in orbem agi, quos ipse Medicea sydera nuncupavit, qui non secus, ac Luna Terram Iovis corpus circumveniunt, cuius respectu phases omnes, quas nobis Luna exhibet, representant, plenas scilicet, silentes, falcatas dico totas, gibbas, una cum suis omnibus mirandis eclipsium phenomenis, quae Luna ipsi contingunt respectu nostri: Ordinem quoque, ac magnitudinem orbium ipsorum planetarum eorumque revolutiones, ac revolutionum periodos adinvenit; verum licet sagacissimum illud ingenium agnovisset in praedictis parvis planetis, varias illas atque multiplices anomalias esse debere quae in alijs etiam errantibus syderibus observantur, brevi tamen suae vitae tempore eas invenire non potuit; At postquam ille fato concessit, quamvis multi in hoc insudarint, nunquam tamen ne minimam quidem notitiam acquirere potuerunt praeter illam quam nobis ipsemet tradidit Galileus. Cumque mihi tam sane ardua, ac perdifficilis, quam longa ac laboriosa praedictarum eccentricitatum, ac periodorum videatur inquisitio, contemplatricem partem sum aggressus, animadvertens, non paucos extitisse, qui cum multum circa eiusmodi materiam studij ac opera contulissent, nedum aliquid novi non indagarunt, verum quid ipsi etiam exquirere debuissent ignorave-

A

runt.



runt, quod à ianua profecto aberrare, est, uti egregie Aristoteles assererat; si ego itaque prædicta medicæ planetarum admiranda phænomena non reperi, non inutile tamen, ac pericundum futurum existimavi, si iter alijs ostenderem rectè circa hæc phænomena meditandi, patefaciendo scilicet quos habiturè sint motus, & habitudines satellites Iouis, dummodo circa ipsos sit eodem modo philosophandum, quo natura in alijs Stellis erraticis operatur; tales autem motus relationes, ac habitudines physicis necessitatibus arguendas duxi, à quibus tales effectus verosimiliter pendent; tandemque attendi modos varios, ac artificia quibus varietates prædictæ reperiantur.



*Mediceorum syderum motus similes esse debere motibus  
ceterorum planetarum. Cap. I.*



**A**D Mediceorum syderum theorias ritè inquirendas, & explicandas necessariò profectò esset exacta quædam, ac omnimoda præcognitio eorum motuum, & multiplicis anomalix, quorum equidem vestigatio, cum nobis tam breui tempore ab eorum prima cognitione tradita à Galileo minimè permiffa sit, circa ipsos motus vlterior contemplatio non dari videtur, omnis enim nostra cognitio scientifica, ac discursiua, à sensibus, atque experimentis oriri debet, sed licet id verum sit, ostendam nihilominus nobis dictorum mediceorum syderum dispositiones motionesque perquirere datum esse, paucis tantum illis obseruationibus præeuntibus, quæ nobis vsque adhuc innotuerunt, vice enim earum, quæ nobis desunt permultis satisque notis cæterorum planetarum obseruationibus vti possumus, cum quibus iouialia sydera in omnibus motuum generibus debent vniuersim conuenire; idque ex hoc primo principio, ac axiomatico deduci potest, naturam scilicet ad omnia sua munia obeunda simplicissima semper facillimaque media adhibere, tandemque eam varietate non delectari, diuersisque rationibus operandi, verùm constanti semper perseuerantia iisdem organis vti, ac instrumentis eademque methodo, cum effectus inter se similes operatur. Huius rei innumera propè dixerim exempla suppeterent, verùm animalium plantarumque structuram actionesque perpendere satis erit, in quibus easdem naturales, vitales, ac animasticas operationes producit, eadem prorsus organa, ac motus adhibendo, proindeque nunquam videmus naturam animantibus eorumque partibus motum ex vno in alium locum tribuere absque illis funiculis tenuissimis, quos nos musculorum fibras vocamus;

4  
quæ quidem, dum contrahuntur, secum annexam trahunt partem, ac ita fit motus, nec vlla vnquam pars motu prædita est, cui desint prædictæ fibræ. Eodem pacto videmus nutritionem fieri mediantibus innumeris canaliculis tenuissimis, cuiusmodi sunt venæ, arteriæ, vasaque lactea & lymphatica, plantarumque radices. Videmus vitæ conseruationem in animalibus ab eo motu pendere principio, quod cordi inest, neque vllum omnino animal reperietur, cordis, hepatis, aut lienis expertis, vel cerebri, aliusq; principis visceris, & licet circa situm figuram, ac magnitudinem, prædictorum viscerum, quædam plerumque variatio contingat, nunquam tamen possibile est vllum animal reperire prædictis membris præcipuisq; organis destitutum, quod sanè ostendit euidentissimè, naturam, neque nouisse, neque posse animantium functiones edere sine prædictis instrumentis, ac sine communissimis illis rationibus, quibus instrumenta ipsa operantur. Hinc deducitur, quod si nobis ex remotissimo quodam climate animal aliquod duceretur antea à nostris oculis, nunquam visum, possemus tamen nedum verosimiliter, sed certò quoque prædicere, ipsum cor perpetuò palpitans habiturum, musculos motui inserviencies, hepar, cerebrum, aliasque partes.

Cum igitur, & Hugeniæ Luna circa Saturnum, & medicea sydera circa Iouem ab occidente in orientem voluantur, sicut & Luna nostra circa Terram, & planetæ primarij circa Solem ab Occidēte pariter in Orientem voluuntur, & medicea sydera tanto breviori tempore suam reuolutionem absoluant, quò viciniora sunt Ioui, sicut planetæ primarij citius perficiunt suam, quo Soli proximiores, & indeterminatim omnes tam primarij, quam secundarij planetæ circa insignes mundi globos gerantur, Solem videlicet Saturnum Iouem, ac Terram, statuendum profectò videtur, talium errantium syderum motus, iuxta vniuersalem, cōmunemq; omnibus regulā absolui, quando certum ratumque est, vt ostendimus, non varijs naturā organis, sed iisdem similes effectus functionesq; perficere, ac operari. Id autem necessarium

tantum videtur quò ad generalia quædam spectat symptoma-  
ta, non verò quò ad peculiare mensuras huiusmodi motuū,  
atque rationum operãdi; verum hæc illis conuenire sufficiat:  
Quod tunc maiori euidencia confirmabimus, cum ex suis  
physicis causis in dictis paruis planetis huiusmodi agēdi nor-  
mas, ac instrumenta necessariò reperiri, deducemus; interim  
nobis satis superque sit, ex ceterorum planetarum analogijs  
iplos collegisse, inter quos, & medicea sydera esse debet  
nil discriminis.

*De theorijs planetarum vulgarum, ac primum ipsius Lunæ.*

*Cap. I I.*

**T**Am ratum perspectumque est, ex lucidis corporibus per  
ætherem diffusis quædam splendida esse, Solem videli-  
cet cæteraque inertantia sydera, quædam autem opaca, ac  
lumen ab ipsis mutuantia, quæ communiter planetæ appel-  
lantur; hi autem sunt in duplici differentia, alij enim pri-  
marij dicuntur, alij secundarij; primarij appellantur illi,  
qui Solem, secundarij, qui primarium planetam immedia-  
tè circumueunt, cuius virtute perductos circa ipsum Solem  
torqueri necesse sit: Huiusmodi sunt quatuor Mediceæ  
Stellæ, quæ circa Iouis globum immediatè feruntur, eius-  
demque generis est Luna Saturni, quæ omnes vnà cum pri-  
marijs planetis quibus circumuoluuntur, circa Solem per  
Zodiacum agitantur. Præterea manifestum est, quælibet  
siuè primarium, siuè secundarium planetam aliquem in-  
signem mundi globum quasi virtutis fontem circumdare,  
qui ita eos stringit, atque conglutinat, vt ab ipso nullo pa-  
cto abstrahi possint, sed ipsum quocumque contendentem  
perpetuis continuisq; orbibus cogantur consequi; videmus  
enim Saturnum, Iouem, Martem, Venerem, atq; Mercu-  
rium Solem ipsum, medicea sydera Iouem, Hugenianumq;  
sydus Saturnum circumire, non secus, ac circa telluris glo-  
bum Luna ipsa reuoluitur.

Omibus præterea planetis commune per Zodiacum iter

con.

conuenit ab Occasu ad Ortum, in quo, si non circulariter, saltem motu illi proximo gradiuntur; dicti tamen orbis non Solem, vel aliquem globum pro centro habent, sed punctum paruum ab ipsis distantem; ideoque eorum circuitus appellatur eccentrici. Rursus omnes planetæ tres habent periodos, quorum primâ dicitur restitutionis in eodem situ vniuersi, seu mundani spatij, quæ quidem respectu fixorum syderum considerari solet; & hæc omnes perficiuntur circa Zonam quamdam à nobis Zodiacum, siue signorum circulum nuncupatam, alia verò anomalix, quæ à suprema abside, hoc est à puncto orbis planetæ à Sole, vel à Terra remotissimo initium sumit, donec ad eundem locum regrediatur. Hæc autem anomalix periodus in omnibus vniuersim tardior est, quam motus periodicus restitutionis sub ipsis syderibus inerrantibus, ex quo deducitur, dictam absidis lineam sub ipsis fixis non stabilem permanere, sed cōtinuo lenitissimoq; motu ab Occidente ad Orientem deferri: alia etiã latitudinis periodus inuenitur, qua mediante planetæ nunc ad Boream, nunc ad Meridiem ab Ecliptica, hoc est ab ipsius Solis itinere declinant: hanc periodum breuiori tempore absolui, quam restitutionem sub eadem fixa stella perspicuum est, vnde indicatur planetæ nodos fixos non esse, sed citra cæterorum syderum motus ordinem continuò retrocedere; orbis autem planetarij Eclipticæque inclinatio fixa supponitur, & immutabilis.

Et licet meum non sit institutum, (speciatim de Lunæ motibus pertractate, cum id iam abundè præstiterint maiores nostri, tamen, tum ob eorum similitudinem cum ioualium syderum reuolutionibus, tum quia, nisi eorum notitia præcederet, nunquam exactè illi percipi possent, idcirco necessarium existimaui breuiter in memoriam reuocare multitudinem, ac varietatem motuum ipsius Lunæ: Intelligatur igitur T esse globum ipsius Terræ, quæ iam supponitur nedum in plano Eclipticæ constituta, in quo etiam Sol collocatur, verùm etiam in centro ipsius Zodiaci, circuloque signorum, describatur autem circa Terram circulus ABP D eccentricus ipsi Telluri, cuius centrū C, huius verò eccentrici

ci planum ad Eclipticam ita inclinetur, vt fecer ipsam in  
 linea recta B T D, pars autem B A D tendat ad Boream, &  
 super planum subiectum eleuetur, contra autem pars B P D,  
 ad Austrum vergat, & sub eodem plano subiecto deprimi  
 intelligatur, recta igitur linea A P, quæ transit per duo cen-  
 tra Terræ scilicet, & orbitæ Lunæ C, linea absidum appel-  
 latur, punctum A Eccentrici Apogeuum, P vero perigeuum,  
 puncta B, & D, communes ipsius Eccentrici, & Eclipticæ  
 inter sectiones vocantur, Nodi, D ascendens ad Polum Arcti-  
 cum B ad Antarcticum descendens, tandemque puncta A,  
 & P Limites nuncupantur, situs scilicet, vbi latitudo maxima  
 est, quæ in Luna quinque gradus non excedit.

Vt autem de motibus differamus, sciendum est bipartitò  
 posse distribui, alij enim sunt Lunæ proprii in suo eccentri-  
 co, alij autem à solari motu pendentes; quod spectat ad mo-  
 tus proprios, primo loco necesse est, vt motum illum con-  
 sideremus, qui absoluitur respectu situs ipsius vniuersi, hic  
 autem est Lunæ transitus à puncto A sub determinata ali-  
 qua fixa stella, v. g. sub Canceri principio secundum ordi-  
 nem signorum ab Occasu ad Ortum, donec integrum ab-  
 soluat circulum A B P D A, redeatque ad idem punctum à  
 quo discescit, hoc est ad initium ipsius Canceri; hic autem  
 Lunæ motus dicitur motus restitutionis, ac intra dies 27.  
 h. 7. 43. 5. absoluitur; sed quoniam Apogeuum A non im-  
 mobiliter perseuerat sub eodem puncto signiferi, sed succes-  
 siuè lento motu progreditur, ita vt vno die nihil amplius  
 quam m. 6. absoluat. hinc est quod post integrâ Lunæ restitui-  
 tionem sub eodem puncto signiferi, ipsa Luna non adhuc  
 regreditur ad Apogeuum Eccentrici à quo discescit, cum in-  
 terim Apogeuum ipsum ex A, in I sit progressum tres gradus,  
 ideoque illud nisi post quinque integras formè alias horas  
 nequit attingere. Hæc autem Lunæ circumuolutio appel-  
 latur cursus anomalix, siuè inæqualitatis, ac intra dies 27.  
 h. 13. 18. 35. absoluitur, ac tali nomine nuncupatur, quia  
 eius motus in Apogeo A, tardissimus apparet, contra verò  
 velocissimus in Perigeo P, ac in intermedijs locis P, & B  
 me.

mediocri. Anomaliæ ergo circuitus quadrifariam diuidi potest; ab A etenim ad B tardus erit, sed crescens usque ad mediocritatem versus B, motus à B ad P pariter à mediocritate increcens, contra verò à P in D velox imminutus, tandemque à D, ad A mediocri imminutus.

Adest etiam tertius circuitus latitudinis, qui à Nodo ascendente D initium sumit progrediente Luna per A B P quousque ad eundem Nodum reuertatur, à quo discessit, hic autem latitudinis motus velocior est motu periodico respectu Zodiaci longeque concitator circuitu. Anomaliæ, ex quo iam patet Nodum D minimè fixum, & immobilem permanere, verum retrogrado eieri cursu contra ordinem signorum ab Ortum scilicet ad Occasum; tardior autem est talis motio, quàm motus Apogei scilicet m. 3 singulis diebus, quod sane ex hoc satis superque constat, quia Lunam in quouis signiferi puncto, nunc latitudinem habere Septentrionalem animaduertimus, nunc autem Meridionalem, ac tandem quandoque nullam, sed sub eadem Ecliptica reperiri; absoluitur ergo circuitus latitudinis à Nodo D ad eundem D spatio dierum 27. h. 5. 36. isti autem sunt motus Lunæ proprii, & sui orbis eccentrici.

Iam superest ut motus, & apparentias à Sole in eadem Luna productas consideremus, prout ipse in diuersis Eclipticæ locis reperitur.

Rursum ergo concipiatur Luna in A, dum Sol versatur in puncto S, cum Terra T inter ambos planetas media est, tunc scilicet, quando oppositio, seu plenilunium celebratur, integramque suam periodum Luna absoluat labens per totum circuitum A B D A, hoc enim tempore quia Sol in puncto eodem stabilis non apparet, sed in L totum ferè Zodiaci signum absoluisse conspicitur, nondum Luna locum Soli oppositum E erit consequuta, sed deficiet toto arcu A E, qua propter, ut ad secundam oppositionem, seu plenilunium perueniat, necesse est, ut pereurat arcum A E, proindeque ab vno, ad alterum plenilunium intercipiuntur dies 29. h. 12. 44. 3. hic autem cursus mensuraus, vel synodicus appellatur,



Ex diuersa Solis constitutione duæ, aliæ anomalix, seu inæqualitates, in Lunæ itinere oriuntur, quæ quidem ita contingunt: mense illo, quo Synodi, hoc est nouilunia, & plenilunia proximè fiunt in Absidum linea A P, tunc Lunæ cursui præter supradictam inæqualitatem alia additur, ob quam Luna ipsa tardiori cursu per A B, quam conueniat anomalix, contra verò per B P velociori progreditur, ideoq; circa finem semicirculi, atque in sequenti nouilunio dictæ inæqualitates ita compensantur, vt semiperiodus eodem tempore absoluatür, ac prius, proindeque prostapheresis angulus, scilicet C B T hoc mense augetur grad. 2. m. 30. euaditq; grad. 7. m. 30. Idipsum accidit inter nouilunium, & plenilunium, sed tamen inuerso ordine.

Deinde intelligatur Sol in E. itaut linea Absidum Eccentrici A P. cum Synodum linea B T Q. rectos angulos constituat, videlicet dato, quod nouilunia, & plenilunia celebrentur in B, & D, Lunares verò quadraturæ in Apogeo, & Eccentrici Perigeo A, & P, tunc toto illo mense propria Lunæ anomalia nullam prorsus alterationem patietur, & nihil augebitur prostapheresis propria, scilicet angulus C B T, qui quinque gradus non excedit.

Concipiatur denique solarem lineam L T, nimirum nouilunij, ac plenilunij incidere inter lineam Absidis Eccentrici A P, & distantias medias, sit videlicet Luna silens in O, plena autem in E, tunc à plenilunio E ad O obseruatur secunda mensura anomalia, minor quidem maxima illa, de qua egimus in principio, quæ eadem tamen regula distribuitur hoc est ab Apogeo menstruo E (quod tamen semper Apogeo Eccentrici propinquissimum est) noua synodica retardatione Luna afficitur vsq; ad quadraturam, & ex hac vsque ad Perigeum menstrum O noua celeritate lunaris motus augetur. Hic autem notandum est, quod, licet aliqua pars Eccentrici, cui naturaliter conuenit retardatio, incidat in aliqua mensuræ anomalix parte, cui motionis celeritas competit, nihilominus motus ille, qui retardari debebat, tantæ velocitatis recipit incrementum, quantum

B

noua

noua requirit anomaliam, & sic in ceteris omnibus locis; Quoniam igitur huiusmodi synodica anomaliam non stabilis perseverat, sed diuersis anni temporibus alteratur, ita ut nunc maxima, modo nulla, quandoque verò mediocris sit, ideo synodica temporaria fuit appellata; & hæc satis dicta sint quoad synodicam temporariam anomaliam motus longitudinis ipsius Lunæ.

Adest etiam altera synodica latitudinis inæqualitas, quæ quidem ita contingit: mense illo, quo linea Synodum, nouilunij scilicet, ac plenilunij cadit in limites A, & P nimirum in loca illa, in quibus lunaris Orbis ab Eclipticæ plano maximè distat, tunc toto illo mense nullo pacto latitudines variantur, sed manent in eo statu, qui conuenit proprio cursui lunaris Orbis, cuius maxima latitudo quinque gradus non excedit; quando verò solaris linea, hoc est plenilunia, & nouilunia incidunt in Nodis B, & D, tunc quidem in toto illo mense latitudines maius solito recipiunt incrementum, Eccentrici videlicet inclinatio super Eclipticæ planum, ita magis dilatatur, atque extollitur, ut cum prius quinque tantum graduum spatium occuparet, nunc quinque gradus, & m. 18. comprehendat; quando autem prædicta linea in dictorum spatiorum medio incidit, inter Nodos scilicet, Limitesque, tunc utrorumque particeps est, & ita lunares latitudines variantur; id autem nou fit in Copulis, hoc est in plenilunijs, & nouilunijs, verum per reliquum ambitum, obseruaturque præcipuè in Quadraturis, ac Octangulis; ex quo colligitur, quod ob huiusmodi synodicam temporaneam anomaliam, nedum lunaris orbitæ planum librari debet, dum nunc magis, nunc minus se se admouet, amouetque, verum etiam necesse est, ut eius Nodi B, & D, quodammodo vacillent, ac motu ferantur irregulari.

Nunc ad vltimam lunarem anomaliam gradum faciamus cuius Tycho fuit auctor, quæ quidem à nonnullis synodica perpetua nuncupatur, hæc autem tali ordine procedit: quolibet tempore in lunaris Orbis semicirculo posito  
ad

ad partes plenilunii inter vnam, & alteram quadraturam Luna tertiam quamdam motus irregularitatem adipiscitur, quæ in prima quadratura ab omnimoda priuatione incipiens, vsque ad plenilunium successiuè acceleratur, & ex hoc deinceps se se retardans, tandem extinguitur in secunda quadratura; hæc autem anomalia præcipuè obseruatur in octangulis, nimirum 45. gradibus à plenilunijs, & nouilunijs, atque huiusmodi peruenit prostaphæresis vsque ad m. 40. se. 30.; in his verò locis alteratur pariter lunaris latitudo. Quapropter, vt huiusmodi varietati Tycho satisfaceret, librationem quamdam plani lunaris Orbis introduxit, eiusque polos moueri statuit per cuiusdam parui circuli peripheriam, qua polorum circumlacione lunares Nodi vltiò citroque dilatantur.

Quod autem dictum est de semicirculo versus plenilunium, de opposito queque debet intelligi, ita vt à secunda quadratura ad nouilunium continuè Lunæ motus celeritas increascat; contra verò à nouilunio, vsque ad primam quadraturam paulatim decreascat, quousque penitùs extinguitur, pariterque producit irregularitas in motu lunaris latitudinis, ac illius Nodorum eo prorsus modo, quo fit in superiori semicirculo, vt iam superiùs insinuauimus.

Isti autem sunt motus omnes, quibus, Lunam ipsam moueri, huc vsque astronomi obseruarunt. Qui motus, licet primo quidem aspectu incredibiles videantur, non tamen in dubium debent vilo pacto reuocari, nisi sensus ipsos, atque experientias negare velimus, quæ nobis proculdubio ostendunt, atque suadent, ita naturam operari, quamuis talium effectuum causæ, vsque adhuc non innotescant.

*De Theorijs Mediceorum planetarum.*

*Cap. III.*

**Q**uoniam, quemadmodum dictum est, Medicea sydera immediate circa Iouis globum reuoluuntur, diuersis quidem ab eo distantijs, sed semper secundum signo-

rum ordinem, ab Occidente, scilicet ad Orientem in proprijs orbibus, aut Epicyclis, simulque cum Iouis globo Epicycli ipsi circa Solem per Zodiacum aguntur duodecim circiter annorum spatio, hinc tres eorundem Mediceorum planetarum theoriæ oriuntur, quarum prima illa est, quæ contingit circa globum ipsius Iouis, & quam, si quis in eodem Iouiali globo versaretur, obseruaret, videretque inæqualitates omnes prædictorum planetarum, tam circa latitudines, quam longitudines, prætereaque phasés illis simillimas, quas nobis in Terra degentibus Luna exhibet, plenas scilicet, silentes, &c.

Secunda verò theoria illa est, quæ varias declarat apparentias, quas Medicea sydera exhiberent respectu Solis, hoc est, si aspicientium oculi degerent in ipso Sole.

Verùm, quia nos iouiales satellites conspicimus, eorumque motus non ex Ioue quidem, neque ex ipso solari globo, sed tantùm ex Terræ huius nostræ superficie, à qua simul cum suo systemate Iuppiter, modò magis, modò minùs remouetur, cum interdum in mediocri ab ea distantia sit constitutus, ac modò ex vna, modò ex altera parte ipsam intueatur, hinc est, quod præter ante dictas anomalias debent iouiales planetæ circa eorum motus has quoque vicissitudines, ac irregularitates habere, de quibus omnibus theorijs tripartitò distributis inferiùs agendum est.

*De iouialium syderum Theorijs, quæ ex Ipso Iouis corpore obseruari possent. Cap. IV.*

**E**X theorijs Mediceorum planetarum, quas admirabilis Galileus calamo commendauit, constat, Primi Iouis satellitis semidiametrum esse quinque semidiametros corporis ipsius Iouis, & duas circiter tertias partes, Secundum verò octo radios Iouiales, & duas proximè tertias partes occupare, Tertium quatuordecim, & Quartum tandem 24. & duas tertias. Nunc igitur ad maiorem perspicuitatem

*Fig. 2. intelligatur circulus A B P D, cuius centrum C, ac in eius peri-*

peripheria vnum ex Mediceis syderibus sub Zodiaco circumagatur: deinde verò sit Iouis globus in plano prædicti orbis distans tamen à centro C; Quoniam igitur supponimus oculum in ipso Ioue, qui in æthere transpicuo, & inuisibili constitutus immense distat à syderibus inerrantibus sit, vt se verè non quiescere, sed circa Solem torqueri minime aduertat, idcirco existimat, Iouem ipsum in quo versatur, esse centrum vniuersi; cum ergo planetam quemlibet Medicum sub Zodiaco à D in A B P ab Occasu, videlicet ad Ortum perspiciat circumagi, primo loco tempus agnoscit restitutionis illius planetæ, quo scilicet tempore vnaquæque Medicea stella ad fixum idem sydus regreditur, à quo discessit; hoc autem absoluitur ferè à Primo iouiali satellite spatio dierum naturalium 1. h. 18. m. 27.; à Secundo verò dierum 3. h. 13. m. 13., à Tertio dierum 7. h. 3. m. 43., ac denique à Quarto, & vltimo dierum 16. h. 14. m. 27.

In hoc autem periodico cursu animaduertendum est, quod licet corpus Iouis in proprio orbe circa Solem feratur, tamen, vt supra diximus, ob maximum inerrantium syderum intervallum semper prædictum corpus Iouis in vniuersi centro collocatum censetur, proindeque vt Medicus planeta positus in A post integram reuolutionem redeat infra eandem fixam stellam, satis est, diametrum orbis dicti Planetæ A P per totum cursum Iouis semper sibi ipsi equidistare, vt inferius declarabimus.

Pro anomalie cursus intelligentia vocabimus maximam distantiam  $\Sigma$  A summam Absidem, vel Apolouiam, punctum A Apolouium  $\Sigma$  P infimam Absidem, punctum P Perilouium mediaque tandem B, & D inter summam, & infimam Absidem medias longitudes. Quoniam verò Absidis linea A P non semper stabilis, hoc est sibi ipsi parallela conseruatur, sed lentissimo cursu ab Occasu ad Ortum, ex A ad B progreditur, hinc est, quod ab Eccentrici centro C longo temporis intervallo, circa corpus Iouis circellus quidam describitur, iouialis autem planetæ cursus à suo Apolouio A computatus, donec ad eundem Apolo-

uium regrediatur, dicitur cursus anomalix, seu inæqualitatis ad distinctionem periodici cursus quoad stellas fixas, vel mundani situs, vocatur quoque cursus inæqualitatis, quia motus Medicei ab Apolouio A. vsque ad B mediam longitudinem est tardus increlcens, si non respectu centri C circa quod uniformi, æquabilique motu reuoluitur, saltem respectu oculi in Ioue positi: a B ad Perilouium P est mediocris crelcens, inde vsque ad D velox diminutus, & tandem à D ad A est mediocris diminutus. Quoniam igitur, vt ante insinuauimus Apolouium A reuera fixum non manet, hoc est linea Absidis AP non semper sibi ipsi æquidistat, nec semper easdem fixas intuetur, cum paululum in anteriora progrediatur secundum signorum ordinem, sequitur, quod, postquam sydus integrum periodicum cursum absoluit, ac se se sub eadem fixa stella restituit, non adhuc totius anomalix circuitus peractus est, verum requiritur paruum illud temporis spatium, quo scilicet sydus ipsum Apolouium assequitur, quod iam in anteriora progressum est; hæc autem potissima ratio est, ob quam circuitus anomalix tardior euadit periodica circulatione.

Adest etiam tertia latitudinis periodus, quæ quidẽ eorumdẽ Mediceorum syderum propria est, vt autẽ hæc intelligatur, oportet, vt prius stabiliatur Eccentrici inclinatio, eius Nodi progressus, ac quibus hæc nominibus sint appellanda.

Primum igitur cum planum orbis Iouis immobiliter ad Eclipticam inclinetur, ad illud scilicet planum, qui per centra Solis, nostrique Telluris globi pertransit, cumque illius inclinatio mensuretur ab angulo gr. 1 in 9. qui boreali Limite respicit signum ♄ gr. 7. respectu tamen Mediceorum planetarum ipsemet orbis Iouis fungetur officio Eclipticæ, ad quem orbem Iouis comparati eorum præcipui orbes A B P D magis, minus ve inclinantur. Supponamus igitur orbem vnus Mediceæ Stellæ A B P D Eclipticæ, hoc est Iouis orbitæ planum secare in recta B D quæ transeat per centrum globi iouialis, pars autem superior B A D, ita vergat ad Boream, vt super planum subiectum G B H eleuetur, con-

trāvetò pars B P D ad Austrum tendat hoc est sub eodem  
 subiecto plano deprimatur; tunc igitur Nodum, seu inter-  
 sectionem D appellabimus ascendentem, qui sanè Nodus  
 Lunæ Q̄ respondebit, punctum A erit borealis Limes, B  
 Nodus descendens similis Lunæ S̄ ac tandem P. erit austra-  
 lis Limes.

Concipiatur deinde Nodus D lentissimo, retrogradoque  
 moru cieri contra ordinem signorum respectù syderum in-  
 errantium, ex quo sequitur, quod, progrediente sydere  
 Mediceo à Nodo D per A B P quousque rursus reuertatur  
 in D, eius cursus breviori absoluetur tempore, quàm cur-  
 sus periodicus, longè que breviori quàm cursus anomaliæ;  
 ideoque periodus hæc non solum Lunæ, verùm etiam ceter-  
 is omnibus planetis assimilabitur; hæc autem tres periodi  
 ad Medicea sydera propriè spectant, hoc est ab eorum mo-  
 tibus in proprio Eccentrico pendent simul cum varietati-  
 bus ab Apogeo, permutato que Nodo productis.

Ad sunt quoque duæ aliæ inæqualitates, quæ ex diuerso  
 Eccentrici situ respectù Solis oriuntur, quas, vt clarè expli-  
 cemus, necesse est, vt animo concipiamus, Iouem cum to-  
 to eius systemate à prima situatione in I ad secundam con-  
 stitutionem in L gradum facere, & ob maiorem facilita-  
 tem, minimum illum Apolouij motum circa Iouem dissi-  
 mulare possumus, vt nimirum Absidum linea A P semper  
 sibi ipsi æquidistet; in prima ergo constitutione solaris linea  
 I S transibit per puncta P, & A, proindeque ab oculo in  
 Ioue posito conspicietur Plenimediceum stellæ propè A,  
 ipsa scilicet videbitur prorsus illuminata, sed iuxta pun-  
 ctum P, fiet Nouimediceum, nimirum oculus in Ioue  
 partem planetulæ illuminatam solique obuersam non vi-  
 debit, sed contra positam, & obscuram, cum verò stella  
 à coniunctione cum Sole in P versus D promouetur, ap-  
 parebit falcata, donec in D dicotoma, hoc est dimidium sui  
 disci illustrati ostendat, à D verò vsque ad A pars luminosa  
 obscuram excedet, ideòque gibba conspicietur: Hoc idem  
 etiam, inuerso tamen ordine, contingit per alterum semicir-  
 culum

Fig. 3.

enlum A P D; Quoties demum Mediceis in P interiectis prospectus Solis impeditur observatores ex Ioue sæpè Solem eclipsatum viderent; contra verò quoties in A prædicta iouialia sydera immerguntur in cono umbræ Iouis, toties solari lumine priuarentur. Circa autem secundam constitutionem in L: cum absidum linea A P propemodum sit parallela solari lineæ I S, hinc est quod solaris linea S H L non amplius transibit per A P, sed cum ipsa angulum S L P constituet, ideòque secabit epicyclum planetulæ in punctis G H; qua propter iouialium syderum Pleni-medicea non amplius in A celebrabuntur, vt in prima constitutione, sed in G, Nouimedicea verò, non vti priùs in P, sed in H. Synodica ergo periodus ab vno scilicet Plenimediceo ad alterum non periodico motui, siue anomaliaco æqualis erit, sed longiori tempore absoluetur, quoniam, postquam Medicea stella suum periodicum cursum absoluit, hoc est sub eadem fixa reuersa est, vt secundum Plenimediceum assequatur, tantum moræ interponendum est, quantum temporis requiritur ad absoluendum arcum A G, quantum scilicet synodicum punctum, siue Aphelium G virtute motus Iouis progressum esse respicitur; huiusmodi autem synodica periodus non discrepat à tempore menstruo nostræ Lunæ, quod in paruis iouialibus planetis multò parùm anticipat; Iouis enim Aphelium per integrum annum tantummodò signum vnum Zodiaci progreditur.

Hic verò notandum est, periodicas iouialium satellitum tabulas, nobis à Galileo traditas, synodicas esse, congruentes mensuris motibus nostræ Lunæ, non autem periodicas prædictorum Iouialium syderum; quoniam verò synodicæ periodi excessus supra periodicum æqualis est motui Iouis in Zodiaco, igitur nos ex illis hos cognoscere possumus, statuentes, motum synodicum Primi Medcei compleri diebus naturalibus 1. h. 18. m. 28. sec. 30. Secundi D. 3. h. 12. m. 17. Tertij D. 7. h. 3. m. 59. Quarti D. 16. h. 16. ita vt motus periodicus Primi sit D. 1. h. 18. m. 27. Secundi D. 3. h. 13. m. 13. Tertij D. 7. h. 3. m. 42. Quarti tandem, & vltimi D. 16. h. 14. m. 27.



*De synodicis inaequalitatibus longitudinis Mediceorum.*  
*Cap. V.*

**M**otum nunc synodicum duæ aliæ consequuntur inæ-  
 qualitates tam quoad longitudinem, quam quoad  
 latitudinem, quæ pariter synodicæ nuncupantur; alia tem-  
 poraria est, alia perpetua. Dissceremus igitur primo loco de  
 temporaria longitudinis synodica inæqualitate, quæ hac ra-  
 tione procedit: eo tempore, quo Synodi, hoc est Pleni Me-  
 dicea, ac Noui Medicea fiunt in linea Absidum A P, vt in  
 constitutionibus I, & R, tunc præter propriam inæqualita-  
 tem superiùs expositam Mediceorum syderum cursui re-  
 cens additur inæqualitas; ita vt per arcum A B ab Apolo-  
 uio Eccentrici Aphelioque computato, qui in I communis  
 est, in R verò contraponitur, prædicta stella longè tardiùs  
 circumuoluatur, quam requirat eiusdem syderis cursus  
 propriæ anomalix, per arcum verò in B P adeo progreditur  
 concitator, vt propè semicirculi finem in Noui Mediceo  
 constitutionis I in Pleni Mediceo verò in R inæqualitates  
 prædictæ omnimodè compensentur, ita vt auctæ velocita-  
 tes, & tarditates absoluantur eodem tempore, quo inalte-  
 rata synodica periodus completur; & demum prostaphere-  
 sis angulo, videlicet C B I, vel C B R illud superaddetur,  
 quod noua importat synodica inæqualitas. Idem autem  
 contingit, dum stella transit à puncto P per D in A, sed or-  
 dine tamen priori contrario.

Intelligatur iam Iuppiter simul cum suo systemate in N,  
 ita vt solaris linea S N transeat per mediæ longitudinis pun-  
 cta B, & D, in quibus fient Plenimedicea, & Nouimedi-  
 cea, contingant autem quadraturæ in Apolouio A, & in  
 Perilouio P eiusdem Eccentrici; iam in tali synodico pro-  
 gressu nulla aderit alteratio propriæ anomalix eiusmodi Ec-  
 centrici, neque vel minimum augebitur prostaphæresis aut  
 imminuetur, sed manebit absque vlla alteratione eo prorsus  
 modo, ac si prædicta synodica periodus non adesset.

G

Tian.

Transeat denique solaris linea M S L inter lineam Absidum, & medias Eccentrici longitudes, ut in constitutionibus L, & M euenire solet, tunc Plenimediceum continget in G, Nouimediceum in H in constitutione L, contra in M, semper autem Aphelium anomalie synodicae erit in puncto G, quod Apollonio A, propinquius est, ex indeque secunda resultat synodica anomalia minor praedicta maxima in constitutione I exposita, & debitis tamen regulis distributa ut scilicet ab Aphelio G synodica incipiat retardatio, usque ad mediam longitudinem, deinde vero fiat incrementum velocitatis usque ad Perihelium A, quod in hoc situ L erit Nouimediceum, in M vero Plenimediceum. Hic autem animaduertendum est, quod in portione prima arcus B P in situ L velox motus competeret ob Eccentricum, attamen retardatur propter synodicam inaequalitatem, prosthaphæresis vero Eccentrici A P in H addenda esset medio stellæ motui, at respectu synodici cursus subtrahi debet à medio cursu, eodemque prorsus modo in alijs casibus. Quoniam igitur in vno quolibet Mediceorum Eccentrici dispositio respectu Solis successiue immutatur, primo ob motum lineæ Absidis A P, quæ verè non semper sibi æquidistat, licet hoc tardissimo fiat motu, deinde vero ob cursum præcipue Iouis, cum modo vna, modo alia pars Eccentrici dirigatur ad Solem S ita ut duodecim annorum spatio, quo Iuppiter circa Solem agitur, necesse sit, ut omnes istæ configurationes absoluantur, proindeque aliquis annus aderit, quo cum Aphelium propè dixerim perpetuò cohereat cum Apollonio alicuius Mediceæ syderis, semper prosthaphæresis maior solito apparebit, eoque anno, quo Aphelium incidit in medias Eccentrici longitudes, prosthaphæreses erunt simplices, & inalteratæ. Quoniam igitur talis noua synodica anomalia fit statutis quibusdam temporibus, non verò semper, ideoque temporaria poterit nuncupari.

Adest etiam tertia varietatis anomalia, quæ quidem semper perseuerat, ideoque perpetua poterit nuncupari; hæc autem

autem huiusmodi est: in quolibet synodico cursu in Medicei planetę orbis semicirculo posito versùs Aphelium synodicum siue Plenimediceum ab vna ad alteram quadraturam Medicei syderis cursus tertia quadam motus varietate alteratur, quę ab vna ad aliam quadraturam perdurat, stellę que cursum in Plenimediceo reddit velociorem, id autem magis perspicuum est in Octangulis, scilicet gradib. 45. ante, & post Plenimedicea, & Nouimedicea.

*De Mediceorum synodica latitudinis inequalitate*

*Cap. V I.*

**S**ynodica tandem latitudinis anomalia reperitur, qua mediante periodicus prædictę latitudinis cursus nonnullam patitur alterationem; in illis enim synodicis reuolutionibus, in quibus solaris linea, hoc est Plenimedicea, & Nouimedicea incidunt in limites A, & P in illa scilicet loca, vbi Medicei orbis ab iouialis Eclipticę plano S E B F D maximè declinant, tunc enim tota illa periodo nullo pacto variantur latitudines, sed remanent in illo statu, quem requirit proprius cursus eiusdem Mediceis; quando autem solaris linea, Plenimedicea scilicet, ac Nouimedicea cadunt in Nodis B, & D tunc tota illa reuolutione solito magis latitudines augentur nimirum inclinatio Eccentrici A B P D, super Iouialem Eclipticam S B E D F magis dilatatur; cum tandem Plenimediceorum, Nouimediceorumque linea cadit inter Nodos, Limitesque, tunc ab vique participatur, id eoque dictorum planetarum consuetę latitudines alteratione quadam afficiuntur, quod nunquam Nouimediceis, Plenimediceisque accidit, sed Quadraturis, & Octangulis, proindeque virtute huiusmodi synodicę perpetuę, temporaneęque anomalię planum orbis dictę stellę A B P D videretur nunc magis, nunc minus librari, se se admouendo, remouendoque ab iouialis Eclipticę plano, eiusque nodi B, & D turbare, suumque motum retrogradum consuetum irregularum efficere videntur.

Hi sunt motus omnes, quibus iouialia sydera prædita sunt, quique ab oculo in Ioue posito obseruari deberent, & illic mortales degere fingentur.

*De Theorijs Mediceorum planetarum respectu solis.*

*Cap. VII.*

**Q**uamquam iouialium satellitum motus tales sint, quales hucusque descripsimus, nihilominus impossibile est, ut ex Sole obseruati eadem forma appareant, qua ab obseruatoribus ex Ioue conspici debere, diximus; quoniam prædicti motus duas habent inæqualitates, quarum vna est physica, atque realis, ob quam Mediceus nunc tardo, modo veloci, quandoque mediocri motu per suum orbem fertur, altera verò optica, & apparens prout arcus à stella transacti conspiciuntur directè, siue obliquè, variisque modis distant ab oculo; cum itaque longè diuersum sit collocare oculum in ipso Ioue, qui intra Mediceei planetæ circulum reperitur, ac in ipso Sole, qui extra, longèque ab ipso positus est, ideò oportet, opticam prostapheresim tam in longitudine, quam in latitudine variari.

Et primùm supponamus realem Mediceei planetæ motum in eius orbe  $A B P D$  uniformem, & æquabilem, hoc est ipsum æqualibus temporibus æquales sui Orbis arcus pertransire; iam dico, quod tunc ex Sole in periodico Mediceorum motu nulla optica inequalitas cognoscetur, licet Mediceei Orbis sit eccentricus, scilicet reuoluatur circa centrum remotum à corpore Iouis; quia ob maximum inter Iouem, & Solem interuallum dictorumque Planetarum Orbium paruitatem, quorum maximus non amplius, quam 10. m. subtendit, euenit, ut lineæ  $S V$ , &  $S X$ , quæ à Sole dictos Orbes tangentes ducuntur, mediasque longitudines definiunt, inter se quoad sensum sint parallele; ideòque arcus  $A V$  æqualis erit  $V P$ , quocirca tanto tempore stella arcum supremum  $A V$ , quanto infimum pertransibit, proindeque nullo pacto aderit prostapheresis, quod equidem obserua-

tori.

toribus in Ioue suppositis non contingit, quibus arcus A B maior quadrante, longiorique tempore translatus, quàm conueniat quartæ parti periodi, se se ostendit sub recto angulo A I B, hoc est quadrantis speciem representat, ac proinde, æquo tardior conspicitur. Itaque quocumque loco inueniatur Eccentrici centrum C cursus à Plenimediceo ad Nouimediceum obseruatori in Sole constituto inæqualitatis omnino expers videretur, quoniam oculus non distinguit verum situm Iouis, sed solummodò, aspicit illum in linea solari collocatum, & in constitutione I, & R ipsum inter A, & P positum esse iudicat, in L verò inter G, & H. Si autem perpendatur motus totius semicirculi descendentis, & cum alio ascendente semicirculo comparatur, alter altero maior potest apparere, vt in constitutione N, in qua solaris linea S N transit per medias longitudes B, & D, centrumque C cadit versùs Apolouium A, ex quo duplex apparentia eueniet, primò scilicet longitudo, seu digressio N A apparebit maior distantia N P: secundò stella longiori tempore maiorem arcum D A B, quam minorem B P D pertransibit. Idipsum in constitutione L, & M, sed minori differentia contingere debet, modò in constitutione I, & R cum collaterales digressiones I B, & I D vel R B, & R D temporaque, quibus stella dictos semicirculos progreditur, æqualia appareant, proculdubio pronunciaré licebit, centrum C huiusmodi Eccentrici incidere in lineam solarem, sed tamen ignorabitur, an supra, vel sub Ioue reperiatur: in constitutione N, cum videatur digressio N A maior altera N P, primique semicirculi tempus longius, quam secundi, asserendum profecto est, centrum C cadere ad partes maioris digressionis N A, in constitutione verò L, & M, vbi eiusmodi differentia, licet minores, tamen inæquales sunt, nobis minimè datam erit distinguere, an centrum C talis Eccentrici Iouis Soli propinquius sit, an remotius, nimirum an ipsum intra, vel extra orbem Iouis, seu Iouialem Eclipticam reperiatur.

Si verò supponamus, quod præter æquabilem motum,  
quò

quò dicti Medicei per proprios orbés circumferuntur, quædam physica realisque motus inæqualitas addenda sit, tunc aliqua prosthaphæresis ex Sole poterit obseruari, ideòque eum in constitutione I stellæ motus tardior sit per A B, quam per B P, tempus per superiorem quadrantem prolixius insumit, quam per inferiorem, sed quia terminus contactus incertus est, atque in tali situ, apparet stationarius planeta, nec in constitutione I nec R prædictam inæqualitatem distinguere poterimus, præterquam in arcibus A Q, & P O solari lineæ contiguis.

Circa verò constitutionem N cum tali loco nulla adsit synodica inæqualitas, vt supra diximus, solummodo physica illa inæqualitas remanebit, quæ pertinet ad ipsam stellam, vt patiter patebit excessus digressionis N A, super N P, cum temporis excessu per primam digressionem supra tempus secundæ.

Postea in L, in qua Plenimediceum incidit inter Apollonium A, mediamque longitudinem B cursus per arcum G B H velocior remaneret, quam cursus per H A S hæ autem sunt nouæ apparentiæ, quæ ex Sole in Mediceorum longitudinibus obseruari deberent.

Remanet modò alia quedam optica varietas, quæ quidẽ talis est: Medicea sydera, licet directo, continuoque motu, ab Occasu, ad Ortum, circa Iouis corpus reuoluantur, attamen respectu Solis in medio Iouialis Orbis collocati, quandoque directè progredi, quandoque verò quiescere, ac deinde cursum retrorsum conuertere videntur; vtriusque autem contrarijs itineribus, nunc veloci modo lento, aliquando verò, mediocri motu progrediuntur; id autem fit, quia dum Stella ab Occidente ad Orientem respectu sui centri C in orbe A B P D ab A graditur per B P D, respectu tamen Solis S positi extra dictum circulum dicti motus inter se contrariantur; ille enim, qui fit a D per A in D fit a dextra ad sinistram, contra verò in inferiori Semicirculo à B per P vsque ad D fit inuerso ordine a sinistra scilicet ad dextram, ac idcirco primus erit directus, hoc est, secundum signorum ordinem,

dinem, secundus autem retrogradus, dictoque ordini con-  
 trarius: rursus in summitate A eius cursus velocissimus erit,  
 sed directus, sicut in P velox, sed retrogradus, quoniam  
 huiusmodi motuum mensura, non à peractis arcubus defi-  
 nitur, sed ab eorum rectis finibus, qui in quadrantis princi-  
 pio A parum discrepant ab eorum peripherijs; deinde pro-  
 pè contractus B, & D stella apparebit stationaria, hoc est re-  
 spectu Iouis, nec ultra, nec retrorsum proficietur, quia tan-  
 gens à Sole in B ducta quoad sensum adaptatur parvæ dicti  
 Epicycli peripheriæ, ac proinde stella predictam tangentem  
 ferri videbitur, ideoque neque Ioui appropinquare, neque  
 ab eodem removeri; cum autem ab iisdem terminis ali-  
 quantisper discesserit, eius motus desuper directus appare-  
 bit, subter autem retrogradus, sed tamen tardissimus, quo-  
 niam sinuum differentia in fine quadrantis minime sunt.

¶ Vt autem ad latitudinis apparentias gradum faciamus, ip-  
 sæ multæ, variæque erunt præter illas, quæ ex Iouis corpore  
 videbantur, quoniam illæ eedem inclinationes, quas Medi-  
 cei Orbis super planum Eclipticæ iouialis exhibet, eiusque  
 Nodorum motus, cum veri, ac reales sint, tales, quodque  
 erunt respectu Solis, qui in iouialis Eclipticæ plano colloca-  
 tur, solaque aderit hæc optica differentia, quod scilicet maxi-  
 me limitum digressiones A E ex Sole longè minores, quàm  
 ex Ioue videbuntur; quoniam idem intervallum A E, si ex  
 Ioue propinquissimo conspiciatur, longè maius, secundum  
 opticas regulas apparebit, quam ex Sole S remotissimo, uti  
 si A E arcus (exempli gratia) maximæ latitudinis borealis  
 vnius Medicei sideris respectu Iouis esset gr. 6. idem ex So-  
 le remotissimo apparebit sub longè acutiori angulo, qui  
 forsitan esse posset minor. 1; quoties verò Mediceus plane-  
 ta deget in Nodis B D nullam, neque ex Ioue neque ex So-  
 le apparentem latitudinem exhibebit.

Quantum verò spectat ad latitudinis periodum, Nodorum-  
 que motionem, satis discriminis intercedet inter observa-  
 tiones factas ex Sole, & eas, quæ fiunt ex ipso Ioue; etenim,  
 ut dictum est, Nodi B, & D retrogrado, lentissimoque cur-  
 su

su feruntur sub stellis fixis, hic autem vnicus ex Ioue obser-  
 uabitur, ex Sole verò alius adest omninò opticus, & appa-  
 rens, ob quem prædicti Nodi retrogrado, lentissimoque cur-  
 su progrediuntur; quod equidem, vt perfectè intelligamus,  
 concipiamus iouiale systema transire à constitutione I ad  
 L, & quoniam in constitutione I solaris linea S I transit per  
 puncta P, & A planeræ latitudo ex Sole apparebit meridio-  
 nalis, dum stella fertur in inferiori arcu B P D; dum  
 verò superiorem semicirculum percurrit versus Ple-  
 nimediceum, eius latitudo septentrionalis apparebit; in  
 constitutione vero R in quia Nouimediceum incidit in  
 septentrionalem limitem A latitudo per totum inferiorem  
 arcum D A B borealem se se exhibebit, cum contra  
 in constitutione I australis conspiceretur, denique in  
 constitutione N cum incidat solaris linea, ac ipsum  
 Nouimediceum in Nodo D, necesse est, vt in altero  
 quadrante A D inferioris semicirculi latitudo A D se-  
 ptentrionalis appareat, in reliquo verò meridionalis vi-  
 deatur. Hæc eadem varietas erit pariter obseruabilis in  
 constitutionibus L, & M, in quibus Nodi incidunt in loca  
 intermedia. Quoniam igitur ex motu Iouis, & sui syste-  
 matis euenit, vt solaris linea varijs in locis Eccentricum  
 Medicei ita disperseat, vt secundum signorum ordinem tan-  
 tum ad vnguem moueatur, quantum Iouis corpus progre-  
 ditur, hinc est, quod solaris linea continuè Nodis admo-  
 uetur, proindeque iidem Nodi apparebunt retrograde so-  
 lari lineæ fieri propinquiores, ideoque præter motum re-  
 trogradum, qui propriè, & naturaliter competit Medicei  
 Nodo respectu syderum inertantium, adest hæc optica re-  
 tardatio omninò optica, & apparens, quæ ex Sole conspi-  
 ci debet.



*De inaequalitatibus Iouialium satellitum, quae ex Terra possunt  
obseruari. Cap. VIII.*

**C**um iam de Mediceorum syderum apparentijs, quae ex Sole conspici possent, satis superque dictum sit, nunc est pertractandum de apparentijs, quas à Terra, nostroque domicilio exhibent. Primum igitur recolendum est, Iouem non secus, ac ceteros planetas circa Solem ferri, à quo nunquam toto suo circuitu seiungitur, nostra autem Terra intra Iouis orbitam posita est, sed tamen non semper ab ipso aequaliter distat; quoties enim Iuppiter Soli opponitur, cum scilicet Terra T intermedia est, toties Iuppiter ipse nobis est propinquissimus; contra verò quando Iuppiter cum Sole coniungitur, videlicet quoties Sol inter Terram, & Iouem ipsum situs est, toties ita à nobis est remotus, ut maior distantia Terrae à Ioue propemodum sesqui altera sit minoris distantiae. Adiunt praeterea medioeres distantiae, quae sunt ad dexteram, & ad sinistram, & huiusmodi quòque varietas appellatur orbis anomalia, quae quidem secundum Tychonem oritur à quadam luxatione totius (planetarij) systematis, quòd à Sole sicuti à quodam rotæ centro transferitur; per Pythagoricos verò talis anomalia est quaedam simplex apparentia, quae non à planetarij systematis motu, sed ab ipsa nostrorum oculorum motione euenit.

Cum Terra igitur semper intra Iouis orbem degat, parumque distet à Sole, accidit, quod omnes apparentias, & periodos inaequalitatis, quae ex Sole conspicerentur, tam scilicet ille, quae ad longitudinis, quamque ad latitudinis motum pertinent, nobis Terrae incolis exhibebunt, paucis tamen varietatibus implicatas, quae conueniunt longiori, seu breuiori à Sole interuallo, aut laterali Terrae constitutioni. Ac ut à primis constitutionibus ordiamur, cum Iuppiter coniunctus, vel oppositus Soli fuerit, tunc Terra in eadem solari linea posita erit, ideoque Aphelij punctum A, etiamnum Apogeeum remanebit, hoc est à Terra

D

remio.

remotissimum, punctumque P Perihelij est Perigeum respectu nostri; in tali autem constitutione omnes apparentiæ motus velocis, tardi, stationarij, aut retrogradi ab Eccentrici anomalijs alterati eodem videbuntur, tam ex nostra Terra, quam ex Sole. Idem dicendum est de dictorum planetarum inclinationibus, seu latitudinibus, quibus parua quedam alteratio contingit; si enim supponamus, latitudinem periheliam P F esse maximam australem, Iouem autem nullam habere latitudinem; hoc est in plano Ecclipticæ collocatum, in quo semper Sol, ac Terra reperiuntur, tunc tam Soli, quam ipsi Terræ latitudo P F meridionalis maxima apparebit, hoc tamen discrimine, quod scilicet ex Terra inter Solem, & Iouem intercepta idem arcus P F se se ostendet sub tantò maiori angulo, quantò ad vnguem incrementum apparet diameter ipsius Iouis Perigei, ac diameter B D orbis Medicei; quod equidem incrementum, cum globo Iouis, Medicei Eccentrico, eiusque latitudini generaliter conueniat, nullam gignet alterationem in apparenti latitudine, quæ Iouis diametro mensuratur; verùm hæc ipsa latitudo eodem prorsus modo apparebit, ac si eum è Sole intueremur. Si verò deinde concipiamus, Iouem satis obseruabilem latitudinem habere v. g. meridionalem, hoc est Terram T sublimem esse, & eleuatam super planum per I S ductum, in quo Iouis orbis describitur, tunc quidem, si Mediceus planeta nullam habuerit latitudinem in puncto P, hoc est si fuerit illius Nodus P in plano iouialis orbis constitutus, tunc Iuppiter, si ex Terra in puncto T collocata respiciatur, meridionalem latitudinem nobis ostendet; ex Terra enim supra planum orbis S I eleuata Radius visus T P inferior apparebit directo, & centrali radio T I proindeque Mediceus in P habebit latitudinem apparentem meridionalem, etiam si reuera sit in suo Nodo, & nullam prorsus latitudinem habeat, si ex Ioue, vel ex Sole conspiceretur. Idem etiam apparebit in secunda constitutione, tunc scilicet, cum Medicæ stellæ latitudo septentrionalis F I P, minor est excessu anguli X T I super angulum I S T,

minor

minor scilicet excessu latitudinis apparentis, meridionalis ipsius Iouis super veram latitudinem eiusdem; tunc enim stella in F se se exhibet in radio T F, qui inferior est centrali radio T 3 I. In tertia verò constitutione, licet stella veram habeat latitudinem septentrionalem respectu Iouis, & Solis, ex Terra tamen videbitur per radium centalem T 3 I; ideoque nullam ostendet latitudinem apparentem, sed precise pertransire videbitur per centrum corporis Iouis. In quarta autem constitutione, cum Medicei latitudo erit, & ipsa meridionalis, ex Terra pariter meridionalis apparebit, magno tamen cum incremento sub angulo maiori I T 4. Ac contra in quinta constitutione, si eadem latitudo maior esset, quam excessus latitudinis apparentis ipsius Iouis supra veram, posset etiam videri septentrionalis, sed minor tamen, quam reuera est. Eodemque modo intelligi possunt varietates oppositæ, quæ contingunt in Apogei parte A, pariterque phænomena omnia, quæ tunc accident, cum Iouis latitudo septentrionalis erit, hoc est, cum Terra T deprimi concipietur sub Ecclipticæ iouialis planum subiectum.

Eadem adunguem phænomena se se ostendent Terræ in V remotissime scilicet à Ioue, hoc tamen discrimine, quod videlicet anguli, qui apparentes Mediceorum syderum latitudines ostendunt, semper minores erunt, ob opticam rationem, qua docemur, idem obiectum, quo magis ab oculo remouetur, eo sub minori angulo videri.

Fig. 6.

Vt autem ad laterales constitutiones gradum faciamus concipientes scilicet Terram in puncto K, aut M, secundæ, aut quartæ constitutionis, sciendum est, lineam Apheliorum, & Apogeorum, tunc non coincidere, sed vnâ ab altera latis remoueri; si enim Terra sit in K, Apogeuum erit N procul ab Aphelio A; pariterque Perigeuum O tantum ad vnguem distabit à Perihelio P, quantum Orbis prostaphæresis annua requirit, circiter gr. 11. ita vt in progressu à constitutione Telluris T in quarta Figura ad septimam ad K, ab oppositione nimirum Solis, & Iouis ad eorum primâ quadraturam Apogeuum retrorsum erit progressum ab A in N

Fig. 7.

8.

D 2

gr.

gr. 11., à situ verò K ad V, scilicet ab eadem quadratura ad coniunctionem Solis, & Iouis reuertetur idem Apogeu-  
 um ab N ad A, motu directo, iterumque ab hac constitu-  
 tione ad secundam quadraturam, ab V in M Apogeu-  
 m antebit per totidem gr. 11. ab A ad Q, tandemque ab M in T  
 à quadratura secunda ad oppositionem Iouis, & Solis re-  
 trorsum reuertetur à Q in A. Tunc igitur ob huiusmodi  
 prostaphæresim motus Mediceorum planetarum apparet  
 satis irregularis, quoniam motus per eorum orbis velo-  
 ciores, quam reuera sint, se ostendunt per sex menses cum  
 dimidio, quo tempore Apogeu-  
 m Q retrocedit, vsque ad  
 N; contra autem per sex alios menses cum dimidio prædi-  
 cti motus tardiores, quam veri apparent, dum Apogeu-  
 m N progreditur versus Ortum. Quapropter licet ex Sole  
 Mediceorum syderum motus essent regulares, vt dictum  
 est, nunc ob istam annuam prostaphæresim satis irregulares  
 apparebunt; hæc etenim tam longitudinis, quam latitudi-  
 nis motui suas affert inæqualitates; quoniam non solum ad-  
 erit motus apparens Nodorum compositus ex reali retrogra-  
 datione Nodorum Iouialium planetarum, & retrograda-  
 tione optica quam requirit motus Iouis cum suo systemate,  
 vt superius est declaratum, verum etiam alia aderit inæqua-  
 litas, quæ aliquando auget motum retrogradum eorum-  
 dem Nodorum, aliquando verò imminuet, ita vt directè  
 progredi appareant secundum signorum ordinem; Qua-  
 propter, si ex Telluris contutione respectu Solis in K, quæ  
 in secunda quadratura Iouis, & Solis contingit, ad consti-  
 tutionem M p imæ quadraturæ transeamus, tunc adest mo-  
 tus retrogradus lentissimus nodi D, simul cum alio motus  
 optico pariter lento, & retrogrado eiusdem Nodi, qui mo-  
 tus pendent à Ioue, eiusque systematis circulatione, quæ  
 ambo videntur transferre Nodum à D in Z. Quoniam au-  
 tem tali tempore Perigeum discessit ab O, & peruenit in R,  
 ergo Nodus Z videbitur satis Perigeo appropinquasse, pro-  
 indeque illius motus retrogradus, hoc est contra signorum  
 ordinem mirum in modum auctus apparebit; contra autem

à constitutione in M ad K perigeum R retrogradè transfer-  
tur usque ad O, ac idcirco remouebitur vltèrius à Nodo Z  
gr. 22. duplo scilicet anguli prostapheresis P I R, cumque  
concipiamus, persuasitque simus, Perigeum O in eodem  
sempè loco manere, ab eoque Nodus Z recedere videatur  
hinc est, quod tunc temporis existimabimus Nodum præ-  
dictum reuertà percurrere directo motu contra propriam  
naturam, ab Occasu, ad Ortum.

Ex prædicta motus Nodorum irregularitate oriuntur va-  
ria latitudinis phænomena, quæ quidem satis miranda sunt;  
possunt etenim meridionales latitudines septentrionales  
apparere, & è contrà: magis, vel minus auctæ, & diminutæ,  
prout Nodi prædicti immutabunt situm respectu Terræ.  
Quæ omnes anomalie simul consideratæ satis arduam red-  
dunt vestigationem peridorum, tam longitudinis, quam  
latitudinis, proindeque necesse est, vt satis circumspèctè  
procedamus, atque eos modos, & artificia potissimus seliga-  
mus, quæ prædictas periodos nobis possunt demonstrare, de  
quibus agemus suo loco. Concludo tandem, quod ex Ter-  
ra non solum videri debent veri ac reales Mediceorum sy-  
derum motus, eorumque veræ tam longitudinis, quam la-  
titudinis anomalie, sed illæ quoque, quæ apparent ex Sole,  
ac Terra, quamuis eorum pars maior optica sit, & apparens  
tantum; proindeque, cum iam satis declarauerimus varios  
motus reales, & apparentes, quos verosimiliter habere de-  
bent Medicea sydera, iam superest, vt ostendam, prædictos  
motus reales tales esse, vt certa nature necessitate ex suis phy-  
sicis causis orientur.

*De Compositione eccentricorum, & Ellipticorum Orbium, Medi-  
ceorum syderum motibus inferuentium. Cap. IX.*

**P**ostquam generaliter declarauimus varias, ac multipli-  
ces inæqualitates motuum Mediceorum planetarum,  
necesse est, vt exactè explicemus, qua figura, & quomodo  
disposita, & collocata prædicti Planeta circumuoluantur;  
Ac,

Ac, vt altiùs ex ordiar, primo loco suppono, Cēlos ipsos, vel omnino inanes, vel saltem ætherea substantia fluidissima repletos, quæ longè rarior sit, quam aer hic noster Telluris globum circum ambiens; hoc autem ob sensatissima recentiorum experimenta quæ iam absque vlla repugnantia, hesitationeque omnes recipiunt, & amplectuntur.

Certum etiam est, erraticas omnes stellas sitas esse in diuersis locis prædictæ ethereæ fluidæ regionis, ibique æquilibratas natate, vt ita dixerim, circa aliquod insigne mundanum corpus, circa Solem videlicet, Terram, Iouem, vel Saturnum.

Manifestum quoque est, prædictos planetas eadem insignia corpora circumdare, perpetuisque circulis circa ipsa torqueri nec, vnquam ab incepto semel itinere deuiare, neque nimis sese admouentes, amouentesque prædictum deserere circuitum, aut à prædicta semita aberrare.

Compertum est pariter ex vetustioribus, recentioribusque obseruationibus horum reuolutionum præcise centrum non esse corpus, illud circa quod reuoluuntur, sed ex vna parte magis, quam ex opposita eleuari ipsos planetas, eccentricum quemdam circuitum formantes, qui repertus tandem est non circularis, sed similis ellipsi.

Ostendunt denique obseruationes, lineam absidum prædicti Eccentrici fixam non esse, seu potius non semper sibi ipsi æquidistare, ideoque non semper eadem fixa sidera intueri, sed motu satis lento trasferri secundum signorum ordinem.

Omnium primus existit Io: Kleperus, qui fortunato ausu contra antiquorum philosophorum, astronomorumque sententiam orbis perfecte circulares à Cēlo exulare iussit, in quorum vicem motus per ellipsim introduxit, id autem in Martis orbe verificari euidentissime demonstrauit ex Tycho- nis obseruationibus; deinde verò hoc idem necessario contingere in Mercurio animaduertit, in Sole vero non adeo euidenter eiusdem Ecclipticam figuram probari posse, licet ipsam planetis omnibus attribuat persuasus à rationibus

qui-

quibusdam physicis admodum ingeniosis, licet infirmis. Opinio hæc ad eo eruditis omnibus placuit, ut summa auiditate admilla fuerit, præcipueque Bullialdus doctissimus, ac famigeratissimus Astronomus summopere eam perfecit, quamuis ipse ex alijs principijs deduxerit, ex alijsque elementis composuerit prædictam ellipticam figuram, proindeque non alienum fortasse erit, breuiter ea, quæ a Bullialdo afferuntur, enumerare, ut deinde, quomodo talis elliptica doctrinâ verificetur, ostendi possit.

Cōcipiatur ergo conus scalenus, cuius vertex A, basis vero circulus super diametrum B C, axis autem A I, triangulum per axim perpendiculare circulo basis A B C, ita ut angulus A I C sit acutus reliquus vero obtusus: ducatur postea recta E K hæc lege subtendens angulū verticis, ut in partes æquales diuidatur in puncto X à linea recta V T, quæ sit æqualis rectæ E K, parallela vero basi B C, fecetque axim in puncto Z; hinc sequitur triangulum M X Z esse isoscelium, latera scilicet M X, & Z X erunt æqualia, proptereaque triangulum A E K non erit subcontrarium triangulo A C B: per rectam deinde E K superficies plana extendatur erecta plano trianguli A B C, quæ in coni sectione ellipsim gignet E R K, cuius axis transuersus erit E K, ei coniugatus O N, centrum X, vnus ex focus, seu polis M cadens in axim coni, sumpta itaque X H æquali X M, alter ellipsis focus erit H, quo supposito assumit ipsemet Bullialdus Solem esse in puncto H, planetam vero æquabili cieri motu circa axim coni A M I per circulos perpetuo æquidistantes circulo basis coni B C, qui circuli æquantes possunt nuncupari, punctum vero M, siuè potius totus axis appellabitur centrum motus æqualis; quoniam autem proprium est motus æquabilis circularis, ut ipse temporibus æqualibus angulos ad centrum æquales pertranseat, isti verò anguli ad centrum similibus circumferentijs insistant, sed tamen proportionalibus eorum radiis, ergo cum deget planeta in puncto E designans circulum, cuius semidiameter S E eius motus erit tardissimus, cum minimus sit huiusmodi circulus eorum omnium qui

Fig. 9.

qui à stella propria periodo describuntur, cum verò stella  
 perueniet ad punctum Y describetque in cono circumferentiam  
 circuli FG, quæ transit per focum M, motus eius  
 erit velox, quoniam talis circulus maior est, percurrentes  
 autem aliorum circulorum peripherias, quousque ad ma-  
 ximam pertingat ad K, ibi eius motus velocissimus erit, quo-  
 niam maximi circuli PK peripheriam describit, quo loco  
 planeta polo H propinquissimus est, quare ab Aphelio E ad  
 Perihelium K, stella percurrent innumeras circulorum peri-  
 pherias successive incrementales, proindeque idem motus æ-  
 quabilis, qui temporibus æqualibus transit circa axim  
 A I æquales angulos, affert ellipticæ circumferentiæ ERK ve-  
 locitatis augmenta semper supra minimum incrementa, quæ  
 eandem rationem habebunt inter se, ac prædictorum circu-  
 lorum radij supra minimum. Quamuis autem Bullialdus in  
 deducenda, ex hac hypothese, physica, & optica æquatione à  
 medio motu aliquid omisisset, vt Sethus Vuardus adnota-  
 uit, negari tamen non potest, illud eius primum inuentum  
 mirabile non esse, ingeniosum, ac laude dignum. Verum enim-  
 verò duas opponunt ipsi difficultates Astrophilotophi, qua-  
 rum prima est, tales cuiusvis planeræ conos esse fictitios, ideo-  
 que percipi non posse, quo pacto stella circa superficiem  
 quamdam conicam reuoluatur, quæ nullibi existit in vni-  
 uerso: secunda verò, videri prorsus a veritate alienum, mo-  
 tus omnes fieri circa vnum punctum vnamque lineam  
 motus æqualis, quæ sita sit in foco M, hoc enim punctum  
 est indiuisibile, & imaginatione fictum in ipso æthere, nul-  
 lamque prorsus virtutem ac facultatem habens, ideoque  
 nulla penitus adest ratio, qua planeta torqueri debeat circa  
 prædictum punctum, lineamque chimericam constanti  
 adeo lege, contra verò circa maximum globum ipsius so-  
 lis in puncto H collocatum irregulariter moueri debeat,  
 quasi præcipuus finis stellæ sit, non solem ipsum circumi-  
 re, sed punctum illud imaginatum atque præstatiticum, nul-  
 lamque possidens perfectionem, facultatemque; & hæc  
 equidem difficultas reuera adeo efficax esse videtur, vt egre  
 tolli queat.

Quoad



Quoad primam crederem ego nedum remoueri, & fieri  
 satis posse, sed aliquod etiam naturę arcanum forsitan con-  
 tineri; ac primum quidem concipiamus, planetam ipsum  
 duobus cieri motibus, circulari vno alio vero per lineam  
 rectam, ostendemus ex hisce duobus motibus tanquam  
 elementis, posse motum ellipticum resultare; intelliga-  
 mus igitur Solem in H planetam verò primum in E Aphel-  
 io, habet autem duos motus, orbicularem alterum circa  
 Solem, alterum verò rectum oblique factum ab E vertus  
 P, sint autem tali pacto prædicti motus commensurabiles  
 inter se, vt cum planeta ex E descripserit semicirculum, de-  
 buerit pariter motu recto ex E peruenire ad P; in sequenti  
 verò semicirculo redeat iterum planeta ex P in E: suppo-  
 nere etiam debemus, planum circularis motus E D semper  
 æquabiliter inclinari lineę motus recti E P, ex quo sequi-  
 tur stellam latam per rectam lineam, pertransire innume-  
 rorum circulorum peripherias semper sibi ipsis equidistan-  
 tium, ac si interim circularis motus esset æquabilis, si scilicet  
 temporibus equalibus ad centra equales angulos pertran-  
 saret, ellipticam describeret peripheriam E R K, vt superius  
 iam dictum est, hic autem videmus, quomodo licet realis  
 conus in vniuerso non supponatur, fieri tamen potest eius-  
 modi motus ellipticus eo prorsus modo, quo fieret, si talem  
 solidum conum admitteremus.

Prædictas autem duarum motionum hypotheses esse pos-  
 sibles, primò potest ostendi planetarum omnium exemplo,  
 qui spiras propemodum describunt, nunquam verò exactas  
 circuli peripherias; tales autem spirę tantò pariter inclinan-  
 tur ad planum orbis ipsius planetę, quantum postulat incli-  
 natio, ex qua latitudo ipsa dependet.

Quoniam planum solaris vertiginis euidentissimè incli-  
 natum plano Eclipticę, si igitur verum esset id, quod sentit  
 Kleperus, a radijs nempe solaribus, dum reuoluuntur, præ-  
 sari quodammodo, & circa Solem rapi errantia sydera, ne-  
 cessarium profectò esset, planetam per circulum L Q aliof-  
 que ipsi parallelos circumferri; si enim concipiamus Solem

in puncto H circulos parallelos ad L Q propria sua vertigine describentem, ita ut eiusdem vertiginis axis erigatur vertiginis plano L Q, solares radij per planum eiusdem circuli L Q, aliorumque huic æquidistantium ferentur, & rapti ab ijs radijs planetæ per idem planum incedat, & quoniam interim stella quoque proprium exercet motum ex E in P, & ex P in E, cogetur percurrere modo circuitum P K, modo L Q, & ita de cæteris; quoniam autem in nullo eorum moratur aliquo statuto tempore ( motus enim per E P continuus supponitur ) Ergo debent circumterris per innumerorum circuituum peripherias inæquales inter se, à quibus difformis velocitas monstratur, quam circa Solem habet planeta; ac propterea videtur, nedum ex hoc capite eiusmodi motum non esse impossibilem, sed esse potius rationabilem, ac verisimilem, nisi alia ipsi occurrerent repugnantia.

Hic autem notandum est, quod, licet solaris corporis revolutio contingat semper eodem situ, circuli tamen æquidistantes, quos illius radij describunt, dum ipse circa proprium axim torquetur, perpetuo incidunt in eodem plano respectu mundani situs, ac spatij, ideoque, ut viae ellipticæ à diversis planetis descriptæ salvari possint, nihil aliud necesse erit, nisi Aphelios in diversis à Sole distantis collocare diversisque sitibus stellati Cæli, atque Zodiaci, ita ut Aphelij linea ex Sole ad planetam ducta magis minusve inclinetur plano vertiginis eiusdem Solis, deinde unicuique ipsorum motum tribuere per lineam rectam tantum super plano solaris vertiginis inclinatâ, quantum præcise sufficit ad ellipsim formandam, quæ unicuique planetarum debet competere simul cum suis periodis, aliisque omnibus circumstantijs, quæ in eorum motibus observantur.

Superest hunc reliqua difficultas, an poterit fieri possit, ut planeta moueatur circa focum ellipsis, siue punctum æqualitatis, dum Sol in reliquo foco, seu polo collocatur, & sanè durum videtur, & incomprehensibile, planetam siue propria, & nativa virtute, siue externa aliqua facultate

circumducatur, posse circa punctum illum æqualitatis nul-  
lam virtutem, aut entitatem habentem moueri, ab eoque  
allici, hoc autem præcipue euincitur ex velocitate inæqua-  
li motus ipsius planetæ, quæ in huiusmodi hypothesi au-  
geri deberet præcise ea proportione, qua distantia ab axe  
conter focum educta, seu eadem ratione qua semidiamet-  
ri æquantium circulo tum crescunt, hoc autem nullo pa-  
cto fieri posset, nam aut planetæ motus per circumferentias  
circulorum æquantium efficitur à propria virtute in ipso  
met planeta existente, aut ab aliqua externa facultate im-  
pellente; in primo casu planetæ velocitas semper vnifor-  
mis sibi ipsi æqualis esse deberet; in secundo vero casu ve-  
locitas planetæ imminui deberet, quo magis semidiametri,  
& periphæriæ circulo rum æquantium augmentur, vt inferius  
ostenderetur. Hæc de causis cogimur relinquere prædictam  
hypothesim, & si fieri potest, aut aliam verisimiliorem in-  
uenire, aut potius ostendere, eandem viam ellipticam reti-  
neri posse in ipsis planetis, sed firmioribus fundamentis in-  
nixam physicisque rationibus magis conformem, quod  
quidem, vt exequamur, quedam lemmata præmittenda  
sunt.

*Lemmata ad inueſtigandum ellipticum planetarum iter.*

*Cap. X.*

*LEMMA PRIMVM.*

**S**I ab vno ex polis ellipsis recta eleuetur perpendicularis  
ad axim vsque ad sectionem, ab incidentia autem duca-  
tur linea recta conſingens ellipſim quouſque ſecet duas ad  
axim maiorem perpendiculares ab eius terminis ductas,  
truncatales perpendiculares æquales portionibus contermi-  
nalibus ipsius axis, vsque ad prædictum polum.

In ellipſi  $A M P$ , cuius axis maior  $A P$ , alter verò polo-  
rum  $S$ , (hic ab Apollonio dicitur punctum comparationis)  
ducantur a punctis  $P, S$ , &  $A$  rectæ ad axim  $A P$  perpendicu-  
lares,

E 2

lars,

*Fig. 10.*

lares, quales sunt  $A E$ ,  $S B$ ,  $P D$ , & à puncto  $B$ , in quod incidit perpendicularis à polo  $S$ , ducatur recta linea  $B D E$  tangens ellipsim, eademque producat, quousque occurrat perpendicularibus in  $D$ , &  $E$ : dico iam,  $P D$  æqualem esse  $P S$ , aliamque portionem axis  $A S$  æqualem suæ conterminali perpendiculari  $A E$ . Producat tangens  $B D$  quousque axi occurrat in puncto  $F$ , & à centro  $C$  ducatur recta  $C M$  perpendicularis ad eundem axim, quæ secet sectionem in puncto  $M$ , tangentem verò in  $G$ ; quoniam ab eodem ellipsis puncto  $B$  ducitur  $B S$  ordinatim ad axim applicata, ac tangens  $B F$ , quæ eidem axi occurrat in  $F$ , ergo  $A F$  ad  $F P$  eandem rationem habet, quam  $A S$ , ad  $S P$ ; verum ut  $A F$  ad  $F P$ , ita  $A E$  ad  $P D$  ab hisce etenim parallelis inter se duo similia efformantur triangula  $A E F$ , &  $P D F$ , ergo  $A E$  ad  $P D$  erit, ut  $A S$  ad  $S P$ . Deinde quoniam rettangulum ex  $A E$  in  $P D$  æquale est quartæ parti Figuræ, quæ describitur ad maiorem axim, pariterque rettangulum  $A S P$  æquale est quartæ parti eiusdem Figuræ; ergo rettangulum ex  $A E$  in  $P D$  æquale erit rettangulo  $A S P$ ; sunt autem hæc rettangula similia inter se, cum eorumdem latera sint directè proportionalia, ut dictum est, quapropter latera homologa  $A E$ , &  $A S$  erunt æqualia, pariterque latera  $P D$ , &  $P S$  æqualia sunt inter se, quod, &c.

**LEMMA SECUNDUM.**

**I**isdem manentibus qualibet alia recta ad axim perpendicularis usque ad tangentem educta æqualis erit rectæ lineæ ex polo ductæ ad concursum sectionis, eiusdemque perpendicularis; vocetur illa radius polaris.

*Fig. 10.* In eodem diagrammate præcedentis lemmatis ducatur quælibet recta  $C G$  perpendicularis ad axim, quæ sectionem dissecet in  $M$ , tangentem autem in  $G$ , iungaturque polaris radius,

radius  $S M$ : dico,  $S M$  equalem esse  $C G$ , atque hoc verificari in quibuslibet ellipsis locis.

Producatur ordinatim applicata  $M C$  usque ad sectionem in  $X$ : quoniam ex precedenti lemmate recta  $A E$  equalis est recte  $A S$ , pariterque earum quadrata equalia sunt; ergo quadratum ipsius  $A E$ , ad quadratum recte  $B E$  eandem habebit proportionem, quam quadratum recte  $A S$  ad quadratum ipsius  $B E$ ; quoniam autem  $A S$  ad  $B E$ , est ut  $C S$  ad  $G B$  (sunt enim recte linee  $S B$ ,  $G C$ , &  $A E$  inter se equidistantes) erit quadratum  $C S$ , ad quadratum  $G B$ , ut quadratum recte  $A S$ , ad quadratum recte  $B E$ , siue ut quadratum recte  $A E$  ad quadratum recte  $B E$ ; verum ut quadratum ex  $E A$ , ad quadratum ex  $E B$ , ita est rectangulum  $X G M$  ad quadratum recte  $G B$ ; ergo tam quadratum ex  $C S$ , quam rectangulum  $X G M$  eandem habebit proportionem ad quadratum recte  $G B$ ; ideoque rectangulum  $X G M$  æquale erit quadrato ex  $C S$ ; addito autem comuniter quadrato ex  $C M$ , erit summa duorum quadratorum recte scilicet  $S C$ , &  $C M$ , hoc est quadratum solummodo recte  $S M$ , equale rectangulo  $X G M$  simul cum quadrato ipsius  $C M$ , soli scilicet quadrato ex  $C G$ , proindeque recta  $S M$  æqualis erit  $C G$ , quod, &c.

*Apol.*  
*lib. 3.*  
*prop.*  
*16.*

### LEMMA TERTIUM.

**I**N Ellipsi polarium radiorum incrementa supra minimum radium eandem habent rationem, quam sinus versi, seu portiones axis maioris secti à perpendicularibus cadentibus a radiorum concursu cum ipsa sectione.

In eodem schemate ducantur quilibet duo radij polares  $S M$ , &  $S T$ , & à punctis  $M$ , &  $T$  cadant perpendiculares ad axim  $G M C$ , &  $N T H$ , que sinus versos  $P C$ , &  $P H$  abscindant: dico, quod excessus radij polaris  $S M$  supra minimum radium  $S P$  ad excessum radij  $S T$  supra eundem minimum  $S P$ , eandem habebit proportionem, quam  $P C$  ad  $P H$ . Ducatur recta  $D I$  parallela axi  $P A$ , quæ secet rectas

*Fig. 10.*

rectas  $GC$ , &  $NH$  in punctis  $K$ , &  $L$ ; quoniam in triangulis  $NDL$ , &  $GDK$  similibus inter se (eo quia  $NL$ , &  $GH$  parallelæ sunt, cum ambæ perpendiculares existant ad axim  $PA$ )  $GK$  ad  $LN$  est ut  $KD$ , ad  $DL$  id est ut  $CP$ , ad  $PH$ ; per lemma autem præcedens radius  $SM$  æqualis est ipsi  $GC$ , radius verò  $ST$  æqualis est ipsi  $NH$ ; pariterque per primum lemma  $SP$  æqualis est ipsi  $PD$ , imò etiam ipsis  $CK$ , &  $HL$ ; si auferantur igitur ex æqualibus æquales partes, id est  $SP$  ab  $SM$ , &  $PD$ , aut  $CK$  à  $GC$  remanebit excessus radij  $SM$  supra  $SP$  æqualis rectæ  $KG$  eodemque modo excessus radij  $ST$  supra minimum  $SP$ , remanebit æqualis rectæ  $NL$ , proindeque excessus radij  $SM$ , supra radiū  $SP$ , ad excessum radij  $ST$  supra eundem  $SP$  eandem habebit proportionem, quam  $KG$ , ad  $LN$ , eandem scilicet, quam  $KD$  ad  $DL$ , seu  $CP$ , ad  $PH$  quod, &c.

#### LEMMA QVARTVM.

**S**i à duobus polis eiusdem ellipsis duo radij ducantur ad idem illius punctum excessus maioris radij, supra radiū mediocrem inter maximum, & minimum æqualis erit defectui minoris radij ab eodem mediocri.

**Fig. II.** In vndecima figura sunt duo ellipsis poli  $F$ , &  $S$ , à quibus coniunguntur ad idem punctum sectionis  $T$  duo radij polares  $ST$  maior, &  $TF$  minor, à termino autem  $M$  minoris semiaxis  $CM$  ducantur duo alij radij  $SM$ , &  $FM$ , tunc quidem radij  $SM$ , &  $FM$  proculdubio erunt æquales (sunt enim  $SC$ , &  $FC$  polorum distantia à centro æquales inter se, angulique sunt recti ex utraque parte communis lateris  $MC$ ) dico iam primò radiū  $SM$  mediocrem esse inter maximum  $SA$ , & minimum  $SD$ ; quoniam duo radij  $SM$ , &  $MF$  sunt æquales axi maiori  $PA$ , erit excessus distantie maioris  $SA$  supra  $SM$ , siue  $CA$  æqualis defectui ipsius  $SP$  distantie minimæ ab eadem  $SM$ . Nunc verò ostendendum est, excessum rectæ  $ST$  supra rectam  $SM$  æqualem esse defectui ipsius  $FT$  ab eadem  $SM$ . Quoniam duo radij  $ST$ , &  $TF$  simul sumpti sunt æquales axi maiori  $PA$ ,

*Apol.*  
*lib. 3.*  
*prop.*  
*53.*


**P**A, duplo scilicet rectæ S M; excessus ergo rectæ S T supra S M æqualis erit defectui ipsius F T ab eadem recta S M.

**C O R O L L A R I U M.**

**S**I deinde consideremus non radios, sed eorum excessus supra minimum, pariter verum erit id quod iam in propositione demonstrauiimus, hoc est, si a tribus radijs S T, S M, & F T comuniter auferatur distantia minima S P, ita vt excessus radij S T supra S P æqualis sit ipsi L N, & excessus radij S M supra S P sit æqualis rectæ K G, tandemque F T minus P S sit æqualis O Q, tunc quidem excessus ipsius L N supra G K æqualis erit defectui O Q, à G K.

**L E M M A Q V I N T V M.**

**S**I circa polos eiusdem ellipsis fiant duo circulares motus ambo ab eodem gradu tarditatis incipientes, ac in eorum altero velocitates eadem ratione increfcant qua radij polares augentur, in altero verò celeritates contrario ordine augmentum sumant, hoc est quò magis polares radij decrefcant, eò magis velocitates crefcant, incrementa velocitarum erunt æqualia iisdem gradibus, eadem periodo, æqualibusque temporibus aucta.



In eadem ellipsi A B P supponamus quod motus circa *Fig. 12.* polum F augeri incipiat ab axis maioris termino A eadem ratione qua elongatur polares radij F A, F T, F M, F B, F P, motus quoque alius circa polum S, scilicet incipiens ab eodem supremo termino A, eodemque tarditatis gradu quo cepit alius, eadem proportione increfcant, qua decurtantur radij polares S A, S T, S M, S B, & S P, dico iam quod augmenta velocitatum æqualia erunt, excedentia se se gradibus æqualibus, ac eadem prorsus periodo. Quoniam in ellipsi radij F M, & S M, æquales sunt cum ducantur a termino axis minoris eiusdem ellipsis, & mediores quoque sint inter maximum radium S A, & minimum

mum  $SP$ ,  $FA$  tantum elongari debet, vt ad prædictam  
 mediocritatem perueniat, quantum decurtari  $SA$ ; verum  
 in prædictis progressibus æqualis auctio-  
 nis & imminutio-  
 nis æquales gradus velocitatis acquiruntur supra mini-  
 mum, à quo ambæ cœperunt, ergo celeritates radiorum  
 $SM$ ,  $FM$  æquales erunt inter se, ac mediocres inter maxi-  
 mam minimamque velocitatem, quoniam autem princi-  
 pio motus in  $A$  celeritas radij  $FA$  cō minor est mediocri  
 celeritate ipsius  $FM$  quò adunguem velocitas radij  $AS$  mi-  
 nor est velocitate  $SM$ , si in vtriusque motibus supponantur  
 duo transitus peracti à prædictis duobus radijs temporibus  
 æqualibus, ita vt  $FT$ , &  $ST$  à termino  $A$  pertingant ad  $T$ ,  
 ibi celeritas radij  $FT$  tantò minor erit mediocri celeritate  
 $FM$ , quantò velocitas radij  $ST$  minor est eadem medio-  
 cri velocitate  $SM$ ; quoniam excessus huius, & illius defe-  
 ctus à radio mediocri, à quibus mensurantur augmenta gra-  
 dum nouæ celeritatis, sunt æquales inter se; ergo gradus  
 velocitatis in vtriusque motionibus acquisiti in puncto  $T$   
 inter se pariter æquales erunt; principia enim in termino  $A$   
 eandem habebant tarditatem in ambobus motibus, ac id-  
 circò temporibus æqualibus æquales celeritatis gradus ac-  
 quirentur, cum verò idem dicendum sit de cunctis alijs el-  
 lipsis punctis, verum profectò erit, amborum motuum cele-  
 ritates æquales esse, adauctasque iisdem gradibus, atque  
 periodis, quod opus erat, &c.

*LEMMA SESTVM.*

**S**I duo mobilia in orbem lata circa duo centra moueri cœ-  
 perint eodem tarditatis gradu, ac temporibus æquali-  
 bus gradus celeritatis acquirant æquales, alterū eadem pro-  
 portione, qua radij producuntur, alterum verò eadem ra-  
 tione, ac mensura, qua radij decurtantur, sintque maximi  
 radij æquales inter se, pariterque minimi inter se æquales,  
 itinera ab eis descripta erunt omnino similia, & æqualia, ita  
 vt si primum ellipsim descripserit circa proprium polum,

sc



secundam quoque ellipsim illi similem, & æqualem delineabit.

Sint duo mobilia A, & B, quorum alterum A feratur circa *Fig. 13.*  
centrum F, alterum verò B circa centrum H, amboque incipiant eodem tarditatis gradu in terminis A, & B æqualibusque temporibus acquirant æquales gradus maioris celeritatis, ita tamen ut mobile A velocitatis incrementum suscipiat eadem proportione, qua elongantur illius radij F A, F T, F M, & F P, mobile verò B, proprias amplificet velocitates inuerso ordine, eadem scilicet proportione, qua decurrantur radij H B, H L, H D, & H E; supponamus autem mobile A suo motu ellipsim describere A M P circa proprium polum F, sitque A P axis maior huius ellipsis, pariterque supponamus radios maximos, qui sint exempli gratia F P, & H B æquales esse inter se, sicuti minimos quoque radios F A, & H E inter se itidem æquales; aio mobilem B pariter designaturum ellipsim B D E similem, & æqualem ipsi primæ, quoniam ambo mobilia motus initium sumunt ab A, & B, eodem tarditatis gradu, æqualibusque temporibus ambo æquales maioris celeritatis gradus adipiscuntur; ergo maximi velocitatis gradus temporibus æqualibus acquisiti, sicuti etiam mediocres gradus inter maximos & minimos erunt æquales inter se, & quoniam eorum alterum velocitatem auget, secundum proportionem incrementi radij F A, aliud verò imminutionis radij H B, ergo cum ambo ad mediocrem celeritatem peruenerint inter maximam, & minimam, tam incrementum minoris radij F A, quam decrementum maioris H B mediocritatem inter maximum, & minimum radium adepti erunt; cum autem tam radij maximi F P, & H B, quam minimi F A, & H E æquales sint, radij etiam mediocres, qui sint exempli gratia F M, & H D inter se erunt æquales; quoniam autem A M P supponitur ellipsis, cuius maior axis A P, polum verò F, si alius polum S reperiatur, iunganturque radij S T, S M (ex lem-mate præcedenti) incrementes celeritatis gradus acquisiti periodo augmenti radiorum, qui circa polum F reuoluan-

tur, æquales erunt celeritatis gradibus incrementibus acquisitis periodo decrementi radiorum, qui torquentur circa polum S; sed ex hypothesi celeritatis incrementibus gradibus acquisitis periodo decrementi radiorum circa polum H, æquales sunt celeritatis gradibus acquisitis incrementibus periodo latorum radiorum circa polum F; ergo incrementibus gradibus celeritatis acquisitis periodo decrementi radiorum, qui aguntur circa polum H, æquales erunt gradibus velocitatis acquisitis periodo decrementi radiorum, qui torquentur circa polum S; quoniam verò ambo ceperunt ab eodem tarditatis gradu in B, & A, ac temporibus æqualibus æquales celeritatis gradus adipiscuntur, idcirco angulos æquales percurreunt B H L, & A S T, suntque maximi radij H B, & S A æquales inter se, quemadmodum radij quoque H L, & S T sunt pariter æquales, temporibus enim æqualibus æqualiter decreuerunt; ergo prædictarum figurarum altera debite alteri superposita punctum B congruet puncto A, punctum verò L ipsi T; ac ita de cæteris; proindeque figuræ D B E, & A M P sibi mutuò congruent; atque idcirco D B E, erit ellipsis similis, & æqualis ellipsi A M P. Quod erat, &c.

*LEMMA SEPTIMUM.*

**S**I circa alterum polorum alicuius ellipsis mobile reuoluatur, eodemque tempore eius axis maior torqueatur circa eundem polum in eodem ellipsis plano, & versus easdem partes, ad quas fertur prædictum mobile, linea à mobili descripta in Vniuersi spatio ellipsis non erit, sed curva quedam inflexa ad instar nodi.

*Fig. 14.* Sit ellipsis A B P, cuius axis maior A B, polum S, percurrat autem mobile ellipticam lineam A B P ita tamen, ut dum mobile fertur per ellipsim, axis quoque A P simul cum integra ellipsi torqueatur circa eundem polum S, ac in eodem plano, in quo ellipsis prædicta sita est, ita ut eodem tempore, quo mobile integram reuolutionem absoluit, &

reuertitur in A, axis P A perueniet ad situm X Z, dico iam, lineam descriptam à predicto mobili in spatio mundano ellipsim non esse, sed lineam quamdam inflexam, atque contortam qualis est A D E X; quoniam eodem tempore, quo mobile descendens ab A percurrit arcum A B, si axis A P simul cum sua ellipsi quiesceret, profectò mobile præcisè peruenisset ad punctum B remotum à polo per spatium in B S; sed quia eodem tempore prædictus axis A S tendit ad easdem partes, inciditque supra lineam S C, tunc necesse est, vt etiam punctum B eiusdem ellipsis antèrius sit progressum versùs D angulo quidem B S D æquali angulo A S C, ac idcirco mobile apparebit in D, cum descripserit curuum iter A D incidens extra ellipsim A B P. Pariter postquam per E, transieritque distantiam minimam per totum ellipsis arcum P G, cum axim longo antèierit interuallo, vtque ad situm S F spatium anguli A S F, mobile pariter distans apparebit à puncto G per angulum G S H æqualem angulo A S F, ideoque mobile non apparebit in G, sed in H, & quousque latitudo G H minor est amplitudine ellipsis G B, punctum H cadet intra ellipsim P G A, cum prius extra appareret in D. Denique postquam axis S F percurrerit totum angulum F S X, eodemque tempore stella pertransierit propriæ ellipsis residuum arcum G A redieritque iterum ad maximam distantiam à polo, mobile non erit in A, sed in X, ideoque extra ellipsim A B P; quapropter necesse est, vt prius ellipsim lecet, ac primum iter A D in puncto I; ergo patet, &c.

**LEMMA OCTAVVM.**

**S**I mobile iter describat ellipticum circa punctum aliquod tanquam polum, eiusque celeritas augeatur eadem ratione, qua decurrantur radij polares, deinde verò imminuatur eadem proportione, qua iidem radij producuntur, absoluatque periodus integer reuolutionis minori tempore, quam sit illud, quo peragitur incrementum, & de-

crementum prædictorum radiorem, mobile in spatio mundano describet lineam quamdam curuam in se ipsam contortam ad instar nodi, sed tamen apparebit translaturum per ellipsim, non quidem fixam, sed mobilem, circa eundem polum, ac versus easdem partes.

Circa punctum S tamquam polum reuoluatur mobile A elliptico motu, incipiens à summa tarditate, ex qua continue acceleratur illius motus eadem ratione, qua radii polares decurrantur, integerque circuitus huiusmodi mobilis circa centrum S, & respectu mundani situs absoluaturs tempore R, periodus verò totius decrementi incipiens ab A S maxima distantia à polo per minimam transiens, deindeque rursus increfcens, quousque redeat ad maximam distantiam à qua discessit, absoluaturs tempore maiori V, iam dico, iter descriptum in Vniuersi spatio à mobile A curuum futurum esse, atque contortum, quale est A I B E H X, sed tamen per mobilem ellipsim apparituram, cuius axis à situ A S, percurrat ad situm S X. Quoniam tempus reuolutionis respectu spatij mundani minus est tempore periodico incrementi, & decrementi radiorum, ergo eorum medietas, aliæque partes proportionales erunt pariter inæquales, proindeque cum mobile medietatem reuolutionis pertrāserit ab A vsque ad P, radiorum polarium incrementum adhuc perdurabit aliquo temporis interuallo vsque ad E, ibique erit minima polaris distantia S E, hæc autem producta in directum secet ellipsim A B P in L, & K; ergo linea à mobile descripta progredietur procul à puncto P, ac extra semiellipsim A B P, punctum verò E cadet intra ellipsim A P K, eo quod S K maior est, quam S P, & quam S E; postea, quia tempus quòd requiritur ad percurrendum circulariter spatium ab infimo situ E vsque ad oppositum F constitutum in eadem recta linea E S F minus est tempore, quo absoluitur periodus omnium incrementorum radiorum, à minimo scilicet S E, vsque ad maximum S X, ergo vt mobile perueniat ad terminum X, alio quoque tempore opuserit, ideoque prædictum punctum X, quatenus

magis

magis remotam ab  $S$ , quam sit  $L$ ,  $S$  valde recedet à prima ellipfi, atque à linea, quam ab initio descripsit mobile; quapropter necesse erit, vt prius se secent in aliquo puncto veluti in  $I$ .

Deinde quoniam eadem linea curva  $A I B E H K$  describitur cum mobile torquetur reuera circa ellipfim  $A P$  translata circa polum  $S$ , cumque mobile semper situm esse debeat in vnico loco, hinc est quod cum nos persuasi simus, quod vbiicumque mobile maximè remouetur à polis ibi reperiatur terminus maioris axis illius ellipsis, quam concipimus à mobile designari, neque obseruemus contortam lineam à mobile proprio itinere in mundano spatio descriptam, meminimus tantum illius primi conceptus, ac idcirco censemus, totam ellipfim e loco ad locum transferri, à situ scilicet  $A P$  ad situm  $E X$  circa eius polum  $S$ ; quod, &c.

*Pronunciata seu principia philosophica apprimè necessaria ad intelligendas causas eccentricitatum orbium Mediceorum Syderum, figuraeque elliptica ab eis descripta, rectique motus in lineam absidum eorumdem. Cap XI.*

**C**Um iam satis declarauerimus fundamenta structuræ motus elliptici, ac proprietatum eiusmodi motionibus competentium iam super est, vt ad applicationem descendamus, ostendentes, ex his quæ in abstracto pronunciamus, quomodo fieri possint motus elliptici in ipsis planetis, præsertimque in Mediceis; deducemus autem hæc omnia ex suis phisicis causis, ac denique demonstrabimus non solum esse possibile, sed verosimile, & proprie dixerim necessarium, Naturam ipsam tali pacto operari.

Primum autem queritur, qua necessitate planetæ nunquam deferant circulos ab ipsis semel descriptos, aut sese remouentes à globo quem circumueunt percurrentes mundanum spatium per diuersa loca, aut se admouentes, quo-  
usque

nisque centrali globo uniantur, quem circumuehit, hoc  
 autem docemur Naturæ lumine tribus modis posse saluari,  
 primò si planetæ aliquo vinculo corporeo alligentur præ-  
 dicto centrali corpori, qualis esset v. g. funis seu rota solida,  
 quæ soli ipsi alligata nunquam permetteret planetam ab eo  
 magis remoueri, quam concedat longitudo prædictæ funis,  
 seu rotæ solidæ radij. Secundo si eum aliquibus suppona-  
 mus ætheream auram habere circa solem quoddam quasi  
 confinium determinatæ consistentiæ, ac raritatis, veluti  
 oceanum aqua, in cuius ætheris externa superficie planetæ  
 corpus innatet veluti nauis in aqua nostrâ; & licet arduum  
 videatur, corpus solidum atque densum, vt est planeta, pos-  
 se à suprema rarissimæque æthereæ regione sustentari, mul-  
 tis tamen modis reddi posset verisimilis eiusmodi effectus,  
 primò supponendo, quod virtus quasi magnetica, qua eius-  
 modi planeta nititur se ipsum solari corpore admouere,  
 dum ipse in prædicta innatat superficie augeatur non secun-  
 dum grauitatis leges, hoc est, quo magis augmentatur pars  
 densa, ac materialis, eo magis talis conatus sese mouendi  
 versus Solem pariter augeatur cuius rei, vel ex eo deducere  
 possumus argumentum, quod accipientes pilam ferream  
 intus cauam, ac aere plenam conspiciemus ipsam maximo  
 impetu, atque energia ad magnetem appropinquare, quod  
 quidem non continget pilæ marmoreæ aut aureæ, licet gra-  
 uissimæ: secundo impossibile non est virtutem magneti-  
 cam per quam planeta conatur Soli sese admouere debilio-  
 rem esse, ac minoris energiæ, quam virtus eiusdem supremi  
 ætheris, ita vt non ex maiori copia materiæ ipsius planetæ,  
 sed ex maiori, & minori facultate magnetica eiusmodi ef-  
 fectum prouenire censeatur, ac idcirco impossibile non es-  
 set corpus planetæ in suprema regione ætheris innatare  
 veluti in quodam oceano, qui cum possit difforem habere  
 densitatē, poterunt in diuersis profunditatibus distantijs  
 que ab ipso Sole alijs, atque alijs planetæ innatare, eodemque  
 modo in diuersis à Ioue distantijs quatuor Medicei planetæ,  
 quod quidem multis exemplis posset confirmari, ac præci-  
 pue

puè experimento vasis partim oleo saxi repleti, partim vero spiritu tartari vini, aliisque similibus, in quo immittuntur globuli vitrei aere pleni, ita aptati, ut in qualibet superficie prædictorum liquorum aliquis globulus supernatet, reliqui vero nequaquam.

Supponendum quoque esset vltimum confinium vniuscuiusque ex prædictis oceanis æthereis figuram habere non quidem exactè sphericam, sed gibbam magis ex vna parte, quàm ex alia, talique pacto motus planetæ supernatantis posset se se eccentricum exhibere; verùm enim verò quoniam ex hisce duobus modis primus observationibus ex sensu ipso petitis iam falsitatis, euincitur, secundus verò multis difficultatibus implicatur, idcirco cogimur eos ambos deserere, & videre an certiori, & faciliori modo saluari possint eiusmodi apparentiæ absque absurda illa cælestis, substantiæ soliditate, & prædictis oceanis æthereis, hoc autem consequemur supponentes id, quòd videtur non posse negari, quòd scilicet planetæ quemdam habeant naturalem appetitum se vniendi cum mundano globo, quem circummeunt, quòdque reuera contendant omni conatu ipsi appropinquare, planetæ videlicet soli, Medicea verò sidera Ioui. Certum est insuper quòd motus circularis mobili impetum tribuit se remouendi à centro eiusmodi reuolutionis, quemadmodum experimur in rotæ, seu fundæ gyro, quo lapis acquirit impetum recedendi à centro suæ reuolutionis; supponamus igitur planetam niti Soli ipsi appropinquare, quoniam interim ob circularem motum impetum acquirit se se amouendi ab eodem centro solari, hinc est, quòd dum æquales euadunt vires contrariæ (altera enim ab altera compensatur) neque vicinior, neque remotior fieri potest ab ipso Sole ultra certum, ac determinatum spatium, ideoque planeta libratus apparebit, & supernatans.

Prædicta autem assertio confirmari poterit sequenti experimento: sumatur circulus ligneus A B C, cui diameter aptetur pariter linea A B eius verò centro D aptetur axiculus

Fig. 157

lus

lus, seu virga D E plano circuli A B C erecta, ac eidem  
 centro D apponatur portio aliqua magnetis F, cuius polus  
 meridionalis respiciat punctum A, deinde hæc omnia ita  
 composita innatent in aqua Stagni R S, in G autem adsit,  
 portio aliqua suberis supra quam sit globulus aliquis fer-  
 reus I, possit autem huiusmodi suber simul cum ferreo glo-  
 bulo supposito liberè natate in ipsa aqua, deinde verò suber  
 prædictum G admoueat magneti F, quousque incidet in  
 spheram actiuitatis eiusdem magnetis, vsque scilicet ad eum  
 situm, ex quo ipse ferreus globulus incipit lentè appropin-  
 quari ipsi magneti, tunc verò manu Horizontaliter cir-  
 cumgiretur extremum punctum E ipsius virgæ, vt nimirum  
 à semidiametro A D transferatur suber G simul cum ferreo  
 globulo supposito: supponamus autem quòd ferreus glo-  
 bulus I innatans moueri possit tempore vnus in nati secun-  
 di horarij ex G in H appropinquans magneti F, sed eodem  
 tempore feratur prædictus globulus ferreus per arcum H L,  
 qui motus circularis adeo velox fieri potest, vt tempore  
 vnus secundi minuti impellat mobile innatans I per tan-  
 gentem H K, vt exigit natura circularis motus per spatium  
 L K, & remotionem efficiat æqualem ipsi G H, ideoque  
 eodem tempore 1. m. sec. cum magneti appropinquatio  
 G H sit æqualis remotioni L K ortæ ex vertigine circularis  
 motus; hinc erit quod distantia, seu radius D K erit æqualis  
 semidiametro D G; cum autem ferreus globulus innatans  
 I temporibus insequentibus, immo omnibus temporis in-  
 stantibus perseueret in eodem conatu, hoc est eodem mo-  
 do appropinquet magneti F, sicuti idem circularis motus  
 pariter perseuerat in eadem depulsione, hinc sequetur,  
 quod per integrum circuitum innatans ferreus globulus I  
 equaliter semper distabit a magnete, & a centro D ideoque  
 describet circuli peripheriam absque vlla deuiatione, hoc  
 autem sequetur etiam si globulus innatans nulli solido  
 corpori alligetur, aut ab externa facultate retineatur, sed  
 fluat per medium liquidum, quod nullo pacto impediat  
 prædicti corporis appropinquationem ipsi magneti, ac cen-  
 tro



tro D; sed multò facilius hoc experiri potest absque magne-  
te, si nimirum virga lignea A B non sit directa, sed inflexa  
in D, vt nimirum duo radij A D, & D B angulum obtusum  
efficiant circa infimum punctum D, atque axiculus E D,  
angulos deinceps acutos E D A, & E D B efformet. Po-  
stea excavetur canalis directus, & leuigatus in radio A D,  
vt in eo pila grauis G descendere possit per canalem incli-  
natum ab A, ad D. Si postea conuertatur horizontaliter  
machina A B reuoluto axiculo E D, dum pila G in canali-  
culo descendit versus D, atque huiusmodi vertiginis velo-  
citas ita moderetur, vt æquali vi expellat pilam G versus A,  
ac illa nititur naturali pondere descendere per canalem D  
versus centrum, tunc profectò æquatis viribus contrarijs  
in tota reuolutione per arcum G K, pila æquè recedere con-  
spicitur à centrò suæ reuolutionis D. Qua propter si eodem  
modo concipiamus in spatio æthereo planetam I, qui natu-  
ralem habeat instinctum appropinquandi Soli D, simulque  
in orbem feratur circa idem solare centrum tali celeritate,  
quæ sufficiat ad remouendum planetam præcisè tantum,  
quantum ipse in vnoquoque instanti Soli appropinquaret  
dudum profectò non est, quòd hisce duobus motibus  
contrarijs sese inuicem compensantibus stella I, neque ad-  
mouebitur, neque remouebitur ab ipso Sole D maiori spa-  
tio, quam semidiameter D G, ideoque librata, & innatans  
apparebit, aut retenta ab aliquo firmo vinculo, quamuis si-  
ta sit in æthere fluidissimo nullique rei innitatur, & à nulla  
sustentetur; hæc autem omnia euenire possent sine intel-  
lectualibus, vel angelicis facultatibus, sed viribus Naturæ so-  
lummodo; ideoque absque illa difficultate planetæ possent  
perseueranter Solem ipsum, vel Iouem circum ambulare,  
neque possent remoueri, vel à semita aberrare, quamuis  
æther sit fluidissimum.

Secundo loco debemus considerare, qua virtute plane-  
tæ circa Solem agantur, vel circa Iouem, hoc est an vis eius-  
modi sit ab intrinseco, ac naturali principio, an ab externo,  
& violento, aut ab ambobus; si autem hoc principium in-

ternum est, quæritur an sit animasticum, ut principium motus animalium, an naturale veluti propensio corporum grauium ad descendendum, seu appetitus, quo magnes ferro appropinquatur; si verò prædicta virtus externa est, quæritur an pendeat ab intelligentis, seu mentibus angelicis, an verò sit similis motui projectorum. Multi ad animam intelligentiasue cōfugiunt, veluti ad sacram anchorā, ut motuum planetarum rationes reddant, qui simplices non sunt, veluti lapidis descensus, sed maximo artificio perficiuntur; concipere enim nequeunt, quomodo planeta per liquidum æther possit constanti lege moueri per circulum eccentricum absque vlla deuatione, tantisque artificiosis anomalis, quæ in eius circuitu obseruantur, cum contra talem finem facillimè consequamur supponentes, ibi ducem adesse nedum oculatum, verum etiam intelligentem, qui ipsum ducat planetam debito itinere absque vlla transgressione. Verum enim verò licet huiusmodi assertio à plerisque admittatur, tamen nullus prorsus reperitur qui in dubium reuocet, quod, si possibile esset motionum planetarum causas assignare merè naturales, confugiendum non esset ad animam, seu intelligentiam, quemadmodum nemo (ut reor) sibi suadebit, motum, quo grauia tendant ad ipsam Terram linea omnium breuissima, pendere ab anima, aliaue Intelligentia, quæ propriam sedem habeat in saxis, ac deorsum impellat; possibile enim est, ac minori quidem labore, atque dispendio, ut natura eiusmodi consequatur finem mediante aliqua simplici naturali facultate, quæ grauitas appellatur.

Quoniam verò præcipua ratio ob quam ad intelligentias contugiunt in motibus planetarum ex eo petitur, quia scilicet eorum cursus solertia nimia, & artificio peraguntur, ita ut verisimile non videatur facultate aliqua naturali simplici, ac cæca planetas non solum suspendi absque vlla titubatione in æthere fluido, verum etiam per eccentricum circumuolui, immò (quod magis mirandum est) per ellipsum, aut lineam ellipticæ propriorem: eorum Apogea in antero-

ra progredi; nodos autem in posteriora firma, ac stabili lege, ac methodo, tandemque in tanta circuitum varietate nunquam vacillare. Si igitur nos ostenderimus hæc omnia effici posse ab vna simplici naturalique virtute, siue interna, siue externa, nihil nobis opus erit confugere ad alias machinas.

Primum autem sensus ipse videtur ostendere, quod in motibus circularibus orbis ex interna, naturalique virtute, aut ab externa, ac violenta illi, qui per maiores circulos peraguntur (eadem tamen motiva vi) semper illis tardiores sunt, qui circa minores circulos reuoluuntur: ita graue aliquod corpus pendulum proprias efficit oscillationes circa suæ suspensionis centrum; hæc autem procul dubio fiunt ab intrinseco, ac naturali principio, scilicet à grauitate prædicti penduli, quod spontè, ac per se absque alia vi externa impellente proprias efficit vibrationes; hic autem videmus quod dum pendulum prædictum vltro citroque percurrit, si filum, quo suspenditur, producat, statim eius motus tardior euadit, si verò contra decurtetur, statim velocior sit; ergo in circuitibus à vi naturali peractis necesse est, vt producto gyro mobile circuitum absoluat maiori tempore, & è conuerso; si vero vtamur aliqua virtute externa impellente gyRANDO scilicet prædictum pendulum per alicuius circuli peripheriam, videmus, quod si postquam talis impulsus pendulo impressus fuit, filum ipsum producat, & circuitus amplificentur, motus retardatur, si verò decurtetur filum, circuitusque restringantur, acceletatur. Idem contingit in parua libra dentati horologii, in qua solent aptari duo pondera æqualiter remota ab eius axi, pariterque hic videmus, quod eadem virtus eiusdem præmentis ponderis maiori velocitate libulam gyrat, omnesque alias rotas, cum pondera prædicta propinquiora sunt centro propriæ reuolutionis, & è conuerso; quapropter circulares motus, seu propria, seu extranea virtute peracti, quotiescumque circuitus amplificatur, ob semidia nostri productionem longiori absoluuntur tempore, & è contra. Si igitur supponamus planetæ

corpus vi intrinseca circa Solem torqueri, seu circa Iouem; seu potius circumgyrari ab impulsu solariū radorum, dum ij simul cum solari vertigine circumferuntur, ac id ipsum contingat in Ioue, nulla aderit difficultas in retardanda planetae velocitate; quotiescumque enim remotior erit a Sole describet circulum ampliorem, proindeque retardabitur; contra verò cum Soli vicinior fiet, angustiore circulum designabit, ac idcirco fiet concitator. Quamquam autem alicui videatur satis probata huiusmodi propositio ex prædictis experimentis, hæc tamen non sufficiunt, neque carent fallacijs; quapropter necesse est vt subtiliori indagine id ipsum perpendamus, ac primùm aio, verum non esse, idem mobile semper ab eadem virtute motiua intrinseca translatum, ac modò percurrens maiorem circuli peripheriam, modò verò minorem, per minorem circulum concitatiore motu cieri, quàm per maiorem; progreditur enim eadem velocitate per ambos circulos inæquales, hoc est temporibus equalibus equalia spatia pertransit, vt si verbi gratia idem mobile B latum ab intrinseco sui principio semper sibi ipsi vniformi, modò feratur per circuli peripheriam B C, cuius radius A B, modò verò per circumferentiam B E, cuius semidiameter B D, falsum erit, idem mobile equalibus temporibus maius spatium pertransire per circumferentiam B E, quam pertranseat per circumferentiam B C; hoc autem probatur ratione habente pro fundamento lumen ipsum naturale, atque experientia.

Ac primùm quidem, cum supponamus, motricem facultatem mobilis B constantem esse, neque vnquam augeri, neque diminui, necessarium profectò est, vt eiusmodi facultas temporibus equalibus spatia pertranseat equalia; varia autem directio, seu inclinatio, aut curuitas dictorum motuum nullam alterationem afferunt prædictæ motrici facultati, neque eius vniformi operationi, id est celeritatis; ergo temporibus equalibus idem mobile B fertur equalibus velocitatibus, ideoque pertransibit equalia spatia B C & B E. Verum quidem est, quod arcus B E maior erit, quam

ut similis sit arcui  $BC$ , quod scilicet angulus ad centrum  $BDE$  ad angulum  $BAC$  eandem reciprocam rationem habebit, quam habent radij predictorum circularum, hoc est erit ut  $AB$ , ad  $BD$ , quoniam facto angulo  $BDI$  æquali angulo  $BAC$ , arcus  $BC$ , &  $BE$  erunt similes inter se, cum autem idem arcus  $BC$ , &  $BE$  sint æquales, habebunt ad communem arcum  $BE$  eandem proportionem; est autem arcus  $BC$  ad sibi similem arcum  $BE$ , ut radius  $AB$ , ad radium  $BD$ ; ut verò arcus  $EB$  ad arcum  $FB$ , ita est angulus  $EDB$  ad angulum  $FDB$ , seu ad angulum  $BAC$ ; igitur angulus  $EDB$ , ad angulum  $BAC$  habebit eandem rationem, quam radius  $AB$  ad radium  $DB$ .

Experimentum verò aptissimum ad hanc veritatem comprobendam erit huiusmodi: sumatur funependulum  $B$ , centro, seu clavo  $A$  suspensum, fiatque distantia  $BD$  minor *Fig. 16.* longitudine fili  $AB$ ; in  $D$  autem alius figatur clavus, fiatque angulus  $CAB$  æqualis angulo  $BDI$ : deinde pendulum transferatur ad situm  $AC$ , eique permittatur descensus versus situm  $AB$  horizonti perpendicularem, dubium profecto non est in suo casu per arcum  $BC$  in situ  $AB$  pendulum acquisivisse certum aliquem velocitatis gradum, quo fertur per circumferentiam descriptam breviori pendulo  $BD$ , experientia constat, quòd arcus transactus  $BG$  subtendit angulum ad centrum  $GDB$ , qui ad angulum  $BAC$  subduplicatam reciprocam proportionem habet ea, quam pendulorum longitudines habent inter se, hoc est facta  $IB$  media proportionali inter  $AB$ , &  $BD$  experientia, inquam, ostendit, quod angulus  $GDB$  habebit ad angulum  $BAC$ , siue ad angulum  $BDI$  eandem rationem, quam habet  $IB$  ad  $DB$ . Hoc experimento supposito demonstrari debet velocitatem penduli  $AB$  æqualem esse velocitati penduli  $DB$ ; quoniam circularum peripheriæ, seu arcus similes eandem rationem habent, quam semidiametri  $AB$ ,  $DB$ ; ergo arcus  $BC$  ad arcum  $BE$ , est ut  $AB$ , ad  $DB$ , arcus verò  $GB$  ad arcum  $FD$  eandem habebat proportionem, quam  $IB$ , ad  $BD$ ; ergo arcus  $CB$  ad  $GB$ , est

ut

vt A B ad I B; deinde verò quoniam tempora oscillationum per arcus C B, & B G subduplam habent rationem eius, quam habent pendulorum longitudo inter se (vt ego alibi demonstraui, ac experientia ipsa testatur) ergo spatium C B ad spatium G B eandem habebit rationem, quam habent tempora, quibus predicti transitus à pendulo peraguntur; sed cum tempora sunt proportionalia spatijs transactis celeritates æquales sunt inter se; ergo celeritas penduli A B æqualis est celeritati penduli B D.

Illi autem qui vim eiusmodi demonstrationis non percipiunt poterunt saltem suaderi ab eiusmodi experimento: Supponatur funependulum A B quadruplum penduli D B, permittaturque prius vt ipsum pendulum circa ambo centra A, & D feratur, hoc est à C per B in G, & à G in C, ac numerentur quatuor oscillationes, quæ fieri supponantur spatio duorum scrupulorum secundorum horæ præcisè, deinde ablato clauo D liber permittatur excursus ipsi pendulo per circumferentiam semidiametri A B, reperitur enim quod in 2. m. sec. horarijs prædictum pendulum peragit tres solummodo oscillationes. Tandem reposito clauo D ipsique alligato filo, ita vt pendulum B D hinc inde feratur per circumferentiam circuli B G, inueniemus quod in 2. m. sec. prædictum pendulum sex oscillationes efficit, sed pendulum A B circa centrum A eodem tempore tres ex illis peragebat; ergo tempore quo pendulum maius vnã efficit oscillationem, pendulum minus duas peragit, ideoque tempore quo maius pendulum semioscillationem efficit per arcum B C, minus pendulum medietatem suæ oscillationis per arcum B G medietate prædicti temporis absoluet; pendulorum ergo natura exigit quacumque celeritate agitentur vt tempus oscillationis penduli A B, duplum sit temporis oscillationis penduli D B, quotiescumque huius longitudo quarta pars fuerit longitudinis illius. Habemus autem in compositis vibrationibus quatuor semioscillationes C B, & quatuor semioscillationes B G, hoc est habemus duas oscillationes penduli maioris A B, & duas

duas oscillationes penduli B D, at duæ oscillationes penduli maioris peragantur 1. m. sec., & 20. m. ter., scilicet duobus tertijs temporis 2. m. sec., cum tali tempore ipsum tres fecisset oscillationes, & duæ oscillationes minoris penduli D B peraguntur tertia parte eiusdem temporis, cum ipsum sexies oscillaret; ergo tempus quod insumit in percurrendo arcu B G pendulum minus, est præcisè medietas temporis consumpti in percurrendo arcu maioris circuli B C proindeque eandem proportionem habebit spatium C B ad spatium G B, quam habet tempus transitus per C B, ad tempus transitus per G B; verùm cum tempora sint proportionalia spatijs peractis, celeritates sunt eadem; ergo temporibus æqualibus æqualia spatia pertransibunt.

Hinc deducitur, quod cum virtus motiva intrinseca est cuiuslibet mobilis, semperque perseverat eiusdem roboris, necesse est, vt eius celeritas perpetuò sit vniformis, ideoque temporibus æqualibus æqualia transigat spatia in qualibet linea, & cuiuslibet figuræ, prædictum mobile ferri conetur, proindeque, licet pendulum circuliue semidiameter producat, vel decurtetur, numquam tamen possibile est, vt celeritas vllam subeat alterationem, sed semper temporibus æqualibus æqualia spatia pertransibit. Quoniam igitur nos in planetarum motu à sensu ipso docemur, physicam quamdam inesse, ac realem motus inæqualitatem, quod scilicet reuera temporibus æqualibus non transigunt æqualia spatia ipsius lineæ, aut semitæ per quam feruntur, cogimur aliam rationem dictæ inæqualitatis vestigare; ideoque necesse est, vt concedamus motricem vim ipsius planetæ non semper eandem perseverare, sed modo augeri, modo autem imminui, aut opus est vt confugiamus ad causam aliquam externam; ob quam vniformis cursus planetæ naturaliter ipsi conueniens acceleretur, ac retardetur.

Quantum autem ad primam, cum videamus, cursum cuiuslibet planetæ nunquam accelerari, nisi cum Soli appropinquat, ac eomagis, quo magis vicinior fit; contra verò cum remotior euadit, progrediatur inuerso ordine (phy-

sicè

ficè enim proprium motum retardat ratione excessuum prædictarum remotiorum) hoc supposito tanquam ratio, atque perspecto dici posset, quod cum Sol sit veluti cor, seu fons vitalis motricis virtutis planetarum, quo magis ipsi planetæ eiusmodi fonti approximantur eo maiorem energiam, ac vim ab ipso suscipiant, ac sortiantur maiorem virtutem motricem, ideoque sint apti ad percurrentia loca Soli propinqua maiori impetu, ac celeritate per proprios orbis, quam percurrentia loca ab ipso Sole magis remota.

Sed antequam ad secundum modum descendamus aliqua præmittenda sunt, & primo loco ostendetur, quod quælibet vasta machina corporea in medio fluido natans pensilis, & æquilibrata ita ut non nino indifferens sit ad motum lateralem, poterit à quacumque potentia impellente licet pusilla moveri trasuersaliter. Supponatur sphaera vasta M, in medio fluido R S natans, ita æquilibrata, ut indifferens sit ad motum lateralem versus R, vel S, tunc quidem si auferantur omnia impedimenta externa, & præcipuè densitas fluidi, in quo sphaera natat, atque superueniat quælibet potentia motiua, ut est atomus P in motu constitutus ab R versus S, ut offendat sphaeram ad partes P, dico quod vasta sphaera M, necessario impelletur versus S. Quoniam sphaera M in quiete constituta supponitur non habere inclinationem, neque repugnantiam ad motum trasuersalem versus S, igitur tanta est eius inclinatio ad motum versus S, quanta est eius resistentia; si ergo addatur potentia impellens P, quæ indiuisibilis non est, sed quanta; necessario superabit resistentiam, quæ nullius roboris est, & propterea corpus ingens M remouebitur a sua primæua quiete, impelleturque versus S.

At quoniam aliqui recentiores, absque vlla ratione, sed propria auctoritate affirmant non posse corpus magnum M remoueri a sua quiete à corpusculo minimo P, decepti, ut suspicor à vulgari proprietate libræ radiorum æqualium, in qua minus pondus non mouet contrapositum maius pondus, & hinc regulam generalem deducunt, non animad-



uertens discrimen inter hanc, & illam operationem, demonstranda est falsitas huius asserti hac ratione. Quia corpusculum P supponitur non iners, & stabile, sed in motu constitutum, cumque motus concipi nequeat, quin aliqua velocitate efficiatur, igitur aliqua velocitas tribui debet corpusculo P, sit illa V B, & supponatur, quod inertia corporis M, ad motum acquirendum ad potentiam motiuam corpusculi P eandem proportionem habeat, quam moles corporea M, ad molem P, & fiat velocitas V B ad velocitatem X, vt moles M, ad P, scilicet vt inertia, & resistentia M ad potentiam impulsiuam P, tunc si supponatur moles M moueri versus R cum velocitate X, erunt iam duæ potentia, quæ motibus contrarijs se mutuò impellunt, & quia ex mechanicis momentum potentiæ impulsuæ P componitur nedum ex gradu suæ virtutis motiuæ, sed etiam ex velocitate V B, qua mouetur, & impellit mobile M, pariterque momentum ipsius M, componitur ex gradu suæ resistentiæ, & ex velocitate X, qua mouetur contra P, suntque proportionem potentiarum, & velocitatum eadem, & *Fig. 17.* reciprocè igitur momentum virtutis P cum velocitate V B æquatur præcisè momento resistentiæ M cum velocitate X, & ideò vna alteram non superabit, sed æquatis viribus ambo quiescent; hinc sequitur, si velocitas qua mobile M fertur versus R, minor esset, quam X, tunc quidem potentia P cum velocitate V B necessario superaret resistentiam M, cum velocitate minori quam X, & ideò necessario machina M transferretur versus S; hoc autem euidentius sequitur, si velocitas resistentiæ M supponatur nedum diminuta, sed prorsus indiuisibilis, & nulla, quandoquidem quiescens omnino absque vlla velocitate ponitur; igitur momentum potentiæ corpusculi P, cum velocitate V B multò magis superabit resistentiam machinæ M nulla velocitate contraria affectæ; quapropter necessario machina vasta M, à quocumque corpusculo impellente P remouebitur à sua quiete, & impelletur versus S.

Ostendere modo debemus, quod quodlibet corpus in

H

motu

motu constitutum, natum est ex sui natura eadem veloci-  
 tate ferri. Constat hoc experientia in proiectis, in quibus  
 post recessum mouentis derelicto mobili in sua libertate  
 perseverat in eadem motus directione, & multò clariùs in  
 pendulis corporibus, & natantibus, quibus à quocumque  
 impulsu exiguo, & debili agitatio imprimitur perseverans  
 in mobili etiam remoto, & ociante corpore impellente.  
 Hic tamen queri solet, quid sit, & qua ratione huiusmodi  
 impulsus imprimatur, & retineatur; huic instantiæ sic res-  
 pondere soleo: supponatur lignum supernatans in quiete  
 constitutum, pariterque adsit corpus aliud in motu con-  
 stitutum, hoc quidem si dum mouetur offendit lignum su-  
 pernatans, & quiescens, quòd indifferens est ad motum la-  
 teralem, nemò sanè miratur, si comprehensum, aut aliquo  
 instrumèto tractum, aut impulsu à corpore moto transfe-  
 ratur, & eadem velocitate moueatur, qua mouens fertur,  
 hic iam nihil aliud imprimi in lignum, seu nauiculam vide-  
 mus præter motum ipsum de nouo superadditum; hic ve-  
 rò motus ex sui natura nihil aliud est, quam migratio à lo-  
 co ad locum, & vt talis, natus est transferre lignum per  
 tantum spatium in tanto tempore; ergo licet vlteriùs non  
 inflet, & cum eo societatem non ineat corpus primò mo-  
 uens, poterit quidem nauicula iuxta motus naturam, quam  
 iam actu habet, moueri per tantum spatium in tanto tempo-  
 re; est enim lex Naturæ: vt motus nil aliud sit, quam mo-  
 tus, idest migratio, quæ talis non esset, si per se ex inguere-  
 tur absque vlla contraria resistentia; neque hic metaphora  
 illa usurpata à Gassendo (pulchra quidem, sed minùs apposi-  
 ta) locum habet, quando inquit, nauiculam tyrocinio  
 quodam assue fieri ad motum exercendum, dum impellitur  
 à mouente, quasi lignum doctrinæ, & disciplinæ capax es-  
 set; potius ergo dicendum, motum ex sui natura modum  
 esse tantum modo facile acquisibilem, quando quidem fie-  
 ri non potest, vt, quod actu mouetur, dum offendit cor-  
 pus indifferens ad motum, id pariter secum non transferat,  
 quæ translatio cum eius naturæ sit, vt perpetuò exerceri  
 pos-

possit, dummodo impedimentum, vel causa destruens non adueniat, sequitur, quod quilibet motus à quolibet principio pendens eius naturæ sit, vt possit continuari, & exerceri, scilicet vt tempore sequenti possit percurrere æquale spatium tempore æquale priori;


Tertio loco dico, quod motus eiusdem machinæ M, licet principio tardus, & insensibilis sit, poterit tamen augeri quousque eadem pernecitate feratur, quo potentia P impellit, dummodo velocitas impellentis semper eadem sit. Supponatur V B velocitas impellentis P, & in prima temporis particula transferatur machina M, cum parua, & insensibili velocitate C D, seceturque V A æqualis C D, & quia in secunda temporis particula mobile M non contra-  
*Fig. 17.*  
 ponitur, nec repugnat velocitati impellentis P, cum fiat ad eadem partes, & propterea potentia P impellet machinam M cum excessu suæ velocitatis supra velocitatem C D, ideò energia composita ex potentia motiua P, & velocitate A B, minor erit ea virtute, qua in prima particula temporis impulit machinam M, & ideò superaddetur velocitas D F aliquantò minor quam C D; & quia præcedens velocitas C D ex sui natura perseuerat in mobile M, igitur in secunda particula temporis mouebitur machina cum integra velocitate C F: rursus secta A E, æquali D F in tertio momento temporis mobile M impelletur nouo velocitatis gradu superaddito F H minori quidem quam D F, vnde totalis velocitas, quæ in tertia particula temporis exercetur à mobile, erit C H, & sic in reliquis subsequentiis temporibus semper velocitas augetur licet non æqualibus incrementis, vnde poterit coaceruari velocitas C L, vt tandem sit prorsus æqualis velocitati V B, quæ competit potentiæ impellenti P; dico iam quod in tali statu velocitas M perpetuò permanebit, neque vltèrius augebitur; quoniam potentiæ P velocitas V B, æqualis est velocitati C L, ergo tanta pernecitate  
*Fig. 17.*  
 machina M fugit, quanta potentia impulsiva P eam insequitur; igitur cessat omnino impulsus, sicuti si quis gladio exempto fugientis iugulum petat, & æquali velocitate ille  
 H 2 fu-

fugiat, hic verò sectetur, manifestum est, nunquam plagam ei inflicturum, itaque velocitas illa summa quæ machinæ M postremò impressa est, erit omnium maxima, nec ulterius augebitur, licet postmodum continuè potentia P subsequatur mobile M, partemque eius posticam continget quidem, non autem percutiet amplius; quare motus ipsius M, si fuerit circularis, poterit repetitis reuolutionibus perpetuò continuari.

Supposuimus in propositione, corpus impellens P perpetuo eadem velocitate V B vrgeri, & promoueri motum sphaeræ M, quod non videtur fieri posse, nam, licet corpus P, antequam incidat in M, velocitate maxima V B feratur, tamen, postquam cogitur moueri simul cum tarda machina M, cessabit illa præcedens maxima velocitas; tollenda ergo est huiusmodi difficultas, declarando, qua ratione hypothesis propositionis verificari possit: concipiatur ergo, corpusculum P esse vnum ex ijs innumerabilibus componentibus fluidum, aquam scilicet, vel aerem, vel ignem, & omnes illæ particule simul concipiantur ferri ab R, versus S eadem velocitate V B, veluti contingit in aqua fluente, vel vento; tunc quidem primæ particule P incidentes in superficiem globi M, efficientes primum impulsu resiliant hinc inde ad latera, postea subsequantur nouæ guttule eadem velocitate V B denuò impellentes machinam M, & sic semper vt contingit in rotis moletrinarum, & in alijs similibus machinis, tunc quidem quolibet instanti temporis particule aqueæ, vel aeræ eadem velocitate impellerent, & vrgerent mobile M; & quia omnes particule sunt eiusdem virtutis, quæ successiuè altera post alteram in eodem loco machinam impellit, & propterea æquialenter concipitur, & vsurpatur vna potentia P, successiuè impellens machinam M eadem virtute, & eadem velocitate V B.

His declaratis patet, Solem esse centrum systematis planetarij, & circa axem proprium verti, vt ostendunt reuolutiones macularum eius; & in tali vertigine solari radij eius efficacissimi poterunt profectò præntare, & impellere cor-  
pora

pora planetaria : quandoquidem , si lux substantia corporea est diffusa à solari corpore adinstar venti alicuius perpetui , deberet talis substantia radiosa reuolui quoque circulariter , sicuti solare corpus rotatur , & tunc quidem nedum possibile , sed etiam necessariò ab iisdem radijs corporeis translatis impelli deberent globi planetarum æquilibrati , & nantes in aura cælesti ætherea ; at licèt ab aliquibus hoc non admittatur , ponaturque lux quid incorporeum , dubitandum tamen non est , vim , & energiam aliquam habere motiuam , cum videamus terrena corpora ab iisdem radijs lucidis commoueri , & agitari , dum mouent particulas vegetabilium separando eas , & postmodùm subleuando cum reliquis vaporibus , & exhalationibus . Videmus quoque , flores planetarum motu locali cieri ab iisdem radijs solaribus , vt videre est in floribus pratensibus ; talis ergo facultas motiua radiorum solarium quantumuis debilis , & pusilla supponatur , potis erit , ex vi demonstrationis adductæ , impellere , & mouere corpora planetarum , eo quòd globi planetarum sunt etiam pensiles , & æquilibrati in æthere fluidissimo , nec inclinationem , aut repugnantiam naturalem habent ad motum transuersalem ; ergo à qualibet virtute motiua impellente poterunt moueri ; quare radij solares , quantumuis debiles supponantur , impellere poterunt corpora planetarum ; & licèt huiusmodi virtus motiua initio paruum , & insensibilem motum planetis imprimere posse videatur in progressu tamen motus ad insignem celeritatem augeri poterit , & ratio est , quia supponitur , quod quolibet temporis instanti radij solares reuoluti impellunt planetas , parum tamen , & insensibiliter , & talis velocitatis gradus minimus non extinguitur , sed remanet impressus , vt motus natura exigit : huic succedit secundus impulsus debilissimus eorundem radiorum solarium , qui impetum planetæ duplum reddit : idipsum tertius impulsus facit : idipsum quartus , ceterique alij insequentes , quibus mediantibus tandem ad maximam illam velocitatem deuenitur , quam imprimere possunt radij solares simul cum Sole in orbem acti . Huius  
autem



autem rei innumera, vt ita dixerim, exempla suppeterent, quorum nos breuitatis gratia vnum tantum seligimus: concipiatur vastissima nauis in placidissimo mari innatans, dubium non est, quod si ipsa tenuissimo trahatur capillo, aut a debilissima aura venti impellatur, moueri poterit ex vno in alium locum; quamuis autem initio ille motus adeo sit debilis atque tardus, vt nequeat obseruari, nauisque proinde ipsa quiescere videatur, patet tamen vnumquemque ex minimis illis impulsibus imprimi in ipsa nauis, ibique impressum manere, ac simul cum serie omnium impulsuum insequentium vim tandem producere, quae denique conspicua fiat, ac manifesta, proindeque obseruabilem reddat motum praedictae nauis; si igitur hoc videmus contingere vastissimo corpori, quod vt possit moueri, diuidere debet, & huc illuc agitare partes tantae molis aquae, eas ex vno loco transferendo in alium, immo superare repulsus, & affricus aquae circum labentis, quanto magis id contingere deberet si nauis praedicta innataret non in aqua, quae corpus satis consistens, ac tenax est, sed in mari liquidissimo, ac fluidissimo, nulliusque tenacitatis, qualis est aether ipse, nemo est, qui non videat, quod a vi motrice incomparabiliter debiliore, quam sit tenacitas muliebris capilli, vel debilissime aerae venti, posset proculdubio praedicta nauis e loco ad locum moueri. Non igitur perdifficile, ac incomprehensibile existimetur, causam motricem producere posse effectum seipsa maiorem, hoc est debilissimam vim mouere immensam resistantiam posse, cum hoc euicerit praecedens demonstratio; sed absurdus, & paradoxum videri alicui posset, si vis nedum debilis, sed tardissimo motu praedita imprimeret in mobile ingentem celeritatem centies, ac milles maiorem illa, qua ipsa met impellit, eo prorsus modo, ac si pigra vis limacis, siue testudinis producere posset impetum fulminis; nihilominus ego demonstraui in meo libello de ictus vi, & energia, in aliquo casu nedum possibilem esse, sed necessarium eiusmodi effectum; at praesenti instituto demonstrationes adductae, satisfaciunt vna cum enar-

rato

rato experimento nauis ab exili afflatu impulsæ, quo mediante, vel lumine ipso naturæ suademur, quod radij solares quantumlibet infirmam virtutem habeant, secum tamen rapere potuerunt, atque in orbem trahere planetarum corpora æquilibrata in æthere fluidissimo. Pariter radij motiui, quos Iuppiter diffundit, suaque vertigine circa proprium axem in orbem agit, quamuis debilissimæ supponantur facultatis, poterunt tamen secum circulariter rapere quatuor Medicea sydera in æthere fluidissimo.

Nunc superest, vt ostendamus, quomodo, & qua ratione motiua facultas, quæ in Sole, vel in Ioue reperitur, cum sit perpetuò eiuſdem gradus, & sibi ipsi vniformis, possit tamen modò maiorem, modò minorem celeritatem tribuere eidem planeræ, prout ipse magis, minusue appropinquat, vel remouetur à Sole, vel Ioue; hoc autem facillimo negotio absoluetur ex aliquibus principijs mechanicis, quæ breuiter recensebimus. Primum ergo supponendum est, corpus cuiuslibet planetæ, quamuis indifferens ad quemlibet motum transversalem, locatumque in fluidissimo æthere, tamen vt ab aliqua potentia possit à quiete remoueri, & gradum aliquem celeritatis adipisci, oportet, vt illa potentia sit quanta, non autem indiuisibilis; hoc autem idcirco euenit, quia quodlibet corpus quiescens aliquo pacto resistit illi potentiæ à qua moueri debet, talis autem resistentia æqualis esse debet potentiæ motrici, immo ea aliquantulum infirmior, hoc autem verum vniuersaliter est, abstrahendo à varijs situationibus, atque distantijs, quas habere potest mobile ipsum, ac potentia à centro reuolutionis, qua propter si concipiamus libram, aut vectem A B C vobis *Fig. 18.* libilem circa centrum seu fulcimentum S, eademque potentia sit in termino A, sed vna, & eadem resistentia modo in B, modo in C ponatur, ita vt distantia à fulcimento B S minor sit, quam C S, dubium non est, quin potentia sita in A indigeat minori vi, ad librandam, mouendamque resistentiam in B, ea, qua indiget, ad librandam mouendamque resistentiam sitam in maiori distantia C, quandoquidem

dem resistentia eiusdem mobilis in B, & in C eandem habet proportionem, quam distantia B S ad C S.

Sumo etiam ex mechanica disciplina, quod, dum aliqui cuius potentia actionem, motionemue consideramus, supra aliquam resistentiam, non solum respicere oportet potentia gradum, sed etiam velocitates, quibus potentia, ac resistentia mouentur: sit igitur D velocitas potentia A, & E sit velocitas resistentia B, & demum F sit velocitas resistentia C, certè ex ambobus componitur momentum, siue energia, qua & potentia, & resistentia operantur, ita vt gradus potentia A debeat simul cum sua celeritate æquare immò aliquantulum excedere gradum resistentia mobilis B sumptæ pariter cum propria celeritate E, & tunc profectò eorum momenta sese inuicem æquabunt, cum proportio potentia A ad resistentiam B eadem reciprocè fuerit, ac proportio E celeritatis ipsius B, ad D celeritatem alterius A: pariterque, vt momentum ipsius A, æquetur momento C, oportet, vt potentia A ad resistentiam C eandem proportionem habeat, quam velocitas F, ad velocitatem D; quoniam igitur momentum mobilis B æquale est momento A, pariterque momentum eiusdem A æquale momento ipsius C, necesse est, vt resistentia B ad potentiam A sit, vt velocitas D ad velocitatem E, atque vt potentia A, ad resistentiam C, ita velocitas F ad velocitatem D; igitur ex æqualitate perturbata, vt resistentia eiusdem mobilis B, ad suam resistentiam in C, ita erit F celeritas ipsius C ad E celeritatem ipsius B; sed resistentia eiusdem mobilis in B, ad resistentiam in C eandem rationem habet, quam distantia B S ad distantiam C S; ergo celeritas F, qua moueri debet idem mobile in C, vt æquet momentum ipsius A, ad celeritatem E, quam debet habere in B, erit, vt B S, ad C S proindeque mensura velocitatis, quam requirit in C, erit B S, mensura verò eiusdem mobilis in B erit C S.

Hoc supposito concipiatur, solare, vel iouiale corpus A S torqueri circa proprium centrum S, globus verò eiusdem planetæ modò sit propinquum Soli in B, modò verò

remo;



remotum in C, quoniam vis, qua Sol operatur, mouetque planetam, à suorum radiorum potentia mensuratur, qui semper iidem, & eiusdem energiæ sunt, & à celeritate propriæ vertiginis, quæ pariter manet inalterata, ac ex ambobus hisce eius momentum componitur, cum debeat hoc momentum æquari duabus resistentijs eiusdem planetæ in B, & in C, necesse est, vt contra minorem planetæ resistentiam in B maiori operetur efficacia, ideoque ipsum maiori celeritate conuertat, ea, qua vtitur contra maiorem resistentiam eiusdem planetæ sibi in maiori distantia C, quem proinde tardiori motu torquebit ea proportione, quam reciprocè habent resistentiæ, seu distantiæ, vt dictum est.

Declarato igitur quomodo planetæ motus in diuersis distantijs collocati à globo mundano, quem circumambit, moueri potest diuersis celeritatibus reciprocè proportionalibus eiusdem distantijs, iam superest demonstrandum, quomodo, & qua necessitate planetæ se se admouent, remouentque à globo, quem circumeunt, vt à Sole, & Ioue; hoc autem secundum erit elementum, quo componitur ellipticus planetæ motus. Vt eiusdem appropinquationis, & remotionis causam redderet Keplerus, commentus est vnâ planetæ faciem amicam Soli, oppositam autem inimicam, quemadmodum habet magnes partem, quæ ferrum allicit, aliam verò, quæ propellit; quod quidem commentum, quantumlibet ingeniosum, nequaquam aptari posse videtur planetarum apparentijs, ac idcirco cogimur ipsum deserere, præsertim, cum alijs modis possit Natura eiusmodi effectus operari. Videmus cuncta animalia perpetuam habere pulsationem in corde, hoc est perennem quamdam systolem, ac diastolem, quæ pariter obseruatur in arterijs: simili modo partes omnes animalis quamdam habent motum peristalticam, qua dilatantur, & constringuntur, ita vt possibile videatur, planetas talem habere agitationem, qua mediante appropinquent, atque discedant à proprio vitali fonte, circa quem ciantur in orbem, proindeque exerceant pulsationem ipsi cordi quodammodo similem.

Verum, si huiusmodi operationes, cum sint animalicæ, alicui non arriserint, suppetunt alia exempla naturalium operationum in quibus conspicimus effectus similes à cæca necessitate productos, talis est sine pendulorum operatio, qua per horas integras durant in exercendis proprijs huc illic oscillationibus, perpetuoque durarent, si impedimenta retardantia omninò remouerentur, sed satis erit animaduertere aliam naturalem operationem magis similem operatio-

*Fig. 19.* ni planetarum: aptetur cylindrus ligneus A B, ita vt perpendiculariter innatet supra aquæ libellam C D in vase R S, ita vt, cum talis cylindrus æquilibratur ipsi aquæ, pars C B demergatur, pars verò A D emergat supra libellam, quo quidem situ cylindrus manebit immobilis: subleuetur deinde idem cylindrus A B, ac transferatur in situm E F, vt pars emergens sit E D, palam est, dictum cylindrum in tali situ eleuatum mansurum non esse, sed descendendo se se in aqua ipsa demersurum; quoniam verò descensus cuiuslibet grauis omnibus instantibus temporis, quo ipsum descendit, affert illi novos, ac novos impetus, ac velocitatis gradus, ultra illum, qui suo ponderi conuenit; ergò, cum prædictus cylindrus perueniet ad situm A B, ibi non manebit immobilis, sed deorsum impelletur à celeritatis gradibus in præcedenti descensu acquisitis, perducaturque verbi gratia vsque ad punctum G; quoniam autem aquæ pondus semper eiusmodi descensui maiori proportione resistit, ac nititur in contrarium, vt lignum scilicet sursum propellat, hinc est quod successiue estinguuntur illi gradus à mobile acquisiti in præcedenti descensu, quousque extinctis omnibus, vis premens aquæ circumfusæ incipit operari, hoc est repellere sursum cylindrum ex G versus libellam aquæ C D; quoniam verò eo tempore, quo ascensus perdurat prædictus cylindrus continuè acquirit novos celeritatis gradus, ac impetus sursum ascendendi; ergò, cum perueniet ad situm B A, ob gradus celeritatis iam acquisitos ibi non sistet, sed adhuc sursum ascendet, quousque redeat ad situm E F, ex quo deinde iisdem rationibus superius allatis rursus descendet

det, ascendetque, quousque post varias sui demersiones, & emersiones maneat immobilis in situ A B sibi connaturali; hic autem notandum est, quod si penitus auferri possent impedimenta causæque accidentales, quæ continuè immi- nuunt, atque debilitant prædictas oscillationes ascensuum atque descensuum, quæ præcipuè pendent ex tenacitate, & corpulentia partium ipsius aquæ, & ex impulsibus eiusdem circumlabentis ipsum cylindrum, proculdubio oscillatio- nes prædictæ non solum ad longum tempus perdurarent, verùm etiam perpetuæ forent; videmus enim funependu- lum plumbeum, quod iisdem causis, proprios peragit itus reditusque, eos continuare per multas horas in aere, cum contra in aqua paucissimis oscillationibus eius motus extin- guatur; ergo si prædictus cylindrus innataret in fluidissimo æthere, auferretur penitus causa diminutionis illius ascen- suum, atque descensuum, ideoque talis motus deberet esse perpetuus, dummodo non adessent aliæ causæ ipsum re- tardantes.

Quoniam hoc ad rem, de qua agimus, plurimum con- fert, oportet, ut à proprijs fundamentis declaremus ratio- nem, ac necessitatem talis operationis, ac præterea indice- mus varietates, quæ in prædicta operatione contingere pos- sunt: aptetur ligneus cylindrus homogeneus F G, ut per- *De im-*  
pendiculariter innatet supra aquæ libellam A C, sitque *fid. bu-*  
aquæ gravitas in specie dupla gravitatis eiusdem cylindri, *mid.*  
cumque ex Archimede tunc quiescat cylindrus G F, cum *lib. 1.*  
mòles aquæ æqualis solido demerso æquè grauitet, ac vai- *prop. 5.*  
uerium solidum; igitur tunc quiescet, & fiet æquilibrium,  
cum pars demersa Y G semissis fuerit totius cylindri G F:  
postea a terminis G, & F ducantur duæ rectæ lineæ inter se  
parallele A D, & B C secantes aquæ libellam in A, & C,  
ducanturque ab occuribus A, & C duæ aliæ A B, & C D *Fig. 20.*  
parallele ipsi G F, atque parallelogrammi B D, latus B C  
secetur in partes equales, in M, N, O, P, ducanturque  
H M, I N, K O, L P parallele G F, secantes aquæ libellam  
A C, in V, X, Z, a, & intelligantur interceptæ parallele

I z

A B

A B, H M, &c. esse situationes eiusdem cylindri lignei  
 G F, ut nimirum in A B totus emineat supra aquam, & in  
 situ C D totus deprimatur, in locis vero intermedijs magis,  
 ac magis immergatur. Ostendendum est, quod gravitas  
 eiusdem cylindri ab A ad Y successiue minuitur, quousque  
 in Y prorsus extinguatur, & inde vsque ad C praeualet vis  
 repulsiva, seu leuitas, quae magis ac magis augetur, quo  
 magis deprimetur cylindrus versus C, eruntque gravitates  
 aequales leuitatibus, quae aequae ab intermedio loco G F di-  
 stant: ducatur recta linea A F, quae secet omnes parallelas  
 ipsi A B in punctis Q, R, S, T, E. Quoniam in triangulo  
 A D E recta G F parallela basi D E bifariam secatur in Y a  
 recta A C igitur reliquae omnes eidem basi parallelae bifa-  
 riam ab eadem secantur, proptereaque V H semissis erit  
 H Q, X I semissis I R, & sic reliquae omnes: abscindantur  
 postea portiones cylindrorum Q M, R N, atque ad dantur  
 portiones O S, P T, C E homogeneae eidem cylindro G F,  
 manifestum est, cylindrum H Q aequilibrari, & quiescere,  
 quia eius naturae est ex hypothesi, ut eius specifica gravitas  
 semissis sit aquae gravitate: eadem ratione equilibrati consi-  
 stent cylindri R I, S K, T L, & E D. Postea in situ A B gra-  
 uitas absoluta cylindri est totalis, nec prorsus imminuta;  
 igitur ut eius descensus prohibeatur sustineri debet a vi  
 contraria praecise aequali gravitati eiusdem cylindri A B;  
 secus autem in situ M H, nam eius portio H Q aequilibratur,  
 ut dictum est, cum ipsa aqua; apponitur autem supra consi-  
 stentem cylindrum H Q alia portio Q M; igitur, ne de-  
 mergatur, sustineri, atque suspendi debet cylindrica portio  
 Q M a facultate ei aequali. Hac portio ratione simplicem  
 contactum, nullam autem pressionem subiectus cylindrus  
 H Q patietur, sed quanta est vis illa, qua detinetur cylin-  
 drus H M, ne demergatur, tanta est eius gravitas; igitur  
 mensura huiusmodi gravitatis erit Q M, minor, quam A B.  
 Fig. 20. Pari ratione in situ I N portio cylindri I R aequilibrata con-  
 sistet, & reposita eminente portione N R, ut prohibeatur  
 demersio totius cylindri I N, sustineri debet a virtute aequae

li gravitati  $NR$ , & hæc erit gravitas eius in tali situ; est verò  $RN$  minor, quam  $QM$ , &  $QM$  minor, quam  $AB$ ; igitur, dū cylindrus demergitur successivè, eius gravitas minuitur, quousque omnino extingatur in situ æquilibri  $FG$ ; hoc profectò contingit propterea quòd sunt duæ virtutes contrariæ, quæ simul operantur, scilicet gravitas cylindri prementis, quæ semper eiusdem mensuræ est, & repulsus dependens à gravitate ipsius fluidi, qui in situ  $AB$  nullus est, cum aqua è suo loco non repellatur; in situ verò  $HM$ , portio aquæ  $VH$  è suo loco expulsa æquatur ponderi portionis cylindri  $HQ$ , ideoque à totali gravitate cylindri  $HM$  aufert aqua gravitatem portionis  $HQ$ , & ideo residua gravitas  $QM$  vigebit premetque, & sic in reliquis. Tandem in situ  $GF$ , cum vis, & repulsio ipsius aquæ æqualis propemodùm sit totali gravitati ipsius  $GF$ , nulla portio residua erit, ac proinde nullam gravitatem cylindrus in tali situ habebit.

Postea, quia in situ  $OK$  cylindrus ultra terminum æquilibrii demergitur, patet, quod in tali situ non consistet, & sursum ab aqua repelletur, & si quidem addatur portio cylindrica  $OS$ , tunc quidem cylindrus  $SK$  quiescet, & æquilibrabitur; cumque ex Archimede cylindrus  $OK$  tanta vi *ibidem* sursum feratur, quanta est gravitas cylindri  $OS$  in tali situ *prop. 6.* cum retinentis, igitur vis, qua sursum fertur, seu levitas cylindri  $KO$ , æquatur ponderi cylindri  $OS$ ; sed quia distantia  $FN$ , &  $FO$  æquales factæ fuerunt, atque à terminis  $F$ ,  $N$ ,  $O$ , parallelæ ducuntur, igitur  $RN$  æqualis erit  $OS$ ; quapropter levitas cylindri  $OK$  æqualis erit gravitati cylindri  $NI$ . Postmodum in situ  $LP$  eadem ratione ostendetur eius levitas æqualis cylindro  $PT$ , seu gravitati  $QM$  ipsius cylindri  $HM$ . Tandem in situ  $CD$  vbi omnino cylindrus demergitur, levitas, seu vis, qua sursum impellitur æquatur gravitati superpositi cylindri  $CE$  æqualis ipsi  $AB$ ; patet igitur, quod à situ intermedio  $GF$ , postquam gravitas premens omnino desijt, successivè magis ac magis levitas, seu vis repellens augetur, & insuper levitates, atque gravitates æque ab intermedio situ recedentes inter se sunt æquales.

Postremò animaduertendum est, quod huiusmodi grauitates diminutæ, & leuitates auctæ componuntur ex duobus elementis perpetuò operantibus, scilicet ab integra grauitate cylindri  $GF$ , quæ semper eiusdem mensuræ est, atque adeò in progressu motus quodãmodò parallelogrammum  $ABCD$  gignit; reliquum verò elementum est leuitas, seu repulsio aquæ, quæ profectò crescit a termino  $A$  successiue, vsque ad basim  $DE$ , efficitque triangulum  $ADE$ ; hoc autem constat, qua moles aquæ æqualis  $HV$  æque ponderat, ac cylindrus  $HQ$ , & sic in reliquis; quare vis, qua aqua ex suo loco expulsa repellit cylindrum demeritum, æquatur cylindro  $HQ$ ; igitur ab  $A$  vsque ad intermedium situm  $GF$  vis repulsiuæ æquatur ipsis  $HQ$ ,  $IR$ , &  $GF$ , quæ sunt differentia inter grauitatem absolutam eiusdem cylindri  $GF$ , & grauitates, quæ in hisce locis exercentur; e contra ab intermedio situ  $GF$ , vsque ad  $DC$  tota vis repulsiuæ æqualis est aggregato grauitatis eiusdem cylindri  $GF$ , & leuitatum  $OS$ ,  $PT$ ,  $CO$ , quæ ibidem exercentur.

Ex hac immutabili operandi Naturæ lege deducitur, quod quotiescumque idem mobile à duobus contrarijs viribus impellitur, quarum altera  $AB$  sit semper sibi ipsi vniformis, analoga ipsi grauitati cylindri superius expositi, reliqua verò  $DE$  continuè decreseat equalibus decrementis, & supponantur eedem vires contrarie nullo tempore otari, semperque mobile ab illa impelli, ab hac verò repelli, & insuper in situ, vel tempore  $GF$  intermedio harum operationum contrarias vires coequari contingat, tunc quidem ab initio motus  $A$ , vsque ad intermedium situm  $GF$  vis premens  $AB$ ,  $QM$ ,  $RN$ , successiue imminuetur, quouique in  $F$  extinguatur, & inde vsque ad  $C$  vis repellens  $OS$ ,  $PT$ ,  $CE$  successiue augetur, & insuper temporibus equalibus  $NF$ ,  $FO$  æque ab intermedio situ remotis, virtus comprimens æquatur repellenti virtuti  $OS$ ; si enim compleatur parallelogrammum  $BD$ , & triangulum  $ABE$ , vt prius, atque æquales rectæ lineæ  $AF$ , &  $FE$  in innumeras æquales particulas diuidantur, atque ab interfectionibus ducantur parallele

lele abscindentes parallelogrammum, & triangulum, profecto recte linee parallele ipsi A B component parallelogrammi superficiem, & designabunt eandem vim uniformem deprimentem, & e contra omnes parallele basi triangulum A D E representabunt, atque vires successive diminutas repellentes. Hinc fit, vt tempore B M post subtractionem repellentis virtutis, que designatur ab innumeris parallelis, scilicet a triangulo A H Q, relinquatur vis premens designata a trapezio A B M Q, pariterque in secundo tempore M N imminutio mensuratur ab innumeris parallelis trapezium H Q R I efficientibus, & tunc residue vires, que operari possunt, impellendo mobile deorsum, determinabuntur a residuo trapezio Q M N R, & tertio tempore N F residue vires prementes post imminutionem designabuntur ab innumeris parallelis triangulum N R F efficientibus, proindeque in fine tertij temporis in F vis deprimens omnino extinguetur, & exinde preualere incipit vis contraria repulsiva. Quarto enim tempore F O vis eleuans, & repellens, mensuratur ab innumeris parallelis trapezium F G K S componentibus; contra vero vis premens mensuratur a parallelogrammo G O, quod minus est dicto trapezio; igitur triangulum F O S erit excessus, & mensura, qua vis eleuans, seu repellens, excedit vim deprimentem, ideoque dicto tempore mobile sursum repellitur ab S versus F; similiter quinto tempore O P excessus virtutis repulsivæ supra deprimentem erit trapezium S O P T, a quo pariter sursum repellitur mobile. Idem prorsus dicendum de insequentibus temporibus vsque ad sextum P C, quo mobile sursum impellitur ab excessu facultatis repellentis supra comprimentem virtutem, qui mensuratur a trapezio P T E C. Hic autem animaduertendum est, quod trapezia æque remota ab intermedio situ F æqualia sunt inter se, vt sunt Q N, & O T; quapropter vires contrariæ, que operantur temporibus æqualibus æque remotis ab intermedio, hoc est primo, & sexto tempore æquales erunt, & sic de cæteris:

His

His declaratis recolendum est id, quod multoties in-  
 nuauimus, quod nimirum, quotiescumque mobile ali-  
 quod à quacumque virtute motiua impellitur, in ipso mo-  
 tus exercitio necesse est, vt acquirat determinatum celerita-  
 tis gradum, qui ita indelebilis remanet in ipso mobili, vt  
 tametsi virtus impellens remoueat, & cesset vltior eius  
 impulsus, attamen ille celeritatis gradus semel acquisitus  
 potest mobile æquabili celeritate tempore infinito mouere  
 per spatium immensum; si igitur concipiamus, virtutem  
 motricem omnibus instantibus temporis insequentis no-  
 uos velocitatis gradus mobili superaddere, qui gradus, vt  
 dictum iam est, remanent indelebiles, necesse est, vt celeri-  
 tas ipsius mobilis semper magis, ac magis augeatur, quan-  
 doquidem gradibus celeritatis præcedentibus, atque inde-  
 lebiliter perseuerantibus, adduntur semper noui gradus:  
 neque interest, an vis motiua semper sibi ipsi æqualis sit,  
 vel potius imminuatur, dummodò omnibus instantibus  
 temporibus, quo impulsus perseuerat, imprimantur noui  
 celeritatis gradus, quorum quilibet sit indelebilis, & quan-  
 uis semper additi gradus præcedentibus essent minores, sem-  
 per tamen velocitas augeri deberet, ac tandem in fine tem-  
 poris mobile iam habebit celeritatem compositam ex in-  
 numeris celeritatis gradibus saltem decreescentibus, à quibus  
 id ipsum transfertur.

Hoc supposito incipiet mobile à termino A descendere  
 impulsus à motiua facultate B Q, hoc est ab excessu facul-  
 tatis prementis supra repellentem; supponamus autem  
 quod primo tempore minuti tertij vnus horæ B M, ac in  
 exercitio motus ipsius mobilis acquiratur vnus gradus ce-  
 leritatis F B, quo gradu idem mobile pertranseat spatium A  
 Q. Secundo deinde tempore M N primo æquali à vi im-  
 pellente M R imprimatur eidem mobili celeritas B e, quæ  
 minor sit celeritate F B propter decrementum sibi allatum  
 à contrario impetu, transibitque mobile spatium Q R. Eo-  
 dem modo tertio tempore N F acquirat mobile vltimam  
 celeritatem e A minorem celeritate B e, transeat autem spa-  
 tium



tium  $R F$ ; ergo in prædicto confinio  $F$  quamvis prorsus ex-  
 tinguatur impellens vis, eiusque excessus supra vim repul-  
 sivam, mobile tamen non quiescet, quoniam iam conce-  
 pit ex præcedenti motu impetum  $F \lambda$  se se mouendi ab  $F$   
 versus  $E$ , qui impetus vigens otiosus esse non potest, ideo-  
 que necessario ulterius impellet mobile ab  $F$  versus  $E$ . Præ-  
 terea, quia quarto tempore  $F O$  vis contraria repulsiva in-  
 cipit operari repellendo mobile sursum, ac eiusmodi vis  
 mensuratur à triangulo  $F O S$ , quæ æqualis est virtuti pre- *Fig. 20.*  
 menti  $R N F$ , necesse erit, vt duobus æqualibus temporibus,  
 tertio scilicet, & quarto, operentur duæ vires contrariæ,  
 sed tamen æquales inter se, verùm æquales facultates tempo-  
 ribus æqualibus debent imprimere ipsi mobili æquales gra-  
 dus celeritatis; ergo, quantum celeritatis auget suprema  
 vis  $R N F$ , tantum detrahit vis  $F O S$ ; ergo quarto tempo-  
 re celeritas detracta erit  $\lambda e$ , ac proinde in principio tertij  
 temporis, & in fine quarti celeritatis gradus erunt æquales  
 hoc est eorum vnusquisque æqualis erit ipsi  $F e$ : at æquales  
 gradus celeritatis ab æqualibus viribus prouenientes tem-  
 poribus æqualibus debent impellere ipsum mobile per æqua-  
 lia spatia; ergo spatia  $R F$ , &  $F S$  equalia erunt inter se. Ea-  
 dem ratione ostendetur spatium  $S T$  peractum quinto tem-  
 pore æquale spatio  $Q R$  peracto secundo tempore, ac ita  
 de cæteris, si plures exiterint; ergo tandem in sexto tempo-  
 re  $P C$  idem mobile percurreret spatium  $T E$  æquale spatio  
 $A Q$  peractum primo tempore  $B M$ ; quapropter spatia  $A F$ ,  
 &  $E E$  temporibus æqualibus equali celeritate ab æqualibus  
 virtutibus motiuis peracta, erunt prorsus equalia inter se;  
 & quoniam tandem spatia peracta iam inuuntur, ac perue-  
 niunt ad indiuisibile in puncto  $E$ , vt à quiete in  $A$  motum  
 incoharunt, pariterque impetus, & celeritas  $F \lambda$  omnino  
 extinguitur, quæ tempore  $F G$  decrefcit ab  $\lambda$  ad  $F$  perueniens  
 ad indiuisibile; ergo necesse est, vt termino  $E$  incipiat se-  
 cunda periodus, rursusque incipiant incrementa, celerita-  
 tes, spatiaque peracta iisdem rationibus superius adductis,  
 repetenturque eadem periodo, percurrento temporibus  
 K æqua-

æqualibus æqualia spacia; quapropter patet propositum. Quod verò prædictæ inæquales vires B Q, & M R temporibus æqualibus mobili non imprimant æquales celeritatis gradus, mirum non erit, quoniam tanta profectò est celeritas, quam successiue mobile acquirit, quanta est energia impulsuum superuenientium, qui maiores esse non possunt facultatibus mouentibus, à quibus producuntur: verùm eiusmodi motrices virtutes successiue decrescunt ordinatis imminutionibus, prout impetus contrarij repellentes crescunt; ergo necesse est, vt gradus celeritatis, qui imprimuntur in ipso mobili, eodem ordine decrescant. Hic autem animaduertendum est, prædictam imminutionem fieri quoad additos gradus, non verò quoad totalem celeritatem mobili impressam, quæ cum ex gradibus præcedentibus componatur, manentibus indelebiliter in ipso mobili, simul cum nouis gradibus imminutis, hinc resultat totalis gradus celeritatis successiue increscens, quamuis eiusmodi augmentum non sit vniforme, hoc est non procedat æqualibus incrementis, sed semper minoribus, ac minoribus.

*De necessitate figura elliptica Orbium planetarum.*

*Cap. XII.*

*De motu animal.* **M**eritò mihi videntur melioris notæ philosophi laudare præclarum illud Aristotelis efflatum, dum perpenderet quanta solertia, & sapientia animalium munia efficerentur, veluti ciborum digestio, chyli, sanguinis, spirituumque elaboratio; horum distributio per debita loca, propagatio speciei, quæ omnia fiunt ob certos fines summo, & arcano quidem artificio, & ratiocinio, dixit philosophus, necessarium non esse, vt animastica facultas intelligens, & architectonica, ministeria exequatur in qualibet animalis parte, verùm sufficere, vt eo pacto proprias edat operationes, quo fiunt in benè, ac sapienter ordinata republica, in qua opus non est, vt princeps supremusque legislator, magistratusque, ac iudices omnibus in locis ministrent, ac ope-

sentur ea omnia, quæ ab eis præscripta sunt, sed sufficit, ut disponant ubique media, ac instrumenta tanto ordine, ac prudentia, ut per se possint operari, ac incæptum seruare ordinem; nos igitur simile quidpiam dicemus de admirabili ordine, quo Cælorum machina mouetur, & dirigitur. Dubium profectò non est, quin hic summum admirandumque artificium detegatur in planetarum motu, cum sit hæc pars præcipua mundanæ reipublicæ miro ordine disposita, ac elaborata ab infinita sapientia diuina architecti, non tamen necessarium videtur, ut intelligentiarum mentes siue animæ ubique eas edant mōtiones, quas ipse præscripsit, ac, ut ita dicam, manu circumferant stellarum globos, cum contra potuerit diuinus artifex res omnes tam miro artificio ordinare, ac disponere, ut deinde mediante generali concursu parerent diuinis legibus, absque vlla titubatione, atque deuiatione; id autem mihi videtur profectò dignius infinita sapientia; maius enim artificium, & ingenium requiritur in constructione machinæ se mouentis, quam inertis, veluti si duo essent architecti, quorum alter machinam disposuisset varijs rotis impulsis à vi ponderis prementis tali artificio, ut tempora designaret, cursum Solis, Lunæque ostenderet, organisque musicis varias efficeret symphonias, aliaque similia; alterius verò machina eadem prorsus prestaret non sponte, sed opera, & labore ministrorum, qui omnibus momentis proprijs manibus horas designarent cursumque Solis, & Lunæ promouerent, tono, & voce canerent, nemo profectò erit, qui artificium primi architecti sapientia, & solettia præcellere non fateatur, & si nos certò sciremus, architectum reuera esse sapientissimum, & perspicacissimum, iniuria profectò ipsum afficeremus, reputantes illius machinam adeo inertem, ut continua ministrorum indigeret assistentia, & impulsu, neque posset per se operari; eodem igitur pacto, cum supponamus, hoc pulcherrimum Mundi opificium ab optimo, maximo, sapientissimoque fabrefactum fuisse artifice, ac aliunde constet, tali industria, & artificio planetarum, motus disponi

potuisse, ut per se ipsi operarentur, ut horologium, incredibile prolius videretur, & absurdum, diuinum architectum operari voluisse minus artificiosè, videlicet construendo planetas pedagogo indigentes omnino inertes, qui ministrorum manibus torqueri circa proprios orbés deberent. Verùm si eiusmodi ratiocinium doctioribus non arriserit, non is sum, qui mordicus meam sententiam sustinere velim, sed satis mihi erit indicasse ( intra limites ratiocinii naturalis persistendo ) facilem, ac possibilem modum ordinandi planetarum vertigines cum omnibus artificijs qui in ipsis obseruantur.

*Fig. 21.* Concipiatur itaque solaris globus in S, qui conuertatur circa proprium axim ab Occasu in Ortum, deinde verò corpus vnius planetæ in A, qui naturali instinctu conetur directo motu appropinquare ipsi Soli, quemadmodum videmus, omnia graua naturalem habere instinctum appropinquandi Telluri nostræ, impulsa scilicet à vi grauitatis sibi connaturalis, & quemadmodum quoque videmus, ferrum directè moueri versùs magnetem; ideoque non erit impossibile, ut corpus planetæ habeat facultatem quamdam similem magneticæ facultati, qua mediante admoueatur ipsi solari globo, ac reuera, cum videamus planetam nunquam deserere, neque remoueri à confinio Solis ultra spatium quoddam determinatum, id satis superque videtur ostendere, ipsum à simili magnetica virtute detineri, quæ postea percipi non potest, nisi pariter concipiamus, planetam naturalem quemdam instinctum habere, se se vniendi, & admouendi ipsi Soli, hoc autem primum erit elementum, ex quo componi debet reuolutio eccentrica planetarum.

Secundo loco supponamus, prædictum planetam à vertigine solarium radiorum in orbem ferri circa Solem per circuloꝝ peripherias ab Occasu ad Ortum; & quoniam ut dictum est motus circularis naturaliter quemdam imprimat impetum ipsi mobili, quo mediante à centro remouetur, atque expellitur, veluti in funda ac rota obseruare licet ergo, dum prædictus planeta circulariter rotatur, remouebitur

bitur à centro Solis S; Præterea talis repulsio maiori vel Fig. 21.  
 minori efficietur impetu, prout planetæ circumductio erit  
 magis, vel minus velocis; verum hæc tanto velocior est, vt  
 superius insinuauimus, quanto magis planeta Soli propin-  
 quor efficitur; ergo, cum ille doget in altissimo, ac remotis-  
 simo loco A, infirmissima erit eiusmodi vis impetu sue, sese  
 à Sole remouendi; at, postquam idem planeta Soli appro-  
 pinquauerit in puncto B, cum eius circularis reuolutio ve-  
 locior sit, maiori impetu repelletur à Sole versùs A: eadem  
 ratione, postquam peruenerit ad punctum C, maiori vi  
 remouebitur à Sole, & maiori iterum in puncto D, maxi-  
 ma autem in puncto E, proindeque hic aderunt duo mo-  
 tus directi inter se contrarij, alter perpetuus, ac vniformis,  
 quo planeta à impulsus à propria magnetica virtute sibi  
 connaturali sese successiue admonet solari corpori, alter  
 verò difformis, & continuè decrescens, quo planeta à pun-  
 cto E expellitur à Sole vi motus circularis præcipuè in E,  
 mediocriter in C, & insensibiliter in A; ergo, vt hætenus  
 demonstrauius, ex compositione dictorum motuum ef-  
 ficitur vis quædam, & impetus compositus, ex quo pendet  
 periodus celeritatis acquisitæ à planeta, quæ a remotissimo  
 termino A vsque ad propinquissimum E augetur ea pro-  
 portione, qua distantie decrescunt. Supponamus modò,  
 vim appropinquandi Soli æqualem esse virtuti, qua à Sole  
 remouetur, quod quidem continget in intermedio puncto  
 C; si igitur conciperemus, Nature auctorem ab initio col-  
 locasse planetam in puncto C, ibi profectò motiua virtus  
 premens, qua Soli appropinquat ipse planeta, fuisset præ-  
 cisè æqualis repulsivæ virtuti, qua à Sole remouetur, quæ-  
 que oritur ex vertigine circulari C G L, ergo planeta in ta-  
 li situ perpetuò maneret, ferreturque per circumferentiam  
 circuli C G L N circa centrum solare S; talis autem motus  
 vniformis esset, temporibus scilicet æqualibus arcus sui  
 circuli æquales pertransiret; hoc autem necessarium esset,  
 quia virtus planetæ premens non posset superare virtutem  
 contrariam repellentem, neque ab ipsa vinci posset; has  
 enim

enim virtutes æquales iam supposuimus, proindeque, licet planeta C situs sit in æthere fluidissimo, ac nullam habente resistantiam, nunquam tamen titubare posset, neque amoveri à circuli peripheria C G L N, sed ea constantia in tali motu perseveraret, ac si orbi solido inniteretur, siue in sphærico oceano innataret, quoniam verò virtutes omnes motrices perpetuò operari supponuntur, eodemque modo, nulla adest ratio, ob quam eiusmodi reuolutio languescat, siue ab incepto cursu desistat, ideoque necesse esset, vt perpetuò proprios absolueret circuitus circa Solem.

*Fig. 22.* Supponamus deinde, diuinam sapientiam ob eius altissimos, & inexcusabiles fines decreuisse, motum planetarum circa Solem eccentricum efficere, ac figuræ non circularis, sed ellipticæ, tunc nihil aliud necessarium fuisset, qua summo compendio ab initio creare locareque planetam non in puncto C, sed in remotissimo puncto A, hoc enim ratione sponte sua subsequitur reuolutio eccentrica, & elliptica eiusdem planetæ circa Solem, quoniam, vt dictum est, virtus motiua planetæ in A componitur ex circulari impulsu, & gradu virtutis prementis vniformis, & ex gradu virtutis repellentis infirmissimæ; ergo ob excessum prementis virtutis supra repellentem debet Soli appropinquari, ideoque omnibus insequentis temporis instantibus prædictus planeta in sua circulari vertigine semper magis, ac magis se Soli admouebit; ergo impossibile est, planetæ corpus per determinatum tempus exempli gratia A B moueri per eandem circula rem peripheriam A R, sed oportet, ipsum transire ex vno maiori circulo ad minorem, quousque perueniat in F. Eadem ratione in circulo B F sequenti tempore B C vis premens continuè præualens, licet minori excessu, virtuti repellenti planetam ad Solem continuè appellet, ideoque in F suum motum non poterit continuare per circulum F X, verum opus erit ipsum transferri per alios circulos minores, & minores, donec perueniat ad terminum G circuli C G mediocriter remoti ab ipso Sole; quoniam autem, vt dictum est, in descensu A C planeta acquirit novos,

ac novos celeritatis gradus, qui in ipso indelebiliter remanent, quamvis virtus premens penitus evanuerit, & ad nihilum redacta sit, proindeque operari nequeat, tamen celeritatis gradus in descensu acquisiti virtutem repellentem excedent, ideoque planeta in G non sistetur, sed continuo progressu ad Solem magis appropinquabitur; quapropter non movebitur per circumferentiam G T, sed per alias minores, ita vt in fine temporis C D planeta perveniat in H, indeque, cum adhuc vigeat pars aliqua impressæ virtutis acquisitæ in descensu A C; se se lento tamen progressu magis Soli admovebit, ideoque non percurrat peripheriam H V, sed alias ipsa minores, minoresque, quousque penitus extincto omni impetu, ideoque omni appropinquatione, planeta perveniat ad Perihelium P, hic autem ob ingentem celeritatem planetæ per minimum circulum vis maxima repellens operari incipiat, ideoque tempore E D planeta rursus progrediatur per alios circulos maiores, atque maiores, ita vt iterum perveniat in N, deinde ad O, ac redeat tandem ad supremum terminum A. Hic autem ex demonstratis palam est, ne dum angulos H S P, & P S M æquales esse debere, verum etiam remotiones S H, & S M pariter æquales inter se, idemque prorsus continget in G, & N, & F, & O.



Ostendendum modò est, iter planetæ A F G H P circum- Fig. 23.  
 lum non esse, sed ellipsim: reponatur orbis ellipticus E O K planetis à Bullialdo tributus, in cuius foco N ponitur Sol, circa verò reliquum polum M supponit motum æqualitatis perfici, vt nimirum circuli omnes æquantes, per quos fertur planeta describantur circa conicæ axim eductum per focum M, & tunc quidem semidiametri eorumdem inæqualium circulorū sunt omnino æquales radijs polaribus M E, M Y, M O, M R; & quia planetæ velocitas augetur iisdem incrementis, quibus circumferentiæ æquantium circulorum crescunt, hæc verò proportionales sunt prædictis radijs polaribus, igitur à summa tarditate planetæ aphelia in E successivè acceleratur planetæ motus iisdem incrementis, quibus

bus prædicti radij polares elongantur?

Nos autem ostendimus, eundem planetam reuolui circa Solem S in eius orbe A G P, non circa vanum, & fictitium punctum æqualitatis I, sed circa corpus Solis S, ostendimusque à summa tarditate planetæ aphelia in A continuo processu accelerati, prout magis radij polares S F, S G, &c. decurrantur, veluti exigunt vectis leges ex causis phisicis pendentes, scilicet ex approximatione planetæ ad Solem, & ex repulsa à vertigine radiorum solarium pendente, vt nimirum planetæ velocitates reciproce proportionales sint peripherijs circularum, quos pertransit, seu radijs circularum eorundem, quæ sunt distantie polares à Sole successiue decrecentes: insuper in vtraque positione

*Cap. X.* incrementa radiorum polarium M E, M Y, M O in Bullialdi sententia, vel decrementa radiorum S A, S F, S G in nostra positione proportionalia sunt sinibus versis angulorum, quos planetæ motus subtendit in suo orbe. Præterea in vtraque positione eiusdem planetæ eccentricitatem N X, & S V eadem omnino est, ideoque minima distantia polaris M E in Bullialdi sententia æqualis erit planetæ distantie periheliæ N K, scilicet nostræ periheliæ S P; eumque maxima polaris distantia M K æqualis sit distantie apheliæ N E, igitur M K erit æqualis S A, quandoquidem idem planeta eandem apheliæ distantiam habet, eandemque periheliæ. Insuper summa tarditas eiusdem planetæ aphelia in E, & A, vna & eadem prorsus erit in vtraque positione, similiterque perihelia maxima velocitas vna, & eadem erit. Postremò vno eodemque determinato tempore instanti idem planeta in Bullialdi positione reperitur in Y, in nostra verò in E, igitur tunc distantie à Sole N Y, & S E æquales erunt pariterque æquales remotiones punctorum Y, & E ab Aphelio E, vel A. Idem dicendum est, quando planeta in alio instanti temporis subsequenti constituitur in O, & G, & sic de reliquis, & quia in Ellipse N O K idem incrementis augentur radij polares M E, M Y, M O, ac decrescunt radij solares N E, N Y, N O, his verò æquales sunt radij so-  
lares

Fig. 23.



lāres S A, S F, S G; ergo iisdem incrementis augentur Bullialdi radij polares M E, M Y, M O, & iisdem temporibus, ac minuuntur radij solares S A, S F, S G; quapropter efficiuntur duo motus, circa duo centra M, & S, qui ab eodem tarditatis gradu in Aphelijs E, & A initium sumunt, & in utroque motu temporibus æqualibus acquiruntur æquales gradus velocitatum, nimirum in Y, & F, nec non in O, & G, atque in primo motu velocitates crescunt eadem proportione, qua polares radij elongatur, in secundo verò ea proportione, qua radij polares minuuntur, suntque maximi radij M K, & S A æquales, pariterque minimi M E, S P inter se æquales; igitur itinera E O K, & A G P omnino æqualia, & similia inter se erunt; cumque primum E O K ellipticum præostensum à Bullialdo fuerit, erit quoque via eiusdem planetæ A G P, quoque ellipsis æqualis, & similis E O K; quapropter &c.

Lēma

4.

Cap. X.

Lēma

6. eius-

dē Cap.

Opus est ergo iter à planeta descriptum eccentricum esse Soli, nec circulare, sed ellipticum; hoc autem sequitur, dummodo recti linea periodus ex A in E absoluat eodem tempore, quo absoluitur medietas reuolutionis A G P: ut autem id allequamur, nil aliud necesse est, nisi, ut supponamus prædictum motum rectilineum pendere à magnetica impellente virtute ex A versus E, & motum circularem planetæ circa Solem; & quoniam peracta vnica reuolutione rursus incipiunt præualere eedem causæ, cum stabiles, ac perpetuæ sint, necessariò renouabitur periodus secundæ Ellipsis, ac ita perpetuò, ideoque motus planetæ repetitis circuitibus perennabit.

Fig: 22

*De causa motus absidis, & Aphelij Orbis planetarij.*

*Cap. XIII.*

**P**ostquam causas exposuimus, ob quas planetæ cieri debent per eccentricos orbis non exactè circulares, sed ellipticos, iam superest declarandum, cur eiusmodi ellipses stabiles non permaneant in eodem situ mundani spatij, sed

L

ien-

lentissimo reuoluantur motu secundum signorum ordinem. Quoniam ostendimus, prædictum ellipticum motum ex duobus elementis componi, ex motu scilicet rectilineo, quo planeta approximatur centro proprii circuitus, & ex circulari reuolutione, quæ dum planetam circumducit, eum simul amouet atque repellit à centro sui orbis, hinc sequitur motus directus appropinquationis, ac remotionis planetæ à Sole una cum vertigine, quæ reuoluitur circa proprium orbem; quotiescumque igitur circularis reuolutionis periodus  $A G P A$  eodem præcisè absoluitur tempore, quo perficitur rectilineus cursus à summa distantia  $A$  ad infimam  $E$ , quousque redeat ad eundem supremum situm  $A$ , tunc quidem, ut iam ostendimus, ab hisce duobus motibus simul vnus describeretur perfecta Ellipsis  $A G P H A$ , prætereaque linea absidum  $P A$  fixè perseuerabit in eodem vniuersi situ, hoc est sub puncto  $X$  stellati orbis; verum, si concipiamus, periodum appropinquationis, ac remotionis ab  $A$ , ad  $E$ , ad  $A$  tardiorum esse, absoluique prolixiori tempore, quàm integra peragatur reuolutio  $A G P A$ , tunc quidem necesse est, periodicum motum ellipticum non esse, lineamque absidis  $P A$  immobilem non manere sub eadem fixa  $X$ ; quoniam ut ostendimus, cum periodus integræ reuolutionis breuiori absoluitur tempore, quàm periodus totius productionis, decurtationisque polarium radiorum, profectò mobile describet in ipso mundano spatio curuam quamdam lineam in se ipsam contortam ad instar nodi, sed tamen prædictus motus nobis se se ellipticum exhibebit, cuius axis sit progressus versùs eadem partes periodici motus; quoniam autem demonstrauimus, periodum decrementi, & incrementi radiorum polarium eundem esse, ac periodus rectilinea appropinquationis, & remotionis à polo prædictæ Ellipsis; ergo necessariò axis eiusdem Ellipsis apparentis moueri debet secundum signorum ordinem, ut patet ex apposito schemate. Si supponamus circularem reuolutionem  $A G P$  breuiori tempore absolui, quàm motus rectus à summa di-

*Fig. 24.* stantia  $A$  ad infimam  $E$ , quousque redeat ad eundem supremum situm  $A$ , tunc quidem, ut iam ostendimus, ab

*Fig. 22.* hisce duobus motibus simul vnus describeretur perfecta Ellipsis  $A G P H A$ , prætereaque linea absidum  $P A$  fixè perseuerabit in eodem vniuersi situ, hoc est sub puncto  $X$  stellati orbis; verum, si concipiamus, periodum appropinquationis, ac remotionis ab  $A$ , ad  $E$ , ad  $A$  tardiorum esse, absoluique prolixiori tempore, quàm integra peragatur reuolutio  $A G P A$ , tunc quidem necesse est, periodicum motum ellipticum non esse, lineamque absidis  $P A$  immobilem non manere sub eadem fixa  $X$ ; quoniam ut ostendimus, cum periodus integræ reuolutionis breuiori absoluitur tempore, quàm periodus totius productionis, decurtationisque polarium radiorum, profectò mobile describet in ipso mundano spatio curuam quamdam lineam in se ipsam contortam ad instar nodi, sed tamen prædictus motus nobis se se ellipticum exhibebit, cuius axis sit progressus versùs eadem partes periodici motus; quoniam autem demonstrauimus, periodum decrementi, & incrementi radiorum polarium eundem esse, ac periodus rectilinea appropinquationis, & remotionis à polo prædictæ Ellipsis; ergo necessariò axis eiusdem Ellipsis apparentis moueri debet secundum signorum ordinem, ut patet ex apposito schemate. Si supponamus circularem reuolutionem  $A G P$  breuiori tempore absolui, quàm motus rectus à summa di-

*Lēma 8.* lati orbis; verum, si concipiamus, periodum appropinquationis, ac remotionis ab  $A$ , ad  $E$ , ad  $A$  tardiorum esse, absoluique prolixiori tempore, quàm integra peragatur reuolutio  $A G P A$ , tunc quidem necesse est, periodicum motum ellipticum non esse, lineamque absidis  $P A$  immobilem non manere sub eadem fixa  $X$ ; quoniam ut ostendimus, cum periodus integræ reuolutionis breuiori absoluitur tempore, quàm periodus totius productionis, decurtationisque polarium radiorum, profectò mobile describet in ipso mundano spatio curuam quamdam lineam in se ipsam contortam ad instar nodi, sed tamen prædictus motus nobis se se ellipticum exhibebit, cuius axis sit progressus versùs eadem partes periodici motus; quoniam autem demonstrauimus, periodum decrementi, & incrementi radiorum polarium eundem esse, ac periodus rectilinea appropinquationis, & remotionis à polo prædictæ Ellipsis; ergo necessariò axis eiusdem Ellipsis apparentis moueri debet secundum signorum ordinem, ut patet ex apposito schemate. Si supponamus circularem reuolutionem  $A G P$  breuiori tempore absolui, quàm motus rectus à summa di-

*Cap. X.* stantia  $A$  ad infimam  $E$ , quousque redeat ad eundem supremum situm  $A$ , tunc quidem, ut iam ostendimus, ab hisce duobus motibus simul vnus describeretur perfecta Ellipsis  $A G P H A$ , prætereaque linea absidum  $P A$  fixè perseuerabit in eodem vniuersi situ, hoc est sub puncto  $X$  stellati orbis; verum, si concipiamus, periodum appropinquationis, ac remotionis ab  $A$ , ad  $E$ , ad  $A$  tardiorum esse, absoluique prolixiori tempore, quàm integra peragatur reuolutio  $A G P A$ , tunc quidem necesse est, periodicum motum ellipticum non esse, lineamque absidis  $P A$  immobilem non manere sub eadem fixa  $X$ ; quoniam ut ostendimus, cum periodus integræ reuolutionis breuiori absoluitur tempore, quàm periodus totius productionis, decurtationisque polarium radiorum, profectò mobile describet in ipso mundano spatio curuam quamdam lineam in se ipsam contortam ad instar nodi, sed tamen prædictus motus nobis se se ellipticum exhibebit, cuius axis sit progressus versùs eadem partes periodici motus; quoniam autem demonstrauimus, periodum decrementi, & incrementi radiorum polarium eundem esse, ac periodus rectilinea appropinquationis, & remotionis à polo prædictæ Ellipsis; ergo necessariò axis eiusdem Ellipsis apparentis moueri debet secundum signorum ordinem, ut patet ex apposito schemate. Si supponamus circularem reuolutionem  $A G P$  breuiori tempore absolui, quàm motus rectus à summa di-

*Cap. 12.* stantia  $A$  ad infimam  $E$ , quousque redeat ad eundem supremum situm  $A$ , tunc quidem, ut iam ostendimus, ab hisce duobus motibus simul vnus describeretur perfecta Ellipsis  $A G P H A$ , prætereaque linea absidum  $P A$  fixè perseuerabit in eodem vniuersi situ, hoc est sub puncto  $X$  stellati orbis; verum, si concipiamus, periodum appropinquationis, ac remotionis ab  $A$ , ad  $E$ , ad  $A$  tardiorum esse, absoluique prolixiori tempore, quàm integra peragatur reuolutio  $A G P A$ , tunc quidem necesse est, periodicum motum ellipticum non esse, lineamque absidis  $P A$  immobilem non manere sub eadem fixa  $X$ ; quoniam ut ostendimus, cum periodus integræ reuolutionis breuiori absoluitur tempore, quàm periodus totius productionis, decurtationisque polarium radiorum, profectò mobile describet in ipso mundano spatio curuam quamdam lineam in se ipsam contortam ad instar nodi, sed tamen prædictus motus nobis se se ellipticum exhibebit, cuius axis sit progressus versùs eadem partes periodici motus; quoniam autem demonstrauimus, periodum decrementi, & incrementi radiorum polarium eundem esse, ac periodus rectilinea appropinquationis, & remotionis à polo prædictæ Ellipsis; ergo necessariò axis eiusdem Ellipsis apparentis moueri debet secundum signorum ordinem, ut patet ex apposito schemate. Si supponamus circularem reuolutionem  $A G P$  breuiori tempore absolui, quàm motus rectus à summa di-

stant-

stantia A, vsque ad minimam E, tunc quidem, cum plane-  
 ta peruenerit in P, postquam transijt præcisè semicirculum,  
 ac in eadem linea absidum P S A X situs est, nondum pro- *Fig. 25.*  
 ductus erit planeta ad infimum situm O, hoc est non adhuc  
 vicinissimus Soli S factus erit; ergo ibidem perueniet ali-  
 quantò post, quo tempore planeta perseuerans in circulari  
 reuolutione, arcum aliquem, vt P D, pertransibit; igitur  
 vltra absidis lineam A S P, scilicet in puncto D efficietur  
 maximè propinquus Soli S. Simili modo, quoniam infe-  
 quens circularis semiperiodus breuiori tempore absoluitur,  
 quàm solarium radiorum incrementum, hoc est totius re-  
 motionis planetæ ex E ad A; ergo cum planeta à puncto D  
 progressus fuerit per integrum semicirculum D H I, non-  
 dum attinget summam altitudinem A, verùm ad eam per-  
 ueniet posterius, quo tempore planeta circumferetur per  
 aliquam sui circuli partem vsque ad F, proindeque, cum  
 absoluetur periodus appropinquationis, & remotionis ab  
 A in E, vsque ad A, erit absidis linea F S K (hoc est ima-  
 ginarius axis Ellipsis à planeta descriptæ) sub fixa Z transla-  
 ta, ideoque progressa erit per totum spatium X Z; quapro- *Fig. 28.*  
 ter vt satisfiat motui absidis planetæ, nihil aliud opus est,  
 quàm supponere periodum accessus, & recessus rectilinei à  
 Sole paululùm tardiozem periodo suæ circularis reuolutio-  
 nis.

Multis autem modis tardior fieri potest accessus, & recessus  
 periodus prædicta circulari vertigine, quorum aliquos  
 declarabimus simpliciores, & faciliores, qui, vt exactè per-  
 cipiantur, supponamus primò duos circulos B C, & E F  
 inæquales inter se, primum autem secundo minorem, ac  
 per eorum peripherias ferri concipiantur duo mobilia equa-  
 libus celeritatibus, quæ sint verbi causa R, & S, proculdubio *Fig. 26*  
 duo mobilia equalibus velocitatibus circumducta tempo-  
 ribus æqualibus æqualia percurret spatia, & quoniam pri-  
 mus circulus, cuius centrum A minor est secundo, cuius  
 centrum D, erit integra illius peripheria minor huius cir-  
 cumferentia, ac propterea, si in minori circulo sumamus

peripheriam æqualem integræ circumferentiæ maioris circuli, necesse erit, vt integræ  $B C B$  alius addatur arcus, qui sit exempli gratia  $B L$ ; ergo tempore, quo alterum mobile celeritate  $S$  percurreret circumferentiam  $E F E$ , alterum celeritate  $R$ , æquali celeritati  $S$  præter integram peripheriam  $B C B$  pertransibit quoque arcum  $B L$ . Deinde, quoniam vis, & energia motus circularis repellendi, remouendique mobile à centro, pendet non ex maiori minorive circuli peripheria, per quam per agitur eiusmodi reuolutio, sed ex celeritate, qua mobile per eam circumfertur, & quia velocitates  $R$ , &  $S$  supponuntur æquales, ergo appropinquationes, & remotiones ipsius mobilis à centri  $A$ , &  $D$  temporibus æqualibus peractæ inter se æquales erunt; Præterea si concipiamus in iisdem mobilibus duas alias virtutes prementes versùs centra  $A$ , &  $D$ , quæ prorsus æquales sint virtutibus expellentibus iam dictis, euenient profectò oscillationes temporibus æqualibus peractæ, seu appropinquationes, remotionesque à centrīs æquales inter se; sint igitur mensuræ eiusmodi oscillationum æqualium  $G H$ , &  $I K$ , ac postremò supponamus, eodem tempore absolui circularem periodum circa centrum  $D$ , ac etiam perfici periodum directum oscillationis ex  $I$  in  $K$ , ad  $I$ , & quoniam eodem tempore absoluitur oscillationis periodus à  $G$  in  $H$ , ad  $G$ , ergo eodem tempore absoluitur oscillatio rectilinea  $G H G$ , ac reuolutio circularis  $E F E$ : verùm tempore huius circularis reuolutionis aliud mobile circa centrum  $A$ , præter integram peripheriam, percurrit etiam arcum  $B L$ ; ergo periodus directà à  $G$  per  $H$  ad  $G$ , tardior est, quàm circulus periodicus  $A C B$ .

*Fig. 27* Secundus verò modus talis esset: supponamus circulos  $B C$ , &  $E F$  æquales inter se, sed celeritatem  $R$  vertiginis per circumferentiam  $B C$  maiorem esse celeritate  $S$ , qua mobile fertur per peripheriam  $E F$ ; & quoniam, vt dictum est, quò celeritas  $R$  maior est impetu  $S$ , eò vehementius circularis vertigo  $B C$  repellet mobile; ergo temporibus æqualibus repulsiones  $B G$ , &  $E I$  erunt proportionales celeritatibus

bus R, & S: suppositis etiam duabus prementibus viribus *Fig. 27.*  
 proportionalibus R, & S fient oscillationum periodi G H  
 G, & I K I planè temporibus æqualibus; nequeunt enim  
 peracta spacia proportionalia esse celeritatibus, nisi cum  
 tempora talium motuum æqualia sunt inter se; si igitur  
 periodus directa I K I peragatur eodem tempore, quo ab-  
 soluitur reuolutio E F E, periodus quoque rectilinea G H  
 G eodem tempore fiet, quo peragitur reuolutio E F E: ve-  
 rùm circuitus per B C B breuiori absoluitur tempore,  
 quàm circuitus E F E (cum enim spacia peracta æqualia  
 sunt, tempora prædictorum transituum sunt reciprocè pro-  
 portionalia celeritatibus) ergo tempus reuolutionis per  
 B C B ad tempus reuolutionis per E F E, seu ad tempus di-  
 recti transitus G H G erit, vt celeritas S, ad celeritatem R,  
 proindeque periodus rectilinea G H G tardior erit, quàm  
 periodus circularis B C B.

Tertius modus talis esset: supponatur, idem mobile  
 eadem velocitate R percurrere orbem B C B, eodemque *Fig. 28.*  
 tempore quo absoluitur periodus rectilinea G H G ex ve-  
 locitate repellente R, & ex alia premente ei æquali resul-  
 tans; tunc, si concipiatur mobile ab initio non in G situm,  
 sed superius in N, fiatque O H æqualis G N, proculdubio  
 tempus oscillationis à G in H, & ab H in G breuius erit tem-  
 pore oscillationis N O N: verùm circularis periodus B C B  
 iam peracta supponebatur eodem tempore, quo directa  
 oscillatio G H G absoluebatur; ergo breuiori tempore per-  
 ficitur circularis periodus B C B, quàm periodus rectilinea  
 N O N.

En igitur tres modos, quibus periodus vertiginis circula-  
 ris circa centrum Solis, seu poli ellipsis celerior, effici potest,  
 quàm periodus oscillationis directæ appropinquationis (sci-  
 licet, ac remotionis ab eodem polo.

Supponamus modò, Diuinum Architectum decreuisse *Fig. 29*  
 ellipsi cuiuslibet planetæ A G P eiusque axi A P tribuere  
 vertiginem quamdam circa polum solarem S, secundum  
 ordinem signorum, intelligatur esse C, G circulus interme-  
 dius

dius constitutus huiusmodi Ellipsis, primò poterat angustiorē reddere circulum C G, ac ipsi relinquere eandem celeritatem, quam habebat ante eius restrictionem, indeque describeret dictam ellipsim. Secundò absque vlla diminutione circuli mediocri C G, aut incremento eius celeritatis compendiosius satis erat, planetam in principio collocare paululum à Sole remotius, faciendo videlicet Aphelium non in A, sed in M; tunc enim periodus circularis velocior fieret, breuiorque tempore absolueretur, quam periodus directus oscillationis M N M, & per consequens linea absidis P S A summa facilitate transferri posset secūdum signorum ordinem ab X ad Z; cum verò constanter maneat eadem causæ, debet talis periodus motus absidis perpetuò perseverare; patet igitur quomodo absque ambagibus facilissimis medijs possibile erat; planetis tribuere motum nedum eccentricum, sed figuræ etiam ellipticæ, tandemque efficere, vt absidis linea vniformi, & continuo cursu torqueretur in orbem secūdum signorum ordinem, quod erat, &c.

Id autem, quod generaliter dictum est de planetarum eccentricitate locum profectò habere debet in planetis etiam Mediceis, de quibus agimus, quorum vnusquisque non præcise circa Iouem agitur, sed eccentrica reuolutione, & elliptica, lineaque Absidis reuoluitur ab Occasu ad Ortum, vt obseruatur in alijs planetis, ac propterea, necesse est, vt eorum celeritates ex Ioue obseruatae, nedum inæquales appareant, hoc est opticam anomalam sortiantur, sed reuera sint inæquales, hoc est circa Perijouium habeant quamdam physicam, ac realem celeritatem; contra verò circa Apojoium veram, & physicam tarditatem.

*Medicea sydera, dum Solem circumueunt nouam acquirere  
anomaliam. Cap. XIV.*

**H**ucusque fatis declarauimus, quam inæqualitatem for-  
turi debeant Medicea sydera, dum periodicè reuol-  
nuntur, hoc est circa Iouem, easque ostendimus cieri debe-  
re per eccentricos, & ellipticos orbis celeritatibus reuera  
inæqualibus, tardioribus scilicet in Apojouijs, velociori-  
bus in Perijouijs, tandemque lineam eorum absidum trans-  
ferri debere secundùm signorum ordinem; hæ autem mo-  
tiones omnes naturales, & propriæ censi debent, ac perio-  
dicè ipsorum syderum iouialium, superest modò, vt motum  
consideremus, quo eadem stellæ circa Solem aguntur, &  
quam anomaliam eiusmodi periodus synodica eisdem su-  
peraddat.

Et primò, quia Medicei planetæ nunquam Iouem relin-  
quunt, sed circa ipsum aguntur, ipse verò duodecim an-  
norum spatio propriam periodum circa Solem absoluit,  
eiusdem temporis spatio coguntur circa solare corpus ro-  
tari à Ioue rapti. Præterea notandum est, Mediceos plane-  
tas non ferri circa Solem fixè alligatos in Iouis atmosphæra,  
quasi ferruminati clauisque firmati essent in quadam solida  
rota, sed liberè, ac solutè percurrere æthera fluidissimum,  
neque ab alio circulo detineri, præterquàm à virtute ma-  
gneticæ analogæ; cum igitur soluti, ac liberi pensilesque si-  
ti sint in fluidissimo æthere, profectò impossibile videtur,  
eamdem illam solarem virtutem, quæ tanti roboris, & ener-  
giæ est, vt ingentes globos Iouis reliquorumque planeta-  
rum mouere valeat, inertem inutilemque esse debere, ac  
nullius roboris in pusillis globulis Mediceis, si enim vide-  
mus, quod, quantò magis Iuppiter, alijque primarij plane-  
tæ Soli admouentur, tantò maiori reali celeritate à solari  
virtute rotantur, quis crederet Mediceos globulos, qui pari-  
ter soluti, ac pensiles siti sunt in æthere fluido, non commo-  
ueri, & impelli ad instar aliorum planetarum maiori cele-  
ritate

ritate cum Soli appropinquant? Siue enim hoc contingat ex eo, quod Sol proximus roborat, augetque motricem planetarum virtutem, vel quod radij solares eius vertigine circumducti, vectis ratione, vt dictum est, maiorem planetis afferunt velocitatem, certè non poterunt Medicea sydera non subijci vniuersali Naturæ legi, qua planetæ omnes Soli proquinqui maiorem virtutem motricem adipiscuntur, seu concitatiore cursu à solari vertigine torquentur; quapropter, cum Medicea sydera circa Iouem agantur, & circa Solem, necesse est, vt duabus viribus motricibus moueantur, quarum altera efficit proprios circuitus circa Iouem, altera verò vertiginem circa Solem temperat. Si autem eiusmodi motrices virtutes pendent, vt verosimile est, à vertigine Iouis, & Solis circa proprios axes, necesse profectò erit, vt in diuersis à Sole distantijs, veluti contingit in vecte, & in libra, motus Mediceorum syderum illas subeant velocitatis alterationes, quas cæteris omnibus planetis tribuere potest maior, seu minor distantia ab iplo Sole,

*Lemmata necessaria, ad intelligendam synodicam Mediceorum syderum anomaliã. Cap. XV.*

**LEMMA PRIMVM.**

**S**I motus aliquis retardatus fuerit eadem proportione, qua ipse continuatur, fiet motus similis primo licet tardior.

Idem mobile percurrat spatia  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ , &  $DE$  temporibus æqualibus ipsi  $T$ ; sitque eius celeritas  $V$ : postea, dum progreditur per spatium  $AB$ , superueniat retardatio  $F$ , ita vt mobile solum modò pertranseat spatium  $KL$ ; simili modo dum percurrit spatium  $CB$ , retardatus à  $G$ , percurrat spatium  $LM$ , & à mora  $H$  in motu per  $CD$  proueniat transitus  $NM$ , ac ità de cæteris: sit deinde mora  $F$  ad  $G$ , vt  $AB$ , ad  $BC$ , & mora  $G$  ad  $H$ , vt  $BC$  ad  $CD$ , & sic de cæteris; aio, motum  $KL$  quamuis tardiozem, tamen



in omnibus suis partibus similem futurum motui per  $ABE$ . Quoniam motus per  $AB$ , &  $BC$  fiunt eodem tempore  $T$ , & ambo retardantur ab  $F$ , &  $G$ , eadem proportione quam habet  $AB$ , ad  $BC$ ; ergo quod subtrahitur à spatijs  $AB$ ,  $BC$  eodem tempore  $T$ , erit ut  $AB$ , ad  $BC$ , quare spatium  $KL$  ad  $LM$  residuum scilicet ipsius  $AB$  post retardationem ad alterius  $BC$  residuum eandem habebit rationem quam  $AB$  ad  $BC$ , seu ut mora  $F$  ad moram  $G$ , fiunt autem tales motus per  $KL$ , &  $LM$ , eisdem celeritatibus ac tempore  $T$ ; ergo motus per  $KL$   $M$  similis omnino erit motui per  $ABC$ . eodemque modo ostendetur motum per  $KO$  similem futurum motui per  $AE$ , quod erat, &c.

Hinc elicitur, quod si primus motus per  $AE$  vniformis, & æquabilis esset, pariter motus retardatus esset vniformis, & æqualis, si ille acceleratus, iste quoque eadem ratione acceleratus; si ille difformis, primò scilicet acceleratus, deinde vero retardatus, talis etiam erit iste, cum semper eadem ratione fiant, quam celeritates habuerint.

#### LEMMA SECVNDVM.

**S**I in circuli, seu ellipsis quadrante ducantur quælibet rectæ lineæ vni axium æquidistantes, secantesque reliquum axim, efficiunt duo quadrilatera, quorum axi propinquius ad magis remotum, maiorem habebit proportionem, quam basis illius ad huius basim in reliquo axi sumptis.

Sit quadrans circuli, siue ellipsis  $AFL$  comprehensus à *Fig. 31.* curua  $AF$ , & a duobus axibus  $AL$ , &  $FL$ , in quo ducantur duæ rectæ lineæ  $BM$ , &  $CN$  parallelæ axi  $AL$ , quæ secent reliquum axim in  $M$ , &  $N$ ; dico, quadrilaterum  $ABML$  ad quadrilaterum  $BCNM$  maiorem proportionem habere, quam basis  $LM$ , ad basim  $MN$ . Ducatur a puncto  $C$  recta  $CH$  parallelæ  $FL$  secans  $BM$ , &  $AL$  in  $R$ , &  $H$ , & a puncto  $B$  ad  $H$  extendatur curua  $BH$  tali lege, ut scilicet quælibet linea recta  $DEO$  parallelæ basi

$M$

$GH$ ,

GH, secans figuram BCH, dividatur a BR, in E, eadem  
 ratione, quam habent bases scilicet EO ad ED, siue HR, ad  
 Fig. 31. RC erit (ex geometria indivisibilium) totum triangulum  
 HBR ad triangulum BCR, ut basis RH ad RC, seu ut  
 LM, ad MN. Preterea manifestum est, curvam BOH  
 cadere intra quadrilaterum B A H R, quoniam in triangu-  
 lo curvilineo BCR definente in acumen B, recta DE mi-  
 nor est, quam CR; est autem CR; ad RH, ut DE ad EO;  
 ergo etiam EO minor erit, quam RH, ac ideo minor,  
 quam EG, quæ equalis est ipsi RH in parallelogrammo  
 RG; quapropter punctum O cadit intra quadrilaterum  
 ABRH; ac idem dicetur de quolibet alio puncto curvæ  
 BOH; ergo tota cadit intra quadrilaterum ABRH, proin-  
 deque triangulum BRH minus erit quadrilatero ABRH,  
 pariterque totum quadrilaterum ABML maius erit qua-  
 drilatero H B M L. Deinde, quoniam parallelogrammum  
 RL ad parallelogrammum RN eiusdem altitudinis est, ut  
 basis LM, ad MN, ut etiam est triangulum HBR ad trian-  
 gulum BCR; ergo totum quadrilaterum B H L M, ad to-  
 tum quadrilaterum B C N M, eandem habebit propor-  
 tionem, quam basis LM, ad basim MN, &c. verum quadri-  
 laterum maius ABML ad idem quadrilaterum B C N M  
 maiorem rationem habet, quam quadrilaterum minus  
 H B M L; ergo quadrilaterum ABML ad quadrilaterum  
 B C N M maiorem rationem habebit, quam basis LM, ad  
 MN.

Si verò proportio ipsius LM ad MN erit maioris inæ-  
 qualitatis, & sint tales particulæ satis parvæ, dubium non est  
 quin excessus proportionis quadrilaterorum supra propor-  
 tionem basium minimus erit, ideoque si iisdem quadrilate-  
 ris inæqualibus addemus æquales partes, successivè immi-  
 nuemus eorum proportionem, ideoque non erit impossi-  
 bile, ut quadrilaterum ABML simul cum partibus additis  
 ad quadrilaterum B C M N simul cum iisdem partibus, ha-  
 beat eandem proportionem, quam basis LM, ad MN,  
 hoc autem contingere poterit quoad sensum in toto qua-  
 dran-

drantis progressu, vbi differentia eiusmodi proportionum perceptibilis non erit.

*LEMMA TERTIVM.*

**S**I idem mobile inæqualibus celeritatibus duas pertranseat æquales rectas lineas comprehensas à rectis lineis equidistantibus inter se, ad quas diuersimodè inclinentur, & per directiones rectarum intervalla paralellarum determinantium mobile retardetur secundum proportionem eorundem intervallorum, modificati motus similes erunt inalteratis motionibus.

Idem mobile per rectas lineas  $AB$ , &  $BC$  inter se æquales, & comprehendentibus paralellis  $AE$ ,  $BD$ ,  $KC$ , diuersimodè inclinatas transferatur inæqualibus velocitatibus, scilicet spatium  $AB$  peragatur maiori tempore  $T$ , at spatium  $BC$  percurratur tempore minori  $R$ ; retardentur postea dicti motus à repulsibus factis per directionem  $EDC$ , scilicet dum mobile fertur ab  $A$  ad  $B$ , & à  $B$  ad  $C$ , frænctur eius motus à tardiori motu rectæ lineæ  $AE$ , quæ semper sibi ipsi equidistanter incedat per directionem  $EDC$ ; mora verò  $EF$ , quæ infertur motui per  $AB$ , ad moram  $DI$ , qua afficitur motus per  $BC$ , eandem proportionem habeat, quàm  $ED$ , ad  $DC$ , ducanturque  $FG$ ,  $IH$  paralellæ  $AE$ ,  $BD$ ; cumque retardati motus per  $AB$ , &  $BC$  prolixioribus temporibus perfici debeant, supponatur, tempore  $V$  maiori, quàm  $T$ , perfici modificatum transitum per  $AB$ , pariterque tempore  $Z$  maiori, quàm  $R$ , compleatur transitus modificatus per  $BC$ , ostendendum est, tempus  $V$  ad  $Z$  eandem proportionem habere, quàm tempus  $T$  ad  $R$ ; sic enim modificati motus similes erunt prioribus in alteratis motionibus. Quoniam motus per  $AB$ , &  $BC$  inter paralellas  $AE$ ,  $BD$ ,  $KC$  intercipiuntur, licet sint diuersimodè inclinati ad eandem directionem  $EDC$ , tamen referri, & considerari possunt in eadem recta linea  $EDC$ , quandoquidem eadem recta linea  $AE$ , semper sibi ipsi

æquidistanter translata, simul cum mobile, dum percurrit li-  
 neam  $AB$ , designat quoque eodem cursu lineam  $ED$  tē-  
 pore  $T$ , pariterque, dum fertur simul cum mobile per  $BC$ ,  
 designat lineam  $DC$  tempore  $R$ ; & quia  $EF$  est mora, quæ  
 infertur motui per  $AB$ , nec non  $DI$  est mora motus per  
 $BC$ , erunt  $FD$  nec non  $CI$  residui motus, post moræ sub-  
 tractionem: erat autem mora  $EF$  ad moram  $DI$ , ut transi-  
 tus  $ED$  ad  $DC$ ; igitur motus  $FD$  residuus, ad residuum  
 motum  $IC$  erit, ut mora ad moram, & permutando mo-  
 tus  $FD$  ad  $ED$  erit, ut motus  $IC$ , ad  $CD$ ; verum, ut  $FD$   
 ad  $DE$ , ita est  $GB$  ad  $BA$ ; (cum sit rectæ lineæ à tribus pa-  
 rallelis  $AE$ ,  $GF$ ,  $BD$ , dissectæ) ergo  $GB$  erit spatium per-  
 actum ab eodem mobili retardato tempore  $T$ , propterea  
 quod tunc solummodò celeritates sunt spatijs proportiona-  
 les, cum transitus æqualibus temporibus fiunt: simili mo-  
 do, ut  $IC$  ad  $CD$ , ita erit  $HC$ , ad  $CB$ , proptereaque spa-  
 tium  $HC$  retardatum peractum erit tempore  $R$ : sunt verò  
 proportionēs  $HC$ , ad  $CB$ , &  $GB$  ad  $BA$  eadem inter se,  
 cum similes sint iisdem proportionibus  $FD$  ad  $DE$ , atque  
 $IC$ , ad  $CD$ : suntque antecedentes  $AB$ , &  $BC$  æquales in-  
 ter se; igitur spatia  $BG$ , &  $HC$  equalia inter se erunt; qua-  
 propter ab iisdem velocitatibus refrænatis æqualia spatia per-  
 currentur  $BG$  tempore  $T$ ,  $HC$  verò tempore  $R$ , sed, cum  
 integrum spatium  $AB$  percurrentum est eadem mōdifica-  
 ta velocitate, necesse est, ut spatium  $GB$  ad  $AB$  sit, ut tem-  
 pus  $T$  ad  $V$ , scilicet ut  $HC$ , ad  $CB$ , seu (eadem ratione)  
 ut tempus  $R$  ad  $Z$ ; igitur tempus  $T$  ad  $V$  eandem propor-  
 tionem habebit, quam tempus  $R$  ad  $Z$ , & permutando, ut  
 tempus  $T$ , ad  $R$ , ita erit tempus  $V$ , quo percurritur spatium  
 $AB$  velocitate modificata ad tempus  $Z$ , quo perficitur spa-  
 tium  $BC$  modificata pariter velocitate; quapropter modi-  
 ficati motus per  $AB$ , &  $BC$  ab inæqualibus motis, seu im-  
 pedimentis proportionalibus ipsis  $ED$ , &  $DC$  efficiuntur  
 temporibus  $V$ , &  $Z$  proportionalibus temporibus  $T$ , &  $R$ ,  
 quibus inalterati motus efficiebantur, ideoque modificati  
 motus, & refrænati similes omnino erunt prioribus inalte-  
 ratis motionibus, quod erat, &c.

LEM-

## LEMMA QVARTVM.

**S**I mobile reuoluatur per circumferentiam circuli, seu ellipsis A F circa centrum L, ac simul centrum L, cum suo circulo feratur in orbem circa centrum S, ac talis motus *Fig. 32.* circa S tarditatem conferat motui per A B F, secundum proportionem distantiarum A S, B S, C S, R S, &c. quouique in mediocri distantia S F mora penitus extinguitur; aio, motum mora affectum per A B F similem, & vniformem esse priori motui absque vlllo sensibili errore.

Secentur arcus minimi quoad sensum A B, B C, C D, D E, & E F, æquales inter se, ac extendantur rectæ lineæ B M, C N, D O, & cæteræ parallele axi A L, quæ secent reliquum axim L F in punctis M, N, O, P, & quoniam moræ, quæ retardant motum ipsius mobilis per arcum A F, supponebantur proportionales omnibus distantijs à centro S, vsque ad peripheriam A B F, si nos concipiamus distantias omnes, licet ductas à centro S vsque ad circumferentiam A F, vt parallelas inter se, & ipsi A L, sumptis illis omnibus, quæ incidunt in arcum A B, quadrilaterum efficiemus comprehensum à duabus parallelis A L, & B M vsque ad S elongatum; quoniam autem ostensum est, quadrilaterum A B M L productum vsque ad S ad quadrilaterum B C N M, paritet vsque ad S elongatum eandem rationem habere posse, quam habet basis L M ad M N, absque sensibili errore, cum ob exiguitatem arcuum A B, B C, C D, &c. tales moræ parvæ sint, ac talia quadrilatera producta sint aggregata distantiarum omnium ab S vsque ad A F, quæ quidem mensurant omnes gradus retardationum decrescētium; ergo summa morarum, seu retardationum omnium ipsius mobilis, dum percurrit arcum A B, ad summam morarum omnium eiusdem, dum percurrit arcum B C, eandem rationem habebit, quoad sensum, quam habet L M, ad M N; & quoniam, vt dictum est, eiusmodi moræ non fiunt respectu centri L, sed respectu centri S, attamen exercentur per  
cir-

circumferentiam  $A B F$ , quam nunquam mobile derelinquit; ergo per talem circumferentiam  $A B F$  mobile retardatur respectu centri  $S$ , hoc est repulsæ, & retardationes fiunt per directionem  $F L$ , & secundum proportionem rectæ  $L M$ , ad  $N M$ ; sed licet arcus  $A B$ , &  $B C$  sint æquales inter se, diuersimodè tamen sunt inclinati respectu centri ipsius  $S$ , & respectu parallelarum  $A L$ ,  $B M$ ,  $C N$ ; ergo licet arcus  $C B$  sit æquales arcui  $B A$ , & mora ipsius  $M N$  minor sit mora  $L M$ , tamen ex præcedenti lemmate eiusmodi retardatio  $M N$  distributa per totum arcum  $B C$  oblique dispositum efficiet modificatum motum per  $B C$  omnino similem quoad sensum ei, qui à maiori mora  $L M$ , applicata tamen arcui  $B A$  directè opposito, producitur, ac proinde vltima retardatio  $P F$ , quamuis minima respectu centri  $S$ , sufficit tamen ad moram, & modum motui mobilis inferendum per arcum  $E F$ , tantum ad vnguem, quantum modificatus fuerat per arcum  $A B$ ; & quoniam maxima obliquitas arcus  $E F$  est in causa, vt possit subtendi à sinu verò  $P F$  ( arcus enim  $E F$  respectu centri  $S$  non occupat maiorem spatium, quàm  $P F$  ) ac ideò parua illa mora eundem producere debet effectum in  $E F$ , quem mora  $L M$  producit in  $A B$ ; ergo mobile per arcum  $A B F$  vni-formiter modificabitur ab inæqualibus moris  $L M$ , &  $M N$  decrecentibus respectu centri  $S$ , hoc est motus per  $A B F$  per omnes suas partes eadem proportione modificabitur, moraque afficietur illa scilicet vni-formitate, quæ propria erat mobilis antequam retardaretur, quod erat, &c.

**Fig. 33.**

*De Mediceorum synodica anomalia, cum eorum absidum  
linea perpendicularis fuerit ad lineam synodum.*

*Cap. XVI.*

**S**atis superius insinuatum est, synodum lineam, seu so-larem, quæ per centra Iouis, & Solis transit, vndique circumferti secando Mediceorum ellipses, dum Iuppiter  
suum

suum annum ( nobis duodecennem ) complet; His positis  
 facile constat, diuersis temporibus ellipticum orbem cuius-  
 libet Medicei varias constitutiones habere posse respectu li-  
 neæ synodicæ, cumque motus Iouis, ideoque translatio  
 iam dictæ lineæ synodicæ tarda valdè sit, compleaturque  
 anno Iouiali; & è contra motus proprius anomalie Medi-  
 ceorum velocissimus sit, quandoquidem omnium piger-  
 rimus diebus 16. horis 16. circiter completur, absque sen-  
 sibili errore supponi poterit, lineam synodicam cuiuslibet  
 Medicei in vna eius reuolutione in eodem situ stabilem per-  
 manere, ita vt aliquando iam dicta synodica linea, & ellip-  
 sis Medicei maior axis sibi mutuò congruant, scilicet No-  
 uimedicea, & Plenimedicea fiant in Apojouio, & Perijou-  
 uio; atque huiusmodi constitutio vocetur absidis synoda-  
 lis. Altera constitutio fiet tunc, cum iam dicta linea syno-  
 dica perpendiculatis est ad maiorem axim ellipsis Medicei,  
 scilicet cum in distantijs medijs ab Apojouio fiunt Noui-  
 medicea, & Plenimedicea; & talis constitutio absidis dico-  
 tomæ appelleretur. Tertia tandem constitutio intermedia  
 dicetur, eritque illa, in qua synodica linea inter Apojouium,  
 & longitudinem mediam incidit in qualibet ex hisce con-  
 stitutionibus. Videndum modò est, quanta, & qualis sit  
 synodica anomalia, & quo ordine procedat; Quoniam ve-  
 rò doctrinæ ordo exigit, vt à simplicioribus, & facillioribus  
 inchoemus, primò de absidis dicotomæ constitutione age-  
 mus, ostendemusque, eius anomalam synodicam ne mi-  
 nimum quidem perturbare, & alterare ordinem, disposi-  
 tionemque anomalie propriæ Medicei, sed effici tardiori  
 quidem motu, tanta tamen regula, & methodo, ac si Me-  
 dicei motus proprius careret superaddita synodica anoma-  
 lia.

Esto igitur orbis ellipticus alicuius Medicei A Q P N  
 cuius axis maior sit A P, minor verò K O, centrum globi  
 Iouis sit in eius polo G, extensoque axi minore K O vsque  
 ad Solem S, sicuti etiam Q G N S æquidistans K O, erit  
 proinde S N Q linea synodica, quoniam existente Mediceo  
 in Q

in Q fiet Plenimediceum, in N verò Nouimediceum. At  
 in Apojouio A, & Perijouio P fient maxime digressiones,  
 Fig. 34. & respectu ad maximam Medicei celeritatem, in suo orbe,  
 fit, vt in vno integro synodico cursu linea solaris S N Q per-  
 manere censeatur in eadem dispositione, & directione cum  
 recta Q N, quoad sensum, inquam, licet aliquantisper  
 ab eadem coincidentia remoueatur. In tali igitur constitu-  
 tione, vt clarius me explicem, fingamus, Iouis globum G  
 cum ellipsi Medicei A K P minime circa Solem S reuolui,  
 sed in vno determinato spatij mundani loco immobiliter  
 commorari, tunc quidem à rotatis radijs polaribus G A,  
 G B, &c. à vertigine iouialis globi circa centrum G, neces-  
 sarò stella Medicea reuolueretur circa eius ellipsim, inæ-  
 qualitamen velocitate, iuxta anomalie ellipticæ exigen-  
 tiam. Postmodum fingamus, Mediceum minime reuol-  
 ui circa Iouis globum, sed tantummodò transferri simul  
 cum Ioue circa Solem per circumferentiã A G P; tunc qui-  
 dem constituta stella in Plenimediceo K, quia duo globi  
 Iouis scilicet G, & Medicei K pensiles, & æquilibrari in  
 æthere fluidissimo ponuntur, necesse est, vt à radijs solari-  
 bus ambo globi circa Solem rotentur, vt vectis natura exi-  
 git, scilicet, quia radius S K longior est radio S G, tardius  
 mouebitur stella K, quam globus iouialis G, & propterea  
 illa non assequetur omnino excursus iouialis globi, sed  
 aliquantisper repedabit à K vsque ad M; è contra si Medi-  
 cea stella sita intelligatur in Nouimediceo O, quia radius  
 S O minor est radio S G, necessario stelliula O celerius mo-  
 uebitur, quam iouialis globus G, ideoque aliquantisper  
 promouebitur ab O vsque ad L, scilicet secundum ordi-  
 nem signorum ab Occalu ad Ortum, sicuti e contra in su-  
 premu situ K stella retrocesserat contra ordinem signorum  
 à K, ad M, hoc, inquam, necessario sequitur propter causas  
 allatas. Modò componantur dicti duo motus, vt reuera  
 ambos exequitur Natura, scilicet fiat motus anomalie stel-  
 læ in orbe elliptico A K P circa Iouis globum, pariterque  
 Iuppiter cum adiuncta ellipsi Medicei circa Solem reuolua-  
 tur,



tur, quia hę duę causę permanentes, & immutabiles sunt, quęlibet suum effectum producit, scilicet periodus anomalie circa Iouem dependens ab immutabili serie radiorum polarium  $GA, GB, \&c.$  perpetuò anomalie periodum eodem tenore perficiet, similiterque reliqua causa, scilicet reuolutio Iouis, & stellę circa Solem perseuerans, eadem varietatē producet, in Plenimediceo nimirum in  $K$ , fiet semper retrocessio  $KM$ , & in Nouimediceo  $O$  fiet promotio anteriùs  $GL$ ; hoc, inquam, sequetur necessariò, quia Mediceus non est affixus, vt clauus in peripheria rotę  $AKP$ , sed est pensilis, & omnino solutus, liberęque in æthere fluidissimo fertur, ne dum circa Iouem  $G$ , sed etiam circa Solem  $S$ , proindeque impossibile prorsus videretur, vt vn uersali Naturę legi nõ subiciatur, quę precipit, vt omnes planete in æthere fluido penduli, quò magis à Sole recedunt, tardius itinera sua peragant; quare fatendum est, Medicei motum  $AKP$ , retardari in Apojouio  $K$ , accelerari verò in Perijouio  $O$ . Si igitur hoc verum est, scilicet si duo effectus semper ab iisdem perseuerantibus causis pendentes consequuntur; igitur duo motus, anomalie scilicet, & retardationis simul perpetuò in motu mediocri reperiri debent commixti, & implicati, nimirum periodicus motus anomalie versùs Plenimediceum  $K$  exercebitur quidem sed mora, & tarditate affectus, retrocessione scilicet  $KM$ , & è contrà cursus periodicus in Nouimediceo  $O$  modificabitur sanò à pusilla promotione stellę ab  $O$  versùs  $L$ ; His positis supponamus, Mediceum suę anomalie periodum incipere ab Apojouio  $A$  per  $K$  vsque ad  $P$ ; & quia in tota hac semiperiodo distantia Medicei à Sole maior est mediocri distantia  $SG$ , quandoquidem semiellipsis  $AKP$  recedit à Sole ultra axim  $PA$ , & quò magis distantia Medicei à Sole augetur, eò magis realis eius velocitas circa Solem minuitur, vt demonstratum est; quare in tota semiellipsis  $AKP$  Mediceus tantò tardius cietur supra mediocritatē, quantò distantia  $SK$  superat mediocrem distantiam  $SG$ . Recordemur postea, Medicei motum secundum ordinem signorum

fieri ab A versus K P, pariterque motus circa Solem, sicut cum Ioue secundum signorum ordinem peragi, in hoc, inquam, motu Mediceus aliquantulum retardatur, ut dictum est, scilicet transitus stellæ ab A versus K remoram patitur, eique obsistitur, ac retrorsum repellitur, sed interim Mediceus non auellitur separaturque ab eius ellipsi A K P; nam in ea retinetur à virtute magneti analogâ; igitur huiusmodi retardatio, & retractio versus Occasum obstabit motui Mediceo versus Ortum in suo proprio orbe; supponamus iam, quod in motu per quadrantem A K retrocesserit Mediceus per arcum K M, ita ut si fuerit exempli gratia quartus Mediceus, qui si solummodo circa Iouem, non autem circa Solem reuolueretur, percurreret quadrantem A K diebus 4. H. 3. m. 30. sed superueniente impedimento retardante per arcum K M, ut dictum est, ut perficiat extremam particulam ab M ad K, requireretur tempus aliquod, ponamus, requiri H. 1. m. 17., igitur compositus motus retardatus atque modificatus ab A ad K efficeretur diebus 4. H. 4. m. 47. Et hic precipue animaduertendum est, quod, licet in A distantia à Sole sit mediocris, in puncto verò K maxima, non inde sequitur, ut propè terminum A retardatio sit nulla, & continuis incrementis augeatur vsque ad supremam distantiam K, quia, ut in lemmate quarto ostensum est, Mediceo

**Cap. 15.** motus uniformiter retardatur, & modificatur propè terminum A, ac in K, nec varietas intercedit animaduersione digna; si igitur motus proprius circa Iouem per A K uniformi repulso, seu remora modificatur, habebit talis motus eandem inæqualitatem seu anomaliam, quæ Eccentrico aut ellipsi A K P competit, hoc solum discrimine intercedente, quod huiusmodi nimirum compositus motus aliquantò tardior est, longiorique tempore completur, quam Mediceo ellipsim proprio motu percurrente, cōpetat, si circa Solem minimè ageretur. Hic iam notandum est, motum, & periodum anomalie modificatæ Mediceo ex duobus elementis componi ex motu nempe proprio in ellipsi, prout solummodo circa Iouem fertur, atque ex retardatio;

ne à motu annuo iouiali dependente; & quia numquam contingit, vt vnus motus solitarius absque alterius miscella obseruetur, cum numquam Iuppiter cesset à reuolutione circa Solem, propterea nos tali præiudicio tenemur, ac persuademur, huiusmodi motum modificatum proprium sibi-que connaturalem esse, ac Mediceo competere, neque vquam præiudicium conuinci posset, nisi vna ex his causis seu elementis, modificatum motum componentibus, tolleretur, & à reliqua segregaretur; attamen nouæ non sunt huiusmodi mixturæ motuum in Natura; sæpè enim sæpius, nedum duæ, sed etiam tres, & plures causæ diuersimodè mouentes simul operantur in eodem subiecto, quæ, si la- fuerint, reputabitur ille motus vnicus, ac simplex, licet sum- moperè compositus fuerit.

Fig. 34.

Sed vltèrius procedendo, dico, quod continuato Medicei motu à K, ad P efficietur modificatio tanta præcisè, quanta in quadrante A K; quia ducta qualibet recta linea B D parallela maiori axi A P, quæ ellipsim in duobus pun- ctis B, & D intersecet, duæ distantie à Sole S B, & S D repu- tari possunt inter se parallelæ, eruntque æquales inter se, & idè tarditates, inde fluentes, motumque periodicum fræ- nantes, erunt inter se æquales, & cum non possit assignari distantia à Sole in quadrante A K, quin alia ei æqualis in re- liquo quadrante K P reperiatur; hinc sequitur, vt omnes di- stantie à Sole, quæ in arcu A K assignari possunt simul sumptæ sint æquales omnibus remotionibus à Sole, quæ in arcu K P reperiiri possint: sed quot, & quales sunt remotio- nes, tot pariter, & tales sunt gradus tarditatis in ambobus quadrantibus resultantes; igitur moræ omnes, quæ in qua- drante A K effici possunt, æquales sunt ijs tarditatibus, quæ in reliquo quadrante K P fiunt; æquè igitur præcisè, & ea- dem periodo motus Medicei modificabitur in quadrante A K, ac in quadrante K P: verum tamen est, quod arcus A Q, vsque ad Plenimediceum maior est arcu Q P, idèque morè in eo factæ diutius perseuerabunt, quàm in isto, sed neutre præcipuum, & proprium Medicei periodum alterant,



vt in præcedentibus lemmatibus ostensum est; quapropter habebimus periodum compositam, seu modificatam tardam versus Apojouium A, velocem versus Perijouium P, quia factis angulis B C A, & D C P equalibus inter se in centro ellipsis habemus duas prosthæreses in ipso Ioue G, vnâ physicę, & realis tarditatis versus Apojouium, alteram optice, & apparentis; contra in Perijouio, cum angulus D G P maior sit angulo D C P excessu prosthæresis C D G. Patet igitur ex dictis, motum anomalie vniformiter retardari, & eodem ordine ac periodo absolui, quod efficeretur solitarius motus Mediceus, si solummodo circa Iouem, non autem circa Solem ageretur.

Accedamus iam ad inferiores arcus, scilicet Soli viciniiores, vt est P O; aio, periodum motus retardati, seu modificati per arcum P O esse præcisè similem, æqualem, leodemque tempore transgressam, & eadem periodo velocitatis, ac est illa, qui in arcu K P præcessit, quoniam recta K O bifariam in C secatur, distantia à Sole S O æquè deficiet à mediocri S C, ac maior distantia S K eandem superat; igitur ex superius dictis, quanto Mediceus in K tardior est, tanto in O erit celerior mediocri motu, qui distantie S C competit; igitur Mediceus, dum integrum arcum P O motu retrogrado transigit à P, versus O, repellatur circa Solem motu accelerato, & directo ab Occasu ad Ortum, ob minorem distantiam à Sole, præcisè, quantum motus directus à K ad P retardatus fuerat; nam vtrobique motus eunt inter se æquales, scilicet in superiori parte K proprio Mediceo motu ab Occasu, ad Ortum à K ad P facto obstabat contrariis retardatio à P versus K, cum maior à Sole distantia S K ratione vectis tardio rem eum efficiebat, quam mediocri motus exigebat, at in inferiori arcu P O à P versus O, scilicet ab Ortum ad Occasum retardatur, frænaturque à motu contrario ab O versus P directo, superante quâ mediocri celeritate circa Solem, ob vectem diminutam S O; quapropter si in retrogrado transitu P O tepallus velocitatis maioris circa Solem fuerit O L, necessario Mediceus pertransibit solum;

modò arcum  $PL$ ; vt verò arcum  $PO$  perficiat; requiritur tempus prorsus æquale ei, quod in arcu  $KP$  insumptum est; quapropter motus retardati, atque modificati  $KP$ , &  $PO$  temporibus planè æqualibus perficientur: ducta postmodum qualibet recta linea  $DI$  parallela axi minori  $KO$ ; que ellipsim secet in punctis  $D$ , &  $I$ , atque maiorem axim in  $E$ , erit  $DE$  æqualis  $EI$ , proindeque excessus distantie à Sole  $SD$  æqualis erit defectui minoris distantie  $SI$  ab eadem mediocri distantia  $SE$ ; quapropter retardatio circa Solem (ratione vectis maioris  $SD$ ) æqualis præcisè erit accelerationi (ratione minoris vectis  $SI$ ) supra mediocrem velocitatem: cumque hoc verificetur in reliquis omnibus punctis oppositis ellipsis; ergo gradus omnes retardationis Fig. 34 supra mediocritatem, per arcum  $KP$  facti, æquales erunt gradibus omnibus velocitatis supra eandem mediocrem, qui efficientur per arcum  $PO$ , eò quod omnes maiores distantie simul sumptæ,  $SK$ ,  $SQ$ ,  $SD$  mediocres distantias tantum superant, quantum omnes distantie  $SO$ ,  $SN$ ,  $SI$  ab iisdem mediocribus deficiunt; igitur gradus omnes retardationis, qui fiunt per arcum  $KP$ , exercentur quoque per arcum  $PO$ ; quapropter in duobus arcibus  $KP$ , &  $PO$  gradus æquales retardationum exercentur eodem ordine, frequentia, & tempore, hi verò repulsus applicantur proprijs motibus Medicei in arcibus ellipsis  $KP$ , &  $PO$  æqualibus, & similibus inter se, & æqualibus temporibus transgressis, suntque uniformiter dispositi respectu Solis, scilicet eadem obliquitate eum respiciunt; igitur periodus modificata per arcum  $KP$ , omnino æqualis, similis, & æquali tempore fiet, ac motus modificatus per arcum  $PO$  absoluitur.

Tandem modificatus motus in arcu  $OA$  iisdem de causis similis planè, & æqualis erit motui modificato per arcum  $AK$ , proindeque in inferiori semiellipsi  $POA$ , motus uniformiter retardatus primariam periodum Medicei respectu Iouis omnino non alterat, & initio sumpto à maxima velocitate in  $P$  perueniet ad mediocrem velocitatem in  $N$ , & tandem maximam tarditatem in  $A$  essequetur; atque hæc

ex physica inæqualitate, & optica composita, erit planè eadem, quæ in semiellipsi superiore; & quoniam duo transitus per semiellipses  $AkP$ ,  $POA$ , licèt sint retardati, & modificati æqualibus tamen temporibus, & velocitatum incrementis, aut decrementis, atque in similibus dispositionibus, & distantijs à Ioue fiunt, certè censerì debet, periodum modificaram, vniformiter, & regulariter procedere, non autem perturbatè, licèt ex duobus elementis componatur, vt dictum est, nempe ex motu anomalix, stellæ competenti, prout circa Iouem circumducitur, & ex retardatione, quæ ex motu circa Solem originem ducit.

**Fig. 35.** Ex dictis facilè colligitur, quod si Sol non versùs  $N$ , sed versùs oppositam partem  $Q$  constitueretur, vt nimirum Nouimediceum esset in  $Q$ , & Plenimediceum in  $N$ , eadem periodus, & ordo retardationis vniformis, & æqualis fieri deberet, scilicet superiores per semiellipsim  $PNA$  essent pares, æquales, eodem ordine, & periodo, ac fiunt retardationes per infimam semiellipsim  $AQP$ , propterea quod distantix à Sole eadem planè essent, eodemque modo dispositæ, cum hoc vnico discrimine, quòd priùs incipiebant ab Apojouio  $A$ , modò à Perijouio  $P$  initium sumunt; antea in primo, & quarto quadrante ellipsis motus tardus fuerat, at in secundo, & tertio quadrante modificatus motus velox, modò in primo, & quarto quadrante velox efficitur, in reliquis tardus, at cum semper cursus veloces inter se comparati, atque tardi inter se sint æquales, existentibus nimirum distantijs à Sole iisdem perpetuò, situationibus, ac dispositionibus iisdem, necessariò in vtroque casu periodus modificata eadem omnino erit.

*De Mediceorum synodica anomalia, cum absidum, atque  
synodum linea sibi mutuò congruunt.*

*Cap. XVII.*

**P**RO absidis synodalis constitutione intelligatur idem or-  
bis ellipticus Medicei A M P O, atque linea solaris  
S P A, seu synodorum, cum maiori ellipsis axi A P conue-  
niant, ita vt Apojouium, & Plenimediceum in A conue-  
niant, pariterque Perijouium, & Nouimediceum in P coin- Fig. 36.  
cidant. Ostendendum est, tunc temporis motum Me-  
dicei modificatum, non vt antea simplicem, & inaltera-  
tum, sed tardissimum esse in Apojouio, celestimum in  
Perijouio multò magis, quam in precedenti constitutione  
absidis dicotomæ apparebat, vt nimirum tum physica, tum  
optica prosthaphæresis valdè augeatur, at periodus integra  
eodem ferè tempore complebitur, ac præcedens. Secentur  
in maiori axi rectæ G Q, & G N æquales semiaxi minori eius-  
dè ellipsis, proindeque distantia G A à Ioue, poloque ellipsis,  
ad Apojouium, tantò maior est mediocri distantia G Q, vel  
G N, quantò distantia G P eadem mediocri minor est: ma-  
nifestum est etiam, quod distantia à Sole S A superat medio-  
crem distantiam S G eodem excessu, quo minima distantia  
S P, ab eadem mediocri S G deficit; cumque Mediceus  
quatenus in æthere fluido circa Solem voluitur, subiciatur  
tarditatibus, atque celeritatibus, quas maior, vel minor di-  
stantia à Sole efficit, necessariò in Apojouio A Medicei tar-  
ditas mensurabitur ab excessu distantie S A, atque in Perijo-  
uio P velocitas eius mensurabitur à defectu distantie S P ab  
eadem mediocri S G. Atque hic notandum est, quod in  
quadrante superiori A M tarditas, qua Mediceus afficitur  
in proluxa illa distantia à Sole, tanto maior erit tarditate, quæ  
in precedenti constitutione absidis dicotomæ habebat,  
quando Aphelion in Q erat, quantò distantia S A maior est  
distantia S Q, & econuersò Medicei velocitas in P minor  
erit velocitate, qua in distantia S N præcedentis constitutio-  
nis

nis afficiebatur, quandoquidem existente  $GP$  minore quam  $GQ$ , seu  $GN$ , erit distantia  $SP$  maior distantia  $SN$ ; igitur in hoc casu stella in  $P$ , magis à Sole recedit quam in puncto  $N$  coniunctionis alterius casus dicotomæ. His positis, supponamus, Mediceum ab Apojouio  $A$  cursum inchoare ubi Soli opponitur, & primò moueatur eo elemento velocitatis, quæ ei competit, quatenus solummodo circa Iouem fertur, manifestum est, huiusmodi motum dupliciter modificari posse, primò mediocri retardatione, vt inde oriatur imperus modificatus, qui sit verbi gratia  $E$ , & competat distantie  $SQ$  constitutionis ablidis dicotomæ; cum hac inquam mediocri tarditate tempore  $T$  percurrat spatium  $AM$ . Secundo modo modificari potest, iam dictum primum periodici motus elementum maiori retardatione iuxta exigentiam maxime distantie  $SA$  constitutionis synodice, vnde resultabit velocitas modificata  $R$ , minor quam  $E$ , cum qua stella idem spatium  $AM$ , tempore  $X$  percurrat; proculdubio modificata velocitas  $R$  tantò languidior, & tardior erit modificata velocitate  $E$ , quantò illa mora hanc retardationem superat; nempe quantò distantia  $SA$  maior est distantia  $SQ$ ; quando verò duabus inæqualibus velocitatibus  $R$ , &  $E$  idem spatium  $AM$  transigitur, oportet, vt velocitates reciproce proportionales sint temporibus, quibus transitus fiunt, siquidem ambo motus per  $AM$  uniformiter crescentes à summa tarditate in  $A$  supponantur; igitur vt velocitas  $R$ , ad velocitatem  $E$ , ita erit tempus  $T$ , ad tempus  $X$ , ac proinde tempus  $X$  maior erit tempore  $T$ , & in prædicto maiori tempore Medicea stella percurrit arcum  $AM$ : at in præcedenti dicotoma constitutione eum pertransibat minori tempore  $T$ ; ergo in synodica constitutione motus per arcum  $AM$  tantò tardius erit motu constitutionis dicotomæ, quantò tempus  $X$  superat tempus  $T$ .

Postea, quia motus per inferiorem arcum  $MP$  respectu  
*Fig. 36.* Solis retrogradus est ab  $M$  ad  $P$ , ab Ortum scilicet ad Occasum, sed interim Mediceus fertur circa Solem ab Occasu, ad Ortum, scilicet a  $P$  versus  $M$ ; & quia distantia  $SP$  minor est  
 di.



distantia  $S G$ , necesse est, ut stella in  $P$  ob breviorē vectem  
 $S P$  velocius feratur, quā exigat vectis maior  $S G$ , & ideo  
 huiusmodi velocitas à  $P$ , versus  $M$  opponitur & obstat re-  
 trogrado motui ab  $M$  versus  $P$ ; at quia distantia à Sole  $S P$   
 maior est distantia  $S N$ , oportet, ut velocitas stellæ in  $P$   
 versus  $D$  circa Solem ratione vectis minor sit velocitate  
 eiusdem stellæ in  $N$  constitutæ, ut nimirum in hac synodi-  
 ca constitutione repulsus eiusdem stellæ debiliores sint, &  
 minus efficaces eis, qui in constitutione dicotoma  $N$  effi-  
 ciebantur; cum igitur repulsus, & contrarietas, seu re-  
 frenatio motus stellæ ab  $M$  ad  $P$  torpidior sit, atque languidior *Fig. 3. 6*  
 dior, necesse est ut motus modificatus, qui remanet, & quo  
 mouetur per  $M P$ , velocior sit tarditate moderata, qua in  
 dicotoma constitutione idem Mediceus ferebatur.

His declaratis noto, quod motus per arcum  $M P$ , usque  
 ad Perijouium potest pariter duplici ratione modificari, pri-  
 mō adhibita mediocri mora, & renitentia, ut exigat vectis  
 distantia  $S N$ , postea minori, & languidiori repulsu, & ob-  
 staculo, ut exigat vectis distantia  $S P$  maior, quā  $S N$ , qui  
 repulsus inæquales inter se, & exerceantur contra naturalem  
 propriam velocitatem, qua Mediceus circa Iouem moueri  
 deberet, resultabit modificata velocitas  $E$  constitutioni di-  
 cotomæ competens, minor velocitate modificata  $Y$ , quæ  
 synodice constitutioni conueniat; supponatur modò, stel-  
 lam in dicotoma constitutione percurrere arcum  $M P$  ve-  
 locitate  $E$ , atque tempore  $V$ , sed in synodica constitu-  
 tione idem eilipsis spatium  $M P$  percurratur velocitate  $Y$ ,  
 tempore  $Z$ ; igitur idem spatium  $M P$  transigitur ab eodem  
 Mediceo in dicotoma constitutione modificata velocitate  
 $E$ , & tempore  $V$ , atque in synodica constitutione eum per-  
 currit velocitate modificata  $Y$ , tempore  $Z$ ; proinde que  
 erunt omnino velocitates proportionales temporibus reci-  
 proce, quandoquidem transitus sunt uniformiter crescen-  
 tes; quapropter sicuti velocitas modificata  $Y$  maior est mo-  
 dificata velocitate  $E$ , ita tempus  $V$  maior erit tempore  $Z$ ;  
 patet igitur, quod eadem stella percurrit in constitutione

O

syno.

synodica idem spatium  $M P$  maiori velocitate modificata, & minori tempore, quam in constitutione dicotoma: at tamen prius arcus  $A M$  transigebatur minori velocitate  $R$ , quam  $E$ , & tempore  $X$  maiori, quam  $T$ , quod in dicotoma constitutione requirebatur; ergo in constitutione synodica arcus  $A M$  pereurritur minima velocitate  $R$ , & prolixo tempore  $X$ , at arcus  $M P$  peragitur maxima velocitate  $Y$ , & minimo tempore  $Z$ ; quapropter periodus anomalie in hac constitutione synodica erit multo magis difformis, & irregularis, quam anomalia constitutionis dicotomae, quae, ob sui simplicitatem, & ordinem, Medicei propria & naturalis existimabatur, seu potius ei tribuobatur; attamen altera anomalia synodica, quae enormi difformitate afficitur, ut noua, & superaddita anomalia concipitur, & usurpatur, quae maiori prosthapherefi physica, & optica mensuratur.

Fig. 36. Si postmodum animadvertamus, excessum temporis  $X$  supra tempus  $T$  æqualem ferè esse excessui temporis  $V$  supra tempus  $Z$ , eò quod mensurantur à retardationibus stellæ, & quanto distantia  $S A$  superat distantiam  $S Q$ , tanto retardatio synodica suprema superat supremam retardationem dicotomam, pariterque quanto distantia  $S P$  superat distantiam  $S N$ , tanto retardatio infima synodica deficit ab infima retardatione dicotomae; estque excessus  $S A$  supra  $S Q$ , equalis excessui  $S P$ , supra  $S N$ , qui excessus, & defectus comparati ad maximam distantiam Iouis à Sole pupilli, & insensibiles sunt; igitur excessus temporis  $X$  supra tempus  $T$  proximè æqualis est excessui temporis  $V$  supra tempus  $Z$ ; quapropter duo extrema tempora  $X$ , &  $Z$  simul sumpta ferè æqualia erunt duobus temporibus intermedijs  $T$ , &  $V$ : sed tempore  $T V$  transferebatur Mediceus ab Apojouio  $A$ , ad Perijouium  $P$  in dicotoma constitutione; igitur æquali tempore  $X Z$  in hac synodica constitutione Mediceus pertransibit semiellipsim  $A M P$ ; quapropter, licet anomalia synodica sit valdè difformis, nihilominus integer transitus æquali ferè tempore perficietur ei quo dicotomae

constitutionis periodus transigebatur.

Facile postmodum percipitur ob eandem rationes, quod in transitu Medicei per semiellipsim  $P H A$  denuo repetat eandem inaequalem anomaliam, quam in precedenti semiellipsi exercebat; ducta enim qualibet recta linea  $B H$  parallela axi minori, coniunctisque solaribus radijs  $B S$ , &  $H S$ , erunt hi aequales inter se, & ideo retardationes, & velocitates modificate, quae in hisce locis exercentur, erunt plane aequales inter se, habiles nimirum ad percurrenda spatia equalia temporibus equalibus per arcus ellipsis uniformiter ad Solem inclinatos, & propterea necesse est, ut in tota semiellipsi  $P H A$ , motus omnino similis, equalis, & eodem tempore fiat, ac in semiellipsi  $A B P$ ; different tamen in hoc, quod in semiellipsi  $A B P$  a termino summae tarditatis pervenitur ad maximam velocitatem in  $P$ , at in semiellipsi  $P H A$  contrario ordine proceditur, a maxima enim velocitate in  $P$ , decrecendo, pervenitur ad summam tarditatem in  $A$ , proindeque in prima semiellipsi physica, & optica prosthapheresis semper subtrahi debet a medio cri imaginario illo motu constitutionis dicotomae; at in secunda semiellipsi eadem prosthapheresis motui medio imaginario addenda est.

Vocatur quoque axis synodicae constitutio, quoties Perijonium  $P$  in Pleni-mediceo constituitur, atque Apojonium  $A$  in Noui-mediceo incidit. In hac pariter constitutione anomalia erit omnino similis, & eadem inaequalitate affecta, ijdem temporibus peracta, ac in altera synodica constitutione hactenus explicata contingebat; quando Pleni-mediceum, & Apojonium coincidebant; hoc autem facile ostendi potest, quia distantia Medicei  $P$  a Sole, scilicet  $S P$ , modo minor erit distantia  $S N$  constitutionis dicotomae, & ideo stella in  $P$  minus retardabitur respectu Solis, quam in  $N$ , proindeque motus velox proprius Medicei respectu Iovis per arcum  $P O$  minus retardabitur, quam in dicotoma constitutione in  $N$ ; & quotiescumque idem motus minus retardatur, tunc modificatus velocior remanet;

igitur motus per arcum  $PO$  velocior erit eo, qui in constitu-  
tione dicotoma efficiebatur, & propterea breviori tem-  
pore propter causas superius expositas, scilicet iuxta diffe-  
rentiam distantiarum  $SP$ , &  $SN$ ; & quoniam perinde est, si  
proprius motus per  $PO$  retardetur in Plenimediceo, ac in  
Novimediceo, dummodo repulsus, & tarditates æquales  
sint inter se; igitur cum Plenimediceum efficietur in  $P$ , erit  
modificatus motus per  $PO$  æqualis, & uniformis eodem-  
que tempore peractus, ac competit eidem arcui  $PO$ , cum  
Novimediceum celebratur in  $P$ ; differunt solummodo in  
hoc, quod in presenti constitutione motus proprius stelle à  
 $P$  ad  $O$  est directus ab Occasu ad Ortum, repulsus verò, &  
retardatio contrario ordine efficitur ab Ortum ad Occa-  
sum, ac prius, quando  $P$  constituebatur in Novimediceo,  
motus stelle per arcum  $PO$  retrogradus erat, retardabatur-  
que non à mora, sed à directa velocitate aucta circa Solem  
ab Occasu ad Ortum; itaque in utroque casu æquè retar-  
datur, quia semper ea mora, quæ à Sole pendet, sibi ipsi  
æqualis est, semperque exaduersò motui proprio Medicei  
contranitur, proindeque eadem planè modificatione, &  
tarditate eum afficiet.

Procedendo postmodum ad infimum arcum  $OA$ , hic  
pariter minima distantia  $SA$ , ratione vectis circa Solem, af-  
fert velocitatem tantò maiorem mediocri, quantò distantia  
à Sole  $SA$  minor  $SG$ , & ideo velocissimè circumferetur  
Mediceus circa Solem ab Occasu ad Ortum, scilicet ab  $A$   
versus  $O$ , & hoc grandè impetu contraponitur mediocri  
motui retrogrado stellulæ per arcum  $OA$ , à quo nunquam  
discedit, igitur in tali casu motus modificatus per arcum  
 $OA$  valdè retardabitur; cumque talis retardatio mensure-  
tur à defectu distantie  $SA$  à distantia mediocri  $SG$ , & prius,  
quando Plenimediceum in  $A$  celebrabatur, retardatio ab ex-  
cessu distantie  $SA$  supra mediocrem distantiam  $SG$  men-  
surabatur, cum ille defectus æqualis sit huic excessui, neces-  
sariò repulsus, & retardationes æquales erunt inter se, quæ  
applicatæ eidem motui per arcum  $OA$ , qui eidem Mediceo

circa

circa Iouem competere, sequitur, ut in utroque casu motus  
 modificatus sit præcisè æqualis vniformi anomaliæ, & eo-  
 dem tempore transactus, propterea quòd semper excessus,  
 atque defectus distantiarum à Sole in respectu ad mediocres  
 distantias dicotomas sunt eadem, & ideò incrementa, & de-  
 crementa graduum tarditatis erunt omnino inter se æqualia  
 in omnibus locis correspondentibus; quapropter dubitan-  
 dum non est, quin in qualibet positione duarum constitu-  
 tionum Absidis synodicæ, siuè Plenimediceum, aut Noui-  
 mediceum in Apojouio constituatur, semper motus modi-  
 ficatione affectus Medicei eodem modo, eadem prosthaphé-  
 resi eodemque tempore efficiatur. Tandem, quia nedum  
 in constitutione Absidis dicotomæ, sed etiam in illa Absi-  
 dis synodicæ primum elementum motus proprii Medicei  
 in ellipsi retardatur, nec vnquam tali retardatione denuda-  
 tum à nobis reperiri potest, cum numquam Iuppiter cesset  
 ab eius motu circa Solem, persuasi erimus, motum sim-  
 pliciore, & minùs alteratum, minùsque irregularem in-  
 ter omnes, qui in ipsis Mediceis apparent esse proprium, &  
 connaturalem earundem stellarum in sua ellipsi, cumque  
 is in constitutione dicotoma contingat, facile persuade-  
 mur, anomalam illam modificatam simplicissimam, &  
 & propriam, atque naturalem esse eiusdem Medicei, cum-  
 que postmodum videamus, in synodica constitutione mo-  
 tum illum insigni affectum alteratione, putamus nouum  
 quid inesse, & superadditum primæ illi simplici anoma-  
 liæ constitutionis dicotomæ; & hæc omnia declarari debue-  
 rant.

*De Mediceorum synodica Anomalia, quæ in intermedia Absidis  
 constitutione contingit. Cap. XV III.*

**P**ostquam duæ præcipuæ constitutiones synodicæ Ab-  
 sidis atque dicotomæ expositæ fuerint, facile inde per-  
 cipientur varietates in constitutionibus intermedijs subse-  
 cuturæ; hæc autem quadruplicem varietatem admittunt,  
 prout

prout Medicee ellipsis eiusque axis maior diuersimodè si-  
 tuatur, quæ vt clariùs percipiantur, supponatur Sol in S,  
 Iuppiter verò in G, quem Medicee ellipsis ambiat A M P R,  
 huius Apojouium sit A, Perijouium P; cumque linea so-  
 laris S G inter axim maiorem A P, & diapolum M R inter-  
 cipitur, tunc vel Plenimediceum B in primo ellipsis qua-  
 drante A M cõstituitur, vt in prima figura. Nouimediceum  
 verò D in tertio quadrante P R, & hæc erit prima constitu-  
 tio intermedia. Econtra, permanente adhuc solari linea  
 in eodem situ S G, potest, inquam, Sol in parte aduersa B  
 collocari, tuncque in puncto B Nouimediceum efficietur,  
 in D verò Plenimediceum, atque hæc erit secunda consti-  
 tutio intermedia. Postmodum linea solaris S G. secet secun-  
 dum quadrantem M P, & quartum A R in F, & E; siquidem  
 Nouimediceum fiat in F in secundo quadrante, & Plenime-  
 diceum in quarto quadrante E, erit hæc tertia constitutio in-  
 termedia; Sed transposito Sole versùs E, vt nimirum ibidem  
 Nouimediceum celebretur, atque Plenimediceum in F, habe-  
 bimus quartam intermediam constitutionem, & in hisce  
 omnibus constitutionibus semper Apojouium synodicum  
 erit punctum B, vel E, quod propinquius est Apojouio el-  
 lipsis A, atque omnes habebunt duas inæqualitates, primam  
 illam nimirum propriam Medicee, quatenus reuoluitur cir-  
 ca Iouem, alteram retardationis, quæ à motu annuo iouia-  
 li dependet; quæ semper in Plenimediceo, vel Nouimedi-  
 ceo B vel E, quod Apojouio proximus est, initium sumit;  
 verumtamen huiusmodi superueniens retardatio, seu mo-  
 dificatio semper minor est ea, quæ constitutioni absidis sy-  
 nodicæ conuenit, maior verò illa, quæ constitutionis Absi-  
 dis dicotomæ, propria est. Hæc omnia in primo casu tan-  
 tum modò ostendemus, ex quo reliqua patebunt; fiat ergo  
 distantia G a æqualis G A, & distantia G m, æqualis G M,  
 pariterque distantia G p æqualis G P, & tandem distantia  
 G r æqualis G R; manifestum est, quod distantia à Sole S a  
 æqualis erit distantia Apheliæ cõstitutionis synodicæ S G A,  
 & distantia S m erit æqualis distantia Apheliæ constitutio-  
 nis

nis dicotomæ  $S G M$ , & econtrâ distantia  $S p$  æqualis erit  
 distantia Periheliæ constitutionis synodica, & denique di-  
 stantia  $S r$  æqualis erit distantia Periheliæ constitutionis di-  
 cotomæ; hinc facilè percipitur quod distantia  $S B$  minor est  
 distantia  $S a$ , maior verò distantia  $S m$  ( propterea quod, in  
 ellipsi,  $G A$  maior est, quàm  $G B$ , at  $G M$  minor est eadem  
 $G B$  ) proindeque retardatio, quam motui Medicei in arcu  
 $B F$  confert distantia  $S B$ , tantò minor est tarditate à distan-  
 tia  $S a$  constitutionis synodicae dependente, quantum  $S B$  *Fig. 38.*  
 minor est  $S a$ , pariterque retardatio dependens à longitudi-  
 ne vectis  $S B$ , tantò maior est tarditate producta à distantia  
 $S m$  constitutionis dicotomæ, quantum  $S B$  maior est  $S m$ ;  
 cum igitur mora, & repulsio in  $B$  minor sit retardatione  
 constitutionis synodicae, & maior illa, quæ dicotomæ  
 constitutioni conuenit, deducitur, quod motus tardita-  
 te moderatus à  $B$  vsque ad  $F$  velocior sit, quàm in syno-  
 dica constitutione, sed tardior quàm in constitutione dico-  
 toma. Idem prorsùs intelligi debet in reliquis quadranti-  
 bus, vt nimirum motus modificatus per totam hanc men-  
 struam Mediceam constitutionem minori inæqualitatis af-  
 ficiatur anomalia, quàm in constitutione synodica, maiori  
 verò, quàm in dicotoma constitutione alteratus fuerat; at-  
 tamen quia anomalia constitutionis dicotomæ, utpotè sim-  
 plicior, minùsque alterata, censetur veluti propria, & pe-  
 riodica Medicei planetæ, propterea in hac intermedia con-  
 stitutione facilè persuademur, illam inæqualitatem, dico-  
 tomæ periodo superadditam, esse nouam anomalam.  
 Adnotandus quoque est situs ellipsis, in quo huiusmodi no-  
 ua prostaphæresis synodica applicatur; nam in primo qua-  
 drante  $B F$  prostaphæresis semper est ablatiua, retardat-  
 que motum Medicei, sed, cum applicetur arcui  $M F$ , in  
 quo ex sui natura motus Medicei velox est, scilicet à medio-  
 critate crescens, inde fit, vt tarditas collata minuatur propriam  
 celeritatem, arcui  $M F$  competentem. Pari modo in ter-  
 tio quadrante  $D E$  anomalia menstrua Medicei celeritatem  
 affert aliquam motui per arcum  $R E$ , tardo ex sui natura.

Idem

Idem contingit in reliquis omnibus quadrantibus aliarum constitutionum, quæ non indigent prolixiori expositione, cum satis superque pateant; quamobrem ab eisdem causis in quatuor omnibus constitutionibus alterari debet cursus modificatus cuiuslibet Medicei, minus, quam in synodica constitutione, & magis, quam in dicotoma; verum tamen est, quod temporum spatia à Plenimediceis ad Nouimedicea non erunt prorsus inter se æqualia; quotiescumque enim in trāsitu ab vna ad aliam synodum intercipitur Apojouium maiori tempore absoluetur v. g. in primo casu tempus à Plenimediceo B, ad Nouimediceum D breuius erit spatio temporis à Nouimediceo D ad Plenimediceum B, proptereaquòd arcus ellipsis B F D minor est, quam arcus D A B, & in illo motus proprius Medicei velox est propè Perijouium P, sed tardius circa Apojouium A; quapropter ab his duabus causis primum temporis intervallum breuius redditur secundo. Idem esto iudicium in reliquis alijs casibus.

*De synodica Anomalia perpetua Mediceorum, seu de nuncupata Varietate. Cap. XIX.*

**C**VM præter anomalam menstruam temporariam, subiiciantur Medicei menstruæ quoque anomalie perpetuæ, cui nomen varietatis tribui solet, perquirendæ pariter sunt physicæ causæ huius inæqualitatis, quæ eius naturæ est, vt in omnibus mensuris reuolutionibus, absque vlla exceptione semper Medicei cursum alteret, atque perturbet; in superiori enim semicirculo versùs Plenimediceum stellæ cursus acceleratur à prima quadratura vsque ad Plenimediceum, & inde retardatur vsque ad secundam quadraturam, à qua denuò celerior fit quousque ad Nouimediceum perueniat, & tandem rursùs retardatur, quousque primam quadraturam attingat, redditurque conspicua huiusmodi inæqualitas in locis intermedijs inter quadraturas, & synodos. Modò vt causâ huius effectus, percipiatur  
denuò




denuò ad penduli & vectis proprietates redeundum est; sit  
 igitur libra A B horizontaliter conuertibilis circa centrum  
 S, & in equalibus à centro distantijs duo equalia pondera  
 G N, & H O suspcndantur, experientia magistra in horologijs *Fig. 40.*  
 ex rotis dentatis compositis in quibus apponi solet huius  
 modi libra horizontaliter conuertibilis, videmus, quod vir-  
 tus motiua prementis alicuius ponderis perpetuis oscilla-  
 tionibus horizontalibus hinc inde circa centrum S vertit li-  
 bram A B, fiuntque huiusmodi oscillationes iisdem semper  
 temporibus: si postea in duabus pariter equalibus distantijs  
 S A, & S B maioribus duo pondera equalia N, & O suspen-  
 dantur, efficiuntur conuersiones eiusdem libræ tardiores, il-  
 cet virtus motiua libræ circumagitans sit semper eadem,  
 hoc, inquam, accidit, quia centrum grauitatis duorum pon-  
 derum G, & A incidit in puncto C intermedio inter G, &  
 A, & proinde ambo suspcnsa censerì debent ex puncto C,  
 remota scilicet à centro S, magis quam pondus G N suspen-  
 sum fuerat, non secus duo pondera H, & B suspenduntur  
 ex eorum centro grauitatis D, quod magis à centro S rece-  
 dit, quam pondus H O, quapropter equalia pondera suspen-  
 duntur in distantijs equalibus S C, & S D, & quælibet earum  
 maior est vecte S G, vel S H, eadem verò virtus motiua lon-  
 giori vecte tantò tardius mouet, quam breuiori vecte, quan-  
 tum reciproce distantia S G minor est distantia S C. Transpo-  
 sitis postea ponderibus A, & B in punctis E, & F cætro vicino-  
 ribus quam G, & H, & equè remotis à centro S, resultabunt  
 vertigines eiusmodi libræ velociore, quam in precedenti  
 casu, quia centrorum grauitatum earum I, & L distantia à  
 centro S erunt minores, quam distantia S C, & S D; propte-  
 rea que eadem virtus motiua vectem minorem S I maiori  
 efficacia circumaget, quam maiorem vectem S C prout di- *Fig. 41.*  
 stantia S C maior est distantia S I. His declaratis intelliga-  
 rur rota A E P B. in cuius centro sit corpus graue aliquod  
 G quod reuoluatur cum annexa rota per circumferentiam  
 circuli B G E circa centrum S, sitque motus centri G à B  
 versus E, ponaturque postea in circumferentia rotæ nau-  
 P cula

eula, seu vas aliquod  $R V$  plenum aqua, in qua natet pila  
 lignea  $A$ , sitque primò vas in loco remotissimo rotæ à cen-  
 tro  $S$ , in eadem recta linea  $S G A$ ; supponaturque rota, &  
 vas  $R V$  prorsus omni pondere carere, quod fiet, si machi-  
 na vniuersa super aquam stagnantem innatet; supponatur  
 pariter vectis, seu libra  $S G A$  reuoluta ab eadem virtute  
 motiua, & primò ablata pila lignea  $A$  è nauicula & reposi-  
 ta in  $G$ , iam dicta virtus motiua impellet graue  $G A$  vecte  
 $S G$  per circumferentiã  $B E$  certa, & determinata quadã ve-  
 locitate; at postmodum translato graui  $A$  è loco  $G$  ad vas  
 $V R$ , in quo innatat suspenditurque in extremo vectis  $S G A$ ,  
 tunc quidem centrum comunis grauitatis corporum  $G$ , &  
 $A$  cadet in  $H$  inter  $G$ , &  $A$  interceptum, eritque tale pun-  
 ctum suspensionis amborum corporum  $G$ , &  $A$ , ( neque  
 enim vasis  $V R$  vlla ratio habenda est, cum nullius graui-  
 tatis suppositum fuerit ) ambo igitur modò suspendentur in  
 Fig. 41. maiori distantia  $S H$ , quàm prius in  $G$  suspensa fuerant; sed  
 eadem virtus motiua maiori vecte  $S H$ , tardius impellit  
 graua  $A$ , &  $G$ , quàm minori vecte  $S G$  pro mensura defe-  
 ctus distantie  $S G$ , à distantia  $S H$ ; igitur quando in extre-  
 mitate vectis reponitur graue  $A$ , translatio corporis  $G$  tar-  
 dior efficitur: at quotiescumque translatio corporis  $G$  à  $B$   
 versus  $E$  retardatur, necesse est, vt eius sistematis, seu rotæ  
 cui affigitur retardetur quoque motus circa centrum  $S$ ;  
 proindeque vasi  $R V$  rotæ affixo tarditas aliqua inferetur, à  
 qua primèua eius velocitas moram aliquam patietur: at-  
 tamen in eodem instanti, in quo motus vasis retardatur, non  
 poterit imminui velocitas contenti fluidi, & natantis cor-  
 poris  $A$ , quia non affiguntur ipsi rotæ; necesse est igitur,  
 dum motus corporis  $G$ , & vasis  $R V$  retardatur, vt corpus  $A$   
 solutum, & natans retineat suam, quam prius conceperat,  
 velocitatem, eamque exerceat, & propterea antrorsum ali-  
 quantulum excurrat ab  $A$  versus  $K$ , vt proinde fiat quæ-  
 dam anticipatio corporis  $A$  respectu centri rotæ  $G$ . Postmo-  
 dum si vas  $V R$  rotetur quoque circa  $G$  per semicirculum  
 $B A E$ , & intereà centrum  $G$  feratur per circumferentiam  
B E,

BE, tunc motus corporis G retardatur successivè incipiendo à termino B, prout magis vas à termino B recedit, & prout magis distantia SA augetur vnà cum vecte SH. Hinc fit, vt post discessum corporis A à termino B aliqua eius anticipatio fiat versùs K, & prout magis recedit à centro S, semper magis, ac magis anticipatio illa crescet, quousque maxima efficiatur, quando ad extremitatem rectæ SGA peruenerit, & hinc excurrento vsque ad E denuò successivè decurtatur vectis SH, proindeque motus centri G vna cum rota, & vase circa S successivè accelerabitur, prout centrum grauitatis H magis centro S appropinquatur, sed quando motus corporis G cum rota, & vase acceleratur, non poterit eodem instanti noua illa velocitas conferri soluto, & natanti corpori K, in quo præcedens tarditas ei impressa adhuc viget; igitur aliquantisper retrorsum remanebit, nec poterit pari passu, & æquali cursu, vasis, & rotæ velocitatem maiorem adæquare, atque hoc de causa corpus natans K versùs R retrocedet, vt nimirum cum vas ad E peruenerit, corpus natans denuò restituetur in A, vbi ab initio constitutus fuerat.

Remoto deinceps vase ab extremo situ rotæ A, repositoque in locum propinquissimum centro S, in quo denuò mobile P supernatet, proculdubio centrum comunis grauitatis corporum G, & P in locum intermedium I, inter G, & P incidet; atque in I suspensa intelligi debent duo grauia G, & P; modo cum vectis SI minor sit quàm SH, necesse est, vt eadem motiua virtus, quæ vertiginem rotæ circa centrum S efficiebat, celerius eam impellat, prout HS maior est quàm SI, ac proinde reuolutio corporis G cum affixa rota velocior, quàm antea, erit à B versùs E: proindeque vas RV maiori velocitate repelletur ab M versùs F, at huiusmodi velocitas retrorsum non subito, sed pedetentim fluido, & natanti corpori P imprimitur; igitur corpus P ob velocitatem priùs impressam, quam retinet, recurret contra motum vasis, scilicet versùs V, & propterea à P versùs L transferetur, & propterea respectu centri G apparebit ve-



locior eius motus retrogradus ab F versus M, & propter eandem causas superius expositas velocitas illa initium sumet à termino E, & maxima efficietur in loco P, & postmodum decrescendo omnino exstinguetur in termino B.

*Fig. 41.* His declaratis intelligatur globus Iouis esse G, qui circa Solem S per circulum B E feratur à B versus E, impellaturque à vi radiorum solarium longitudine vectis S G: adest postea circa Iouem rota imaginaria B A E P, per quam fertur vnus Mediceorum directè in superiori semicirculo B A E, retrogradè per inferiorem E P B: ratum quoque est, Iouis satellitem in Plenimediceum A constitutum moueri circa Solem S vna cum Ioue, & quia eadem virtus solaris mouet vtrumque planetam, Iouem scilicet, & Mediceum, suntque ambo penduli in æthere fluidissimo; igitur erunt veluti suspensi in puncto H vectis intermedio, quod centro comunis grauitatis correspondet, & propterea eadem vis solaris impellet ambos globos planetarios ea velocitate, quæ longitudini vectis S H competit; quapropter Iouis corpus G in hac constitutione tantò tardius mouebitur, quam antea, quantum longitudo vectis S G minor est vecte S H; sed quoties retardatur motus Iouis non poterit eodem instanti corpus Mediceum A in æthere natantis retardari, propterea, quod non affigitur veluti clauus in sua rota circa Iouem, proptereaque vigente adhuc pristina eius velocitate periodica circa Iouis globum excurret anterius aliquantisper ab A ad K, eo quia huiusmodi excurus secundum ordinem signorum efficitur ab A versus D, igitur respectu Iouis G Mediceus A nouam velocitatem acquireret in supremo eius Plenimediceo, & propter rationes paulò ante expositas, hæc velocitas incipere debet à termino B quadraturæ, perduceturque ad summam velocitatem ad Plenimediceum A, & inde denuò retardabitur, quousque ad secundam quadraturam E omnino pereat eiusmodi acquisita velocitas.

Existente postea Iouiali satellite in Nouimediceo P, centrum comunis grauitatis eius & Iouis erit in puncto I, inter

ter G, & P intercepto, idest Soli vicinius efficietur, quàm  
 G, & ideo eadem solaris virtus, quæ ambos planetas circum-  
 ducit, tale centrum grauitatis transferet à B versus E vnâ  
 cum Ioue maiori tamen velocitate, quàm antea, prout ve-  
 ctis G S, & H S maiores vecte S I; attamen Mediceus in P  
 pendulus in æthere fluidissimo non cogitur nouam celeri-  
 tatem obsecundare, sed à tarditatis gradu proprio, & perio-  
 dico, quo prius afficiebatur, aliquantisper retrorsum rema-  
 nebit versus L, hæc autem retrocessio motum retrogradum  
 auget ab F, versus M, & proinde respectu Iouis verè Medi-  
 cei velocitas aucta erit sensibili incremento per spatium P L  
 ab hac, inquam, necessitate stellula in Nouimediceo celerius  
 quàm antea mouebitur, & insuper talis celeritas incipiet à  
 secunda quadratura E, & maximum incrementum susci-  
 piet in Nouimediceo P, & finem sortietur in prima qua-  
 dratura B.

Sed obiciet fortasse quispiam, me repugnantia protulisse,  
 cum causæ physicae varietatis, seu synodicae anomalie per-  
 petuæ Mediceorum minimè coherere videantur cum ratio-  
 nibus ad iuctis cap. 16. & 17. pro synodica temporaria ano-  
 malia; ibi enim ostendimus, Iouis asseclam in Plenimediceo  
 propè Apojouium ratione vectis prolixioris, non assequi  
 præcisè motum iouialis globi, seu centri sui systematis, &  
 ideo repedare, & reali quadam tarditate affici, hic verò con-  
 tra deduximus, in eisdem Plenimediceis eandem stellam in  
 suo epicyclo non repelli, sed antèrius promoueri, celerius-  
 que ferri, quàm idem met globus iouialis progreditur, quæ  
 quidem motiones videntur omnino contrariæ, & sibi mu-  
 tuo repugnantes; vt autem huiusmodi scrupulus tollatur  
 considerandum est, nouum non esse in astronomia simul  
 componere motus inter se contrarios à diuersis causis pen-  
 dentes; qui saluari solent comminiscendo varios circulos,  
 qui motum planetæ regulent, & moderentur, & licet mo-  
 tus resultans ex varijs circuituum hypothésibus sit valde  
 commixtus, & inuolutus, vnicus tamen, & simplex appa-  
 ret, & iudicatur; & nihilominus astronomica solertia, ac  
 dexte-

dexteritate solent singuli motus ab alijs seiungi, & perscrutari vna cum suis periodis, atque mensuris. Sic in nostra Luna cum plenilunium propè eius Apogeeum celebratur, tunc quidem vera, & reali tarditate Luna mouetur in superiori semicirculo sui orbis, & nihilominus verum est, vt Thyco obseruauit, quod eadem Luna in eodem supremo semicirculo vera, & reali celeritate fertur: hęc iam sunt duo effectus omninò inter se contrarij, vt potè vera retardatio, & vera eiusdem Lunæ acceleratio, scilicet repeditio, & promotio simul & semel in Luna verificantur, ex quibus porro subsequitur motus apparens lunaris globi in tali constitutione, non tardus, vt anomalia menstrua temporaria exigit, neque velox, vt perpetua anomalia postulat, sed ex vtrisque commixtus, & contemperatus; hoc, inquam, non impedit, quin solertia astronomica possint huiusmodi contrarij effectus distingui, atque causæ contrariæ eos producentes assignari. Sic pariter in casu nostro, licet Iouis a secula in superiori orbis semicirculo reali tarditate afficiatur, vt exigit synodica temporaria anomalia, pariterque eius motus promotionem, & celeritatem aliquam formatur, iuxta leges anomaliæ varietatis, nihilominus apparens motus erit ex his contrarijs commixtus, si, inquam, contrarij motus apparentem planetæ progressionem constituentibus sunt veri, & reales effectus inter se contrarij, mirum alicui videri non debet, quod à causis physicis contrarijs pendeat, ac proindè si prolixitas radij solaris in Plenimediceo ratione vectis tardus impellit Mediceum, quàm Iouis globum, necessariò vera tarditate afficietur Mediceus, & quia aliunde motus ipsiusmet globi iouialis circa Solem aliquantulum retardatur, vt in postremo hoc capite ostensum est, necessariò systema, seu rota annexa epicicli stellæ Medicæ retardabitur quoque, tunc verò Mediceus in æthere fluido pensilis, & non affixus veluti clauus in tali rota, seu systemate, non poterit omnino obsecundare, & obedire moræ, ac retardationi ipsius globi iouialis, & ideo antèrius aliquantulum promouebitur. Quare licet duo effectus con-

trarij

trarij tarditatis, ac celeritatis in eodem Mediceo simul commisceantur, nihilominus verè producantur à duabus causis diuersis, quarum vna alterius existentiam non tollit, & propterea simul & semel agendo possunt denique commixtum, atque contemperatum motum Medicee efficere, non secùs, ac nostræ Lunæ motus cõmixtus ex vera celeritate, ac tarditate producitur à diuersis causis, seu hypotesibus; quapropter vitio quispiam non vertet, in Mediceis huiusmodi effectus contrarios à diuersis causis physicis produci posse.

*De causis inclinationum orbium Mediceorum supra planum  
eclipticæ iouialis. Cap. XX.*

**P**ostquam omnes causas inæqualitatum, quæ in reuolutionibus longitudinis Mediceorum intunt satis apertè (ni fallor) ex posuimus, remanent modò admirabiles operationes Naturæ in eorum latitudinibus. Indicabimus itaque primo loco necessitatem qua globi Mediceorum non in eodem plano eclipticæ iouialis, sed inclinati supra ipsum circumferri debeant; & facilis intelligentiæ gratia, supponatur *Fig. 40.* Iouis globus in G, Sol in S, atque per S, & G ducantur rectæ lineæ R Z, & B D perpendiculares ad lineam solarem S G, sintque hæ omnes in vno plano constitutæ, quod perpendiculare sit ad eclipticæ iouialis planum E O F per S G ductum. Manifestum est, quod virtus radiorum solarium, quæ globum Iouis circa Solem circumducet, eum non impellit per superficiem aliquam conicam, aut aliam curuam, sed per simplicissimam planam superficiem per centrum Solis extensam. Hocque necessitate quadam accidit si consideretur, quod vis, & energia motus circularis circa axem aliquem, expellere nititur mobile rotatum à centro versus peripheriam per omnium breuissimum interuallum eorum, qui assignari possunt, hinc fit, vt si ab initio mobile per circulum aliquem minorem circumductus fuisset ab eo magis ac magis recederet, quousque ad maximum circulum per-

perueniret, qui tandem in vno plano existit.

Hoc supposito repeto id quod in vltimis inculcatum est, quod nimirum Medicei præter revolutionem circa globum Iouis, patiuntur quoque vertiginem circa solare corpus, complectique revolutionem, seu annum ioualem simul cum Ioue; si, inquam, hoc verum est, necum probabile, sed necessarium videtur, vt effectus communis, atque vniuersalis ab vna, & eadem causa pendeat; promouque vt ratum perspectumque assumi potest, quod eadem illa virtus, quæ globum Iouis impellit, & circumagat in plano ecclipticæ iouialis, vim quoque inferat transferatque planetas Mediceos circa Solem, licet interea particulares eorum reuolutiones perficiant circa Ieuem. Quapropter eiusmodi vertigines circa axem R Z efficiuntur, cuius poli sint R, & Z sed illa eadem virtus, quæ impellit Mediceos, ac reuoluit circa axem R Z, cogat quoque, necesse est, ad efficiendas particulares eorum reuolutiones in eodem plano, scilicet circa axem B D parallelum ipsi R Z; igitur ab eadem communi virtute motiua Medicei circa polos B D circumferri debent, ac proinde reuolutiones, seu circumductiones Mediceorum circa Iouem, quarum vna sit H K, parallelæ erunt plano ecclipticæ iouialis E O S. Supponatur modo vna ex Mediceis stellis in H, nimirum extra planum ecclipticæ iouialis S O E, supponaturque pariter ( vt alibi dictum est, stellam hanc nullam aliam inclinationem naturalem habere, nec impetum alium præter illum vnicum, se nimirum mouendi directè versus centrum Iouis G, qui, inquam, motus directus per lineam H G perpetuo ab ea exerceatur: postea quia vertigo circa axem B D stellæ H circularem motum confert, qui, inquam, nec dum expellendi, & renouendi stellam H à centro facultatum habet, sed etiam nititur eam remouere à plano minoris circuli H K, quem descripturus fuerat, atque versus maximum circulum E F impellit; quod autem ex suppositis causis huiusmodi effectus subsequi debeant, à nemine in dubium reuocatur, quod iam, atque à multis sensatis experimentis confirmatur; si enim in pun-



Et in medio E alicuius axis B D alligetur filum P E, cuius  
 extremo P connectatur pila aliqua grauis; hoc, inquam, li-  
 cet sit inclinatum obliquè ad axim B D, vt nimirum angu- *Fig. 43.*  
 lus P E B sit acutus, & digitis postea axis B D circumuerta-  
 tur, describet primò pila P circulum minorem P N, sed ibi  
 non quiescet, semperque per maiores circulos circumdu-  
 cta, tandem in plano circuli maximi A C consistet; simili-  
 ter si globus aliquis A B C D madidus vndique sit, agatur  
 postea vertigine circa polos B D, videbimus aquæ guttulas  
 ex P excurrere spiraliter, quousque ad circulum maximum *Fig. 44.*  
 A C pertingant, ibique persistent, non secus Medicea stel-  
 la H circa axim B D rotata successiuè magis, ac magis ad  
 punctum E maximi circuli reuolutionis appropinquabitur;  
 cumque translatio ab H ad E facta sit ab impetu, & veloci- *Fig. 42.*  
 tate circularis motus, quo fertur stella H per circulum H K,  
 posito quòd transitus dictus ab H ad E fiat eodem tēpore, quo  
 quarta pars reuolutionis stellæ H in suo orbe perficitur, ma-  
 nifestum est, quod eo tempore, quo stella quadrantem sui  
 circuli H P pertransit ob transuersalem motum genitum ab  
 impulsu vertiginis, non quidem in P, nec in E, sed potius in  
 O translata erit, in eodem nimirum plano eclipticæ iouia-  
 lis, existet tamen in extremitate rectæ G O, quæ quidem  
 perpendiculariter eleuata est ad rectam H G, nec non per-  
 pendicularis erit ad planum per rectas H G, B D, & E S du-  
 ctum, proindeque ex tali transuersali motu ab H ad E in  
 quadrante periodi stellæ perueniet illa ad Nodum, seu se-  
 ctionem O, arcus nimirum H O ab ea descripti, & plani io-  
 uialis eclipticæ E O F.

Præterea aduertendum est id quòd multoties insinuauim-  
 us, impossibile nimirum esse, vt inferatur motus alicui  
 naturali corpori, quin simul impetus, & velocitas ei non  
 imprimatur, hæc autem eius naturæ est, vt in eodem moto  
 corpore impressa remaneat, à qua postmodum vlteriùs pro-  
 moueri illud potest; & quia ex hypothesi stella H nullam  
 aliam naturalem inclinationem habet nisi appropinquandi  
 centro Iouis G; igitur ex sui natura indifferens erit ad mo-

tum transversalem ab H versus E, carebitque nimirum  
 qualibet inclinatione, vel repugnantia: huic indifferentiæ  
 noua motiua virtus superuenit, quæ eam impellit ab H ver-  
 sùs E, pendens nimirum à circulari vertigine circa axim  
 B D; cumque huiusmodi transversalis impulsio in omni-  
 bus instantibus sequentis temporis vigeat, & operetur, &  
 aliunde quolibet temporis instanti, quo viget motus tran-  
 sversalis, imprimitur stellæ H gradus aliquis nouæ velocita-  
 tis, & impetus, qui ex sui natura perseverans est; igitur  
 quando stella transversali motu ab H ad E peruenit, tot  
 Fig. 42. gradus impetus acquisisse reperietur, quot præcesserunt  
 impulsiones omnibus instantibus temporis, quo precedens  
 motus perduravit: at stella in E retinens supradictum impe-  
 tum impressum sese mouendi versus M, videtur impossibi-  
 le, vt iners, & otiosa ibi remaneat, ac proinde impelletur  
 vltèrius versus M, vt pendulo contingit: at quia transgres-  
 so termino E vertigo circularis circa axim B D incipit con-  
 trario nisu retardare, atque impedire excursum stellæ ab E  
 in M, eo quòd huiusmodi vertigo vim habet repellendi  
 stellam retrorsum versus maximum circulum E O F; ade-  
 runt igitur iam duæ contrariæ virtutes, prima quidem in-  
 gnis impressa à motu præcedenti H E, secunda verò ei con-  
 traria, quæ repellit stellam versus maximum circulum E O  
 F; ab hac, inquam, continuata repulsione, & contraniten-  
 tia, successiue primus ille maximus impetus præconceptus,  
 mouendi se ab E versus M, magis, ac magis debilitatur, vn-  
 de fit, vt eodem ordine, & tempore velocitas illa ab E ver-  
 sùs M debilitetur, quo antea in transitu ab H ad E incre-  
 mentum sumpserat: sed æquali fermè tempore stella in suo  
 orbe transigit secundum quadrantem sui epicicli; igitur in  
 fine dicti temporis stella in L perueniet remota ab F spatio  
 æquali E M, vel potius H E, proindeque stella perueniet ad  
 terminum extremum L, diametri H G L, sui orbis; prop-  
 tereaque motus inde resultans factus erit in semicirculo  
 maximo H N L, cuius diameter est H G L. Constituta post-  
 modum stella in L, propter easdem rationes superius ex-  
 posi-

positas, denuò circularis vèrtigō eam impellet versùs maximum circulum  $E O F$ , & dum talis motus celebratur in quolibet instanti temporis noui, & noui gradus velocitatis stellæ imprimuntur, ( sic enim exigit motus natura ) qui, inquam, gradus impressi indelebiles, postquàm stella ad  $F$  peruenit, motum eius continuare possunt versùs  $K$ ; cumque talis impetus successiuè minuatur, & debilitetur à vi circularis motus, repellentis stellam versùs maximum circulum  $F O E$ , minuetur quidem decrementis, equalibus anteauctis augmentis, quousque stella in  $K$  perducta equè remota ab  $F$ , quàm  $L$ , seu spatio equali  $H E$ , atque in tali tempore, & transitu percurreret stella subsequenter semicirculum, reductaque tandem erit in  $H$ , completa nimirum periodo circuli maximi  $H O L H$ , cuius diameter est  $H G L$ ; cumque aliunde huiusmodi causæ perpetuò perseuerent, necesse est, vt inclinatio plani epicycli  $H O L$  supra iouialis eclipticæ planum  $E O F$  temper permaneat, scilicet angulus  $H G E$  maximæ inclinationis huius orbis sit perpetuò eiusdem mensuræ; nulla enim ratio adest, qua talis inclinatio varietur, proindeque remanebit eiusdem mensuræ, & insuper Nodus  $O$ , pariterque limes borealis  $H$  stabilis permanebit sub eisdem stellis fixis.

Supposuimus facilitatis gratia periodum circularem stelle in suo epicyclo eodem tempore præcisè completam fuisse *Fig. 42*; se, quo periodus transversalis ab  $H$  ad  $M$ , & inde ad  $H$  perficeretur; modò supponatur, periodum transversalem compleri minori tempore, quàm perficiatur circularis periodus, & tunc sanè summa euidencia, & facilitate satis fit motui retrogrado Nodorum, & Limitum. Quoniam tempore quo stella spatium  $H E$  percurrit vsque ad maximum circulum, nondum præcisè primum quadrantem sui orbis perfecisse, supponitur, sed deficit adhuc particula aliqua veluti  $O N$ ; igitur, antequàm quadrantem absoluat, stella circulum maximum  $E N F$  attinget, proindeque, postquàm stella integrum quadrantem  $H O$  transijt, necessariò prætergressa erit terminum  $E$ , promotaque aliquantulum versùs  $M$ ,

scilicet ultra sectionem N (ui orbis H N L cum maximo circulo E N F; quare in fine dicti temporis post transitum quadrantis H O, Nodus vel intersectio N dictorum planorum retrorsum relinquetur spatio nimirum O N; ideoque existimabimus, Nodum N verè retrorsum excurrisse ab O ad N, scilicet ab Ortum ad Occasum. Idem prorsus in subsequentibus quadrantibus continget; quapropter in fine periodi stella non amplius in maxima digressionem H existet, sed particulam secundi periodi transversalis pertransibit, eritque constituta intermedio loco inter H, & E, scilicet multò prius Limitem borealissimum H reliquisse, apparebit, transisseque in V, & propterea Limes retrocessisse videbitur spatio V H, sed æquè Nodi retrocedunt, ac Limites, igitur æquali spatio Nodi retrocessisse videntur; insuper quia transversalis periodus H E M H perseueranter efficitur iisdem temporibus, minoribus tamen ijs, quibus circulares periodi perficiuntur; igitur necesse est, vt inclinatio orbis H O supra planum E O S eclipticæ iouialis inuariabilis perduret, scilicet angulus H G E semper idem erit, nec vquam crescat, vel minuetur, & hinc habemus modum facillimum eidentissimumque saluandi, nedum inclinationem constantem plani orbis Medicei supra iouialem eclipticam, sed etiam motus retrogrados suorum Nodorum, & Limitum. Hæc omnia, inquam, deducta sunt ex duobus principijs facillimis, & eidentissimis, qui non videntur in dubium reuocari posse, à virtute nimirum qua stella ad Iouem nititur accedere, & natura motus circularis expellendi planetam versus circulum maximum suæ reuolutionis.

Postremo loco animaduertendum est quod si in principio creationis mundi Medicea stella H constituta fuisset in puncto E eiusdem plani eclipticæ iouialis nullo pacto potuisset in postherum ab eodem plano iouialis eclipticæ discedere, sed ibidem perpetuò absque vlla latitudine circumducta fuisset. E contra si suprema, ac diuina sapientia architectonica decreuisset, situm eclipticæ iouialis inclinatum  
præ-

prædictæ stellæ tribuere, vt nimirum modò ad Austrum in L, modò ad Boream in H digrederetur, nulla alia machina adhibita potuisset quidem facillimè hoc efficere, si tantummodò ab initio posuisset Mediceum in H in aliqua, inquam, distantia à plano iouialis eclipticæ E N S, ac demùm vt Nōdī orbis dicti Medicei motu retrogrado conuerterentur, ita vt progressū temporis latitudines variam situm acquirerent respectu spatij mundani, seu cæli stellati, poterat inquam hoc effici, si Mediceum posuisset in debito situ, & distantia à Ioue, atque ab eius ecliptica, in qua periodus approximationis, atque remotiois per H E M, & vicissim ab M ad H breuiori tempore absolueretur, quàm reuolutio eiusdem Medicei in suo orbe circa Iouem completur. Et hac ratione facillime, & absque ambagibus huiusmodi motus atque varietates Mediceorum effici potuissent.

Motus hic Nōdorum retrogradus Mediceorum quolibet tempore, & situ respectu Iouis, & Solis verificatur, & hac de causa vocatur motus latitudinis periodicus, cuius præcisa mensura obseruabilis quidem esset ex centro Iouis, at cōspecta ex Sole, vel ex nostra Terra subiicitur omnibus illis varietatibus, & prostaphæresibus opticis, quæ alibi expositæ sunt, nec debent hic denuò repeti.

*De Varietatibus synodicis Latitudinum*

*Mediceorum. Cap. XXI.*

**P**Ræter periodicam reuolutionem Latitudinis iam expositam, patiuntur Medicei nouam varietatem in cursu Latitudinis eorum, quæ de nouo aduenit, atque euanescit in qualibet synodo, seu cursu menstruo à Plenimediceo scilicet primo ad subsequenter, subiiciturque eiusmodi legibus: in Nouimediceis ac Plenimediceis nullam varietatem patiuntur Latitudinis, sed eadem inalteratæ remanent, quæ ex cursu periodico Latitudinis pendent; discedente verò Mediceo à linea solari, nempe à Nouimediceis, & Plenimediceis, statim ei superadditur noua Latitudinis

varietas synodica, quæ conspicua, & maximã redditur in quadraturis à Sole, nec tamen hæc regula vniuersalis est, quandoquidem in aliquibus synodicis periodis nil prorsus latitudines alterantur, atque hoc euenit, quando Nodi in quadraturas incidunt, & Limites in Nouimediceis, ac Plenimediceis collocantur; si verò Nodi in ipsa linea solari incidunt, tunc Latitudines in tota periodo synodica valdè au-  
gentur.

Et quoad primam constitutionem intelligatur Iuppiter in G, & orbis alicuius Medicei D E B F, cuius Limites E, & F in linea solari constituentur, scilicet in Plenimediceis, & Nouimediceis A, & C, tunc quidem Nodi B, & D existente in quadraturis. Ostendendum est, maximam borealem latitudinem A E, vel Australem C F nil prorsus excre-  
scere supra eam, quæ periodico cursui competit, nec pari-  
ter alterari Latitudines in tota menstrua reuolutione. Et primo recolenda sunt ea, quæ attulimus circa variationem perpetuam longitudinis, quod nimirum dum Mediceus per semicirculum supremum D E B eius epicycli fertur, motus globi Iouis verè retardetur, proindeque Mediceus nouum realis velocitatis incrementum acquirit, quod maximum erit in Plenimediceo E, & extinguatur in quadratura B. His positis, dico, Medicei Latitudinem in semicirculo superiori D E B minimam esse, scilicet angulum A G E non excedere inclinationem propriam, & naturalem plani orbis Medicei supra planum eclipticæ iouialis; quoniam  
in tali situ motus Medicei ex duobus elementis componitur, ab impulsu scilicet transuersali, quem vertigo circa Solem, & Iouem efficit, quatenus nititur propellere stellam Mediceam, versùs planum maximi circuli D A B C in ecliptica iouiali existentis, & insuper ex motu eiusdem stellæ, per innumerabiles circulos eclipticæ iouiali parallelos; igitur quo celerius stella rotatur circa Iouem, & Solem, eò vehementius versùs eclipticam iouialem transuersali motu impelletur: at quanto vehementius impellitur, eo magis plano eclipticæ iouialis approximat; igitur

igitur quia in semicirculo supremo  $DEB$  quo magis stella ad Plenimediceum  $E$  accedit, eò celerius rotatur circa Iouem, vt dictum est, proculdubio ibidem maiori vi Medice *Cap. 19.* stella impelletur versus iouialis eclipticę planum  $DAB$ , proindeque Latitudo maxima  $AE$  valdè imminuta erit in tali situ. Eadem lege in reliquis locis collateralibus semicirculi  $DEB$ , Latitudo proportionaliter decrescet; quapropter integer semicirculus  $DEB$ , magis, quàm quolibet alio tempore, plano eclipticę  $DAB$  proximus efficietur, idemque de inferiori semicirculo  $BFD$  planè affirmandum est.

In secunda verò constitutione, cum scilicet Nodi in linea solari  $CA$  existunt, atque Limites  $H$ , &  $I$  in quadraturis  $B$ , &  $D$  transferuntur, ostendendum est, maximas Latitudines *Fig. 46.*  $BI$ , &  $DH$ , & inclinationem orbis supra iouialem eclipticam insigni incremento auctam esse magis quàm in præcedenti constitutione; quoniam in integro semicirculo  $AIC$ , & præcipuè in quadratura  $I$ , reuolutio Medicee circa Iouem retardatur, prout exigit anomalia varietatis, seu synodica perpetua, sed quò tardius stella rotatur circa Iouis globum, eò languidius impellitur stella transuersali motu versus maximum circulum  $ABC$  in plano iouialis eclipticę constitutum; *Cap. 20.* verùm quò magis lentè, ac torpidè planeta impellitur versus iouialem eclipticam, tantò minus ad eam approximat, proindeque maiori distantia ab eodem removebitur; quapropter huiusmodi remotio, seu maxima Latitudo  $BI$ , maior efficietur maxima Latitudine  $AE$ , quam habuit stella in Plenimediceo primæ constitutionis, ideoque inclinatio orbis supra planum iouialis eclipticę, scilicet angulus  $IGB$  superabit angulum  $AGE$  eiusdem primæ constitutionis, non secus in tota periodo Latitudo Medicee manifestum incrementum suscipiet; & quoniam in tota periodo Latitudinis primæ constitutionis valdè imminutę sunt digressiones seu Latitudines, fit vt præiudicio quodam tribuatur huiusmodi Latitudo imminuta periodicę planetę reuolutioni, & proinde censeamus, in illa constitutione, quando Nodi in quadraturis existunt, tunc

tunc Latitudines prorsus inalteratas permanere. Ab eodem præiudicio subsequitur, ut in secunda constitutione, cum Nodi in Nouimediceis, ac Plenimediceis collocantur, noua, & super abundans dilatatio inclinationi B G I, supra inclinationem prioris constitutionis A G E censeatur noua variatio latitudinis synodica. Præterea notandum est in secunda constitutione latitudinem maximam, atque orbis inclinationem supra eclipticæ iouialis planum, verè, & realiter augeri, & dilatari adeo ut B G I maior sit angulo C G F; quapropter planum orbis stellæ Medicæ libratione quadam magis, ac miuus inclinabitur, atque flectetur supra planum iouialis eclipticæ.

Postremo sumatur tertia constitutio intermedia inter duas expositas, in qua nimirum Nodi K, & L inter solarem lineam A C, & quadraturas B D incidant, tunc profectò patet, inclinationem M G O, & latitudines ampliores fore, & magis alteratas, quàm in prima constitutione, minùs verò, quàm in secunda, prout magis vel minùs ab extremis superius enarratis receditur.

Hæ profectò sunt causæ, nedum inæqualitatum motus Mediceorum, quoad longitudinem, sed etiam illæ, quæ ad Latitudinem pertinent, tam periodicæ, quàm temporariæ, seu synodice, quæ omnes desumptæ sunt ex principijs facillimis, & obuijs, nedum possibilibus, quæ ab insignioribus astronomis, & philpophis admittuntur; quapropter concludere licet, non omnino improbabile esse, ut Natura iisdem causis, ac medijs superenarratos effectus producat; non ausim tamen affirmare, hoc ita se habere; sciò enim in exhaustum esse Naturæ thesaurum, eamque non carere artificijs arcanis reconditisque, quibus huiusmodi effectus absolui possunt, sed si eius institutum inspexerimus, dum semper medijs facillimis simplicissimis, & obuijs operatur, temerarium fortasse non erit suspicari, à causis superius enarratis produci potuisse anomalias Mediceorum, atque hæc retineri præter rationem non erit, quousque à sublimiori aliquo ingenio, & fæliciori veritas propaleatur, vel nugæ, & fallaciæ meæ detegantur, DE



D E

# MEDICEORVM ORGANICA, ET PRACTICA ASTRONOMIA LIBER SECVNDVS.

*Motus medios periodicos planetarum Mediceorum prius investi-  
gari debere. Cap. 1.*



Ostquàm varietates Mediceorum in præce-  
denti libro considerauimus iuxtà analo-  
giam, quam habent cum reliquis vulgatis  
planetis, atque vt exigant causæ, & necessi-  
tates physicæ, debent modò ad praxim redu-  
ci, & reperiri in cælo ipso, vt constet Naturæ  
cum theoreticis consensus; hoc autem exigit, vt prius decla-  
rentur modi atque industria, quibus inæqualitates Medi-  
ceorum in cælo reperiri valeant.

Et primò quia finis astronomi est cognoscere motus, &  
reuolutiones cælestium corporum eorumque constitutio-  
nes, & situs præteritos, atque futuros prænosse, cumque  
hæc omnia minimè haberi possint absque inuestigatione  
motuum mediorum, hinc est, quod maiores nostri ini-  
tium astronomicæ inquisitionis sumpserunt ab iisdem mo-  
tibus medijs; igitur hi pariter in Mediceis à nobis primo lo-  
co inquirendunt.

Habent planeta Medicei, vt dictum est, quatuor pro-  
prias periodos, primam restitutionis sub eisdem stellis fixis  
Zodiaci, secundâ anomaliz in suo orbe elliptico, tertiam la-  
titudinis, & quartâ synodicâ respectiue ad Solem, quæ men-  
strua Medicea nuncupari potest, ad instar menstruæ lunaris.

Inter omnes periodos menstrua euidentior est, & magis

nostris sensibus exposita, & idē primo loco quaesita fuit à Galileo primo inventore earundem stellarum, & sicuti antiqui astronomi Chaldei ab initio mensuram cursum Lunae satis ruditer, & imperfecte reperierunt, & postmodum successu temporis magis, ac magis eos excoluerunt, sic pariter periodi mensurae Mediceorum adhuc ad perfectionem optatam redactae non sunt, neque hoc mirum alicui videri debet, si meminerit, periodos lunares post tot saecula adhuc ad necessariam praecisionem non peruenisse, licet in ea insudarint quam plurimi magni viri, atque cursus lunares facilius decernantur, & conspiciantur, quam inaequalitates Mediceorum. Huiusmodi itaque mentes Mediceorum non sunt aequales inter se, sed sicuti aetas, vel mensis lunaris aliquando diebus fere 30. completur, aliquando diebus 29. cum quadrante, non deius Mediceis aliquando citius, aliquando serius suam mensuram periodum absoluunt; hinc patet necessitas decernendi mediocrem cursum inter excedentes, & deficientes menses, vel quia ut antiqui censebant, naturales, & proprii motus planetarum aequabiles, & medij sunt, vel tales finguntur, & supponuntur, ut adhibitis prostapheresibus physicis, aut opticeis, veros motus, idest eos, qui in caelo ipso apparent, elicere possimus; eadem de causa in periodo restitutionis, & anomaliae medij motus inter excedentes, & diminutos reperiri debent.

*Enarrantur difficultates, & ambages, quibus periodus mensurae*

*Mediceorum implicatur. Cap. I R.*

**Q**uoniam, ut dictum est, planetae Medicei nedum circa Iouem, sed etiam circa Solem feruntur ab ipso met Ioue rapti, utpote à centro eorumdem orbium, ideo necesse est, ut periodus Mediceorum constet ex una integra reuolutione Medicei in suo orbe, & ex illo arcu, quem interim per ambulat linea solaris, quae per centrum Iouis extenditur, & efficit Aphelium synodicum; modo si praedicti duo

motus Medicei in suo orbe, & illius, qui à Ioue interim  
 percurritur, semper essent vniformes, scilicet fierent eadem  
 æquabili velocitate, essent profectò omnes menses Medi-  
 cei æquales inter se, & omnes equalibus temporibus absol-  
 uerentur; at quia tum periodus stellæ Mediceæ in suo orbe,  
 cum translatio Iouis in suo eccentrico sunt velocitatibus  
 inæqualibus, ( modò enim tardè, modò celeriter excu-  
 runt ) hinc fit, vt duabus de causis Medicei menses inæqua-  
 les reddantur, & difformes; nam quando centrum Iouis G  
 lento cursu mouetur in Aphelio sui eccentrici per arcum  
 Gg, certè eo tempore, quo stella Medicea percurrit inte-  
 grum suum orbem A B P A, parùm promouebitur Aphe- *Fig. 48.*  
 lium, scilicet ab A ad D, ob tarditatem motus Iouis, &  
 ideò citò stella Medicea Aphelium D assequetur, & hæc est  
 prima causa, quare mensis Mediceus breuis efficitur. Econ-  
 tra quando Iuppiter est perihelius, idest reperitur in infima  
 abside sui eccentrici F, tunc velocissimè mouetur per ar-  
 cum Ff, qui maior est, quàm Gg, & ideò eodem tempore,  
 quo Medicea integrum orbem H I H complet, multò remo-  
 tius transferetur Aphelium, excurretque totum arcum ab  
 Had K; igitur tardius, & maiori tempore Mediceus cum  
 assequetur, & ideò in hac constitutione mensis Mediceus  
 prolixior erit. Si postea consideretur motus Medicei in suo  
 eccentrico, is sanè tardius mouetur circa Apojouium A, quàm  
 ad partes Perijouij P; igitur si Plenimediceū fieri debet pro-  
 pè Apojouium in A, postquam Mediceus pertransit integrū  
 orbem A B P A, non assequetur Aphelium, seu punctū Ple-  
 nimedicei, quod interim traslatum est vsque ad D, nisi post-  
 quam ipse motu tardo, quo in suo Apojouio mouetur, ibidē  
 feratur, & ideò mensis Mediceus in tali casu prolixus erit. Ex  
 opposito si mensis initium sumat in Perijouio P postquam  
 Mediceus integrum suum orbem P C A P pertransijt, asse-  
 quetur locum Plenimedicei interim vsque ad E translatum  
 citissimè, scilicet cum ea velocitate, qua Mediceus in tali situ  
 sui orbis mouetur; quare talis mēsis Mediceus breuis efficie-  
 tur. Modo si hæc duę causę simul coniungantur, idest, si Iuppi-

er in Perihelio  $\Gamma$ , & Mediceus in Aphelionio  $\Gamma$  sui orbis fuerint, resultabit mensis Mediceus maxime omnium prolixus, & exaduerso constituto Ioue in Aphelio  $\Theta$ , & Mediceo in Perijouio  $P$ , tunc mensis Mediceus omnium brevissimus efficietur. Adest postmodum tertia causa, quæ variat periodum menstruam eorundem Mediceorum, quæ profecto pendet ex prosthaphæresi orbis annui, quia scilicet ex motu annuo Solis varias configurationes Tellus nostra

*Fig. 49.* sortitur respectu ad Solem, & Iouem, ac proinde respectu Telluris diuersimodè dispositæ efficitur alius mensis Mediceus apparens ad differentiam veri mensis ad Solem relati; modo intelligatur Terra in  $T$ , ubi efficitur configuratio secundæ quadraturæ Iouis ad Solem, postmodum (ad vitandam figuræ confusionem) intelligatur locus Tertæ esse  $X$ , ut nimirum representetur constitutio primæ quadraturæ Iouis, & Solis, consurget in secunda quadratura Plenimediceum apparens in  $M$ , in quo radius visualis à Terra ductus per Iouem perringit, pariterque Plenimediceum apparens in prima quadratura erit in  $N$ , igitur ab illa ad hanc constitutionem Plenimediceum apparens percurreret arcum

*Fig. 50.*  $M A N$  graduum 22., & propterea quotidie antèrius promouetur; quare postquam Mediceus integrum orbem  $M B P M$  percurrat, non adhuc mensis apparentem perficiet, quia interim apparens Plenimediceum transfertur ab

*Fig. 49.*  $M$  ad  $Q$ , & ideo expectandum est, quousque pertranseat arcum  $M Q$ , ut assequatur Plenimediceum antèrius transpositum in  $Q$ , quapropter ex hac tertia causa tempus menstruum prolixius erit; & e contra à prima Iouis, & Solis quadratura, cum Terra concipitur esse  $X$  ad secundam

*Fig. 50.* quadraturam, quando caractere  $T$  Terram designamus, orbis prosthaphæresis motu retrogrado transfert Plenimediceum apparens ab  $N$ , ad  $M$ , & ideo tunc temporis Mediceus antequàm integrum orbem perficiat, assequetur apparens Plenimediceum  $Y$ , quod interim retrocessit ab  $N$  ad  $Y$ , quæ de causa menstruum tempus breuius efficietur; eumque hæc tertia causa periodum menstruam alterans, facile

legre-

segregari possit, quia non minus ex theoria Iouis quanta sit  
 eius, prosthæresis, remanet tantummodo inquirenda  
 periodus mensura vera in respectu ad Solem, & ab hac rur-  
 sus facile segregari potest inæqualitas, quæ à maiori vel à  
 minori velocitate Iouis pendet, itaque, si cognita esset pe-  
 riodus anomalie Mediceorum, facili negotio reperiretur  
 cursus synodicus medius, seu mensis Mediceus medius in-  
 ter maiores, & minores, sed licet cognitio periodi anomalia  
 non præsupponatur, poterit nihilominus præterpropter  
 allequi periodus mensura media eorumdem, si scilicet ob-  
 seruentur plures periodi mensurae ijs temporibus, quando  
 Iuppiter stationarius est, quando scilicet mensis Mediceus  
 non alteratur à motu Iouis, vel à prosthæresi orbis, in re-  
 liquis verò temporibus non est difficile duas illas inæqua-  
 litates motus Iouis, & prosthæresis orbis distinguere, &  
 segregare ab ipsis mensibus Mediceis, vnde ex observatio-  
 nibus colligerentur Medicei menses prolixi, & breues, inter  
 quos mediocres secerni possent, & cum ijs tabulæ Mediceo-  
 rum motuum synodicorum effici possent, sed quia difficilli-  
 mè (vt postea dicemus) huiusmodi observationes præcisè,  
 & absque errore haberi possunt, propterea alia ratione ne-  
 gotium petagendum est.

*De Eclipsium Mediceorum varietate.*

*Cap. III.*

**S**i collocati essemus in globo Iouis, vt intra orbem Lunæ  
 positi sumus, quoties Medicei in eorum umbra iouia-  
 lis incidunt, eclipses earum conspiceremus, e contra quo-  
 tiecumque interponerentur inter oculos observatorum, &  
 Solem, eundem, vel eius partem obtenebrarent non secus,  
 ac facit nostra Luna, sed cum hoc discrimine, quod obleu-  
 ratio Solis esset ferè momentanea, cum Medicei sint exiles  
 comparati ad vastitatem globi iouialis, quæ exilitas si minima  
 esset quod non videtur incredibile, apex coni umbrosi cuiusli-  
 bet Mediceorum Iouis su perficiem non attingeret, sed tan-  
 tum

tum eius penumbra; quæ maculam in facie Iouis ampliora rem ipso disco Medicei efficere posset, transcurrerent tamen prædictæ umbellæ discum integrum Iouis: insuper moræ, seu tempora transituum Mediceorum in cono umbræ, vel umbellæ in disco Iouis modò prolixiora, modò breuiora essent, quatenus transitus ob variam Latitudinem Mediceorum fieret vel per centrum, aut per axim coni umbræ, vel lateraliter excurrerent; variareturque postea mora pro varia velocitate Mediceorum, in his eclipsibus hæc, inquam, conspici possent ex globo Iouis; at ex nostra Terra, quæ non intra, sed extra orbem Mediceorum in magna distantia ponitur præter duo genera eclipsium iam expositarum ad sunt duæ aliæ diuersæ occultationes, vna quando in suprema, & postica Iouis facie constituti ab opacitate corporis iouialis occultantur visui nostro; altera verò fit non ab opacitate, sed à splendidis radijs iouialibus, quando nimirum Medicei interponuntur inter Iouem, & oculo nostros, & tunc à fulgentissimis radijs iouialibus pariter inuisibiles redduntur; vocabimus autem distinctionis gratia hanc occultationem anteriore siue anticam, illam verò posticam. Singulare hoc habent Medicei, quod in qualibet mensura reuolutione quatuor hisce eclipsibus subiiciantur, ab hac tamen lege eximitur quartus Mediceus remotissimus, qui aliquando ob suam maximam Latitudinem nullo pacto eclipsatur. Utile tamen erit exactè declarare proprietates dictarum eclipsium cum omnibus varietatibus earum, & quibus modis obseruari queant, & quænam commoda ex eis obtineri possint, pro inquisitione mediarum periodorum earundem stellarum.

Et vt clariùs me explicem, sit globus Iouis G, Sol verò in Fig. 51. S, cuius radijs SA, SB, ob maximam Iouis à Sole distantiam reputari possunt paralleli inter se; & quia corpus Iouis opacus est, necessariò in parte eius postica creabitur conus umbræ A C D B: postea quia orbem Mediceorum parum ab ecliptica iouiali SG declinant, estque globus Iouis insignis vastitatis in respectu ad Mediceos, qui illi maximè

propinqui sunt, ideo necesse est, ut in omnibus Plenimediceis stellæ prædictæ incidant in conum vmbrae iouialis, excepta quarta aliquando, ut dictum est, quæ ob insignem latitudinem, efficit Plenimediceum non eclipticum; dico iam, quod respectu ad Terram nostram tales eclipses, non semper apparent, neque uniformes, neque vniuersales sunt, quia quando Terra T ponitur in eadem directione lineæ solaris S G, quod accidit in conjunctionibus, & oppositionibus Iouis, & Solis, tunc radius visualis T G in eadem directione constituitur cum radio solari S G, & sicuti Sol conum vmbrae iouialis A C D B non videt; itaqueque oculis nostris occultatur; quapropter tunc temporis videri non poterunt Mediceæ eclipsari in vmbra ioualem: at quoties linea solaris S G ponitur ad dextram, vel leuam nostræ Telluris G T, tunc profectò conspicuum erit latus B D coni vmbrosi, & ideo visibiles erunt, vel ingressus, vel exitus tantummodò, Mediceorum à dicto cono vmbroso. Insuper quando angulus T G S prosthapheresis orbis non est valde acutus tunc tertius, & quartus Mediceus efficiunt ingressum in vmbra pariterque exitum visibiles in locis I K, & C D, sed primus, & secundus Mediceus solummodò ingressum in vmbra, vel tantummodò exitum habebunt in locis F, & H; ratio huius discriminis est, quia portiones E 1. & P 2. nobis occultantur in postica parte Iouis, nec conspici possunt à terricolis. Insignem hanc proprietatem habent huiusmodi eclipses, quod incidentiæ, vel emissiones Mediceorum ab vmbra Iouis sunt ferè momentaneæ, quando quidem paruitas earumdem stellarum, & velocitas motuum earum facit, ut ferè in momento dispareant; essent igitur hoc nomine prædictæ eclipses utilissimæ, & aptissimæ pro inquisitione motuum periodicorum earumdem stellarum; quia ut dictum est primi, & secundi Mediceæ videri non possunt ingressus in vmbra, & immediatè post exitus, ideo determinari non potest tempus, in quo axem coni vmbrosi pertrahunt. Præterea non est facile nosse velocitates quibus Mediceæ conum vmbrosam percurrunt, quia ferè sem-

Fig. 52.

per

per Latitudinem aliquam habent, & ideo non per axem  
conum umbrosum intersecant, unde spatia transecta in  
ipsis eclipsibus erunt inequalia, prout transitus magis, vel  
minus recedunt ab axe conii umbrosi, præterquam quod  
certè sciri non potest quantitas arcus  $D C$  comprehensi in  
cono umbroso, nisi præcedat exacta cognitio distantie  $C A$   
dicti arcus à centro Iouis; hoc autem supponit certam co-  
gnitionem semidiametri orbis Medicei, & mensuram ec-  
centricitatis eius, quarum secunda prorsus ignoratur, pri-  
ma verò incerta est; quare transitus per arcum  $C D$  tempo-  
re eclipsis non ducet nos in certam cognitionem cursus pe-  
riodici, nisi adhibeantur circumstantiæ inferius exponen-

Fig. 53.

Pro intelligentia eclipsium secundi generis intelligantur  
Medicei interpositi inter Solem  $S$ , & Iovem  $G$ , certè radij  
solares  $S G$  incidentes in Mediceos  $D, K, H, F$  efficiunt um-  
bellas veras, vel saltem penumbras in eadem directione di-  
spostas radiorum solarium, & ideo conii umbrosi Mediceo-  
rum  $D M, K N, H O$ , &c. erunt paralleli inter se, & radijs  
solaribus, quapropter in transitu Medicei à  $C$  ad  $D$  creatur  
umbra, vel penumbra in incida facie Iouis, quæ mouebitur  
à  $B$  ad  $Q, P, O, N$ , &c. percurrendo vel arcum circuli ma-  
ximi  $B O A$ , vel minoris circuli, quando Latitudinem ali-  
quam habet; his positis, si oculi nostri cum terra  $T$  ponun-  
tur in eadem linea solari  $S G$ , tunc umbra Medicei conspi-  
cua non erit, quia radij visuales, & luminosi, & consequen-  
ter directio umbræ cuiuslibet Mediceorum collocantur in  
eadem directione, & propterea umbella in facie Iouis oc-  
cultabitur ab eadem stella Medicea, quæ umbram efficit. In-  
telligatur postea Terra remota à linea solari  $S G$ , vel quia  
Latitudo ipsiusmet Iouis (vt in hoc altera figura conspici-  
tur) est in causa vt radij visuales, & radij solares angulum  
efficiant in centro Iouis, & tunc umbra Mediceorum visi-  
biles erunt in facie Iouiali, quia Terra  $T$ , & Sol  $S$  in eo-  
dem plano eclipticæ existunt, at Iuppiter  $G$  ob eius Lati-  
tudinem subleuatur ab eodem plano eclipticæ solaris, &  
ideo



ideò radius visualis  $TG$ , & solaris  $SG$  efficiunt angulum *Fig. 54.*  
 $TGS$ , & si quidem Mediceus in  $M$  ponatur, procreatur  
 eius umbra in  $C$ , & radius visualis  $TM$  productus in  $D$ , se-  
 cabit radium solarem  $SM$ , & cum eo angulum efficiet, &  
 propterea videbimus stellam  $M$  eleuatam supra eius um-  
 bram  $C$ , & quando ob acutiem anguli  $DMC$  duo circelli  
 $D$ , &  $C$  se se mutuò secant, si tamen valdè exigui non sunt,  
 conspiceretur umbra  $C$  non circularis, sed falcata.

Aliter continget in reliquis temporibus exceptis Iouis  
 acronichijs; si enim intelligatur linea solaris  $SG$  ad de-  
 xtram, vel sinistram Telluris  $T$ , scilicet quando efficitur ali-  
 quis angulus  $TGS$  prostaphæresis orbis, tunc radij lumi- *Fig. 55.*  
 nosi Iouem tangentes sint  $SB$ , &  $SA$ , at radij visuales tan-  
 gentes eundem globum sint  $TV$ , &  $TM$ , & arcus  $BV$ , &  
 $AM$  æquales erunt arcui subtento ab angulo  $TGS$ , sup-  
 ponamus modò, Mediceum in  $R$ , apparebit ille ex Terra in  
 $V$ , & ideò stringet discum Iouis, nec deinde videri poterit  
 in splendida facie Iouis, & sic perseverabit dum percurrit  
 arcum  $RE$ , & cum primum ad  $E$  peruenerit, repente crea-  
 bitur, seu potius conspicietur eius umbra in  $B$  in interiore  
 parte disci iouialis, remota à confinio  $V$ , postea talis um-  
 bella percurrat loca  $Q, P, O, N, M$ , & hic quidem disparebit  
 in confinio disci iouialis, licet reuera perseveret transitus  
 eiusdem umbræ per arcum  $MA$ , qui ex Terra  $T$  non est vi-  
 sibilis. Hinc colligitur, quod licet Mediceus percurrat ar-  
 cum  $ER$  sui orbis uniformi velocitate, nihilominus eius  
 umbra conspicietur ex Terra  $T$  percurrans arcum  $BPOM$   
 velocitate tamen difformi; nam in primo arcu  $BQ$ , qui obli-  
 quus est ad Solem  $S$ , sed directus, seu minùs obliquus ad  
 Terram  $T$ , apparebit eius motus velocissimus, sed tardior  
 in sequenti arcu  $OP$ , & multò tardior in altero arcu  $PO$ ,  
 & tandem in postremis circumferentijs  $ON$ , &  $NM$  cursus  
 erunt omnium tardissimi, & stationarij; igitur si quis ex cur-  
 su umbræ in disco iouiali deducere vellet velocitatem mo-  
 tus Medicei in suo orbe valdè deciperetur.

Huiusmodi eclipses Romæ primò ab Excellentissimo

Cassinio obseruatas, & postmodum Florentiæ optimis, atque ingentibus telescopijs in dubium ab aliquibus reuocatas fuisse, audio, qui censent nigricantes maculas cum ipso Ioue reuolutas obseruatoribus imposuisse, quod quidem mirum esset, nam licet ego ob vitus debilitatem videre eas non potuerim, alij docti viri, & acutissimo visu præditi in aëre Serenissimi Magni Ducis eas conspexerunt iisdem temporibus, & locis, quos calculus mihi designauerat, quod non semel, sed multoties experientia comprobatum est; imo iidem obseruarunt maculas in disco Iouis existentes differre situ, & figura ab umbris à Mediceis procreatis, quæ quidem valde exiles erant; at licet amplitudo talis maculæ umbræ excederet diametrum Mediceæ umbram procreantis inter Iouem, & Solem intercepti, non inde deduci potest, maculam rotundam obseruatam umbram Mediceæ non fuisse; nam posito quod vertex conii umbræ non perueniret, neque attingeret superficiem Iouis, posset nihilominus in disco iouiali gigni umbra quidem diluta, & rotunda, cuius diameter superaret diametrum Mediceæ, umbram generantis. Hoc quidem apud opticos certum est, comprobaturque experientia: si paruus globulus M filo tenui suspensus exponatur radijs Solis S, atque papyrus G in parte eius aduersa umbram globuli excipiat, remoueaturque papyrus à globulo ultra apicem conii umbræ E ab integro disco solari geniti, tunc quidem conspicitur in papyro G, umbra quidem secundaria H I circularis non valde obscura, sed diluta, cuius diameter H I maior est diametro C D eiusdem globuli M, quia nimirum radij penumbræ, seu secundariæ umbræ terminantes, ut sunt globum M tangentes A D, & B C, decussati se mutuò secant in puncto F inter Solem S, & pilam M posito; quare, ab F diuergentes, spatium H I umbræ gignent ampliore quidem quàm C D; & si quidem umbræ conspectæ in disco iouialis huius naturæ essent, posset profectò hoc verificari in quarto Mediceo, at in primo non videtur credibile, nam valde exilis esse deberet primus Mediceus, ut apex eius conii umbræ lo-

uam

uem non attingeret, scilicet eius diameter minor esse deberet, quam vna pars ducentesima diametri Iouis, quod quidem repugnat experientiae oculari; si postea subsequentes observationes has coniecturas redarguent, amore veritatis etiam propria sententia refelli, & repudiari debet, quod philosophico candore libentissime faciemus. Interim si vertigo globi iouialis cum maculis ei adherentibus horis decem ferè absoluitur, vt obseruasse ait Excellentissimus Cassinius, poterunt sanè vmbre Mediceorum distingui à maculis iouialibus ex tempore transitus cuiuslibet earum in exposita facie Iouis; nam primi Medicei vmbra percurrit quadrantem diametri Iouis à centro eius m. 35. horarijs proximè; tertia verò hor. o. m. 59. at macula iouialis m. 50. ferè, ac proinde transitus vmbellæ à prima stella genitæ celerior erit iouiali macula horæ quadrante ferè, tertij verò tardior eadem horæ sextante ferè, differentia sanè conspicua, & perceptibili.

Restant reuolutiones Mediceorum in suprema, & postica facie globi iouialis, vbi nimirum Medicei nobis occultantur ab opacitate corporis iouialis, pariterque aliæ, quæ efficiuntur in facie Iouis à nobis conspecta, occultanturque non ab opacitate, sed à splendore vultus iouialis; in hisce duabus occultationibus principia, & fines reuera sunt temporibus determinatis, essentque earum obseruationes vtilissimæ, cum ex eis motuum periodicorum certæ, & indubitatae mensuræ haberi possent, nisi insigni defectu laborarent, scilicet quod non exactè distinguitur initium, & finis, proindeque medium dictæ occultationis, propterea quod discus iouialis ob sui luminis viuacitatem non ostendit eius confinium tornatum, & terminatum, irradiatur enim capillitio quodam splendido, ita vt confinium circumferentiæ eius occultetur, eiusque diameter dilatetur, atque eius circumferentia non perfecte circularis appareat; talis ergo corona radiosa est in causa, vt ingressus atque exitus Mediceorum infra, vel supra discum Iouis minimè conspicui, & obseruabiles sint; multoties animi gratia breui telescopio

trium cubitorum initium occultationis alicuius Medicei  
 obseruavi, & quando iam occultata prorsus videbatur sum-  
 pro maiori telescopia sex cubitorum eadem Medicea valde  
 distabat à Iouis margine, neque adhuc post semihoram ad  
 eius contactum peruenerat, tumque sumpto longiori tele-  
 scopio quindecim cubitorum denuò apparuit eadē Medi-  
 cea à disco iouiali remota, neque post viginti quinque mi-  
 nuta prima horaria eius discum ingressa est. Insuper cir-  
 cumstantiæ aliquæ huius experimenti minimè negligi de-  
 bent: videbatur scilicet figura Medicei in contactu disci  
 Iouis non vt circellus maiorem circulum stellæ Iouis con-  
 tingens, sed efficiebat extuberantiam quamdam, seu verru-  
 cam latiori basi præditam, in acumen desinentē ac formam  
 papillæ, aut monticuli præferentem, & talis figura diu per-  
 seueravit. Hinc colligitur quod ingentia telescopia nuper  
 reperta nequeunt omninò capillitium radiosum stellarum  
 Iouis & Mediceorum abraderè, à quibus iam dicta verruca,  
 seu excrescētia disci Iouis creabatur, & stellarum verè figuræ  
 circulares tegebantur, & confudebantur, coniunctis nimi-  
 rum excrescentis radiosus Iouis, & Medicei; vnde suspicari  
 licet, in tali obseruatione nondum Mediceum ad conta-  
 ctum Iouis peruenisse, sed ab eo aliquantulum distitisse,  
 cum primò talis extuberantia conspecta est, quod conijci-  
 tur ex mora diuturna in tali situ; nam multoties perseuerat  
 m. 5. horaria; & siquidem toto hoc tempore ingressus tota-  
 les, aut exitus Medicei à perimetro Iouis fierent, ampliores  
 essent disci Mediceorū, quàm sensatè esperientiæ ostendunt;  
 nam primi Medicei diameter esset maior decima octaua  
 parte diametri iouialis, & tamen visu iudice minor est, quàm  
 trigesima pars diametri Iouialis, si nimirum loco debito fiat  
 talis comparatio, scilicet quando propè Iouem consistit; ibi  
 enim ad instar exilissimi puncti conspicitur, & tunc quidem  
 vera eius magnitudo ostenditur, sicuti reliquæ omnes stel-  
 læ noctu crinibus radiosus auctæ, postea in claritate crepu-  
 sculi diminutam, & veram earum magnitudinem osten-  
 dunt. Sic pariter Medicei telescopia visi à Ioue remoti

incrementa sensibilia à splendida corona suscipiunt, quæ demum spoliantur, propè fulgentissimum Iouis discum constituti. Deducitur ergo ex dictis, quod cum non possit omninò capillitium radiosum à virtute telescopij resecari, semper dubitari potest, an occultatio Mediceæ facta adhuc sit, & ideo ignoratur momentum, quando centrum disci stellæ Mediceæ limbum disci Iouis attingit, quare ambiguitas paucorum minorum nullo modo evitari potest, quæ maxime perturbat, atque impedit inquisitionem anomalie motuum velocissimorum, quales sunt revolutiones Mediceorum.

*Qua ratione Mediceorum digressiones à disco, vel corpore Iouis mensurari possint. Cap. IV.*

**Q**uoniam motus inæquales Mediceorum in suis ellipticibus non ex Ioue, sed ex Terra observantur, non possumus aliter eorum anomalias perscrutari, nisi artificio parùm diverso ab eo, quo anomalias Veneris, atque Mercurij inquirimus; horum enim orbis Solem circumdantes habent quoque Terram extra positam, à qua sanè observantur motus inæquales metiendo non arcus, quo Venus, atque Mercurius percurrit, sed sinus eorundem arcuum, scilicet distantias ab ipso Sole; eò igitur difficultas redacta est, ut mensurentur præcisè sinus, seu digressiones laterales Mediceorum à disco Iouis; sed usque ad nostra tempora (quod sciam) organo aliquo artificioso dimensum non sunt sinus, neque maximæ digressiones Mediceorum ab ipso Ioue, ac proinde ignorantur mensuræ præcisæ semidiametrorum orbium Mediceorum. Difficultas oritur ex eo, quod non possunt organo aliquo astronomico, consueto scilicet sextante, aut quadrante metiri huiusmodi digressiones, quandoquidem adhibito telescopio non autem oculis liberis videri possunt. Hac de causa maiores nostri visus iudicio, ac estimationi steterunt, comparando nimirum distantias Mediceorum collaterales, & iuxta visus apparentiam mensuran-



rando quoties discus iouialis in dictis distantijs intercipientur; at quanta sit incertitudo huius ocularis estimationis argumento est opinionum discrepantia circa magnitudines orbium Mediceorum; alij enim semidiametrum orbis primi Medicei quinque semidiametros disci Iouis cum duobus tertijs continere, alij sex, alij septem aiunt, & in semidiametro quarti Medicei discrepant à 22. ad 28. semidiametros disci iouialis, itaque in negotio tanti momenti, vbi error centesimam partem vnus semidiametri disci iouialis, excedere non deberet, vt exactè reperiretur, eccentricitas & anomalia in tanta incertitudine nullo pacto reperiri, ac determinari possunt.

Percepit hanc difficultatem magnus ille Galileus, quam vt vitaret excogitauit pulcherrimum artificium, dignum lanè sagacitate, & ingenio tanti viri, at suis temporibus, quando telescopia ad eam perfectionem non peruenerant, ad quam huiusce temporibus redacta sunt, nullam ferè utilitatem ex suo inuento consequi potuit. Pendet Galilei artificium ab utili fallacia nostri visus, quam operæpretium erit exponere, vt inde lucrari aliquid possimus; docent optices præceptores, distantiam obiectorum visibilium non videri per se, scilicet non ab ipso sensu visus, sed ab aliqua sublimiori facultate, iudicio, & ratiocinio quodam percipi; iam si aliquod visibile obiectum duobus oculis conspiciatur ita vt duo axes visuales conueniant, & se mutuo secent in eodem obiecto visibili, tunc in prædicto concursu concipitur plana aliqua superficies ad quam perpendicularis sit axis communis, siuè recta inter duos oculos educta, vocarique poterit tale planum visionem terminans, quia nimirum nedum obiectum in quo intersecantur duo axes visuales, sed etiam reliqua visibilia collateralia, atque etiam propinquiora, & remotiora in iam dicta superficie plana collocata, & veluti depicta censentur visu iudice, & propterea dici potest talis superficies visionis terminatrix. Huiusmodi operatio pendet ex consuetudine acquisita ab initio vitæ, & operationis sensitivæ, quando Natura duce, & instinctu quodam seligimus

mus

REPERTUM  
IN BIBLIOTHECA  
MUSEI AGRICOLA

mus mediorem, & perfectiorem modum percipiendi imagines visibilium obiectorum; scilicet si vno modo representetur imago confusa, alio vero clarissime, & distinctissime, Natura dictante, hanc sequimur, illam fugimus, & electio talis operationis perfectioris ex longa consuetudine nobis non aduertentibus, acquisita, facta est quasi connaturalis. His positis, cum imago eiusdem obiecti distinctissime delineetur, & pingatur in utroque oculo, sintque partes pictæ illæ versùs axim visualem clariores, & distinctiores, quàm illæ, quæ à prædictis axibus recedunt, fit, vt quoties optamus visionem distinctam, & claram, dirigamus duos axes versùs idem obiectum visibile, & quia picturæ ex usu inueterato iudicantur, ac referuntur extra oculum, nequæ alibi, quàm in concursu axium duarum picturæ eiusdem obiecti adæquatè sibi mutuò congruunt, & aptè superponuntur, ita vt vna pars vnus super aliam alterius sibi correspondentem superposita ex duabus picturis vnica distinctissime delineata efformetur, hinc percipitur, quare obiectum visibile in dicto plano terminatore visionis apparet vnicum, & singulare, licet duabus picturis representetur; pariterque deducitur, quod reliqua obiecta visibilia constituta ante vel post planum, vbi visio terminatur, non singularia, sed duplicata appareant, & collocata censeantur in eadem superficie, visionem terminante.

His suppositis conspiciatur iam dextro oculo A Iouis stella I telescopio CD, postea aperto oculo sinistro B dirigatur axis visualis BE, vt intersecet reliquam axim AE per telescopium traductum in puncto E, atque per punctum E extendatur reticulum, vel rastellum aliquod FG perpendicularare ad comunem axim oculorum EM, patet ex dictis, in plano FG terminari visionem, & ideo omnia obiecta, quæ duobus oculis conspiciuntur, visu iudice collocantur in dicto plano FG; & quia dexter oculus A videt stellam telescopio auctam in E, atque sinister oculus B reticulum, aut rastellum FG conspicit, existimabit, discum Iouis auctum occupare interstitium reticuli, aut rastelli, & ideo  
men-

mensurari poterit diameter disci iouialis E respectiuè ad  
 amplitudinem reticuli, seu rastelli F G; quapropter si inte-  
 grum interuallum F G subdiuisum fuerit in viginti equalia  
 spatia, siuè intersitia, apparebit diameter Iouis telescopio  
 aucta vigesima parte reticuli: postea quia telescopio nedum  
 discus Iouis E, sed Medicei H, O, L, N vna cum suis di-  
 stantijs à disco iouiali E eadem proportione augmentur, & re-  
 presentantur in plano F G, vbi visus terminatur, & auxilio  
 alterius oculi mensurari possunt distantie eorundem Me-  
 diceorum in eodem rastello à limbo vel centro Iouis, &  
 vltèrius situs, & inclinationes eorundem Mediceorum  
 præcisè reperiri & delineari possunt, vt postea dicemus.

Fig. 57

Hoc inuentum, licèt pulchrum & elegans, non caret suis  
 difficultatibus, quas vtile erit recensere, vt ijs medela ali-  
 qua adhibeatur. Primo loco cum huiusmodi experimen-  
 tum telescopio fieri debeat, atque telescopij imperfectio Iou-  
 is discum omninò tornatum absque omni capillitio radio-  
 so non representet; igitur non habemus præcisam mensu-  
 ram disci iouialis, cum semper vero maior appareat, & ideò  
 nec distantie Mediceorum ab illo in reticulo supradicto  
 mensurari possunt; eò quod distantie Mediceorum mensu-  
 rantur diametro disci Iouis non vera, sed acuta, & turgida;  
 huic autem vitio mederi possumus adhibito telescopio per-  
 fectissimo, & vastæ longitudinis, vt sunt ea, quæ hinc po-  
 stremis annis elaborata fuerunt: & insuper si digressiones  
 Mediceorum, & orbium diametri non mensurantur dia-  
 metro Iouis aucta, & ignotæ magnitudinis, sed à mensura  
 ipsiusmet rastelli, aut reticuli, à qua orbis Mediceorum in-  
 ter se comparati dimetiri possunt in respectu ad cẽtrum di-  
 sci iouialis, vt postea dicemus. Secundo loco adest motus  
 continuus Iouis diurnus ab Ortus ad Occasum, & æquali ce-  
 leritate eius imago per telescopium visa mouetur per reti-  
 culum, vnde eius discus nunquam quiescit, & ideò maxi-  
 ma solertia citissimè, & in transitu per reticulum dimetiri  
 debet, quod quidem facilè non est. Adest postea tremor,  
 & palpitatio quædam continua, quam aer vaporosus, pro-  
 ducit



ducit in illa imagine iouiali per telescopium representata hoc autem accidit etiam celo sereno, & claro, quando Iupiter parum ab horizonte distat; huiusmodi autem palpitatione modo auget modo minuit distantias Mediceorum à disco Iouis, & hac de causa obseruatio difficilis redditur. Huic vitio occurritur, si obseruationes fiant celo puro, & sereno, & in notabili altitudine Iouis supra horizontem. Tertia difficultas oritur ex vitris ipsis telescopij, qui minimas refractiones aliquas producant, à quibus adscititij crines radiosi Iouis, & Mediceorum, modò ad dextram, modò ad leuam fursùm, aut deorsùm porriguntur, quæ omnia præcisam mensuram distantiarum impediunt, eò magis, quòd egrè potest fixè, & absque vlla vacillatione retineri pupilla oculi in eodem situ centrali, seu in axi telescopij; nam semotis alijs causis, necessitas respirandi nedum dilatat thoracem, atque constringit, sed consequenter caput, atque oculum modò subleuat, modò deprimat. Euitatur hæc difficultas, si obseruatio fiat commodè sedendo innixò capite, atque pupilla oculi in axi lentis ocularis telescopij collocata. Postrema difficultas est, quòd noctu, dum obseruationes fiunt, videri nequeunt interstitia reticuli, seu rastelli E G, & vt videri possint, apponi debet transuersim lucerna aliqua, quæ illustret filamenta prædicta, sed occultetur, impediaturque eius splendor, ne oculis obseruatoris occurrat; tunc quidem dimetiri, & obseruari poterunt spatia reticuli, sed talis illustratio duo alia incommoda affert, primò impedit aspectum pusillarum stellarum, vt sunt Mediceæ; secundò representat fila ipsa admodum crassa, & aucta ab exerescentia quadam radiofa, & huius difficultatis medela vnica est vitus acumen, atque perfectio. Has omnes difficultates recensui non vt contemnerem, atque refellerem huiusmodi sagacissimum inuentum, sed vt obseruatores monerem, vt cautè, & summa industria procedant, prout tanti momenti negotium exigit.

Id ipsum præstari potest plæclaro artificio nuper ab ingeniosissimo Christiano Hugenio editum (licet multò prius

idipsum mihi Dominus Candidus Buonus Florentinus, communicauerit) adaptatur in tubo optico propè lentem ocularem in eiusque foco tenuissimum filum æneum, & tum si telescopio luminosum aliquod obiectum conspiciatur, veluti est Luna, aut Iuppiter, representatur in disco splendido stellę linea quædam umbrosa distincta, & terminata, genita ab æneo filo: huiusmodi linea transfertur, moto, vel circumuoluto telescopio, vt secet per centrum, vel contingat discum Iouis, perpendicularisque sit ad lineam motus diurni, quam centrum Iouis percurrit, postea breuissimo, & celerrimo aliquo funependulo per eius oscillationes dimetitur tempus, dum supra filum umbrosam transit discus Iouis: demùm sequentes oscillationes numerantur, quouisque stella Medicea Ioui propinquior pertingat ad eandem fili vmbra, eodemque modo proceditur in reliquis Mediceis; exempli gratia si fuerit linea motus diurni Iouis A F, adaptetur fili ænei vmbra in R S perpendiculariter super A F, tunc fixo manente telescopio, atque oculo

*Fig. 58.* conspicientis discus Iouis cum Mediceis annexis mouebitur ab F versùs A, & posito quod terminus B perueniat ad vmbrosam lineam R S, dum pendulum decem oscillationes perficit, & centrum G offendat R S in quinque oscillationibus, postea stella Medicea D cum linea D C parallela ad R S offendat eandem vmbrosam lineam post decem, alias penduli oscillationes, & denique recta linea F E, quæ per Mediceam E transit, occurrat eidem lineę vmbrosę R S post viginti eiusdem penduli oscillationes; igitur transitus semidiametri Iouis B G efficitur tempore quinque oscillationum penduli; quapropter distantia C G ad G B eandem proportionem habeat quam 15. ad 5., & distantia F G ad B G erit vt 35. ad 5.: postea reperiri debet angulus F G E vt in triangulo G F E rectangulo in F innotescat proportio E G ad G F: hæc autem exempli gratia ponatur esse, vt 40., ad 35., & sic se habeat D G ad G C: sed qualium partium B G erat 5., reperta fuit G F 35.; igitur earumdem partium distantia G E erit, 40., & consequenter in distantia G E continentur

nētur octo semidiametri Iouis, pariterque qualiū partiū diameter Iouis est quinque, erit distātia D G 17. & pars septima.

Hæc artificiosa operatio quibusdam etiam vitijs, atque difficultatibus laborat; primo quia fili ænei linea umbrosa R S videri nequit, nisi telescopium dirigatur directè versùs obiectum aliquod lucidum, & splendidum veluti est Luna, aut Iuppiter; at si dirigatur versùs stellas minutissimas, ve sunt Mediceæ, talis linea umbrosa omninò inuisibilis est, excepto illo momento in quo stellula lineam umbrosam pertransit, & proinde, si vellemus ante vel post occursum situm eiusdem lineæ umbrosæ, & eius distantiam à stellula mensurare, deberet quidem filum æneum ab aliqua lucerna, vel laterna illustrari, quod sanè incommodum est, licèt non vnicum filum, sed craticula ænea in ipso tubulo accommodetur. Secundò difficile maximè est abradere crines radiosos disci iouialis; nisi enim hoc fiat, ignorabitur prorsùs momentum temporis, quando eius margo contingit lineam vmbrosam: postea oculus conspicientis in eodem situ stabilis retineri debet, ne vacillando confundantur, & perturbentur transitus disci Iouis, & Mediceorum per eandem vmbra R S: postmodum angulus F G E difficillimè mensurari potest, licèt craticula filorum vtamur; propterea quod, nisi illustraretur, non esset visibilis, nec ostenderet inclinationem anguli F G E, præcipuè si oculi pupilla in eodem situ lentis ocularis stabilis maneat, nec ab vno ad alium locum transferatur. Ambo hæc artificia, si debitis cautionibus in vsum redigantur, satis exactè ostendent, nedum digressiones, sed etiam motus anomalias, & latitudines Mediceorum si tamen à viris industrijs visu acutissimo præditis, optimis, & longioribus telescopijs patienter, & summa diligentia, & cautione fiant.

Sed antequam vlteriùs procedamus, ostendenda est praxis accuratior mensurandi distantia Mediceorum à Ioue in reticulo superius exposito. Extendantur primo tenuissima fila A B, & C D ad angulos rectos se secantia in I, & in distantijs equalibus a sectione I extendantur bina & bina fila

æquidistantia ipsis  $AB$ , &  $CD$ , ut sunt  $GL$ ,  $HM$ ,  $GH$ , &  
 $KM$ , disponaturque reticulum in debita distantia, ut discus  
*Fig. 59.* Iouis telescopio auctus conspiciatur inter has lineas paral-  
 lelas, ita ut eius centrum  $I$  conspiciatur motu diurno ferri  
 per directionem filii  $AB$ ; hoc autem facile fieri poterit, licet  
 discus Iouis incremento coronæ radiosæ auctus fuerit; nam  
 tunc sufficiet, ut extremitates eius  $C$ , &  $D$  præcisè in transcur-  
 su tangant lineas  $GL$ , &  $HM$  parallelas, & æquè remotas ab  
 $AB$ ; tunc enim certum est, centrum eius  $I$  semper in filo  
 $AB$  collocari: perveniat iam in situ  $E C F D$ , ut nimirum  
 extremitates  $E$ , &  $F$  contingant duas parallelas ipsi  $CD$ , &  
 æquè ab ipsa recedentes, patet, quod centrum Iouis  $I$  præci-  
 sè transit per  $CD$ , scilicet per cōmunem sectionem recta-  
 rum  $AB$ , &  $CD$ ; tunc quidem consideretur digressio  
 Medicei  $P$ , non quidem à confinio Iouis fallaci  $E$ , sed  
 ab eius centro  $I$ , quæ mensura perhibetur ab ipso reticu-  
 lo; si postea sumatur eiusdem Medicei digressio opposita  
 versus  $Q$ , tunc quidem, si instrumentum ostendet  $I Q$ , &  
 $I P$  æquales inter se, erunt quoque digressiones eiusdem  
 Medicei à centro Iouis æquales, & insuper habebitur men-  
 sura diametri  $P Q$  orbis eiusdem Medicei, quæ mensura, li-  
 cèt non perhibeatur in partibus disci iouialis  $F E$ , sufficit ta-  
 men, ut per se, & respectu centri iouialis  $I$  habeatur in parti-  
 bus ipsius filii; nam si postmodum diameter  $P Q$  augetur,  
 vel minuitur, atque digressiones maxime  $I P$ , &  $I Q$  inæqua-  
 les reperiuntur, hæc sufficient ad inquirendam eccentrici-  
 tatem, locum Apojouij, & eius anomaliam. Poterit quo-  
 que diameter  $P Q$  orbis unius Medicei comparari cum dia-  
 metro  $R S$  alterius Medicei, ostendetque instrumentum ip-  
 sum intercapedines  $P R$ , &  $Q S$ , si fuerint æquales vel inæ-  
 quales, ex quibus theoricæ Mediceorum deduci possunt,  
 dummodo, quoties mensuræ sumuntur, centrum Iouis in-  
 cidat in punctum  $I$  reticuli, quod ut ritè fiat, animaduer-  
 tendum est, oculi pupillam collocari debere in puncto inter-  
 medio, seu axi lentis ocularis, & telescopij, tunc enim cri-  
 nes adscitij uniformi amplitudine ambiunt, & comple-  
 ctunt.

Et tunc Iouis peripheriam, at si oculus ultra axim ad latus lentis ocularis applicetur, tunc quidem ex vna parte veluti F splendor ille aduentitius tanta copia multiplicatur, vt Iuppiter non appareat circularis, sed oblongus, & exprorectus. Et hæc monuisse, inutile non erit.

*Quomodo linea absidis eccentrici Mediceorum reperiri possit.*  
*Cap. V.*

**P**ostquam difficultates omnes proposuimus, quæ inquisitionem periodicorum motuum Mediceorum impediunt, & industrias, atque artificia, quibus inquiri debeant retulimus, reliquum est modò, vt praxim earumdem doceamus; & quia, vt dictum est, nullus periodicorum motuum præcisè haberi potest, nisi præcedat cognitio periodi anomalæ, scilicet motus inæqualis stellæ in suo eccentrico; propterea primò reperiri debet situs lineæ absidis, & consequenter positio Apojouij, vt inde tempus reuolutionis Medicei in suo eccentrico eliciatur; Hoc autem assequi non possumus, nisi ea tempora, & constitutiones eligamus, in quibus motus anomalæ, seu inæqualitatis discretus omninò sit, nec implicetur, aut confundatur cum reliquis inæqualitatibus Mediceorum; igitur, vt hoc assequamur, eligere debemus constitutiones illas, quando inæqualitas synodica, seu menstrua nulla est, quod verificatur solùm modò, cum stella Iouis est stationaria, & apparet terricolis per plures dies stabilis subijsdem stellis fixis; tunc planè nec prosthæresis orbis annui, nec motus Iouis in Zodiaco alterat, aut perturbat cursum inæqualitatis Mediceorum, & proinde tunc temporis sensibilis, & obseruabilis erit.

His positis, si velimus situm lineæ absidis orbis alicuius Medicei reperire; supponatur orbis ellipticus eius A N P X, in cuius polo G sit Iuppiter, linea absidum sit A P, & A Apojouium, intelligaturque Terra in T, tunc optimo, & per magno telescopio iam dicto reticulo, seu rastello, vel filis æneis in foco lentis ocularis affixis cum omnibus cau-  
 tio;

tionibus superius relatis accuratè obseruentur duæ æquales  
 digressiones eiusdem Mediceæ à centro Iouis, vt sunt  $GF$ ,  
 &  $GE$ , & posito, quod æqualibus temporibus interstitia  
 $FG$ , &  $GE$  ab eodem Mediceo percurrantur, dico, quod  
 tunc linea absidis  $AP$  erit in directam constituta cum linea  
 Plenimediceæ  $GT$ , propterea, quod rectæ lineæ  $GF$ , &  
 $GE$  inter se æquales percurruntur temporibus æqualibus;  
 ergo arcus eiusdem orbis, quibus correspondent, pariter  
 inter se æquales erunt, sed nunquam eiusdem ellipsis arcus  
 æquales temporibus æqualibus percurruntur, nisi quando  
 arcus translati æquè mouentur à linea absidum; ergo puncta  
 ellipsis  $B$ , &  $C$  æquè recedunt à linea dicta absidum, proindeq;  
*Fig. 60.* secto arcu  $CB$  bifariam in  $A$ , erit recta linea  $AGT$  illa quæ  
 quærebatur. Sed ex hoc non inde innotescit, an punctum  $A$  sit  
 Apojouium, vel Perijouium, quod vt distinguatur, con-  
 siderari debent duo alij transitus æquè remoti à centro Iou-  
 nis  $G$ , qui inter se, & prioribus sint æquales, sed existente  
 stella in parte opposita eccentrici, vt sunt  $HE$ , &  $FI$  subten-  
 dentes arcus  $KO$ , &  $LR$ , vel potius  $GF$ , &  $EG$  subten-  
 dentes arcus  $PL$ , &  $KP$ , hi quoque transitus fient tempo-  
 ribus æqualibus inter se proximè, & ideò puncta  $K$ , &  $L$   
 erunt æquè remota à linea absidum; & si quidem contingat  
 quod transitus eiusdem Mediceæ à  $K$ , ad  $L$ , vel per duo ar-  
 cus  $OK$ , &  $LR$  minori tempore absoluantur, quam eius-  
 dem transitus à  $B$  ad  $C$ , tunc necessariò punctum  $A$  erit  
 Apojouium, &  $P$  Perijouium. His peractis expectetur  
 quousque denuò perueniat eadem stella Medicea versus  
 Plenimediceum, & secundo obseruentur duo æqualia in-  
 terstitia  $FI$ , &  $HE$  æquè remota à centro Iouis  $G$ , subten-  
 dentia arcus  $QB$ , &  $CM$ , si tùm contingat, digressionem  
 $FI$  transigi tempore aliquantisper breuiori, quam percur-  
 ritur interstitium  $HE$ , tunc conijciemus, Apojouium trans-  
 latum anteriùs esse in respectu ad lineam synodum  $TG$ ,  
 quæ supponitur fixa sub stellis fixis, cum Iuppiter stationa-  
 rius sit; ergo persuaderi debemus, Apojouium  $A$  anteriùs  
 translatum esse secundum ordinem signorum, & ideò con-  
 sta-

stabit, anomalix periodum tantò prolixius periodo restitutionis fieri sub stellis fixis, quantum est spatium translationis Apojouij A.

Expendendæ postea sunt eadem obseruationes in subsequentibus Plenimediceis, ac Nouimediceis apparentibus, sumendo semper easdem digressiones G F, & G E, vel F I, & H E, dum velocitas transitus per G F crescit, & superat velocitatem per G E, vel transitus I F velocior est, quam per E H, signum erit, nondum Apojouium A ad Nouimediceum peruenisse, sed tum demum eum assequetur, quando primò transitus æquales G F, & G E, nec non F I, & H E denuò temporibus æqualibus inter se fieri contingat; attamen si transitus, qui in Plenimediceo modò obseruantur, velociores fuerint ijs, qui in Nouimediceo fiunt, tum dubitandum non est, Apojouium integrum semicirculum sui orbis percurrisse, & intermedio tempore numeratis omnibus Plenimediceis transactis deduci potest proximè periodus anomalix, diuidendo scilicet semicirculum in tot partes æquales, quot fuerunt Plenimedicea, seu revolutiones menstruæ, & si illæ partes addantur iisdem periodis integris, resultabit periodus anomalix mediæ quæsitæ.

Huiusmodi obseruationes fieri possent, modò Iuppiter stationarius permaneret; at quia talis constitutio citò euanescit, oportet minorem multitudinem Plenimediceorum sumere, scilicet non omnia illa, quæ in semicirculo anomalix, sed ea tantummodò, quæ in eius quadrante fiunt, in quo velocitates in prædictis interstitijs æqualibus successiue crescunt ab illa maxima tarditate, quæ in Apojouio fit, attamen in hisce incrementis diuersificantur inter se celeritates per G F, & G E maiori differentia, ita vt in transitu Apojouij ab A ad N, scilicet à Plenimediceo ad quadraturam sequentem, seu ad maximam digressionem orientalem transitus per G F temper celerior erit minorique tempore absoluetur, quam transitus per G E, eamque maiori excessu superabit, & tum demum maximè inter se differentes erunt dictæ velocitates, cum Apojouium A præcisè quadrat-

drantem vnum pertransijt; & hinc poterimus inquirere periodum anomalie mediæ, sicuti supra inuimus; & licet quies, & statio Iouis transacta fuerit, antequam Apojouium Medicei quadrantem pertransierit, possumus tamen cursum medium anomalie proximè perscrutari; quandoquidem primæ illæ periodi, licet fuerint incertæ, non possunt tamen valdè à verò aberrare: sit v. g. error commissus vnus gradus, tunc coaceruatis pluribus reuolutionibus, vt nonaginta, omnes errores simul sumpti vnum quadrantem conficient; quare error iam maximus redditus non posset nos latere, sed clariùs, & multò faciliùs postea ostendemus, qua ratione periodus media anomalie, licet crassa minerva ad inuenta, possit postea emendari, & ad præcisam mensuram redigi.

Alia ratione, & faciliori poterit linea absidum Mediceorum, & periodus anomalie reperiri, scilicet ea methodo, qua astronomi eccentricitatem Veneris, atque Mercurij perquisierunt: debent igitur sumi maximæ digressiones Mediceorum ab ipso Ioue summa diligentia, & præcisione, mensurando (duobus artificijs supra expositis) duas maximas remotiones eiusdem Medicei orientalem, & occidentalem à centro Iouis, vt sunt XG, & NG. Hoc pariter fieri debet, dum Iuppiter stationarius est, & si forte iam dictæ digressiones maximæ æquales inter se fuerint (neglectis temporibus in quibus tales digressiones absoluuntur) tunc eliciemus lineam absidum esse AP, & in linea Plenimediceorum, & Nouimediceorum coincidere: postea, vt sciamus num Apojouium in Nouimediceo, vel in Plenimediceo collocetur, usurpari debent duæ paruæ digressiones à Ioue, vt in præcedenti methodo tradidimus, vel potius expectandus est secundus cursus synodicus, in quo demùm dimensio digressionibus maximis, quæ non erunt, vt antea, inter se æquales, siquidem occidentalis digressio XG diminuta, & orientalis GN aucta fuerit supra mediocritatem præcedentem, dubitandum non est, in præcedenti mense Apojouium in Plenimediceo extitisse, à quo in sequenti mense  
disces.



discefferit continuato motu secundum ordinem signorum: & repetitis observationibus in subsequentibus mensibus semper maiori decremento digressio maxima  $G X$  diminuetur, & maiori incremento  $G N$  elongabitur, quousque demum fiant inter se maxime differentes, & inaequales, & in hac constitutione linea absidum quadrantem percurrisse existimandum est, & postmodum denuo crescet distantia  $G X$ , & minuetur distantia  $G N$ , & quando denuo maximae digressiones collaterales fiunt aequales, certi erimus; Apojouium percurrisse integrum semicirculum. Hinc iam perquiri possunt periodi medij anomaliae non secus, ac supra expositum fuit,

Præterea facillime eccentricitas orbis cuiuslibet Medicei reperiri poterit, quandoquidem maximis digressionibus *Fig. 60.*  $G X$ , &  $G N$  existentibus aequalibus inter se habebimus semidiametrum eccentrici, seu axem minorem ellipsis, ac quando digressiones  $G A$ , &  $G P$  acquirunt omnium maximam differentiam inequalitatis inter se, scilicet cum excessus unius supra alteram maximus est omnium, qui in toto periodo contingunt, tunc quidem certum erit, lineam absidum  $A P$  perpendicularem esse ad lineam synodicam  $T G$ , seu ad lineam Nouimediceae, & Plenimediceae apparentis, & tunc sumptis duabus maximis digressionibus, *Fig. 61.* scilicet  $G A$  maiore, &  $G P$  minore, habebimus maiorem axem ellipsis: diuisa verò axi  $A P$  bifariam in  $Z$ , erit  $Z$  centrum ellipsis, atque  $G Z$  eius eccentricitas, à qua facile erui potest species ellipsis, quæ cuiuslibet Mediceo pertinet, & consequenter anomalia eius. Modus iste inueniendi eccentricitatem, nedum facilis est, & expeditus, sed forsan singularis, nec aliter reperiri potest.

Deuenio postmodum ad tertium modum inquirendi positionem absidum orbium Mediceorum, & periodum anomaliae; is verò perhibetur, si adnotentur solummodo tempora, in quibus aliqua stella Medicea ab apparenti Plenimediceo ad Nouimediceum peruenit, & ab isto ad illum, neglectis maximis digressionibus, aut partialibus, dummo-

do observationes fiant, quando Iuppiter stationarius exi-  
 stit; supponatur ergò, quod stella Medicea percurrat semi-  
 Fig. 60. circulum A N P à Plenimediceo apparenti, ad Nouime-  
 diceum in tanto tempore, in quanto percurrit præcisè reli-  
 quum semicirculum P X A à Nouimediceo adsequentem  
 Plenimediceum apparentem, & tunc necessariò linea ab-  
 sidum cum linea synodica apparenti coincidet: postmodum,  
 vt pateat an Apojouium in Plenimediceo apparenti, vel  
 Nouimediceo reperiat, adhibendæ sunt digressiones par-  
 tiales æquè remotæ à Plenimediceo, vt superius expositum  
 fuit; postea consideratis subsequenibus constitutionibus,  
 si fortè Apojouium in Plenimediceo A extiterit, obserua-  
 tur transitus à Plenimediceo apparente ad Nouimedi-  
 ceum prolixiori tempore fieri, quàm subsequens transitus  
 à Nouimediceo ad postremum Plenimediceum, tum Apo-  
 jouium A antè secundum ordinem signorum transisse,  
 concludemus, & sic in Mediceis mensibus sequentibus  
 semper motus descendens semicirculi tardior erit, quàm  
 in mense præcedenti, & econtrà in semicirculo ascendente  
 transitus velocior erit, atque incrementum velocitatis pri-  
 mi transitus, & decrementum secundi semper magis, ac  
 magis augebitur, quousque Apojouium A ad quadratu-  
 ram perueniat, & tunc maximus erit excessus temporis su-  
 pra mediocrem, quo differunt transitus semicirculi descen-  
 dentis ab ascendente, à Plenimediceo scilicet ad Nouime-  
 diceum apparentem, & econtrà maximus erit temporis de-  
 fectus à medioeritate, quo percurritur semicirculus ascen-  
 dens à Nouimediceo ad Plenimediceum apparentem; at-  
 que hoc erit tertium artificium, quo cursum medium ano-  
 malia venari possumus; quare ex his tribus, si accuratè &  
 summa diligentia obseruentur, non dubito, quin possint  
 exactè anomalia medi motus acquiri.

His peractis poterunt emendari, & ad exactam præcisio-  
 nem reduci reliquæ periodi restitutionum, & synodicorum,  
 atque ipsiusmet anomalia hac ratione: sumantur duæ eclip-  
 ses eiusdem Medicei omninò inter se similes, & maxime  
 di;

distantes, ita ut ab vna ad alteram tempus aliquorum annorum intercedat, & in vtraque eclipsi Mediceus in eodem loco sui eccentrici existat, atque maioris facilitatis gratia tam in illa, quam in ista Iuppiter stationarius sit, & si fieri possit, eius latitudo sit omnino eadem, pariterque in vtraque Iuppiter sit in statione occidentali, vel ambæ sint orientales: tunc, quia ingressus, vel emerſio Medicei à cono umbrato Iouis est ferè momentanea, cognitum erit præcisè temporis interuallum ab vna ad alteram eclipsim; (quod ad æqualitatem reduci debet solito artificio astronomico, quo dies naturales corriguntur) igitur habebimus datam multitudinem periodorum mensuorum vnà cum multitudidinem periodorum anomalix suntque tam hi, quam illi integri, & quia hætenus tempora periodica mensura, & anomalix, licet non exacta habebamus, coaceruatis omnibus periodis, quæ in interiecto tempore intercipi possunt, constabit, an calculus Cælo, & obseruationibus respondeat, & siquidem dissensus aliquis reperiat, tum præhabiti medij motus corrigendi sunt, redigendique ad omnimodam, & exactam præcisionem, & consequenter elicietur motus Apojouij, & absidis, eruenturque radices, seu epochæ è quibus mediante calculo loca Mediceorum assignari possunt in quolibet tempore præterito, vel futuro.

*De varietate hypotheseum, quibus Latitudines Mediceorum, & earum periodi saluari possunt. Cap. V I.*

**N**on minus, quam eccentricitatis & anomalix Mediceorum inquisitio, difficiles & abstrusæ sunt Latitudinum apparentes constitutiones, & earum periodi, de quibus modo agendum est, sed primo loco considerari debent hypotheses variæ, quæ latitudinibus Mediceorum applicari possunt, experiendumque, an cum obseruationibus, & cum Cælo conueniant.


Et primo supponi possunt omnes quatuor Mediceorum orbis in vno, & eodem plano iacere, ita ut vnus super alte-

rum non inclinetur. Secundò circa situationem dicti plani communis orbium Mediceorum plura comminisci possunt; aut enim in eodem plano eclipticæ iouialis iacet, vel supponitur eidem eclipticæ iouialis inclinatum; & si hoc verum est, quæritur, an talis inclinatio sit stabilis uniformis, & perpetua, vel potius variabilis. Vtteriùs dubitari potest, an planum commune orbium Mediceorum semper equidistet plano eclipticæ solaris, & terrenæ, & tunc fieri potest, ut eadem peripheria seu facies orbis Mediceorum perpetuò respiciat, & dirigatur ad Solem: vel supponi potest, quod diametri orbium Mediceorum semper sint ipsis paralleli maneant; ostendemus igitur, ferè omnes has positiones ordini Naturæ eiusque consuetis operandi modis in reliquis planetis refragari, pariterque causis physicis superiùs expositis, atque etiam observationibus in Cælo habitis omninò repugnare.

Sed antequam hæc omnia singillatim in examen reuocemus, explicare erit operæpretium, & exemplis exponere *Fig. 62.* supradictas hypotheses. Sit igitur Sol in S, & orbis, in quo reuoluitur centrum Iouis, sit I G K L, qui secet planum eclipticæ solaris & terrenæ I P K Q in recta linea I S K, angulus inclinationis eorundem planorum supponatur inuariabilis, sicuti experimenta maiorum docent, & quoniam orbes, seu epicycli Mediceorum A B C D à Ioue eorum centro nunquam separantur, propterea transferentur vnà cum Ioue per circumferentiam iouialis eclipticæ I G K L. *Fig. 62.* Iam prima hypothesis explicanda ponit, A B C D semper in plano eclipticæ iouialis I G K L, licet transferatur vnà cum Ioue per totã eius eclipticam; in hac inquã hypothesi debent apparentiæ Latitudinum Mediceorum considerari: Sit centrum Iouis in suo Nodo ascendente I vel descendente K, scilicet in sectione orbis Iouis, & nostræ eclipticæ, siuè potius centrum Iouis ponatur in limite boreali G, vel austrino L; & quia Terra T in plano eclipticæ solaris duas habitudines, & situationes habere poterit pro varia situatione Iouis, & Solis, scilicet centri systematis planetarij circa

Ter-

Terram; aut enim per Terram T transit eadem linea recta  
 I S K, quæ communis sectio est eclipticæ iouialis, & solaris,  
 vel lateraliter constituitur: in primo casu, quia Terra, &  
 Sol in cõmuni sectione vtriusque eclipticæ ponuntur, exi-  
 stent ambo in plano iouialis eclipticæ, in quo pariter semper  
 Iuppiter eiusque systema constituuntur, ac proinde radius  
 visualis iacebit quoque in plano eclipticæ iouialis, & con-  
 sequenter in plano A B C D: sed ex opticis quando radius  
 visualis iacet in plano orbis A B C D, idem circulus vt li-  
 nea recta ab oculo conspicietur; quare in tali constitutione  
 Medicei, dum reuoluuntur per A B C D, efficiunt cursum *Fig. 62.*  
 apparentem per lineam rectam, quæ per centrum disci Io-  
 nis transibit, eritque via itineris Mediceorum in Limitibus  
 parallela ad planum eclipticæ solaris, in Nodis verò incli-  
 nata angulo inclinationis orbis Iouis supra eclipticam sola-  
 rem. Si verò linea I S K cõmuni sectionis eclipticarum, *Fig. 63.*  
 sita fuerit in parte sinistra Terræ V, quia semicirculus I Q K  
 eclipticæ solaris eleuatur supra semicirculum I L K eclipti-  
 cæ iouialis, fit, vt radius visualis V I, V G, V K, & V L su-  
 blimis quoque sit ad planum eclipticæ iouialis I M L, proin-  
 deque eleuatus quoque erit supra planum orbis Mediceo-  
 rum A B C D; quare dictus orbis non amplius linea recta,  
 sed ellipsis apparebit, cuius partes viciniores versùs B de-  
 pressiores, & cum Latitudine australi conspicietur, & econ-  
 trà partes oppositæ versùs D erunt subleuatae cum Latitudi-  
 ne boreali respectiuè ad eclipticam iouialem. Si postea li-  
 nea solaris I S K sita fuerit ad dextram Terræ X, quia illa si-  
 mul cum semicirculo solaris eclipticæ I P K deprimitur in-  
 fra semicirculum eclipticæ iouialis I G K, erit quoque vi-  
 sualis radius X I, X G, X K, X L depressus infra eandem  
 iouialem eclipticam, & proinde infra planum orbis Medi-  
 ceorum A B C D, & tunc dictus orbis ellipsim representa-  
 bit, cuius infima pars B eleuata, & cum Latitudine boreali  
 conspicietur, pars verò opposita D cum Latitudine australi.  
 Pater quod, existente Ioue in Limites G, angulus X G S in  
 situ acronico maximus est omnium, qui effici possunt à ra-  
 dio.



dio visuali ex Terra X ducto cum semidiametro BG orbis Mediceorum; qualiscumque igitur sit distantia, & habitudo Telluris respectu ad Solem, & Iouem ob prosthapherum orbis annuam, minuitur borealis latitudo in Nouimediceis B, quo magis distantia Iouis a Terra augetur, & hæc quidem sunt varietates, quæ in apposita sententia obseruari deberent.

Sit secundo loco planum orbis ABCD semper æquidistans plano eclipticæ solaris I P K Q, ponaturque Iuppiter in Nodo ascendente I, & quia Terra semper in eodem plano eclipticæ solaris iacet, in quo modo collocatur orbis ABCD; igitur ipse lineam rectam representabit, pariterque iter Mediceorum, per centrum Iouis transiens, rectum erit; quapropter in Nouimediceis B, aut Pleni-mediceis D nullam Latitudinem habebunt; at in maximis digressionibus A, & C Latitudines ab ecliptica iouiali erunt insignes, quarum mensuræ erunt arcus AN, & OC, eritque Latitudo partis dextræ C borealis, & sinistrae A australis.

Fig. 64. lato postea Ioue cum suo systemate in Limite boreali G producatum planum XGS ad ambas eclipticas perpendiculare, secabit sanè duo plana parallela I P K, & A B C in duabus rectis lineis BD, & SX inter se parallelis; cumque punctum X infra Iouis eclipticam, & infra planum ABC ponatur, necessariò radius visualis XG depressus erit infra planum orbis ABC, & proinde inferior pars B Nouimediceæ altior erit, habebitque Latitudinem borealem. Contraria postea apparentia efficietur in limite australi L. Hic similiter maximus angulus XGS Latitudinis efficietur in Iouis acronichijs, in reliquis verò locis minuetur.

In hac hypothese aut idem terminus B diametri BD semper dirigitur versus Solem in tota reuolutione orbis Mediceorum per eclipticam iouialem, vel diameter BD semper sibi ipsi æquidistat; exemplum primi casus habetur in nostra Luna, quæ in sua reuolutione eandem faciem maculatam ad Terram dirigit; si ergo supponatur, punctum B orbis Mediceorum semper ad Solem dirigi, efficientur duo

motus reales orbis  $A B C D$  circa planum eclipticæ iouialis, quia in Nodo ascendente  $I$  diameter  $A C$  perpendicularis ad lineam solarem  $I S$  est inclinatus ad viam Iouis  $N O$ , ita vt terminus  $A$  Latitudinem australem respectu iouialis eclipticæ, &  $B$  borealem habeat, sed in Limite boreali  $G$  huiusmodi inclinatio euanescit, cum puncta  $A$ , &  $C$  eclipticæ iouialis circumferentiam contingant, & postea in secundo Nodo  $K$  denuò diameter  $A C$  ad eclipticam iouialem inclinatur, sed situ inuerso, quia in  $K$  terminus  $A$  maximam Latitudinem borealem, &  $C$  australem habebit, & tandem in reliquo Limite  $L$  denuò diameter  $A C$  in ecliptica iouiali coestenditur; quare patet, diametrum  $A C$  vna cum eius orbe reflecti circa diametrum  $B D$ , eleuando, & deprimendo terminos  $A$  &  $E$  respectuè ad eclipticam iouialem. Præterea adest alius motus inclinationis, quia diameter  $B D$  in Limite  $G$  inclinatur ad planum eclipticæ iouialis, cum terminus  $B$  Nouimediceus eleuetur versus Boream, &  $D$  versus Austrum deprimatur, at in Nodis  $K$ , &  $I$  eadem diameter  $B D$  congruit cum plano eclipticæ iouialis, & postmodum in Limite australi  $L$  denuò inclinatur, sed contrario modo, ac in Limite  $G$  disponebatur; ergo circa diametrum  $A C$  efficitur noua conuersio diametri  $B D$  vna cum orbe Mediceorum, subleuando, & deprimendo terminos  $B$ , &  $D$ ; & huiusmodi circumductio vocatur inclinatio, sed præcedens appellatur reflexio, quæ non differunt ab ijs, quas Ptolomeus epicyclis Veneris, atque Mercurij tribuit, qui cum à recentioribus astronomis propter eorum absurditatem rejiciantur, non videntur in Mediceis recipi debere. Si postmodum supponatur diameter  $B D$  semper sibi ipsi æquidistare, dum reuoluitur per iouialem eclipticam, debent quoque admitti iidem duo motus reflexionis, & inclinationis, non tamen reales in respectu ad eclipticam iouialem, sed apparentes.

In nostra hypothese, quæ conformis est motibus reliquorum planetarum, & ex causis physicis deducitur, determinauimus, plana orbium Mediceorum certam, ac

ita-

stabilem inclinationem supra planum eclipticæ iouialis habere, quæ alterationem aliquam patiuntur in curtu menstruo, quoties à Plenimediceis, & Nouimediceis recedunt.

*Orbes Mediceorum non iacere in vno, & eodem plano.*

*Cap. VII.*

**S**imon Marius, & alij constitutos esse orbis Mediceorum in eodem plano persuasi sunt hoc potissimum argumento, quia nimirum Medicei in maximis à Ioue digressionibus semper in vna & eadem recta linea per centrum Iouis extensa collocantur; at ego, si vim argumenti percipio, nihil certi ex eo deduci posse arbitror, quandoquidem duo vel plura plana adinuicem inclinata possunt quidem se mutuò secare in eodem recta linea; igitur pari modo possunt plana orbium Mediceorum se mutuò secare in recta linea, quæ per centrum Iouis transit, ita vt talis communis sectio per maximas digressiones à Ioue extēdatur, & tunc, quoties Medicei in comuni dicta planorum sectione existerent in vna recta linea cum centro Iouis conspicerentur, & tamen semicirculi supremi, & infimi vario modo possēt ad inuicē inclinari. Secūdo loco aduerto, hætenus obseruatū non fuisse diligenter, an Medicei in maximis à Ioue digressionibus semper in vna recta linea per centrum Iouis educta collocentur, neque patuit modus inquirendi accuratè an in maximis digressionibus Medicei in iouiali ecliptica reperiantur, an potius ab ea aliquantisper deflectant, & recedant. Hoc deducitur ex eo, quod obseruationes absque vlla machina, sed mera visus estimatione factæ fuerunt, & insuper telescopia præteritis annis, quibus Medicei obseruabantur, parua, & imperfecta erant, comparata cum ijs, quæ hinc vltimis annis elaborata fuerunt, sed situs, & dispositiones Mediceorum paruis, & imperfectis telescopijs obseruatæ errores non contemnendos inducunt, eò magis, si visus iudicio, & estimationi standum est; quapropter suspectæ omnino erunt obseruationes præteritæ; hoc, inquam, profero ab experien-



rientia edoctus; nam multoties paruo aliquo telescopio duo Medicei videbantur in eodem recta linea cum centro Iouis positi, at postea, adhibitio maiore, & perfectiore telescopio, notabili differentia à rectitudine aberrare visi sunt: rursus quando telescopio satis perfecto septem ferè cubitorum duo Medicei in directum cum centro Iouis apparebant, nedum mihi, sed etiam pluribus adstantibus, iisque visu acutissimo pollentibus: extenso deinde filo tenuissimo, aut aliqua regula lignea directa, in commoda distantia, & situ constituta, vt altero oculo aperto, Medicei cum centro Iouis telescopio visi conferri possent cum fili, vel regule directione, tunc quidem sensibilis aliqua differentia, & discrepantia reperiebatur, quæ quidem ab ipso visu absque filo, vel regula non apparebat. Postmodum quod Medicei in maximis digressionibus ab Ioue perpetuò careant Latitudine & in via, seu ecliptica iouiali existant, certè scio, discerni non posse à simplici visu, sed requiruntur artificia inferius explicanda, quæ cum hactenus ignota, vel ad praxim redacta non fuerint, iure meritò suspectas esse veterum obseruationes censeo, proindeque certè pronunciari non potest Mediceos in maximis à Ioue digressionibus omnī Latitudine caruisse, & præcisè in ecliptica iouiali extitisse. Et si hoc, inquam, incertum est, multò minùs affirmari poterit, quatuor orbis Mediceorum in vno, & in eodem plano collocari.

Si igitur præteritæ obseruationes insufficientes, & incertæ iure meritò censeri debent, erit operæ prætium exactioribus, & accuratioribus obseruationibus veritatem inquirere, ostendereque, quod orbis Mediceorum in vno, & eodem plano minimè iaceant.

Prima ergo mea obseruatio habita est nocte sequenti diei 14. Augusti huius anni 1665. hor. 8. 22. p. m. Florentiæ. Tunc profectò videbatur tertius Mediceus ferè in vna recta linea cum primo, & secundo, erantque primus, & tertius occidentales à Ioue, secundus verò orientalis, & tunc prope modum tertius Mediceus à disco Iouis inferiori egressus

*Fig. 65.* fuerat; distabatque à Nouimediceo apparente gr. 4. m. 11. secundus recedebat à Plenimediceo apparente gr. 145. m. 18.; sed primus distabat à Nouimediceo gr. 72. m. 25. Itaque omnes inferiori parte eorum epicyclorum degebant: ponatur ergo discus Iouis I; & ecliptica iouialis M O, in qua extensi intelligantur in eodem plano orbis dictorum Mediceorum, sitque primus in A, secundus in B, & tertius in C: intelligatur postea Terra in T sublimis supra planum eclipticæ iouialis, & supra planum orbis communis Mediceorum, & licet eleuatio visualis radij T I supra commune planum iam dictum sit parua, nihilominus est impossibile, vt planum A I B C conspiciatur ab oculo in T, vt linea recta (quod effici potest tantummodo, quando oculus T extitisset in eodem plano I A B C) efficient igitur tres Mediceci cum centro Iouis trapezium, cuius angulus, vel stella C vicinior, & directior oculo erit, quam stellæ A, & B; igitur necessario stella C magis depressa infra lineam M O, vbi visio terminatur, apparebit, quam reliquæ duæ stellæ A & B; cumque stella A in E, & stella B in F appareant, conspicietur stella C in puncto inferiori G depresso versus Meridiem, & intra rectam E F; quapropter tres stellæ E, F, & G triangulum aliquod, licet obrusum angulum efformabunt, numquam verò lineam rectam, vt à nobis reperta fuit. Hinc deducitur, minimè tunc collocatas fuisse in vno plano, sed debuerat stella C cum plano sui orbis subleuari, & radio T I appropinquare aliquantò magis, quam planum ductum per A B I, quandoquidem vt stella C non in G, sed in H minùs meridionalis appareat, & in directum cum reliquis duabus E, & F, situari deberet noster oculus in eodem plano per stellæ A B C traducto: at planum T A B cadit infra planum T M O; ergo necessario stella C subleuari debet supra planum A B I; cumque aliter hæc iam dicta apparentia saluari nequeat, concedendum est, tertiam stellam C nequaquam in eodem iacere plano per stellæ A, & B & centrum Iouis extenso.

Postea nocte sequenti 6. Octobris eiusdem anni hor. 7. p. m.

m. adnotavi quod recta linea per primum, & quartum Mediceum extensa, proximè per centrum Iouis transibat; distabat tunc primus Mediceus A. gr. 46. m. 54. ab apparenti Nouimediceo versùs Occidentem, & quartus D distabat ab eodem Nouimediceo gr. 15. m. 30., quare duæ stellæ A, & D reuera non erant in directum positæ cum centro Iouis I, sed triangulum efficiebant; igitur si stella A apparuit in puncto E eclipticæ iouialis, vbi visio Mediceorum terminatur, debuerat stella D apparere in K magis meridionalis, & infra rectam lineam I E; sic enim triangulum I E K efformaretur, licet valde obtusum, & talis figura, & constitutio videri debuerat visuali radio T I supra planum I A D eleuato, essetque omnino impossibile, vt stella D in puncto L sublimiori, & minùs meridionali à recta E I appareret, nisi oculus T in plano eiusdem trianguli I A D exstitisset: estque stella A depressa infra radium T I ex hypothesis; igitur deberet radius T D eleuari, & consequenter stella D, ideoque non constituebarur in eodem plano per A, & I ducto, scilicet in plano orbis primi Medicei.

Postmodum nocte subsequenti scilicet diei 7 hor. 6. p. m. reperi quartum Mediceum borealem supra rectam lineam per secundum Mediceum, & centrum Iouis extensam; & quia tunc distantia secundi Medicei B ab Apojouio apparenti erat gr. 213, & m. 18, & distantia quarti erat gr. 216. m. 12, igitur proximæ duæ stellæ B, & D in eodem semidiametro I B D, scilicet in vna recta linea constitutæ fuissent, si duæ stellæ B & D in vno plano positæ essent; hæc autem recta linea à radio visuali T I conspecta obliquè apparere debuerat in visus terminatore M O in punctis F, & K, quæ cum centro Iouis I in vna recta linea disponi debuerant, & proinde punctum K, scilicet situs stellæ D meridionalior fuisset contra sensum obseruationis; ad hoc igitur, vt stella D appareat minùs meridionalis, idest supra rectam lineam I E K, subleuari debet stella D supra planum subiectum I B O, ita vt visualis radius I I minùs inclinatus ad orbem Medicei D, quàm ad orbem Medicei B conspiciat el-

ipsum efformatam ab orbe D O magis coangustatam, quam si fuisset in eodem plano D B O: sed quando ellipsis circa eundem axem maiorem constringitur, omnes ordinariæ ad axem maiorem applicatæ, eadem proportione diminuantur, qua minor axis decrescit; igitur distantia stellæ visæ L ab ecliptica iouiali M O, minor erit, quam distantia ipsius K, & propterea apparebit illa supra rectam lineam I F. Possem plurimis alijs observationibus eandem veritatem confirmare; quapropter dubitandum non est in diuersis planis, & ad inuicem parâni inclinatis, stellas Mediceas circumduci.

Ut postea certi reddamur an Mediceorum maximæ à Ioue digressiones fiant semper in eadem iouiali ecliptica M O, organum satis commodum excogitasse videor, cuius tamen vsus supponit inuentionem anguli, quem ecliptica iouialis efficit, cum circulo parallelo à Ioue in eius motu diurno ab Ortus ad Occasum descripto, qui angulus augeatur, minuitur, & aliquando penitus extinguatur; igitur sit circulus æquinoctialis G B F, & portio eclipticæ solaris C B A, quæ secet æquinoctialem in B, sitque locus Iouis I, habeatque latitudinem boream, vel austrinam, ita vt ducta linea I A perpendiculari ad eclipticam, sit punctum A locus eclipticus Iouis, & I A arcus Latitudinis eius: sumpto postea puncto C in septimo gradu ☉, vel ♃ vbi Nodi Iouis reperiuntur, & coniuncto arcu maximi circuli I C, qui secet æquinoctialem in E, hic sanè erit orbis seu ecliptica iouialis, postea à puncto I ducatur arcus I H circuli minoris equidistantis æquinoctiali G F. Profectò motus diurnus Iouis in circumferentia minoris circuli H I efficietur, atque naturalis eius motus in arcu I C. Quæritur modo inclinatio anguli H I C; ducatur à puncto I arcus I E maximi circuli perpendicularis ad æquinoctialem G F, eum secans in F, & hic erit declinatio Iouis, veluti B F est eius recta ascensio, vel distantia ab æquinoctio B. postea à puncto I ducatur arcus circuli maximi I G perpendicularis ad I F, & ab eodem puncto I in plano eiusdem maximi circuli I G ducatur

catur recta  $I L$  cum tangens; hæc eadem recta continget minore circulum  $I H$  ex elementis sphericis postea à puncto æquinoctij  $B$  eleuetur arcus  $B D$  circuli maximi perpendicularis ad eclipticam  $A C$ , quousque viam Iouis secet in  $D$ ; & quia ex punctis  $I$ , &  $D$  sumptis in maximo circulo  $I C$  cadunt duo normales arcus maximorum circulorum  $B D$  &  $I A$  supra maximum circulum  $A C$ , qui cum priori arcu angulum acutum efficit, & dati sunt arcus  $A C$ , &  $B C$ , scilicet distantia à loco Iouis ecliptico, & ab æquinoctio ad Nodum iouialem, & datur pariter  $I A$  scilicet Latitudo Iouis; igitur ex sphericis innotescet quantitas arcus  $B D$ , proindeque in triangulo  $C B D$  datis duobus lateribus  $C B$ , &  $B D$  circa angulum rectum  $B$  eliciemus angulum  $C D B$ ; quapropter in triangulo spherico  $D B E$  habebimus angulum  $E D B$ , & latus  $D B$ , & tandem angulum  $D B E$  scilicet excessum recti anguli  $D B C$  supra angulum  $G B C$  inclinationis solaris eclipticæ supra æquinoctialem, ex quibus datis elicitur quantitas lateris  $E B$ , qui additus, vel ablati ab ascensione recta iouiali  $B F$ , dabit arcum  $E F$ , & propterea in triangulo  $I E F$  data erunt latera  $E F$ , &  $F I$ , circa angulum rectum  $F$ , proindeque innotescet angulus  $F I E$ ; hic verò ablati ab angulo recto  $F I G$  dabit angulum  $E I G$ , qui querebatur; quandoquidem in plano circuli  $I C$ , ducta circulum tangente  $I N$ , angulus  $L I N$  equalis erit angulo  $G I C$ , qui idem erit, ac angulus  $H I C$ , cum recta  $I L$  sit communis tangens minorem circulum  $H I$ , & maiorem  $I G$ .

Si verò Iuppiter in suo Nodo constitutus fuisset, tunc quidem facilius angulus iouialis eclipticæ, & paralleli in motu diurno descripti reperiri poterit, posito enim Iouis loco in  $A$  7.  $\text{gr}$  in Nodo scilicet ascendente vel 7.  $\text{gr}$  in Nodo descen- *Fig. 69.*  
dente habebimus eius declinationem  $A F$ , eiusque rectam ascensionem, vel distantiam  $B F$  à proximo Æquinoctio, & tunc in triangulo  $B F A$  ex duobus datis lateribus circa rectum angulum Felicitur angulus  $F A B$  factus à Meridiano cum elliptica solaris; huic verò addatur angulus  $B A E$  inclinationis

nationis, nempe orbis Iouis E A supra eclipticam solarem, dabit angulum E A F factum ab ecliptica iouiali cum meridiano, & consequenter innotescet angulus G A E complementum vnius recti, scilicet inclinatio iouialis eclipticæ cum parallelo circulo tunc temporis à Ioue transacto, estque talis angulus gr. o. m. 42. & hic animaduertendum est, quod paulò ante, quam Iuppiter Nodum assequatur, idest inter Solstitium præcedens & Nodum iouialis ecliptica A E præcisè tangit circulum parallelum Æquatori, quem motu diurno tunc temporis Iuppiter describit, & propterea via motus diurni Iouis erit in directum cum iouiali ecliptica; & hoc vtile erit exposuisse, cum insignes, commoditates talis constitutio afferat.

His declaratis præparetur magnus circulus ligneus A C B D, cuius diameter A B, quàm duorum cubitorum, minor non sit: in eo adaptentur plura tenuissima fila inter se parallela, vt sunt A B: postea abscindatur circumferentia B D, quæ subtendat angulum ad centrum B I D æqualem angulo H I C præcognito inclinationis motus diurni Iouis eiusque eclipticæ: ducatur postea filum C I D traductum per centrum I, atque alia ei parallela: aptetur postea circulus A B D ad horizontem perpendicularis, & expositus directe oculo obseruatoris, & propè orificium remotum telescopij, quo Iuppiter obseruatur, & ritè aptato circulo, altero oculo aperto conspicientur Medicei inter fila prædicti circuli excurrere, cumque motus diurnus Iouis velocissimus sit ab Ortum ad Occasum, in horis 24. proximè, poterit circulus situari, ita vt centrum Iouis I in transcurso motus diurni semper per filum A I B incedat ab A vsque ad I, quod faciliè assequitur reuoluendo summa dexteritate sursùm, aut deorsùm diametrum A B, tunc conspicientur nedùm Iuppiter, sed etiam quatuor Medicei in filum C D offendere, quod eodem temporis instanti eueniet, cum Iuppiter intersectionem filorum I attingit; hoc, inquam, eueniet quotiescumque Medicei Latitudine prorsus carentes in ecliptica iouiali existunt, & ideo in vna linea recta cum centro Iouis; verum  
si quar-

si quartus Mediceus v. g. declinauerit à diametro C D ver-  
 sùs A, dicemus, illam esse Latitudinem eius septentriona-  
 lem, & sic de reliquis. Hoc sanè artificio cautè & solerter  
 adhibito facile experiri potest, an Medicei in maximis à Io-  
 ue digressionibus constituantur in vnica linea recta in via  
 Iouis, seu in ecliptica iouiali extensa, vt prædecessores no-  
 stri opinati sunt, quod porrò falsum esse existimo, ab ali-  
 quibus meis observationibus persuasus, & præcipuè sequenti  
 nocte diei 30. Augusti huius anni 1665 quãdo tertius Medi-  
 ceus erat in maxima occidentali digressionem à Ioue remotus  
 à Plenimediceo apparente gr. 271. m. 21. & quartus Medi-  
 ceus erat in maxima digressionem orientali remotus ab eo-  
 dem Plenimediceo gr. 116. m. 12. & apparuit recta linea per  
 tertiam, & quartam stellam e ducta inclinata ad viam motus  
 diurni centri Iouis A B, eratque angulus inclinationis A I C  
 paulò minus gr. 22. verum est tamen, quod quartus qua-  
 draturam transierat, seu terminum maximæ digressionis,  
 & proinde eius declinatio meridiana aucta paulò maior  
 vno gradu esse poterat; itaque, licet diminueretur vsque ad  
 gr. 18. nihilominus in maximis digressionibus stellæ præ-  
 dictæ declinabant plusquam duo gradus à iouiali ecliptica,  
 quandoquidem tunc temporis ex calculo linea motus  
 diurni A B efficiebat cum ecliptica iouiali angulum gr. 15.  
 m. 52. quare tum tertius, tum quartus Mediceus in ma-  
 ximis digressionibus valdè recedebant ab ecliptica iouiali  
 declinando ad Boream in parte occidentali, & ad Austrum  
 in parte orientali.

Hoc eodem instrumento commodè mensurari possunt  
 particulares Latitudines Mediceorum in quolibet situ epi-  
 cycli.

*De varietatibus hætenùs in Mediceorum Latitudinibus  
 obseruatis. Cap VIII.*

**P**rimus omnium Galileus anno 1611. quando Iuppiter  
 Latitudine prorsus carebat, obseruauit Mediceos in  
 quo-

quolibet loco suorum orbium semper in eadem linea recta extitisse, quæ per centrum Iouis extendebatur. Postea Io: Baptista Hodierna anno 1654., quando Iuppiter propè Nodum pariter Latitudine carebat, vidit, Mediceos in superiori parte suorum orbium septentrionalem Latitudinem habere. Nos pariter anno præterito existente Ioue propè Nodum descendente adnotauimus, Mediceos in superiori parte suorum orbium non septentrionalem, sed meridionalem Latitudinem habuisse.

Insuper Galileus, quando Iuppiter declinabat à nostra ecliptica versus Boream, ait, Mediceos in superiori parte suorum epicyclorum meridionalem Latitudinem habuisse, & e contra in Iouis Latitudine austrina Mediceorum Latitudines in suprema parte orbium boreales reperiit. Nos æstate anni præteriti à Iunio mense, quando Iouis Latitudo australis fuit vidimus Mediceorum Latitudines austrinas in superiori parte epicyclorum, at æstate currentis anni à mense Iunio, licet Iouis meridiana Latitudo valdè excreuerit, nihilominus Mediceorum Latitudines in supremis semicirculis orbium septentrionales extiterunt, & tandem mense Octobris iam dictæ Latitudines Mediceorum valdè diminutæ sunt vt die tertia Octobris hor. 8. m. 35. p. m. primus Mediceus occultatus fuerit in postica parte disci Iouis, nempe versus eius Plenimediceum apparentem, cuiusque ingressus in limbo disci Iouialis factus fuerit paulùm infra medium, scilicet centrum Iouis, & proinde austrinam Latitudinem proculdubio habuit in suprema parte sui epicycli, fuitque talis ingressus obseruatus accuratè, nedum à me, sed ab amicis etiam adstantibus. Non secus noctu diei 13. eiusdem mensis conspeximus primum Mediceum egressum ab anteriori disco Iouiali post Nouimediceum, eratque in directum positus cum extremo Limite nigrioris Zone versus centrum Iouis, quæ quidem fascia extenditur in superiori, & boreali parte disci Iouis ultra centrum; ex quo colligitur, fuisse Latitudinem primi Mediceei septentrionalem, dum stella in infima parte sui epicycli excutieret, & tamen per



totam æstatem eius Latitudo in Nouimediceis fuit meridionalis, sicuti adhuc experitur in tribus reliquis Mediceis; quapropter ab anno præterito triplici modo variata est Latitudo primi Medicei; nam ab initio habuit in superiori semicirculo eius orbis meridianā Latitudinem, In æstate huius anni ibidem Latitudo fuit septentrionalis, & postremò mense Octobris denuò meridionalis facta est eius Latitudo in eadem suprema parte versùs Plenimediceum.

Deducitur prætereà ex his obseruationibus, quod Nodi primi Medicei, & planum sui orbis non præcisè ponitur in ijsdem locis, vbi collocantur Nodi, & plana reliquorum Mediceorum; quandoquidem mense Octobris reliqui omnes Medicei, excepto primo, Latitudinem meridionalem perseueranter retinuerunt in inferiori parte suorum epicyclorum.

Postmodùm circa quantitatem Latitudinum Mediceorum insignes varietates obseruatae sunt; nam Hodierna anno 1655. reperijt maximam Latitudinem quarti Medicei in Synodis valdè auctam, scilicet superantem semidiametrum disci Iouialis, vt nimirum nocte diei 9. Augusti eiusdem anni 1655. transierit quartus Mediceus propè conum umbræ iouialis, nec eclipsim passus fuerit; & deinde noctu diei 20. Septembris eiusdem anni idem quartus Mediceus transijt in Nouimediceo infra discum Iouis, nec prorsùs iouialem marginem tetigit, ac proindè eius meridianā Latitudo tunc temporis superauit Iouis semidiametrum. Refert idem auctor, se vidisse duos Mediceos insigni distantia interse discretos in ijs coniunctionibus, in quibus motus erant interse contrarij, scilicet vnus directus, alter retrogradus, & præcipuè tertij, & quarti intercapedo disci Iouis semidiametrum sensibiliter superabat. Nobis autem aliter contigit anno præsentis in coniunctionibus quarti, & tertij, dum vnus directus alter vero retrogradus ferebatur; visi enim sunt tam propinqui, vt inter eos ne quidem integra semidiameter vnus stellulæ interponi poterat. Sed magis admiranda fuit obseruatio vespertina 14. Octobris huius

anni conspecta quidem ab amicis visu acutissimo præditis, qui aderant, dum ego obseruarem egressum tertij Medicei, & ingressum quarti in conum vmbrae iouialis; illius egressus apparuit alta aquila versus occidentem gr. 52. præcise, & alterius ingressus euenit alta aquila gr. 43. m. 54.; sed antequàm quartus Mediceus occultaretur vix distingui, & discerni poterant duæ stellulae dictæ ob maximam earum vicinitatē, nihilominus iam dicti amici adstantes acutissimo visu donati anima duerterunt peruersum situm earum dē stellarū respectiue ad centrum Iouis, nam tertius Mediceus ob ingētem eius magnitudinem exactè distinguitur à quarto exilissimo Mediceorum, & apparuit tertius infra quartum constitutus in situ inuerso ( quem efficit telescopium duabus lentibus præparatum ) quapropter Latitudo septentrionalis tertij Medicei superauit Latitudinem quarti, licet ambo ferè æqualiter distarent à Plenimediceo apparente. Deducitur ergo ex tali obseruatione, planum orbis quarti Medicei in superiori eius hemicyclo depressum, uisile infra hemicyclum supremum tertij, & ideo apparentem ellipsim genitam ab orbe quarti Medicei magis coangustatam fuisse, quam ellipsim tertij; & hic forsitan magis recedebat à suo Nodo, quàm quartus. Ex his omnibus licet inferre, non haberi adhuc hypothesim, quæ satisfaciat hisce omnibus varietatibus, quæ in Latitudinibus Mediceorum obseruantur.

*Ex nostra hypothesi ex causis physicis deducta phenomena iam enarrata Latitudinum Mediceorum saluari posse. Cap. IX.*

**Q**uamquàm præmanibus non habeamus Mediceorum obseruationes continuatas in integra Iouis reuolutione per Zodiacum, conabimur tamen ex paucis obseruationibus hucusque habitis, inuestigare præterpropter inclinationes orbium Mediceorum supra planum eclipticæ iouialis, & progressum Nodorum, sed prius ostendemus, quàm exactè obseruationes hypothesibus nostris coaptentur;

tur; utque clariùs procedamus: fit Sol in S, & orbis seu *Fig. 71.*  
 ecliptica iouialis L I K, ponaturq; in signo Y globus iouis I,  
 quem ambiat orbis alicuius Medicei A D B C, qui secet  
 eclipticam iouialem in recta linea D C, itaut semicirculus  
 D B C supremus eleuetur supra planum eclipticæ iouialis,  
 declinando versùs Boream, atque oppositus semicirculus  
 C A D declinet versùs Austrum, sitque D Nodus ascendens, C  
 descendens, B Limes boreus, & A Limes australis, & recta li-  
 nea solaris S I transeat per N versùs Limitem austrinum; in-  
 telligatur iam Terra in T sublimis supra planum eclipticæ io-  
 uialis versùs Boream; vnde Latitudo Iouis erit austrina; & hæc  
 erit constitutio Iouis, eiusque systematis die 20. Septembris  
 anno 1655. quando Sol in ♃ Ioui opponebatur, & Latitu-  
 do iouialis austrina ex Terra visa sub angulo Y T I erat gr. 1.  
 m. 33. Vidit tunc Hodierna quartam stellam in Nouimedi-  
 ceo A habentem australem Latitudinem M A, quæ tanta  
 fuit, vt quartus Mediceus A extra, & infra discum Iouis I  
 transierit, neque eius marginem tetigit; quapropter meri-  
 diana Latitudo M A maior fuit semidiametro Iouis; sed  
 supposito semidiametro I A orbis quarti Medicei non ex-  
 cedere 27. aut 28. semidiametros disci Iouis, maxima digres-  
 sio M A non excedet duos gradus cum dimidio, si metian-  
 tur in orbe A B C D; & quia hæc latitudo maxima est om-  
 nium, quæ hætenus obseruatæ fuerint nõ inani probabilitate  
 supponere possumus, tunc Limitem austrinum A in linea  
 solari S I incidisse, scilicet in Nouimediceo. Hic tamen *Fig. 71.*  
 animaduertendum est, radium visualem T M I eleuari su-  
 pra planum eclipticæ iouialis S D C N, & ideo minus obli-  
 quus erit, sed potius magis directè, & in prospectu videbit  
 diametrum B A, quàm radius solaris S I, proindeque angu-  
 lus I T A maior erit angulo I S A; quapropter apparens  
 maxima Latitudo stellæ quartæ maior erit vera eius Latitu-  
 dine, scilicet ea, quæ efficitur respectu Solis; itaque, si nobis  
 terricolis apparuit maxima Latitudo M A sub angulo I T  
 A duorum graduum cum dimidio, erit ea multò minor re-  
 spectu Solis, eo quòd angulus Y T I Latitudinis meridiona-

lis Iouis erat gr. 1. m. 33., & adhuc minor fuit angulus T I S scilicet m. 13. huius verò anguli quantitate minuitur obliquitas diametri B A; quapropter radius I A tunc temporis subtendere debuerat angulum ad Solem I S A paulò maiorem duobus gradibus. His positis debuerant quarti Medicei Nodi D, & C collocari in maximis digressionibus à Ioue.

Tranſeamus modò ad conſtitutionem anni præteriti *Fig. 72.* 1664. Iunii, quando Iuppiter erat in ♃, & Sol in ☉, quare Terra intercipiebatur in V; & quia tunc Iouis Latitudo auſtrina minima, & inſenſibilis erat, minimum quoque eleuata erit Terra V ſupra planum eclipticæ iouialis; & quia tunc quartus Mediceus H in Nouimediceo borealẽ Latitudinem habebat, neceſſe eſt ergo, vt punctum H Nouimediceum in ſemicirculo boreali D B C cadat; & quia Latitudo H N in Nouimediceo trientem maximæ Latitudinis, quam in Nouimediceo eadem ſtella habuit anno 1655, non ſuperabat, eo quòd ſtellæ in H ſitẽ infra falſciam vmbroſam Iouis diſtantia à centro eius verſus Boream pars tertia proximè ſemidiametri iouialis fuit; igitur punctum H non in Limite Boreali B, ſed propè Nodum cecidit; hoc enim ſequitur ex eo, quod inclinatio orbis D B C ſupra planum eclipticæ iouialis ponitur ſtabilis, & propterea quoties ſtella in puncto B reperitur, eius Latitudo ab ecliptica iouiali erit tripla Latitudinis H N. Conſtat igitur Nouimediceum H incidiffe inter Limitem boreum B, & vnum ex duobus Nodis; at non adhuc innotefcit, an Nodus vicinior Nouimediceo H ſit descendens C, vt ſubſequentes obſervationes oſtenderunt. Poſtmodum præſenti anno 1665. per totam æſtatem Iuppiter in ♃ commoratus eſt cum ſenſibili Latitudine auſtrali peruenitque ad Solis oppoſitionem 19. Auguſti, & tunc temporis pariterque ante, & poſt per totam æſtatem Mediceum, & præcipue quartus in Nouimediceo N non quidem habuit Latitudinem ſeptentrionalem, vti anno præterito, ſed meridionalem. Hinc colligitur Nouimediceum N non ampliùs in boreali ſemicirculo D B C, ſed in auſtra-

i C A D peruenisse, & hac de causa Latitudo in Nouimediceis australis conspecta est, & borealis in Plenimediceis, proindeque ab anno præterito ad præsentem Nodus descendens C directè translatus erit, ita vt radius visualis V H I transegerit arcum a puncto H ad G, & tempore intermedio acciderit præcisè transitus Nodi descendens C per radium visualem X I. Et hic notandum est, quod transitus Nodi C, tribui non debet reali motui eiusdem Nodi, quandoquidem maxima pars huius motus est merè apparès, producta nimirum à motu Iouis in Zodiaco; quandoquidem si supponatur diameter D C per Nodos educta permanere proximè sibi ipsi parallela, fueritque arcus H C gr. 20., cum signum Zodiaci integrum Iuppiter transegerit à Capricorno ad Aquarium, erit angulus  $\sphericalangle$  S  $\sphericalangle$ , maior angulo H I C, & ideo existente recta linea I H parallela  $\sphericalangle$  S, erit angulus H I G maior angulo H I C, & consequenter radius visualis X G I transijt integrum arcum H G, licèt reuera linea Nodorum D C sibi ipsi parallela permanisset, scilicet circa globum Iouis circumducta non fuisset.

Fig. 73.

Sed non videtur, negari posse motus aliquis retrogradus lineæ Nodorum, licet tardissimus; nam anno 1655. linea Nodorum D C, existente Iouem in Ariete, perpendiculariserat ad radium solarem S I V; igitur si illa semper sibi ipsi parallela extitisset anno præterito, Ioue in Capricorno posito, linea solaris S I  $\sphericalangle$  perpendicularis pariter esse debuerat ad lineam solarem anni 1665. per Arietem, & Libram eductam; quare linea Nodorum D C in Capricorno incidere debuerat cum radio solari S I O: at fuit valdè inclinata, effecitque angulum H I C; igitur linea Nodorum præter apparentem eius motum directum dependentem à transitu Iouis per Zodiacum habebit quoque proprium, & peculiarem motum; hic vero retrogradus esse debet, iuxta analogiam cum reliquis planetis; igitur in annis 9. Nodus D percurrit circumferentiam O C B D, quæ minor est integra orbis periphæria, & constabit cum denuò Iuppiter ad Arietem peruenit, an linea Nodorum D C denuò fiat perpendicularis.

Fig. 71.

Fig. 72.

dicu.

dicularis ad solarem radium  $S \Upsilon$ .

*Fig. 73.* Potest quoque observatio huius anni comparari cum vetusta observatione Galilei, ex qua euincitur, lineam Nodorum  $DC$  non semper sibi ipsi æquidistare; ait enim anno 1611 à Februario vsque ad Iunium vidisse Mediceos per lineam præcisè rectam traduci, quæ per centrum disci Iouis extendebatur; igitur dubitandum non est, tunc temporis lineam Nodorum  $DC$  extensam fuisse in eadem directione radij solaris, & visualis  $S I \odot$ , vbi tunc Iuppiter reperiatur, & postquam quater Zodiacum percurrit, & insuper si-

*Fig. 73,* gna septem, tandem modò ad Aquarium Iuppiter perductus est, vbi similiter linea Nodorum  $DC$  ferè coincidit cum radio solari, & visuali; ducta ergo recta linea  $OH$  parallela ad solarem radium  $BS \odot$  erit angulus  $HIC$  æqualis angulo  $BS$  proptereaque non poterit linea Nodorum  $DC$  permanere in eodem situ parallelo, quem habebat anno 1611. & ab illo situ distat per arcum  $HC$ ; cumque motus Nodorum supponatur retrogradus, vt dictum est, oportet, vt à puncto  $H$  per  $BD$  vsque ad  $C$  translata sit præter integras reuolutiones, quas fortasse in prædicto tempore pertransiit; quare dubitandum non est, lineam Nodorum in eodem situ sibi parallelo non permanere.

Fieri etiam potest, vt in decem annis à 1655. ad 1665. linea Nodorum semel vel pluries circa Iouem reuoluta fuerit, quod in obscuro manebit, quousque series observationum veritatem patefaciat, licet hoc credibile sit, vt ego existimo. Haftenus considerauimus situm acronicum Iouis, scilicet eius constitutiones in oppositione Solis, sed non erit superuacaneum varietates, quas orbis annui anomalia affert vnà cum incremento Latitudinis Iouis adnotare. Dicitur est, quod ab anno 1664. ad ætatem præsentis anni radius visualis transit ab  $H$  ad  $G$  comprehendendo descendentem Nodum  $C$ ; notandum modò est, radium vitualem propter orbis anomalam mente Octobris ad sinistram respectu Solis constitui, vt in situ  $ZI$ , tuncque Nouimediceum retrogradè translatum erit a puncto  $G$  versùs  $H$ , scilicet

cet Nodo C appropinquauit, & hæc potissimum est causa, quare Latitudines in Nouimediceis, & Plenimediceis sunt multò magis diminutæ, quàm antea. Vtèriùs facili negotio Nodus C primi Medicei propinquior esse potest termino G, quàm sint Nodi reliquorum Mediceorum, & ideò radius visualis Z I nedùm Nodum C descendente[m] assequi potuit, sed etiam transgredi; & ideò in Nouimediceis eius Latitudo potuit esse septentrionalis, vt apparuit die 3. & 13. Octobris huius anni; propterea Latitudo Iouis australis maximè aucta efficit, vt radius visualis X I vel Z I sit eleuatus supra planum eclipticæ iouialis, & propterea Latitudines in Nouimediceis apparenter effici possent meridionales in tribus planetulis remotioribus, licèt radius visualis per Nodum C traducatur, vt superiùs expositum fuit. Si hoc inquam verum esset, probabiliter dici posset, nondùm Nouimediceum ad Nodum descendente[m] C peruenisse, licèt quoad apparentiã prædictum terminũ transgressum fuisse, videatur. Hæc omnia, ni fallor, ex observationibus sequentium temporum verificari debere, conijcio.

Fig. 73.

74.

*Quomodo Latitudines Mediceorum atque eorumdem periodi obseruari debeant. Cap. X.*

**Q**uoniam Mediceorum Latitudines à pluribus causis alterantur, augentur, atque diminuuntur, non poterunt certa methodo reperiri, nisi more astronomico singulæ causæ à ceteris separatim considerentur, vt nimirũ ab alijs non perturbatę possint sinceram Latitudinem à se dependentem ostendere; cumque Latitudo ipsius Iouis, vt innuimus, sensibilibiter alteret apparentem inclinationem orbis cuiuslibet Mediceorum supra eclipticam iouialem, pariterque eorumdem Latitudines diminutas, auctas, & perturbatas nobis representet, debet primo loco hæc causa confusionis euitari, ideoque obseruationes Latitudinum Mediceorum tunc fieri debent, quando Iuppiter caret omni Latitudine, poniturque in eius Nodo, scilicet cum eius centrum præci-

sè

sè in ecliptica solari incidit; & quia Terra in plano eiusdem eclipticæ solaris iacet, tunc inclinatio orbium Mediceorum eorumque verè Latitudines respectivè ad Solem erunt quoque apparentes ex Terra nostra, vbi visus degit. Insuper, quia prosthæresis orbis annua transfert apparenter Nodos orbium Mediceorum modò directo motu, modò retrogrado, & velocitate inæquali, nunquã vera cõstitutio, & situs eorundem Nodorum observari poterit, nisi illis articulis temporum, quando prosthæresis orbis nec ante, nec retrò transfert Nodos apparenti quidem, & optica translatione; quandoquidem querimus verum situm Nodorum respectivè ad Solem, & spatium mundanum, qui quidem vnicus & determinatus est, non varius, & inconstans; quare tunc temporis Nodorum constitutio sincera apparebit, quando Terra, & radius visualis in eadem recta linea extendentur cum solari radio, quod quidè evenit in articulis oppositionum Iovis, & Solis; quapropter tempus commodissimum ad observandas veras Latitudinem Mediceorum, & inclinationes eorundem orbium erit in oppositionibus Iovis, & Solis, quando etiam Iuppiter in ecliptica solari & terrestri nullam prorsus Latitudinem habet, & tunc certi erimus, quod Latitudines Mediceorum apparentes sunt veræ absque vlla alteratione.

Præterea linea Nodorum orbium Mediceorum tres constitutiones habere potest, prima erit, quando in eadem recta linea coincidunt linea solaris visualis, & Nodorum. Secunda, quando eadem linea Nodorum perpendicularis est ad radium solarem, & visualem, & in maximis digressionibus Mediceorum incidit. Tertia verò constitutio efficitur in locis intermedijs. In prima constitutione motus transversales Mediceorum apparenter efficientur in vna linea recta per centrum disci Iovis extensa, & inclinata ad planum eclipticæ iouianis, eritque talis inclinatio perpetua, & stabilis. Duplici modo effici potest observatio huius constitutionis: Primò circulo ligneo filis parallelis intersecto, & ab alijs obliquis, sed præcognosci debet præcisè situs eclip-



eclipticæ iouialis, quæ haberi potest reperto angulo ab  
 ecliptica iouiali, cum parallelo motus diurni Iouis, vt supra  
 expositum fuit, & tunc ligneus circulus ritè disponi debet,  
 vt vna directio filorum motum diurnum Iouis ostendat, re-  
 liqua verò fila secundùm directionem eclipticæ iouialis di-  
 sponantur, quæ v. g. sit EF in respectu ad verticalem cir-  
 culum AB; & tunc si fuerint Medicei in obliquo situ HI, in-  
 flecti debet machina filaris, vt per digressiones laterales HI  
 incedant, & in tali casu conijciemus, angulum FGI esse  
 mensuram præcisam inclinationis orbis Medicei supra  
 eclipticam iouialem. Vtteriùs, non considerato diurno  
 motu Iouis, expectetur eius transitus per meridianum AB,  
 & tunc, quia facilè angulus eclipticæ solaris CD cum me-  
 ridiano AB reperitur, & aliunde cõstat quantitas anguli in-  
 clinationis eclipticæ iouialis EF supra eclipticam solarem;  
 ergo disponi potest filum EF vt præcisè in directione  
 eclipticæ iouialis incidat illo nempe articulo temporis, quã-  
 do centrum Iouis in meridiano existit, tunc si per centrum  
 G dirigatur filum HI coincidens cum Mediceis, hinc inde  
 à Ioue translatis, obseruenturque digressiones, dum cen-  
 trum Iouis in comuni sectione G existit, eliciemus pariter  
 inclinationem orbis Medicei supra eclipticam iouialem,  
 atque Latitudinem, quam habent in maximis digressioni-  
 bus à Ioue.

Fig. 75.

Fig. 75.

In secundo casu, quando nimirum linea Nodorum per-  
 pendicularis est ad radium solarem atque visualem, quia ra-  
 dius visualis est inclinatus ad planum orbis Medicei, licet  
 perpendicularis sit ad lineam Nodorum, necessariò orbis  
 Medicei, non vt linea recta, sed vt ellipsis EMNF O maxi-  
 mè dilatata conspicietur, & in tali via curua EMF motus  
 Medicei efficietur, eritque in suprema medietate orbis La-  
 titudo borealis vel austrina pro varia radij visualis situatio-  
 ne, efficieturque Latitudo omnium maxima in Nouimedi-  
 ceis R, & Plenimediceis N quia nimirum mensuratur ab  
 axe minori ellipseos, quæ maior est omnium ordinatè appli-  
 catarum ad axem maiorem, & vteriùs ex proportione,

Fig. 76.

Z

quam

quam habent maximæ digressiones laterales ad maximam Latitudinem in Synodis eliciemus angulum inclinationis orbis Medicei supra eclipticam iouialem. Hic verò notandum est, digressiones maximas fieri in eadem iouiali ecliptica E, & F, nec vllam Latitudinem habere, vt in priori constitutione. Modus verò obseruandi Latitudines non differt ab eo, quem in præcedenti casu exposuimus.

*Fig. 77.* In tertio casu cum linea Nodorum inter digressiones maximas, & Synodos incidit, figura quam describunt Medicei in suis reuolutionibus, erit pariter ellipsis, sed angustior præcedenti, in qua axis minor deficiet aliquantisper à minori axi ellipsis in præcedenti constitutione efformatæ, ex quo fit, vt Latitudines Mediceorum in Nouim ediceis, & Plenimediceis N, R minores reddantur ijs, quæ in secunda constitutione apparebant. Præterea maximæ digressiones

*Fig. 77.* M, & O, vel axis maior M O ellipsis non præcisè in ecliptica iouiali E F, vt in secunda constitutione, nec in situ maximè inclinato H I, veluti in prima reperiēbatur, sed incidet intra vtramque lineam, & ideò inclinatio visa in maximis digressionibus minor erit verà inclinatione orbis Medicei supra eclipticam iouialem. Modus postmodum obseruandi postremam hanc constitutionem non differt à superius exposito.

Aptissima sanè essent obseruandi tempora, quando Iupiter est acronicus, & absque vlla Latitudine, vt veræ Latitudines Mediceorum obseruarentur, at quia rarò contingunt huiusmodi cōmoditates, poterunt obseruari, licet Iupiter aliquam Latitudinem habeat, dummodò fuerit oppositus Soli, & tunc ex apparentibus maximis inclinationibus orbis Medicei supra eclipticam iouialem, poterit subtrahi, vel addi differentia illa, quæ à iouiali Latitudine pendet, & sic pariter loca Nodorum, & eorum periodi perquiri possunt, dummodò præ manibus habeamus obseruationes Latitudinum Mediceorum factas in vna integra reuolutione Iouis in Zodiaco, vel saltem sepè repetantur in prædicta periodo; quæ obseruationes cautè, & accuratè à viris peritis factæ,

factæ, vt dictum est, dabunt præcisè motum Nodorum, & periodum Latitudinis Mediceorum, & iidem postea possent denuò corrigi, & limitari more Astronomico sumptis pluribus periodis eorundem revolutionum.

His præhabitis posset quoque perscrutari, an præter propriam periodum Latitudinis in Mediceis immisceatur varietas aliqua menstrua, præcipuè in Quadraturis, & Octantibus.

Ex his, quæ satis prolixè exposita sunt, quilibet animaduvertere poterit, quàm difficilis, & laboriosa sit inquisitio theoricarum Mediceorum; requirerentur enim exactæ observationes continuatæ per plures annos summa diligentia habitæ, quæ cum minimè à me effici possint ob ætatem, atque ob gracilem, & infirmam corporis constitutionem, non dubito, quin postheri equi bonique consulant hæc mea monita, & animaduersiones, quibus mediantibus poterunt iam dictas theorias reperire, prælata face, ostensaque via, qua incedendum sit, ostensisque difficultatibus omnibus, quæ huiusmodi inquisitionem impediunt, & insuper quomodo possint evitari.



## INDEX CAPITVM

## LIBRI PRIMI.

- Proemium . fol. 1.
- Caput I. Mediceorum syderum motus similes esse debere motibus ceterorum planetarum . f. 3.
- Cap. II. De Theorijs planetarum vulgatorum, ac primum ipsius Luna . f. 5.
- Cap. III. De Theorijs Mediceorum planetarum . f. 11.
- Cap. IV. De Iouialium syderum theorijs, quae ex ipso Iouis corpore obseruari possent . f. 12.
- Cap. V. De synodicis inaequalitatibus longitudinis Mediceorum . f. 17.
- Cap. VI. De Mediceorum synodica latitudinis inaequalitate . f. 19.
- Cap. VII. De Theorijs Mediceorum planetarum respectu Solis . f. 20.
- Cap. VIII. De inaequalitatibus Iouialium satellitum, quae ex qua ex Terra possunt obseruari . f. 25.
- Cap. IX. De compositione eccentricorum, & ellipticorum orbium, Mediceorum syderum motibus inseruentium . f. 29.
- Cap. X. Lemmata ad inuestigandum ellipticum planetarum iter . f. 35.
- Primum . Si ab uno ex polis ellipsis recta eleuetur perpendicularis ad axim vsque ad sectionem, ab incidentia autem ducatur linea recta contingens ellipsim, quousque secet duas ad axim maiorem perpendiculares ab eius terminis ductas, erunt tales perpendiculares aequales portionibus conterminalibus ipsius axis vsque ad praedictum polum . f. 35.
- Secundum . Iisdem manentibus quolibet alia rec-

ta ad axim perpendicularis, vsque ad tangen-  
tem educta, equalis erit recte lineae ex polo duc-  
ta ad concursum sectionis, eiusdemque perpen-  
dicularis: vocetur illa radius polaris. f. 36.

Tertium. In ellipsi polarium radiorum incre-  
menta supra minimum radium eandem ha-  
bent rationem, quam sinus versi seu portiones  
axis maioris secti à perpendicularibus cadenti-  
bus à radiorum concursu cum ipsa sectione. f. 37.

Quartum. Si à duobus polis eiusdem ellipsis duo  
radij ducantur ad idem illius punctum excessus  
maioris radij supra radium mediocrem inter  
maximum, & minimum equalis erit defectui  
minoris radij ab eodem mediocri. f. 38.

Quintum. Si circa polos eiusdem ellipsis fiant  
duo circulares motus ab eodem gradu tardita-  
tis incipientes, ac in eorum altero velocitates  
eadem ratione increfant, qua radij polares  
augentur, in altero celeritates contrario ordi-  
ne augmentum sumant, hoc est quò magis po-  
lares radij decrefant, eò magis velocitates cre-  
fant, incrementa velocitatum erunt equalia  
ijsdem gradibus eadem periodo, equalibusque  
temporibus aueta. f. 39.

Sextum. Si duo mobilia in orbem lata circa duo  
centra moueri ceperint eodem tarditatis gra-  
du, ac temporibus equalibus gradus celeritatis  
acquirant equalis, alterum eadem proportio-  
ne, qua radij producuntur, alterum verò ea-  
dem proportione, qua radij producuntur, sint-  
que maximi radij equalis inter se, pariterque  
minimi inter se equalis, itinera ab eis descripta  
erunt omnino similia & equalia, ita vt si pri-  
mum ellipsim descripserit circa proprium po-  
lum secundam quoque ellipsim illi similem, &  
equalis delineabit. f. 40.

Septi.

**Septimum.** Si circa alterum polorum alicuius ellipsis mobile reuoluatur, eodemque tempore eius axis maior torqueatur circa eundem polum in eodem ellipsis plano, & versus easdem partes, ad quas fertur predictum mobile, linea à mobili descripta in vniuersi spatio ellipsis non erit, sed curua quædam inflexa ad instar Nodi.

f. 42.

**Octauum.** Si mobile iter describat ellipticum circa punctum aliquod tamquam polum, eiusque celeritas augeatur eadem ratione, qua decurtantur radij polares, deinde verò imminuatur eadem proportione, qua ijdem radij producantur, absoluatque periodus integra reuolutionis minori tempore, quam sit illa, quo peragitur incrementum, & decrementum predictorum radiorum, mobile in spatio mundo describet lineam quamdam curuam in se ipsam contortam ad instar Nodi, sed tamen apparebit translatum per ellipsim, non quidem fixam, sed mobilem circa eundem polum, ac versus easdem partes.

f. 43.

**Cap. XI.** Pronunciata seu principia philosophica apprimè necessaria ad intelligendas causas eccentricitatum orbium Mediceorum syderum, figureque elliptica ab eis descriptæ, relique motus in linea absidum eorumdem.

f. 45.

**Cap. XII.** De necessitate figure ellipticę orbium planetarum.

f. 74.

**Cap. XIII.** De causa motus absidis, & Apbelij orbis planetarij.

f. 81.

**Cap. XIV.** Medicea Sydera, dum Solem circumeunt, nouam acquirere anomalam.

f. 87.

**Cap. XV.** Lemmata necessaria ad intelligendam synodicam Mediceorum syderum anomalam.

f. 88.

**Primum.** Si motus aliquis retardatus fuerit eadem

dem

dem proportione, quia ipse continuatur fiet motus similis primo, licet tardior. f. 88.

Secundum. Si in circuli, seu ellipsis quadrante ducantur quilibet recta linea uni axium equidistantes, secantesque reliquum axim, efficiunt duo quadrilatera, quorum axi propinquus ad magis remotum maiorem habebit proportionem, quam basis illius ad brevius basim in reliquo axi sumptis. f. 89.

Tertium. Si idem mobile in aequalibus celeritatibus duas pertranseat aequales rectas lineas comprehensas a rectis lineis equidistantibus inter se, ad quas diversimode inclinentur, & per directiones rectarum intervalla parallelarum determinantium mobile retardetur secundum proportionem eorundem intervallorum, modificati motus similes erunt inalteratis motionibus. f. 91.

Quartum. Si mobile revolvatur per circumferentiam circuli, seu ellipsis  $AF$ , circa centrum  $L$ , ac simul centrum  $L$  cum suo circulo feratur in orbem circa centrum  $S$ , ac talis motus circa  $S$  tarditatem conferat motui per  $ABF$  secundum proportionem distantiarum  $AS, BS, CS, DS$ , &c. quousque in mediocri distantia  $SF$  mora penitus extinguatur; atque motum mora affectum per  $ABF$  similem, & uniformem esse priori motui absque ullo sensibili errore. f. 93.

Cap. XVI. De Mediceorum synodica anomalia, cum eorum absidum linea perpendicularis fuerit ad lineam synodum. f. 94.

Cap. XVII. De Mediceorum synodica anomalia, cum absidum, atque synodum linea sibi mutuo congruant. f. 103.

Cap. XVIII. De Mediceorum synodica anomalia, que in intermedia absidis constitutione contingit. f. 109.

Cap. XIX.

- Cap. XIX. De synodica anomalia perpetua Mediceorum,  
seu de nuncupata varietate. f. 112.
- Cap. XX. De causis inclinationem orbium Mediceorum su-  
pra planum eclipticæ iouialis. f. 119.
- Cap. XXI. De varietatibus synodicis latitudinum Mediceo-  
rum. f. 115.

## LIBRI SECUNDI CAPITA.

- Cap. I. Motus medios periodicos planetarum Mediceo-  
rum prius inuestigari debere. f. 129.
- Cap. II. Enarrantur difficultates, & ambages, quibus  
periodi mensuræ Mediceorum implicantur. f. 130.
- Cap. III. De Eclipsium Mediceorum varietate. f. 133.
- Cap. IV. Qua ratione Mediceorum digressiones à disco, vel  
corpore Iouis mensurari possint. f. 141.
- Cap. V. Quomodo linea absidis eccentrici Mediceorum  
reperiri possit. f. 149.
- Cap. VI. De varietate hypothesium, quibus latitudines  
Mediceorum, & earum periodi saluari possunt. f. 155.
- Cap. VII. Orbes Mediceorum non iacere in uno, & eodem  
no. f. 160.
- Cap. VIII. De varietatibus hætenus in Mediceorum lati-  
tudinibus obseruatis. f. 167.
- Cap. IX. Ex nostra hypothesi ex causis physicis deducta,  
phenomena iam enarrata latitudinum Medi-  
ceorum saluari posse. f. 170.
- Cap. X. Quomodo latitudines Mediceorum, atque eorum-  
dem periodi obseruari debeant, f. 175.



Imprimatur servatis servandis V. de Bardis V. Gen. Flor.

Die 26. Februarij 1666.

Adm Reu. Pater Lidanus Colanelli Societatis Iesu Consultor S. Officij Florentiæ videat, & referat.

*Fr. Iacobus Tosini de Castilione Florentino Vic. Gener. S. Officij Flor.*

1666. 2. Martij.

Ego Lidanus Colanellus Societatis Iesu Consultor S. Officij ex commissione Reuerendissimi P. Inquisitoris Florentiæ recognoui præsentibus duos Libros de Astronomia Ioannis Alphonsi Borelli, & nihil inueni, quod fidei Sanctæ Ecclesiæ Catholicæ, bonisque moribus repugnet.

Die 10. Martij 1666.

Stante prædicta attestazione Imprimatur Florentiæ.

*Fr. Antonius Maria Iordana à Cuneo pro Cancell. S. Officij Flor. de mandato, &c.*

Gio: Federighi Senatore, & Auditore di S. A. S.

Impressum in ...

Die 20. Februarj 1682.

Adm. Rca. P. ...

...

Die 10. März 1682.

...

Die 10. März 1682.


...

...

Gio: Fedrigli Seniore, & Auditor di S. A. S.


*Mendosa nonnulla, & quedam, que mutata post impressionem  
Auctor voluit, sic locis infra adnotatis restituere.*


Pag. vers.		Pag. vers.	
28	26 Telluris constitutione	88	25 pro ( sitque eius celeritas V )
30	18 harum revolutionum		leg. ( sed inequalibus cele-
	35 eiusdem ellipticam		ritatibus )
33	8 habeat autem	92	2 eodem curru
36	7 omittantur superuacanea ver-		23 est eadem
	ba ( & à centro G, &c. ) vs.	93	5 D S, &c.
	que ( in G )	105	35 maius erit
38	3 & G K parall.	115	17 hac de
	30 minimum S P.	120	31 facultatem
39	21 qua elongantur	125	7 varium situm
41	17 aio mobile	126	13 existant in
45	31 propè dixerim	131	33 locum Nouimediceï
47	36 pariter lignea	132	28 prolixius erit
50	13 Anomalijs	133	11 periodi menstrug
57	1 animaduertentes	134	31 cuius radij
68	31 ne altiùs demergatur	135	32 at quia, vt
70	9 quia moles	138	29 secundariam
	18 P T, C E, quæ		33 iouiali
72	25 incipiet mobile	141	20 quos Venus
75	9 Diuini.	143	1 meliorem &
78	12 & inescrutabiles	144	5 vigesima pars
	14 quam summo		22 sed aucta
	16 hac enim	156	11 semper sibi
79	16 incipiet	159	14 & C respectiuè
	17 progredietur	160	12 in eadem
80	18 eccentricitas	161	2 in eadem
84	12 à centris	171	29 sed potiùs




LIST OF THE CONTENTS

1	Introduction	1
2	Chapter I	15
3	Chapter II	35
4	Chapter III	55
5	Chapter IV	75
6	Chapter V	95
7	Chapter VI	115
8	Chapter VII	135
9	Chapter VIII	155
10	Chapter IX	175
11	Chapter X	195
12	Chapter XI	215
13	Chapter XII	235
14	Chapter XIII	255
15	Chapter XIV	275
16	Chapter XV	295
17	Chapter XVI	315
18	Chapter XVII	335
19	Chapter XVIII	355
20	Chapter XIX	375
21	Chapter XX	395
22	Chapter XXI	415
23	Chapter XXII	435
24	Chapter XXIII	455
25	Chapter XXIV	475
26	Chapter XXV	495
27	Chapter XXVI	515
28	Chapter XXVII	535
29	Chapter XXVIII	555
30	Chapter XXIX	575
31	Chapter XXX	595
32	Chapter XXXI	615
33	Chapter XXXII	635
34	Chapter XXXIII	655
35	Chapter XXXIV	675
36	Chapter XXXV	695
37	Chapter XXXVI	715
38	Chapter XXXVII	735
39	Chapter XXXVIII	755
40	Chapter XXXIX	775
41	Chapter XL	795
42	Chapter XLI	815
43	Chapter XLII	835
44	Chapter XLIII	855
45	Chapter XLIV	875
46	Chapter XLV	895
47	Chapter XLVI	915
48	Chapter XLVII	935
49	Chapter XLVIII	955
50	Chapter XLIX	975
51	Chapter L	995





VENETIA  
VENETO



VENETIA  
BIBLIOTECA

BIBLIOTECA